


ভাৰতৰ বনৰীয়া জন্তু



ভাৰতৰ বনৰীয়া জন্তু

শ্ৰীফটিক চন্দ্ৰ গগৈ



অসম প্ৰকাশন পৰিষদ

গুৱাহাটী-৭৮১০২১

BHARATAR BANARIA JANTU : An illustrated book on wild mammals of India in Assamese by Phatick Chandra Gogoi, and published by Laxmi Nath Tamuly IAS, Secretary, Publication Board Assam, Guwahati - 781 021, Assam, India.

Third edition December 2003

Price Rs. 170.00

অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ আগতীয়া লিখিত অনুমতি অবিহনে এই গ্ৰন্থ বা ইয়াৰ কোনো অংশ ফটোকপি, ৰেকৰ্ডিং আদিৰ দৰে কোনো ইলেক্ট্ৰনিক বা যান্ত্ৰিক উপায়েৰে অথবা কোনো তথ্য সংগ্ৰহ-পুনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালীৰে পুনৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব বা আন কোনো ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব।

No part or whole of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without the prior permission in writing from Publication Board Assam.

প্ৰকাশক
লক্ষ্মীনাথ ডামুলী আই এ এছ
সচিব
অসম প্ৰকাশন পৰিষদ
গুৱাহাটী ৭৮১ ০২১

প্ৰথম সংস্কৰণ : ১৯৬৬
দ্বিতীয় সংস্কৰণ : ডিছেম্বৰ ১৯৮৮
তৃতীয় সংস্কৰণ : ডিছেম্বৰ ২০০৩

মূল্য : ১৭০.০০ টকা

মুদ্ৰণ
ভৱানী অক্ৰেট এণ্ড ইমেইজিং চিটেম্ছ প্ৰাঃ লিঃ
ৰাজগড় ৰোড, গুৱাহাটী ৭৮১ ০০৭

ମନ୍ତ୍ରୀ-ଶ୍ରୀମତୀ ଦିବାଗା ମୈଶବ ହାତ-

ଦେଖକ

দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পাতনি

১৯৬৬ চনত গ্ৰন্থখনি প্ৰথম ছপা হোৱাৰ পিছত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু বিজ্ঞান সন্মত বিচালনা সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তুৰ আমূল পৰিবৰ্তন ঘটিছে। বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে বিগ্ন-জোৰা অভিযান আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ দেশতো সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত ১৯৫২ চনত “ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী পৰিষদ” আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ‘বন্যপ্ৰাণী উপদেষ্টা কমিটি’ আদি গঠিত হ’ল। ইংৰাজী আৰু ভাৰতীয় ভাষাসমূহত বহুতো পুথি-পাঁজি প্ৰকাশিত হ’ল। ইতিবধ্যে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বিষয়টোৱে চৰকাৰী ৰেচৰকাৰী পৰ্যায়ত সৰ্বভাৰতীয় মৰ্যাদা লাভ কৰিলে।

চূড়ান্ত পৰ্যায়ত বিগত ১৯৭২ খ্ৰীষ্টাব্দত সৰ্বভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী (সংৰক্ষণ) আইনখন সংসদত গৃহীত হোৱাৰ পিছত অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে অসমতো ১৯৭৬ চনত আইনখন প্ৰযোজ্য হয়।

এই সকলোবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত যথাযোগ্য গুৰুত্ব দি প্ৰথম সংস্কৰণৰ প্ৰতিটো প্ৰৱন্ধকে নতুন ৰূপত লিখি ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। তদুপৰি আগৰ সংস্কৰণত ঠাই নোপোৱা একাধিক প্ৰবন্ধ ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। পৰিশিষ্টত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য আৰু পক্ষীবিহাৰ বিলাকৰ এখন তালিকা সংযোগ কৰি সেই বিষয়ক কথা একে ঠাইতে খুপাই দিয়া হৈছে। ভাৰতৰ ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন গোত্ৰ বা পৰিয়ালৰ স্তন্যপায়ী জন্তুৰ জীৱনবৃত্তান্ত বৰ্ণনা কৰোঁতে পাৰিতপকে সূক্ষ্ম বিষয় বস্তুত আলোকপাত কৰি সামগ্ৰিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিষয় সামৰি লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

দ্বিতীয় সংস্কৰণো প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ বাবে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ। পৰিষদৰ সচিব শ্ৰীসতীশ ভট্টাচাৰ্য্যলৈ এই হেগতে ধন্যবাদ জনালোঁ। পৰিষদৰ সভাপতি তথা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীবৃন্দাবন গোস্বামী দেৱে গ্ৰন্থখনি প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগ ভাগ লোৱা বাবে লেখক তেখেতৰ ওচৰত চিৰ-কৃতজ্ঞ।

গ্ৰন্থত ব্যৱহাৰ কৰা আলোক চিত্ৰসমূহ যোগান দিয়া কাৰণে শ্ৰীভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ দে (শিলচৰ) শ্ৰীকৃষ্ণ মেচ (দিল্লী), শ্ৰীশিৱ গোস্বামী (গুৱাহাটী) আৰু অসমৰ প্ৰাক্তন বন সংৰক্ষক স্বৰ্গীয় হেমকান্ত বৈশ্যৰ ওচৰত লেখক কৃতজ্ঞ। ৰেখাচিত্ৰ আঁকি দি সহায় কৰা বাবে শ্ৰীবীৰেন্দ্ৰলাল ভৌমিকৰোঁ শলাগ ল’লোঁ।

১২৬ পৃষ্ঠাত ছপা হোৱা ‘গড়াল’ৰ বৈজ্ঞানিক নাম ‘বুদবকাচ টেকিকলৰ’ নহৈ ‘নেমৰহিষ্ণ গড়াল’ হ’ব লাগিছিল। তাৰ বাবে বিজ্ঞজনে যেন দায়-দোষ নৰবে।

প্ৰথম সংস্কৰণৰ পাতনি

বনৰীয়া জন্তু বুলিলে যদিও জনপ্ৰিয় ভাষাত উদ্ভিদক বাদ দি হাবিত বাস কৰা সকলো বিলাক প্ৰাণীকেই বুজায় তথাপি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শ্ৰেণীভুক্ত কৰি কেৱল স্তন্যপায়ী জন্তুসমূহৰ কথাহে এই কিতাপত উল্লেখ কৰা হৈছে।

প্ৰাণী জগতৰ ভিতৰত স্তন্যপায়ী জন্তুবিলাকৰ বিশেষত্ব এইয়ে যে ইহঁতে গৰ্ভত সন্তান ধাৰণ কৰি পোৱালি জন্মায় আৰু মাতৃ-স্তনৰ গাখীৰ খুৱাই এই পোৱালিবিলাকক ডাঙৰ দীঘল কৰে। ইহঁতৰ শৰীৰ নোমৰ আৱৰণেৰে আচ্ছাদিত। জন্তুভেদে এই নোমবিলাকৰ কপাস্তৰ পৰিলক্ষিত হয়। বনৰী বা কেমেটাই পহৰ গাত বৌমাছৰ দৰে বাকলি আছে, কেঁটেলা পহৰ নোমবিলাক আকৌ কাঁইটৰ দৰে ঠনুঙা। জলচৰ, স্থলচৰ, উভয়চৰ আৰু খেচৰ এই চাৰি প্ৰকাৰৰ স্তন্যপায়ী জন্তুৰ অৱস্থান ভিন্ ভিন্ পৰিৱেশত দেখা যায়। তিমিয়াছ, শিহু আদি জলচৰ জন্তু পানীত থাকে। বাঘ, হাতী, শিয়াল, হৰিণ আদি অসংখ্য জন্তুৱে পৃথিবীৰ স্থলভাগৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত বাস কৰে। এই স্থলচৰ জন্তুবিলাকৰ ভিতৰৰে নিগনি, কেঁটেলা আদি জন্তুৱে মাটিৰ তলত বঢ়িয়াকৈ গাত খান্দি উপযুক্ত সুৰক্ষা নিৰ্মাণ কৰি তাৰ ভিতৰতে অলপ আহল-বহল কোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰি বাস কৰে। কেৰ্কেটুৱা, বান্দৰ আদি জন্তুৱে আকৌ গছৰ ওপৰৰ ডাল-পাতত বিচৰণ কৰি কেতিয়াবাহে মাটিলৈ নামি আহে। নভচাৰী স্তন্যপায়ী জন্তুৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি বাদুলিয়ে চৰাইৰ দৰে শূন্যত উৰি দিক্-দিগন্ত পৰিব্ৰমণ কৰে। জনবায়ুৰ বিভিন্নতাৰ ফালৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখিবলৈ পোৱা যাব যে স্তন্যপায়ী জন্তু-বিলাকৰ বহুতে হিমালয়ৰ বৰফাচ্ছন্ন শৈলমালাৰ শীতমণ্ডলত বাস কৰে আৰু আন আন কিছুমানে মৰুভূমিৰ তপত বালিৰ শুকান ঠাইত বিচৰণ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে একে প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন জন্তুৱে জনবায়ু আৰু মাটি পানীৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত কৃতকাৰ্যতাৰে বাস কৰি পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাৰ লগত অতি সহজে খাপ খুৱাই বাস কৰিব পৰাৰ অদ্ভুত ক্ষমতাৰ পৰিচয় দিয়ে। গৰম তেজ থকা জন্তুৰ এই বিশিষ্ট গুণৰ অধিকাৰী হৈ মানৱ জাতিয়ে পৃথিবীৰ সকলো ঠাইতে বিভিন্ন জনবায়ুৰ লগত খাপ খাই বসতি বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

পৰিবেশ আৰু বনৰীয়া জন্তু

পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জন্তু-জগতৰ পৰিবেশৰ বিভিন্নতাক চাৰিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰা যায়। যেনে-দৈহিক পৰিবেশ, (Mechanical environment) ৰসায়নিক পৰিবেশ, (Chemical environment) প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ, (Physical environment) আৰু জীৱন্ত পৰিবেশ (Animate environments)

কোনো কোনো প্রজাতির জন্তুৰে নিজৰ দেহৰ বিভিন্ন গঠনৰ সহায়ত অনুভব গভীৰ তলিৰ অতিশয় ভয়াবহ পাবিপাশ্বিক অৱস্থাৰ সাক্ষাত ঘাস কৰি জীৱন ধাৰণ কৰিব পাৰে। এই অৱস্থাক দৈহিক পৰিৱেশ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰাচুৰ্য আৰু মাটিৰ বসায়নিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা আকৃষ্ট হৈ বহুতো প্রজাতিৰ জন্তুৰে এনে ধৰণৰ সূচল ঠাই বাসস্থানৰ বাবে বিচাৰি লয়। এই অৱস্থাক বসায়নিক পৰিৱেশ বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। হাতী, পহু আদি জন্তুৰে এই বসায়নিক পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ বহুতো সময়ত নিমখৰ পুং থকা ঠাইবিলাকত গোট খায়হি। পোহৰৰ পৰিমাণ আৰু শীত উষ্ণতাৰ তাৰতম্যৰ দ্বাৰা কিছুমান প্ৰাণী প্ৰভাৱান্বিত হয় বুলিব পাৰি। মানুহৰ সাহচৰ্য আৰু অগাধ্য জন্তুৰ সংস্পৰ্শৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈ নিবাসৰ বাবে নিদিষ্ট স্থান নিৰ্বাচন কৰি লোৱা অৱস্থাক জীৱন্ত পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হোৱা বুলি ক'ব পাৰি।

খাদ্য সামগ্ৰী আৰু দেহৰ গঠন

খাদ্য-সামগ্ৰীৰ বিভিন্নতা আৰু খাদ্য আহৰণৰ বিভিন্ন নিয়ম প্ৰণালীৰ ভিত্তিত বনৰীয়া জন্তুবিলাকক বেলেগ বেলেগ ভাগত শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পাৰি। যেনে মাংসা-হাৰী জন্তু, পতঙ্গ-ভোজী জন্তু, তৃণ-ভোজী জন্তু, দাঁতেৰে কুটিখোৱা জন্তু ইত্যাদি। খাদ্যৰ বিভিন্নতা আৰু বাসস্থানৰ নানা পৰিৱেশে ভিন্ ভিন্ জাতীয় জন্তুৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গৰ গঠন আৰু সঞ্চালনক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱান্বিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অভ্যুদয়ৰ পাছত জীৱ-জগত ক্ৰমোন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাওঁতে এই স্তন্যপায়ী জন্তু-বিলাকেই বিকাশৰ চৰম অৱস্থা লাভ কৰিছে। আনহাতে এই স্তন্যপায়ী জন্তুৰ অন্ত-ভুক্ত জীৱ শানৱ জাতিয়ে বুদ্ধি-বৃত্তিৰ চৰম পৰিণতি লাভ কৰি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জীৱ বুলি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। এই শ্ৰেষ্ঠতাৰ গুৰিতেই হ'ল মানুহৰ উৰ্বৰা মস্তিষ্ক, যাৰ দ্বাৰা মানুহ পৃথিৱীৰ একছত্ৰী অধিকাৰী হৈ সৌৰ জগতৰ মহাকাশ পৰ্যন্ত জয় কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব পাৰিছে। মানুহৰ পাছতে আন আন জাতিৰ জন্তুবিলাকৰ ভিন্ ভিন্ স্তৰত মস্তিষ্কৰ বিকাশ ঘটিছে। অপৰিপক্ক মগজুৰ অধিকাৰী হাতী, বাঘ, ভালুক আদি জন্তুৰে ভিন্ ভিন্ ধৰণৰ কাৰ্যৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন স্তৰত মগজু বিকাশৰ প্ৰমাণ কৰিছে।

বনৰীয়া জন্তু বিশেষৰ কাৰ্যকলাপ আৰু স্বভাৱ-চৰিত্ৰৰ লগত ইয়াৰ দেহৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গৰ গঠন আৰু উৎকৰ্ষ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ প্রজাতিৰ জন্তুৰ দাঁত বিলাকৰ গঠন আৰু আকাৰৰ তাৰতম্য বিশেষ ভাৱে লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। মাংসাহাৰী জন্তুবিলাকৰ দাঁতবিলাক সজবৃত আৰু অলীম শক্তি সম্পন্ন। আগদাঁতৰ দুয়োকাষে থকা দীঘল দাঁত দুটা জোঙা আৰু অতিশয় চোকা। এই শক্তি সম্পন্ন দাঁত দুটাই চিকাৰৰ জন্তুৰ গাত কাঁড়ৰ দৰে বিন্ধ কৰি তাক বধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গুৰি-দাঁত কেইটাৰে ই মাংসবোৰ টুকুৰা-টুকুৰ কৰি আৰু সৰু সৰু হাড়বিলাক, গুৰি কৰি ভাঙি খাব পাৰে। কেবটাই পহুৰ আকৌ দাঁতেই নাই। সেই কাৰণে ই পোক, পৰুৱা আদি খাদ্য সামগ্ৰী জিভাৰে চেলেকি বুৰৰ ভিতৰলৈ লি়ে। আনহাতে

ভিনি

হাতীৰ আগদাঁত দুটাই অস্বাভাৱিক ভাৱে বাঢ়ি গৈ অতিপাত দীঘল ৰূপ ধাৰণ কৰে। এই দাঁত দুটা হাতীয়ে প্ৰতিবন্ধকৰ সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে।

খোজ কঢ়া, গাঁত খন্দা, গছত উঠা, পানীত সাঁতোৰা, শূন্যত উৰি যোৱা আদি ভিন্ ভিন্ কাৰ্যৰ সূচনৰ বাবে জন্তু বিশেষৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু স্বভাৱৰ লগত সমন্বয় ঘটাই ইহঁতৰ ঠেঙৰ নখ বা খুৰাৰ গঠনে বিভিন্ন গঢ় লয়। কুকুৰ জাতীয় জন্তুৰ নখ সোনি যোৱা কাৰ্যৰ উপযোগী। বাদুলিৰ ঠেং দুটা আকৌ পাতল ছালৰ দ্বাৰা সংলগ্ন হোৱাত ই চৰাইৰ দৰে শূন্যত ভাহি উৰি যাব পাৰে। আনহাতে বান্দৰৰ হাত-ঠেং বিনাক এনে শৰণেৰে গঠিত যে ই সহজে গছত উঠি বগাই যাব পাৰে।

আত্মৰক্ষাৰ সজুলি

শৰীৰৰ উদ্ভাপ বন্ধা কৰাৰ বাবে প্ৰায়বিলাক বনৰীয়া জন্তুৰ গাত নোমৰ আৱৰণ আছে। অতিশয় শীতল হানী আক্ৰান্ত হোৱা বৰফেখান সৰীপৰাতী স্থানত বাস কৰা জন্তু কিছুমানৰ গাত গজা দীঘল নোমৰ আৱৰণৰ তলত উল সন্ধান কোমল আৰু চুটি নোমৰ আধাৰ থাকে। প্ৰাৰিপাশ্বিক অৱস্থাৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে বহুতো বনৰীয়া জন্তুৰ গাৰ নোমৰ আৱৰণে ভিন্ ভিন্ ৰূপত চিত্ৰ-বিচিত্ৰ আকাৰ ধাৰণ কৰে। এনে সমন্বয় আত্মৰক্ষামূলক হ'ব পাৰে নাইবা চিকাৰ কাৰ্যৰ সূচনৰ বাবে আক্ৰমণসূচকও হ'ব পাৰে। চেকীয়া-পতীয়া বাঘৰ গাত থকা দীঘলীয়া পট্টবিলাকে এই জন্তুটোক চিকাৰৰ জন্তুৱে সহজে চিনিব নোৱাৰাকৈ হাৰিত ৰূপ পাতি জোপ লৈ থাকিবলৈ সুবিধা দিয়ে। জহামাল আদি জন্তুৱে দেহৰ সমুখভাগ আৰু মুখৰ চিত্ৰ-বিচিত্ৰ আকৃতিৰ দ্বাৰা ভয়ঙ্কৰ ৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু শত্ৰুক আঁতৰ কৰাত সক্ষম হয়। মুখৰ ভয়ঙ্কৰ অঙ্গি-ভঙ্গি, অঙ্গ-সঞ্চালন, বিকট শব্দৰ উচ্চাৰণ আদি ভিন্ ভিন্ কাৰ্যৰ দ্বাৰা ভিন্ ভিন্ জন্তুৱে শত্ৰুক আঁতৰ কৰি আত্মৰক্ষাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। জহামাল জাতীয় জন্তুৱে আকৌ একটা গোন্ধৰ জুলীয়া পদাৰ্থ নিঃসৰণ কৰি শত্ৰুৰ পথবিহীন ঘটায় আৰু এনে সুযোগতে নিজে পলাই পত্ৰং দি আত্মৰক্ষা কৰে।

বৰ্তমান আৰু অতীত

ভাৰত উপমহাদেশত বসবাস কৰা ভিন্ ভিন্ ধৰণৰ বনৰীয়া স্তন্যপায়ী জন্তুৰ জাত-উপজাতৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা পাঁচশৰ কম নহ'ব। এই জন্তুবিলাকৰ বহুভাৱে বসতি বিস্তাৰ ইমান স্তম্ভৰ প্ৰসাৰী যে ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী দেশ আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তিব্বত, চীন, নেপাল, ব্ৰহ্মদেশ আৰু শ্ৰীলঙ্কাৰ বাদ দি এই জন্তুবিলাকৰ বাবে কেৱল ভাৰতত আছুতীয়া স্থান নিৰ্ণয় কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। বুৰঞ্জীয়ে হুকি নোপোৱা অতি পুৰণিকালত আজিৰ মধ্যভাৰতৰ পৰা কুমাৰিকা অন্তৰীপলৈ বিস্তৃতি লাভ কৰি থকা দাক্ষিণাত্যৰ মালভূমি অঞ্চল এটা স্বতন্ত্ৰ ৰীপ হৈ থকাৰ কথা জনা যায়। তাতোতকৈয়ো আগতীয়া কালছোৱাত এই ৰীপটো এসময়ত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ লগত লগ লাগি আছিল। পৰবৰ্তী সময়ত এই ৰীপ আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ বিস্তীৰ্ণ ভূভাগ অপভীৰ সমুদ্ৰৰ

খাদ্য সংলগ্ন আছিল। হিমালয় পৰ্বতমালা আৰু ত্ৰিমুখত মালভূমি তেতিয়াও গভীৰ সমুদ্ৰৰ গৰ্ভতে লুকাই আছিল। কোটি কোটি বছৰৰ পাছত যেতিয়া এই ঠাইবিলাক কোনো কাৰণবশতঃ ক্ৰমে বাম হৈ ভূগৰ্ভৰ ওপৰলৈ উঠি সূউচচ হিমালয় পৰ্বতমালাৰ সৃষ্টি হ'ল তেতিয়া ভাৰতভূমি আৰু মধ্য-এচিয়ান নাভৰ ব্যৱধান লুপ্ত হৈ বিৰাট এচিয়া মহাদেশৰ সৃষ্টি হ'ল। এই সংযোগৰ ফলত ভাৰত আৰু এচিয়া-ইউৰোপৰ বন্য-জন্তু-বিলাকৰ যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা বাঢ়িল। আজিৰ আধুনিক যুগত ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিবিলাক নানা প্ৰকাৰৰ বনৰীয়া জন্তু বাস কৰা দেখা যায় সেইবিলাকে প্ৰাক্ ঐতিহাসিক যুগৰ বিভিন্ন সময়ৰ জন্তুৰ যুগ-যুগান্তৰ সংঘাত অতিক্ৰম কৰি বাচি থকা প্ৰজাতিৰ শেষ চিহ্নহে মাত্ৰ। আনহাতে ভাৰতীয় উপ-মহাদেশত বাচি থকা আটাইবোৰ বন্য-জন্তুৰ পূৰ্ব-পুৰুষবিলাক কেৱল এই অঞ্চলৰে পলুৱা জন্তু নাছিল। পলুৱা জন্তুৰ বাহিৰে ইমানেই অহা মানয় দেশ, ইপিওপিয়া, ইউৰোপ আদি দেশ মহাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ জন্তুৰ ইয়াত সমাবেশ ঘটি সংমিশ্ৰণ হৈছে। সেই কাৰণে আজিৰ ভাৰত-ভূমিত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ জন্তু সন্মিলন-ক্ষেত্ৰ হৈ অপূৰ্ব সমাবেশ ঘটিছে।

আধুনিক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা

কোৱা ৰাহিয়া যে বনাঞ্চল আৰু বন্য-জন্তুৰ ভিতৰত ওতঃপ্ৰোত সঙ্গ জড়িত হৈ আছে। পানী নহ'লে নাচ জীয়াই থাকিব নোৱাৰা নিচিনাকৈ হাবি নহ'লে বহু জাতৰ বনৰীয়া জন্তু বাস কৰিব নোৱাৰে। জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি আৰু জনবসতিৰ বিস্তৃতি হোৱাৰ বাবে এই বন্য জন্তু বিলাকৰ বাসৰ উপযোগী স্থানৰ পৰিমাণ কমি আহিছে। ফলত কেইবাবিধ আপুৰুগীয়া জন্তু পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা ইতিমধ্যে চিৰদিনৰ বাবে বিলুপ্ত হ'ল আৰু আন কিছুমান নিশ্চিহ্ন হ'বৰ আশঙ্কাই দেখা দিছে। সেই কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত এই বনৰীয়া জীৱ-জন্তুবিলাক সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে দ্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ আলোচনাৰ বাবে ১৯৩৫ চনতে নাইনিতাল চহৰত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সন্মিলন আহ্বান কৰা হৈছিল। পৰবৰ্তী কেই বছৰ মানৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশত 'হেইলি নেথ্যনেল পাৰ্ক'ৰ প্ৰতিষ্ঠা ভাৰতৰ বনৰীয়া প্ৰাণী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই জাতীয় উদ্যান আজি "কৰবোৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান" বুলি প্ৰখ্যাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰ-পুঞ্জৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ লুপ্ত প্ৰায় জন্তুবিলাকৰ অণুসন্ধান হাতত লবৰ উদ্দেশ্যে এটি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞৰ প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই সময়ৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত বনৰীয়া প্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বিষয়টোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা লাভ কৰে আৰু এই দেশৰ বনাঞ্চলত বসবাস কৰা আপুৰুগীয়া আৰু লুপ্তমুখী জন্তুসমূহৰ শেষ সুহৃদলৈকে বাচি থকা জন্তুকেইটাক আটোম্‌টোকাকৈক ৰাখি পুনঃস্থাপন কৰিবলৈ সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে জাতীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষিত হয়।

বোম্বাইৰ "প্ৰাকৃতিক বুৰঞ্জী সমাজ" দ্বাৰা প্ৰচাৰিত আৰু প্ৰকাশিত আলোচনীখনত বনৰীয়া জীৱজন্তুৰ সংৰক্ষণ আৰু পৰিচালনাত নিষেধ ওষষ আৰোপ কৰা হয়। এই প্ৰাকৃতিক বুৰঞ্জী সমাজকে কেন্দ্ৰ কৰি বনপ্ৰেমী আৰু বন্য-প্ৰাণী প্ৰেমী চিন্তাশীল

ব্যক্তিগণৰ মাজত যি মনোভাৱ গঢ়ি উঠিল গিয়েই দেশত এটা নৱজাগৰণৰ সূত্ৰপাত কৰিলে।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সমৰ্পন লাভ কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগিল। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণে সংৰক্ষণৰ উপযোগী এখন বৃহৎ আৰু সৰ্বাঙ্গ সুন্দৰ আঁচনি প্ৰস্তুতিৰ বাবে উঠি পৰি লাগিল। ১৯৫১ চনত ভাৰত চৰকাৰে বন্য-প্ৰাণী সংস্থা গঠন কৰিলে। ১৯৫২ চনত মহীশূৰত বহা সৰ্বভাৰতীয় সন্মিলনত ভাৰতীয় বন্য-প্ৰাণী সংস্থা গঠন হ'ল। এই সংস্থাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্যসমূহ তলত দিয়া ধৰণেৰে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হ'ল।

(১) সদনৰ সমৰ্পন লাভৰ বাবে কাৰ্য্যকৰী পন্থা হাতত লৈ ঋতু পৰিৱৰ্ত্তন আৰু ভৌগোলিক অৱস্থান অনুযায়ী বন্য-প্ৰাণী বিশেষণ সংৰক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, কোনো কোনো প্ৰজাতিৰ আপুৰুগীয়া জন্তুক স্তবক্ষিত জন্তু বুলি ঘোষণা কৰা আৰু অনাবশ্যকীয় বা বিবেচনাহীন প্ৰাণীহত্যা সমূল্যে বন্ধ কৰিবৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা।

(২) ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসাদোদ্যান, অভয়াৰণ্য আৰু চিৰিয়াখানা প্ৰতিষ্ঠা কৰা।

(৩) প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাৰ লগত খাপ খুৱাই বন্য-প্ৰাণী-বিলাকক সংৰক্ষণ কৰি পৰিচালনা কৰাৰ বাবে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জনকৰা।

(৪) জীৱিত বন্য-প্ৰাণী, জন্তুৰ ছাল, নোম, পাখি আৰু অন্যান্য বনজাত দ্ৰব্যৰ বণ্ঠানি সম্পৰ্কে চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা।

(৫) দেহত আঘাত কৰি বা বিনা আঘাতত কংগ্ৰহ কৰা বনৰীয়া চৰাই আৰু বন্য-জন্তুবিলাকৰ প্ৰতি মানুহৰ নিষ্ঠুৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা।

(৬) বনৰীয়া প্ৰাণী সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত থকা ওপৰত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ যেই কোনো কাম হাতত লোৱা।

আমাৰ দেশত বন্য-জন্তু আৰু বনৰীয়া চৰাই আদিৰ সংৰক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা যে ইতিমধ্যে বিবেচনা কৰা হোৱা নাছিল এনে নহয়। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত খাদ্য জাতীয় জন্তু আৰু চৰাইবিলাকক চিকাৰীসকলে অনুমতি পত্ৰ লৈ চিকাৰ কৰি আঁৰ বাবেহে আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। কালক্ৰমত কোনো কোনো আপুৰুগীয়া বন্য-জন্তু বা চৰাইৰ সংখ্যা আশাতীত ভাৱে কমি অহাত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগীয়া হ'ল আৰু আগৰ মৃগয়াৰণ বিলাক বন্য-প্ৰাণী সংৰক্ষণৰ আছুতীয়া পৱিত্ৰ স্থানলৈ পৰিৱৰ্ত্তন কৰি "বন্য-প্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্য" বুলি অভিহিত কৰা হ'ল। এতেকে এই অভয়াৰণ্যবিলাক প্ৰকৃততে মৃগয়াৰণ নহয়। এইবিলাক বন্য-প্ৰাণীবিলাকৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰখা পৱিত্ৰ বনভূমিহে।

প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ভাৰতীয় বনৰীয়া জন্তুবিলাকৰ বিশদ বিৱৰণ থকা এখন সচিত্ৰ গ্ৰন্থ প্ৰণয়নৰ পৱিত্ৰ ইচ্ছা বহুত দিনৰ পৰাই আছিল। ভাৰতবৰ্ষ আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাছৰে থকা অন্যান্য দেশসমূহৰ ভিন্ ভিন্ পৰিৱেশত বাস কৰা নানা বিধৰ বিভিন্ন আকাৰৰ বনৰীয়া

অঙ্কবিলাকক সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ ভাৰতীয় সিংহ, গঁড় আদি বিচিত্ৰ ধৰণৰ লুপ্তমুখী জন্তুসমূহক পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা সমূলকৈ বিলুপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেশত যি প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে, সেই পৰিত্ৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্যৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি আমাৰ দেশৰ হাৰিত ৰাস কৰা বনৰীয়া হস্ত-পায়ী জন্তুবিলাকৰ বিৱৰণ আৰু জীৱন-বুৰঞ্জী থকা এই সচিত্ৰ কিতাপখন বাইজটেল আগ বঢ়োৱা হ'ল। উদ্দেশ্যৰ বহানতাই লিখকৰ অপৈণ হাতত লেখনীক আওকাণ কৰিছে। তেওঁলোকে কিতাপখনে বাইজৰ একেদি সৰম পোৱাৰ আশা বুকুত ৰাখিছে। সময়ৰ নাটনি, বিষয়ৰ জটিলতা আৰু অঙ্কবিলাকৰ জীৱন-বুৰঞ্জী অধ্যয়নৰ সুযোগ সুবিধাৰ অনাটন ইত্যাদি এশ এটা প্ৰতিবন্ধকৰ সন্মুখীন হৈ ১৯৫৭ চনতে যেতিয়া এই কিতাপখন লিখাৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ তেতিয়া এই দুঃসাহসিক প্ৰচেষ্টা যে এদিন ফলৱতী হ'ব সেই বিষয়ে সন্দেহ না আছিলোঁ। বনৰীয়া জন্তুবিলাকৰ নিৰ্ভুল পৰিচয় আৰু ছবি সংগ্ৰহ কৰোঁতে বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰৰ সহায় লোৱাৰ উপৰিও এই বিষয়ত অভিজ্ঞ থকা আৰু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ বহুবৰ্গৰ সহায় আৰু উপদেশ ল'ব লগীয়া হৈছিল।

অসমৰ ভূতপূৰ্ব চিনিয়ৰ কন্‌জাৰভেটৰ এণ্ডি, ডি ষ্ট্ৰেচি, অসমৰ মুখ্য বন-সংৰক্ষক এণ্ড প্ৰভাকৰ বৰুৱা, বন-সংৰক্ষক শ্ৰীৰবীৰমোহন দাস, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বন সম্ৰাটৰ বিষয়া এণ্ডেৰেজনাথ মিশ্ৰ, বোম্বে ৱেষ্ট প্ৰতিম সতীথ বন্ধু (সকল) এণ্ডলিভচন্দ্ৰ দাস, এণ্ডেৰেকান্ত বৈশ্য, শ্ৰীমূৰ্গাপ্ৰসাদ মেওগ, শ্ৰীমজয় দেৱৰব, শ্ৰীছাঁজুল ইচলাম আৰু এণ্ডেল, বিজ্ঞাৰ সম্বোধিত বুদ্ধি পৰামৰ্শ আৰু উদগনিৰ বাবে তেখেত সকললৈ বোম্বে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। লোক সভাৰ সদস্য শ্ৰীলীলাধৰ কটকী আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্য্য-নিৰ্বাহক সমিতিৰ অন্যতম সদস্য বন্ধুবৰ্গ শ্ৰীৰবীৰ কুমাৰ ৰাজখনিৰ ডাঙৰীয়াই যি উৎসাহ উদগনিৰে বোক এই কাৰ্যত অনুপ্রাণিত কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতসকললৈ বোম্বে হিয়া ভৰা প্ৰণাম আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিলোঁ। কাছাৰৰ বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী শ্ৰীৰীবেজলাল ভৌমিক আৰু আলোক চিত্ৰ-শিল্পী এণ্ডগোপেন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ (আলোচাৰ্য্য) একান্তিক আৰু স্বাৰ্থহীন সাহায্য আৰু উৎসাহ উদগনিৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওচৰত লিখক চিৰকৃতজ্ঞ থাকিব। আগ্ৰাৰ "বিশাল ভাৰত"ৰ সম্পাদক শ্ৰীৰাম শৰ্মাই আগ বঢ়োৱা বুদ্ধি পৰামৰ্শ আৰু উদগনিৰ বাবে তেখেতলৈও ধন্যবাদ আগ বঢ়ালোঁ। অসমৰ ৰাণ্যতানামা কৰি সাহিত্যিক আৰু প্ৰবীণ দেশনেতা ৰাণেশ্বৰ শ্ৰীলীলমণি ফুকন দেৱে অনুগ্ৰহ কৰি পাতনি লিখি দি কিতাপখনৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে তেখেতৰ ওচৰত লিখক কৃতজ্ঞতাৰ পালত আবদ্ধ থাকিল। সৰ্বশেষত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সম্পাদক শ্ৰীৰিণুনাবায়ণ শাস্ত্ৰীদেৱে কিতাপখনৰ নকল চাই প্ৰকাশৰ দায়িত্ব তাৰ গ্ৰহণ কৰি লিখকক কৃতজ্ঞতাৰ বাবে তেখেতলৈ বোম্বে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ। শ্ৰীমলোৰাম শইকীয়া আৰু এণ্ডেৰেকান্ত বৰাই গোট গোট আখৰেৰে পাণ্ডুলিপিখন লিখি প্ৰেছৰ উপযোগী কৰি দিয়াত তেওঁলোক দুয়োজনৰ শলাগ ল'লোঁ।

এই কিতাপখন সংকলন কৰা কাৰ্যৰ বাবে আৱশ্যকীয় সবল সংগ্ৰহ কৰোঁতে তলত নাম লিখা কিতাপবিলাকৰপৰা অকুঠ সহায় গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই শুযোগতে এই

সাঁও

কিতাপবিলাকৰ লিখক সকলকে। মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰিলোঁ।

১। দি বুক অৱ ইণ্ডিয়ান এনিমেলচ্

শ্ৰীএচ, এইচ, শ্বেটাৰ ডিবেক্টৰ,, প্ৰাকৃতিক বুৰঞ্জী সমাজ, বোম্বাই।

২। নেচাৰেল হিষ্টৰী

শ্ৰীটানচ্ টাটে বীগেন ডিবেক্টৰ, বৃটিছ প্ৰাকৃতিক বুৰঞ্জী সংগ্ৰহালয়, লণ্ডন।

৩। ভাৰতকে জঙ্গলী জীৱ

শ্ৰীৰাম শৰ্মা, সম্পাদক “বিশাখ ভাৰত”, আশ্ৰা।

৪। মেনেইজমেণ্ট অৱ ওয়াইল্ড লাইফ ইন্ ইণ্ডিয়া

শ্ৰীপি, ডি, ট্ৰেচি, ডিবেক্টৰ অৱ ফৰেষ্ট নাগাভূমি, কোছিম।

৫। ওয়াইল্ড লাইফ অৱ দি ওৱল্ড ----শ্ৰীবাৰটন আৰু অন্যান্য সকল, ইংলণ্ড।

৬। ওয়াইল্ড লাইফ অৱ ইণ্ডিয়া----শ্ৰীই, পি, জী, চিলং।

নগাঁও, অসম

ফটকচক্স গগৈ

১৩ মাৰ্চ, ১৯৬৫ চন

সৃষ্টিপ্ৰব

বিবৰ	পৃষ্ঠা
১। হাতীপোঠীৰ শ্ৰাবীৰোষ	১
২। এছিন্নাৰ হাতী	৫
৩। গঁড় জাতীৰ শ্ৰাবীৰিনাক	২২
৪। এটা বৰ্গ-পক্ষ ভাবতীৰ বৃহৎ গঁড়	২৫
৫। ঘোঁৰা, গাধা, জেবু ইত্যাদি	৩০
৬। ভাৰতৰ বনবীয়া গাধা	৩৩
৭। গৌড়ৰ, সেঠোন বা বনগৰ	৩৭
৮। চুঁহীৰ গৰু	৪৩
৯। বনবীয়া ব'হ	৪৬
১০। বনবীয়া ছাগলী	৫১
১১। হিমালয়ৰ খাৰ	৫৪
১২। মীলগিৰি খাৰ	৫৭
১৩। মাক-বাক	৫৯
১৪। আইবেক	৬২
১৫। ডাঙাল বা নীমাভেড়া	৬৫
১৬। উৰিয়াল, চাপু, বা কাঁড়াকী ভেড়া	৬৭
১৭। মৰল বা তিব্বতৰ বগলীয়া ভেড়া	৭০
১৮। হৰিণ গোষ্ঠীৰ শ্ৰাবী	৭৪
১৯। খন-পহু	৭৫
২০। বন হৰিণ	৭৯
২১। কুটুকী হৰিণ	৮২
২২। বন-শিঙীয়া হৰিণ বা চাভাই	৮৫
২৩। বগীয়া হৰিণ	৯০
২৪। দুগৰী পহু	৯৩
২৫। কাম্বীৰি হৰিণ বা হাকুল	৯৬
২৬। মিলগি হৰিণ	৯৯
২৭। কড়বী হৰিণ	১০২
২৮। এক্টোনোপ আৰু গেভেল জাতীৰ শ্ৰাবী	১০৫
২৯। কুকুৰাৰ বা ব্লেক্-বাক	১০৭

গুচী-পত্ৰ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০।	চাবিশিষ্টীয়া এণ্টেনলোপ বা চাঙ চিঙ্গা	১১০
৩১।	নীলগাই	১১৩
৩২।	চিন্কাৰা বা ভাবতীয়া	১১৬
৩৩।	ছাগলী এণ্টেনলোপ ফৈদৰ প্ৰাণীসমূহ	১২০
৩৪।	ছেবাও বা দেও-ছাগলী	১২২
৩৫।	গড়াল	১২৬
৩৬।	টাকিন	১২৮
৩৭।	গাহৰি ফৈদৰ প্ৰাণী	১৩১
৩৮।	নদ-গাহৰি	১৩২
৩৯।	বনৰীয়া গাহৰি	১৩৬
৪০।	দস্তহীন আৰু জিভাবে চেলেকি খোৱা জন্তু সমূহ	১৩৯
৪১।	কেমটাই পছ বা বনৰৌ	১৪০
৪২।	বাদুলি বিলুপ্ত	১৪৩
৪৩।	পতঙ্গভোজী প্ৰাণী	১৪৮
৪৪।	চিকা	১৫০
৪৫।	হেজহগ্ বা কেটেলা গাহৰি	১৫৪
৪৬।	উতনুয়া	১৫৫
৪৭।	শহা ফৈদৰ প্ৰাণীবিলাক	১৫৬
৪৮।	শহা পছ	১৫৮
৪৯।	দল খৰিয়া বা হিচু পিঙ্গ হোয়াৰ	১৬০
৫০।	দাঁতেৰে কুটি খোৱা ড'ল্‌বিলাক	১৬৩
৫১।	কেটেলা পছ	১৬৪
৫২।	সাব্‌বট্	১৬৮
৫৩।	কেৰ্কেটুৱা	১৭০
৫৪।	পিঠিত আঁচ থকা কেৰ্কেটুৱা	১৭৩
৫৫।	বৰ কেৰ্কেটুৱা	১৭৫
৫৬।	উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা বাৰশৰ, বা বাংকেপ	১৭৭
৫৭।	গিন্দিপিগ্	১৮০
৫৮।	এন্দুৰ আৰু নিগনি গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী সমূহ	১৮৩
৫৯।	কামুৰে কামুৰ বান্ধকা নিগনি	১৮৬
৬০।	কামুৰে কামুৰ বান্ধ কাৰু এন্দুৰ	১৮৮
৬১।	বীৰজৰিয়া কামুৰ	১৮৯
৬২।	কামুৰ বা বীৰজৰিয়া কামুৰ ফৈদৰ প্ৰাণী সমূহ	১৯২
৬৩।	কামুৰ	১৯৪

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৪। মেচেকা বা সৰু জহামাল	১৯৭
৬৫। তাড়িপোরা জহামাল	১৯৯
৬৬। পাহাৰী জহামাল	২০১
৬৭। ভালুক মেকুৰী বা বিনটুৰং	২০৩
৬৮। ফুটুকী জহামাল	২০৫
৬৯। মেকুৰী জাতীয় প্রাণীবিলাক	২০৮
৭০। ভান্ডতৰ সিংহ	২১১
৭১। ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ	২১৫
৭২। বগা বাঘ	২১৯
৭৩। নাহৰ ফুটুকী বাঘ	২২২
৭৪। ক'লা বাঘ	২২৫
৭৫। গোধা-ফুটুকী বাঘ	২২৭
৭৬। চিতা বাঘ	২৩১
৭৭। হিম-বাঘ	২৩৩
৭৮। বন-মেকুৰী বা ছেপা	২৩৭
৭৯। লতা-মাকড়ি	২৪০
৮০। সোণালী মেকুৰী	২৪৩
৮১। মার্ল কেট বা লতাকটুকী মেকুৰী	২৪৫
৮২। মাছুই মেকুৰী	২৪৭
৮৩। কাবাকাল বা চিগেগোচ	২৫০
৮৪। কুকুর গোষ্ঠীর অন্তর্বিলাক	২৫২
৮৫। বাং কুকুর	২৫৫
৮৬। কুকুর-মেচীয়া বাঘ	২৬০
৮৭। শিয়াল	২৬৩
৮৮। বাঘ-শিয়াল বা থেক-শিয়াল	২৬৮
৮৯। বঙা-শিয়াল	২৭৩
৯০। হায়েনা	২৭৭
৯১। ভালুক গোষ্ঠীর প্রাণীবিলাক	২৮১
৯২। মাটি-ভালুক সুখ বিষয়	২৮৫
৯৩। হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক	২৮৯
৯৪। হিমালয়ৰ বগা ভালুক	২৯৫
৯৫। মালয় ভালুক	২৯৮
৯৬। পাণ্ডা জাতীয় বিলাক	৩০২
৯৭। বঙা পাণ্ডা	৩০৪

সূচী-পত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮।	উদ্, উইয়েল. গৌবেলা প্রভৃতি ব্রহ্ম সমূহ	৩০৭
১৯।	উদ্	৩০৯
১০০।	সম্প্রদায়ীনা উদ্	৩১৫
১০১।	উইয়েল	৩১৭
১০২।	হগ্ বেলেদ বা গৌবেলা	৩২০
১০৩।	বাটেল বা হনি বেলেদ	৩২২
১০৪।	বিচ্ বা হৌন মার্টেন	৩২৬
১০৫।	হালধীয়া ডিঙিয়া মার্টেন	৩২৯
১০৬।	মার্বল বহুদ হেপা	৩৩২
১০৭।	নেউল ফৈদন প্রাণীসমূহ	৩৩৪
১০৮।	নেউল	৩৩৬
১০৯।	বান্দর গোষ্ঠীর প্রাণী সমূহ	৩৪০
১১০।	বৃক্ষাবোহী চিকা	৩৪৩
১১১।	মাজুকী বান্দর	৩৪৫
১১২।	মাহি মাজুকী বান্দর	৩৪৯
১১৩।	মামানথ বান্দর	৩৫২
১১৪।	অসমীয়া বান্দর	৩৫৬
১১৫।	সিংহ নেজীয়া বান্দর	৩৫৮
১১৬।	দক্ষিণ ভারতীয় বান্দর বা টুপী-মুরীয়া বান্দর	৩৬১
১১৭।	খব-নেজীয়া বান্দর	৩৬৩
১১৮।	গাহনি-নেজীয়া বান্দর	৩৬৬
১১৯।	হনুমান বান্দর বা লেসুৰ	৩৬৮
১২০।	টুপী-মুরীয়া হনুমান বান্দর	৩৭১
১২১।	সোণোরালী হনুমান বান্দর	৩৭৫
১২২।	নীলগিবি হনুমান	৩৮০
১২৩।	হলৌ বান্দর	৩৮৩
১২৪।	সমুদ্র বাসী স্থানীয় জন্তু সমূহ	৩৮৬
১২৫।	পরিশিষ্ট	৩৯৬
	১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দটেক প্রতিক্রিত ভারতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য বিলাকৰ বিষয়ে পুলমুলটেক জাণিব লগীয়া কথাবোৰ।	
১২৬।	অগণ্য নতুনটেক প্রতিক্রিত কৰা অভয়াৰণ্যবিলাকৰ পৰিপূৰক তালিকা।	

চিত্র পৰিচয়

১। জলদাপাৰা অভয়াবধ্যত চাবকুৰা এটা “একনুৰা” দাতাল হাতী	৪
২। বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ সপ্তাহ পালনৰ সময়ত শোভাযাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ কানৰণে পাছত এডাক বনৰীয়া হাতী	১০
৩। কাৰ্ণাটকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চৰি-কুৰা এটা বনৰীয়া হাতী	১৯
৪। কাৰ্ণাটকৰ হানিত চৰি-কুৰা এটা পৰ্শধাৰী বৃহৎ ভাৰতীয় গড়	২৬
৫। এটা ভাৰতীয় বনৰীয়া গাধা	৩২
৬। গৌড়ৰ বা বনগৰ	৩৮
৭। আৰু-বচীয়া মেৰ্চান্টল মাল-পোহালি	৪১
৮। হিমালয় শৈলমালা নিবাসী চুঁৱৰী-গৰু	৪৪
৯। বনৰীয়া ছাগলী	৫২
১০। হিমালয়ৰ পান	৫৪
১১। নীলগিৰি পান	৫৭
১২। মানখৰ	৫৯
১৩। আইবেক্স	৬৩
১৪। ভাউল বা নীলা ভেড়া	৬৪
১৫। উৰিয়াল বা চাপু	৬৮
১৬। নয়ন বা ত্ৰিৰূপৰ বনৰীয়া ভেড়া	৭০
১৭। শৰ-পহু	৭৬
১৮। দল-হৰিণ	৮০
১৯। ফুটুকী-হৰিণ	৮৩
২০। ধনু-শিঙীয়া হৰিণ বা চাড়াই	৮৫
২১। এটা কম বয়সীয়া খসিয়া হৰিণ	৯১
২২। মুগৰী পহু	৯৪
২৩। কাম্বীৰি হৰিণ বা হাঙ্গল	৯৭
২৪। এটা নিগনি হৰিণে সাৱধানভাৱে শঙ্কৰ গতি-বিধি লক্ষ্য কৰিছে	১০০
২৫। কস্তুৰী-হৰিণ	১০৩
২৬। কৃষ্ণাৰ বা ব্লেক্ বাক্	১০৭
২৭। চাৰি শিঙীয়া এণ্টেলোপ বা চাওচিকা	১১১
২৮। নীলগাই	১১৪
২৯। চিন্‌কাৰা বা ভাৰতীয় গেজেল	১১৭
৩০। ছেৰাও বা পেণ্ড-ছাগলী	১২৩

চিত্র-পৰিচয়

৩১। গড়াল	১২৭
৩২। টাকিন	১২৯
৩৩। নল-গাহৰি	১৩৩
৩৪। বনলীয়া গাহৰি	১৩৭
৩৫। কেয়াটাই পত্ৰ বা বগবো	১৪১
৩৬। চুঙা বাদুলি	১৪৫
৩৭। বৰ বাদুলি	১৪৬
৩৮। গাটাত বগুয়া চিকা	১৫১
৩৯। গছত বগাই ফুৰা চিকা	১৫২
৪০। ছেজ্‌হগ বা কেটেনা গাহৰি	১৫৪
৪১। শহা পত্ৰ	১৫৯
৪২। দল পাঁচৰা বা ছিচ্-পিচ্ হেমান	১৬১
৪৩। কেটেনা	১৬৬
৪৪। মাৰ্‌মট্	১৬৯
৪৫। কেৰ্কেটুৱা	১৭১
৪৬। পিঠিত আঁট থকা কেৰ্কেটুৱা	১৭৪
৪৭। বৰ কেৰ্কেটুৱা	১৭৬
৪৮। উৰলীয়া কেৰ্কেটুৱা, বাবশৰ বা বাংকেপ	১৭৮
৪৯। গিনিপিগ্	১৮১
৫০। পপাবত বাস কৰা এন্দুৰ	১৮৪
৫১। মানুহৰ দৰত বাস কৰা নিগনি	১৮৬
৫২। বাঁহ-বাৰীয়া এন্দুৰ	১৯০
৫৩। জহামাল	১৯৫
৫৪। তাড়ি খোৱা জহামাল	২০০
৫৫। পাহাৰী জহামাল	২০২
৫৬। ভালুক বেকুৰী বা ৰিষ্টবং	২০৪
৫৭। কুটুকী জহামাল	২০৬
৫৮। ভাৰতৰ সিংহ	২১২
৫৯। চেকীয়া-পতীয়া বাঘ	২১৬
৬০। বগা বাঘ	২২০
৬১। নাহৰ ফুটুকী বাঘ	২২৩
৬২। ক'লা বাঘ	২২৬
৬৩। গোখা-কুটুকী বাঘ	২২৮
৬৪। চিত্তা বাঘ	২৩১
৬৫। হিম বাঘ	২৩৪
৬৬। বন বেকুৰী বা হেপা	২৩৮

৬৭।	নভা মাকৰি	২৪১
৬৮।	গোণালী মেকুৰী	২৪৮
৬৯।	নভা-কুটুকী মেকুৰী	২৪৬
৭০।	মাছুৱৈ মেকুৰী	২৪৮
৭১।	কাৰাকান	২৫০
৭২।	বাং কুকুৰ	২৫৭
৭৩।	কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ	২৬০
৭৪।	শিয়াল	২৬৩
৭৫।	ৰাম-শিয়াল বা খেক-শিয়াল	২৬৮
৭৬।	বঙা-শিয়াল	২৭৩
৭৭।	হায়েনা	২৭৭
৭৮।	মাটি-ভালুক	২৮৫
৭৯।	গছ-ভালুক বা হিৰানয়ৰ কদা-ভালুক	২৮৯
৮০।	হিৰানয়ৰ মুগা-ভালুক	২৯৫
৮১।	মানয়-ভালুক	২৯৮
৮২।	বঙা-পাণ্ডা	৩০৪
৮৩।	উদ্	৩১০
৮৪।	সৰু-নখীয়া উদ্	৩১৫
৮৫।	উইজেল	৩১৮
৮৬।	হগ্ বেজাৰ বা গেবেলা	৩২১
৮৭।	বাটেল বা হলি বেজাৰ	৩২৩
৮৮।	বিচ্ বা দৌল মাটেল	৩২৭
৮৯।	হালধীয়া ডিঙীয়া মাটেল	৩৩০
৯০।	মাৰ্বল বঙৰ ছেপা	৩৩৩
৯১।	নেউল	৩৩৭
৯২।	নাছকী বান্দৰ	৩৪৬
৯৩।	নাছি নাছকী বান্দৰ	৩৫০
৯৪।	সাধাৰণ বান্দৰ	৩৫৩
৯৫।	অসৰীয়া বান্দৰ	৩৫৭
৯৬।	সিংহ নেজীয়া বান্দৰ	৩৫৯
৯৭।	টুপী বুৰীয়া বান্দৰ	৩৬২
৯৮।	খৰা নেজীয়া বান্দৰ	৩৬৪
৯৯।	পাহৰি নেজীয়া বান্দৰ	৩৬৭
১০০।	হনুমান বান্দৰ	৩৬৯
১০১।	টুপী বুৰীয়া হনুমান	৩৭২
১০২।	গোণোৱালী হনুমান বান্দৰ	৩৭৬
১০৩।	নীলগিৰি হনুমান	৩৮১
১০৪।	হলৌ বান্দৰ	৩৮৪
১০৫।	স্মাৰ্ভ হোৱেল	৩৮৮
১০৬।	ব্লু-হোৱেল	৩৯২
১০৭।	ডলফিন	৩৯৪



হাতী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰ

হাতী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰক মহাদেৱীয়া নামৰ এটা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সন্মুখৰ কান্দে আৰু মূৰৰ আকৃতিৰে তেওঁৰ নামৰ প্ৰিয়তাৰ বাবে এইবিলাক প্ৰাণীৰ বাবে প্ৰযোচ্য হিচাপে নামৰ বিশেষ শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। বৰ্তমান যুগত গোটেই পৃথিৱীখনত কেৱল দুই শকাব্দৰ হাতী বান্ধা আছে। এছিয়া মহাদেশখনৰ অন্তৰ্গত ১৩ খন দেশত কম-বেছি পৰিমাণে সিহঁত হাতী বান্ধা কৰে সেই বিধক সংক্ষেপতে এছিয়া মহাদেশীয় হাতী বা এছিয়াৰ হাতী আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰা হাতীক আফ্ৰিকা মহাদেশীয় হাতী বা আফ্ৰিকাৰ হাতী নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। পৃথিৱীৰ আন কোনো মহাদেশত হাতী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী স্বাভাৱিক পৰিবেশত বাস কৰা দেখা নাযায়। এই দুবিধ হাতী জাতীয় প্ৰাণীক ক্ৰমে এফ্ৰিকাৰ স্লেভিয়াছ আৰু ইণ্ডোচাইয়া আফ্ৰিকানা নামেৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নামকৰণ কৰা হৈছে। এই দুয়োবিধ হাতীকে একেলগে সামৰি লৈ এনিকেন্টিদি নামৰ এটা কুল বা পৰিয়ালত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই দুবিধ হাতীৰ বাহিৰে আফ্ৰিকা মহাদেশত আন এবিধ স্তন্য প্ৰসূ আকাৰৰ হাতী বাস কৰাৰ কথা জনা যায়। সেই উপ-প্ৰজাতিৰ হাতীবিলাকক ইণ্ডোচাইয়া আফ্ৰিকানা চাইলোট্টিচ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়।

অতীততে এছিয়া মহাদেশৰ হাইবেৰীয়া অঞ্চলত আন এবিধ হাতী গোষ্ঠীৰ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰিছিল। সেই বিধ প্ৰাণীক মেগা নামেৰে জনা যায়। আজিকালি বাস কৰা এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশ দুখনৰ হাতীতকৈ এই বিধ হাতী আকাৰত ডাঙৰ আছিল আৰু ইয়াৰ গাত লীখন লোমৰ আৱৰণ আছিল। এই বিধ হাতী জাতীয় প্ৰাণী আজিকালি পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল। আজিৰ পৰা বহুত দিনৰ আগতেই এই বিধ প্ৰাণী পৃথিৱীৰ পৰা লোপ পালে। এইবিধ প্ৰাণীৰ প্ৰতিটোৰেই নাইকিয়া হোৱাৰ প্ৰত্যেকটোৰেই বাহিৰে বাকী সকলোৰে জীৱনৰ বাবে এই হাতীৰ প্ৰাণী আনতে পৃথিৱীত বাস কৰি থকাৰ প্ৰমাণ উলিয়াব পাৰিছে। আনখন উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াৰ নামৰ এবিধ হাতী এনেদৰে বাস কৰিছিল। সেইবিধ হাতীৰ ইতিহাস

পৃথিৱীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল। আনৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত ঐৰাত নামৰ আন এবিধ বিচিত্ৰ হাতীৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ প্ৰমাণ আছে। এই বিধ প্ৰাণী প্ৰকৃততে পৃথিৱীত বাস কৰিছিল নে নাই সেই বিষয়ে ভালদৰে জনা নাযায়। স্বৰ্গৰ অধিপতি ইন্দ্ৰই ঐৰাতক বাহন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা জনা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰ পৰা বিবেচনা কৰি চালে ঐৰাত নামৰ হাতীক কাল্পনিক বুলি গণ্য কৰিব পাৰি।

এছিয়াৰ হাতী আৰু আফ্ৰিকাৰ হাতীৰ দেহত প্ৰতিকলিত হোৱা কিছুমান শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাগুণত ভিন ভিন ৰূপ বিকশিত হোৱা দেখা যায়। দুয়োবিধ প্ৰাণীৰ দেহত কুঠি উঠা গুণাগুণৰ পাৰ্থক্যৰ বাবে এবিধৰ পৰা আন বিধৰ বিসদৃশ কাল্পনিক কৰিবলৈ সিহঁতৰ জেনেটিক আৰু শ্বেটিকিক নামত ভিন্ন ৰূপ দিবলগীয়া হৈছে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আফ্ৰিকাৰ হাতীৰ জেনেটিক নাম লজ্জাদন্তা আৰু এছিয়াৰ হাতীৰ জেনেটিক নাম এলিকাচ দিয়া হৈছে। এছিয়া মহাদেশৰ অন্তৰ্গত ১৩ বন দেশত বিবিধ হাতী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায় সেই একে বিধ হাতীয়েই ভাৰত উপ-মহাদেশখনৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ ভিন ভিন পৰিবেশত বাস কৰি আহিছে। অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য কেইখনতো এই বিধ হাতীয়েই প্ৰতি-নিবিধ কৰিছে। ইয়াৰ বিচৰণ ভূমি দক্ষিণৰ ফালে শ্ৰীলঙ্কালৈ সংপ্ৰসাৰিত হৈছে। এছিয়া মহাদেশৰ পূব আৰু দক্ষিণ-পূবৰ ফালে থকা দেশসমূহৰ ভিতৰত বাংলা দেশ, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়ালিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, থাইলেণ্ড, চীন, ভূটান, নেপাল আদিৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বসতি বিস্তাৰ কৰি থকা হাতীবিলাকক আঞ্চলিক ভিত্তিত তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায়। এই তিনিটা অঞ্চলক ক্ৰমে পূৰ্বাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল আৰু দক্ষিণাঞ্চল নামেৰে অভিহিত কৰিব পাৰি। পশ্চিম বঙ্গ, অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নগালেণ্ড, মেঘালয়, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম পূৰ্বাঞ্চলৰ হাতী অধ্যুষিত এলেকাত পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে চিকিৰত কোনো হাতী বাস কৰাৰ প্ৰমাণ পোৱা নাযায়।

অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকোনো ৰাজ্যত এছিয়া মহাদেশীয় হাতী বাস কৰে সেই হাতীবিলাকৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাগুণৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইত বাস কৰা হাতীৰ গুণাগুণৰ বিশেষ পাৰ্থক্য আছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। অৱশ্যে অঞ্চল অনুযায়ী বহু হাতীবিলাকৰ ৰাজত থকা দাঁতাল আৰু বৰনা হাতীৰ অনুপাতত লেখত ল'বলগীয়া পাৰ্থক্য বিকশিত হোৱা দেখা যায়। অসমত আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ আন আটাইকেইখন ৰাজ্যত বিবিধ হাতী বাস কৰে সিহঁতৰ ৰাজ্যবিলাকৰ শক্তকৰা দ্বাৰা পৰ্য্যটন ভাগ দাঁতাল আৰু বাকী পৰ্য্যটন ভাগ বৰনা হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বিহাৰৰ পানানৌ অভয়াৰণ্যত যিকোনো হাতী বলুৱাভাৱে বাস কৰি আছে সেইবিলাকৰ ৰাজত কোনো দাঁতাল হাতী থকা দেখা নাযায়। ঠিক সেইদৰে ভালৰা অভয়াৰণ্যত বাস কৰা হাতীবিলাকৰ ৰাজতে দাঁতাল হাতীৰ সংখ্যা তেনেই নগণ্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। 'চিমলি পাল' অভয়াৰণ্য নামৰ উৰিষ্যাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত বাস কৰা হাতীবিলাকৰ সবৰতাপেই দাঁতাল বুলি জনা যায়। সকলোবিলাক কেন্দ্ৰতে দেখা যায়

যে নাইকী হাতীৰ কোনো দাঁত নাথাকে। এই সঙ্গৰ্কত দাঁত মানে বাহিৰলৈ ওলাই অহা ডাঙৰ আকাৰৰ দাঁতৰ কথা বুজিব লাগিব। এটা দাঁত থকা হাতীক সাধাৰণতে গণেশ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। মধ্য আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ হাতী অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকত গণেশৰ উৎপত্তি তেনেই সামান্য।

দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্ণাটক, তামিল নাডু আদি ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত যিমানবিলাক এছিয়া মহাদেশীয় হাতী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবিলাকৰ আটাইবোৰ মতা হাতীকে দতাল হোৱা দেখা যায়। আনহাতে শ্ৰীলঙ্কাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা হাতীবিলাকৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহা দাঁত নাথাকে। বাংলাদেশৰ দক্ষিণ-পূব অঞ্চলত থকা চিটাং-জিনাত টেক-বাখ নামৰ যিটো উপদ্বীপ আছে সেই উপদ্বীপতো এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ হাতী বাস কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এইবিলাক হাতীৰ ক্ষেত্ৰত মথনা আৰু দঁতাল হাতীৰ পৰিমাণ যোটাটিভাৱে সমান সমান হোৱা দেখা যায়। আঞ্চলিক ভিত্তিত দঁতাল হাতীক মথনা হাতীৰ আনুপাতিক ব্যৱধান থকাৰ বহুত্ব স্পষ্টভাৱে বুজা নাযায়।

আফ্ৰিকাৰ হাতীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এই ভাৰত হাতীৰ মতা আৰু নাইকী উভয়েৰে বাহিৰলৈ ওলাই অহা এবোকা এবোকা দাঁত থাকে। এইবিলাক হাতী এছিয়াৰ হাতীবিলাকৰ দৰে নোদোকা আৰু মোটা নহয়। আফ্ৰিকাৰ হাতীৰ গাটো পাতলীয়া হয় আৰু সেই অনুপাতে ইহঁতৰ ঠেং কেইখনো দীঘল চানেকীয়া হোৱা দেখা যায়। প্ৰকাণ্ড কাণ দুখনেৰে সৈতে এই ভাৰত হাতীক একো একোটা দৈত্যৰ নিচিনা দেখি। এই বিধ হাতীক ভাৰতীয় বা এছিয়াৰ হাতীৰ দৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰি কামত নিয়োগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ইয়াৰ ঠেং চাৰিখন এছিয়াৰ হাতীৰ ঠেঙৰ দৰে মডহাল আৰু নিপোতল নহয়। আফ্ৰিকা মহাদেশখনৰ হাবি-বননিত এই বিধ হাতী আকে আকে বিচৰণ কৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পূব আফ্ৰিকাৰ কানো থকা চেৰেংকোট নেচেনেল পাৰ্কৰদৰে কেন্দ্ৰ কৰি আফ্ৰিকা মহাদেশখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠিত বনাঞ্চলবিলাকত বহুতো সংখ্যক আফ্ৰিকাৰ হাতীয়ে আক বাছি বাছি বাস কৰে। সেইখন মহাদেশত বাস কৰা হাতীই মানৱ জন্ম-জাতীয় মানুহ কিছুবানে চিকাৰ কৰি বনৰীয়া হাতী ৰখ কৰে আৰু এই বিধ প্ৰাণীৰ মাংস খাই পৰস তৃপ্তি লাভ কৰে। বৰ্তমান অৱস্থাত আফ্ৰিকা মহাদেশত সৰ্বমুঠ প্ৰায় তিনি লাখ হাতী জীৱিত অৱস্থাত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে অভিন্নত প্ৰকাশ কৰে।

এছিয়াৰ হাতীৰ কিছুমান মতাৰ কাণৰ তলৰ কোমল অংশৰ পৰা এবিধ জুলীয়া পদাৰ্থ বাহিৰ হয়। এই সময়ত জন্তুটোৱে পুগলাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰি উদগু হৈ পৰে। এই অৱস্থাক আমাৰ অসবীয়া মানুহে ভাটি খোলা বুলি কয়। ভাটি খোলা হাতীৰ অন্যতম লক্ষণ হ'ল যে সেই সময়ত ই নাইকী হাতীৰ সজ বিচাৰি হাবাখুৰি খাই খুৰি ফুৰে। বৰচীয়া হাতীৰ গাটলৈ ভাটি খোলাৰ অৱস্থা আহি পালে বাউড, কান্দী আৰু বাঁচিয়ে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি সময় কটাবলগীয়া হৈ পৰে। বনৰীয়া ভাটি খোলা হাতীয়ে অকলশৰীয়া জীৱন যাপন কৰে। আফ্ৰিকা

মহাদেশীয় হাতীবোৰেও ডাটি খোলাৰ চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে। আনহাতে দেখা যায় যে বয়ল আৰু মজা, বাইকী হাতীৰ কোনো ভেদাভেদ নৰখটকৈয়ে বহুৰ যি কোনো সময়ত আফ্ৰিকাৰ হাতীৰ কুৰ পৰা জুলীয়া পদাৰ্থ নিঃসৰণ হৈ থাকে। এইদৰে কুৰ পৰা ওলাই অহা বসে আফ্ৰিকাৰ হাতীৰ ক্ষেত্ৰত সঙ্গৰ সময় আহি পোৱাৰ ইঙ্গিত দিয়া দেখা নাযায়।



জলপানৰ অন্তিমভাগত চৰিকুৰা এটা একনুৰা দাঁতাল হাতী

পৰৱৰ্তী প্ৰবন্ধৰ অধীনতে এছিয়াৰ হাতীৰ বিষয়ে আনিবলগীয়া বাঙালী কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে।

এছিয়াৰ হাতী

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—থৰোচেটমিয়া

কুল—এলিফেণ্টিডি

প্ৰজাতি—এলিফাচ মেছিয়াচ

এছিয়া মহাদেশীয় হাতী আৰু আফ্ৰিকাৰ হাতীৰ মাজত যিবোৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক ব্যৱধান আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আগৰ প্ৰবন্ধৰ যোগেদি উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ চানিসীমান অন্তৰ্গত যিবিলাক হাতী বৰলীয়া অৱস্থাত বাস কৰি আহিছে সেই আটাইবিলাককে ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্ট বা ভাৰতীয় হাতী নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। কিন্তু এই বিধ বিচিত্ৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বাসস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি এছিয়া মহাদেশখনৰ কেইবাখনো দেশত; সংপ্ৰসাৰিত হৈছে। তদুপৰি পৃথিৱীৰ অন্য কোনো মহাদেশত এই বিধ হাতী বৰলীয়া অৱস্থাত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে বহুল দৃষ্টিভঙ্গীৰ ফালৰ পৰা বিবেচনা কৰি চাই আমাৰ দেশত বাস কৰা হাতীবিলাকক এছিয়ান হাতী নামেৰে নামকৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণৰ ফালে অৱস্থিত শ্ৰীলঙ্কাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূব আৰু দক্ষিণ-পূব ফালে নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, ব্ৰহ্মদেশ, ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়ছিয়া, থাইলেণ্ড, চীনদেশ প্ৰভৃতি বহুতো দেশত এই বিধ হাতীৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান বিয়পি আছে। অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ হাতীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে। পিয়ল কাৰ্য সম্পাদনৰ জৰিয়তে এই হাতীবিলাকৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা আৰু সিহঁতৰ মাজত থকা মতা, মাইকী আৰু পোৱালিৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত অৱস্থিত বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাককে আৰম্ভ কৰি এছিয়া মহাদেশৰ অন্যান্য হাতী অধ্যুষিত দেশবিলাকে পিয়লৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। বেংগালৰ দক্ষিণ-পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত বন্যাকাৰাৰ নামৰ বিখ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই বনভূমিত যোৱা ১৯৮১ চনতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে জৰিপ আৰু গণনাৰ জৰিয়তে বৰলীয়া হাতীৰ স্থিতিৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছিল। এই পিয়লৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ'ল যে প্ৰায় ৫০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাহি সামৰি ৰখা বেংগালৰ এই বনভূমিত সৰ্বমুঠ ৮৬০ টা হাতী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে বাস কৰিছে। জনবসতিৰ পৰিমাণ কম হোৱা বাবে এইবিলাক হাতীয়ে বিলাকটাই ইয়াত বিচৰণ কৰি কুৱিবলৈ সুবিধা হৈছে। হাবিত নিজে নিজে উপপত্তি হোৱা খাদ্যোপ-যোগ্য উদ্ভিদবিলাকে ইহঁতৰ বাবে খাদ্য-সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰিছে। ইহঁতবোৰৰ মাজত

দৰ্ভাল, বধনা, চাৰিণ আৰু বিভিন্ন বয়সৰ পোৱালি হাতী আছে। বেলেগ বেলেগ বয়সৰ হাতীৰ সংখ্যা, উৎপাদনৰ বয়সৰ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাইকী হাতীৰ পৰিমাণ আৰু কম বয়সীয়া পোৱালি হাতীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰাটো এই পিয়ল কাৰ্যৰ অন্যতম উদ্দেশ্য আছিল। উৎপাদনৰ ক্ষমতা থকা বয়সৰ অধিক সংখ্যক হাতী থকা অৱস্থাই ভৱিষ্যতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ইঙ্গিত দিয়ে। ঠিক সেইদৰে অধিক সংখ্যক পোৱালি হাতী থকা পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমে সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰে। সময় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কোনো এবিধ বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বা কমি যোৱাটো প্ৰকৃতিৰ চিৰন্তন ৰীতি। নৱা নুটুটাকৈ একে অৱস্থাতে থকা অৱস্থাটোৱে অপৰিবৰ্তিত সংখ্যাৰ অৱস্থা প্ৰতিপন্ন কৰে। সংখ্যাৰ সঙ্কোচন ঘটোৱা বন্যপ্ৰাণী পৰিচালকসকলৰ বাবে কান্ধ্য নহয়।

অনুকূল পৰিবেশৰ সন্নিবিষ্ট এলেকাই কিমান পৰিমাণৰ সৰ্বাধিক জন্তু ধাৰণ কৰিব পাৰিব সেই তথ্য জন্তু অনুযায়ী আগতীয়াকৈ নিৰ্ণয় কৰি ল'ব পাৰিলে পৰিচালনা ব্যৱস্থাত নিখুঁত ৰূপ দিব পাৰি। বন্যপ্ৰাণী পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ এই চৰম পৰ্যায়ক ধাৰণ ক্ষমতা বৃদ্ধি অভিহিত কৰা হয়। অনুকূল পৰিবেশৰ বিভিন্ন অৱস্থাই ধাৰণ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা বিষয়ত পোনপটীয়াভাৱে সহায় কৰে। খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰচুৰতা, অভাৱাৱস্থা আৰু সমভোজী বিভিন্ন প্ৰাণীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাত্ৰাই চূড়ান্তভাৱে ধাৰণ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা বিষয়ত সহায় কৰে। আনহাতে সংখ্যা নিৰ্ণয়ৰ পিয়ল কাৰ্য ধাৰাবাহিকভাৱে কিছুদিনৰ অন্তৰে অন্তৰে অনুধাবন কৰিব নোৱাৰিলে উন্নতি বা অৱনতিৰ স্বৰূপ প্ৰতীক্ষমান হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে মেৰালয়ৰ বন্যকাকৰাম নামৰ বনভূমিত সম্পাদিত হোৱা একক পিয়ল কাৰ্যই জন্তু সমাজৰ সৰ্বাঙ্গীন ছবি এখন আনাৰ আগত দাঙি ধৰিব নোৱাৰে। বন্যকাকৰামৰ পিয়ল কাৰ্যক পৰিচালনা ব্যৱস্থা নিৰ্ণয়ৰ বাবে কৰিব লগীয়া কামৰ প্ৰথম পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি। অন্যান্য ঠাইত সম্পাদন কৰিবলগীয়া বন্যপ্ৰাণী পিয়লৰ মৌলিক ভিত্তিত বন্যকাকৰামৰ কাৰ্যসূচীক অনুকৰণীয় আহি ৰূপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। অৱশ্যে পৰিবেশৰ বিভিন্ন ৰূপে প্ৰভাৱান্বিত কৰা পিয়লৰ সমুদায় কাৰ্যসূচীত ভিন্নমুখী নিয়ম প্ৰণালী যো প্ৰৱৰ্তন কৰা বিধেয় হ'ব পাৰে এই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি। সি যিগেই কি নহওক হস্তী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ সৰ্বাঙ্গীন অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ মেৰালয়ৰ অৱশিষ্ট হাতী অধ্যয়িত এলেকাকাক সামৰি লৈ পিয়লৰ কাম হাতত লোৱাটো আৱশ্যকীয় বিষয় হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব।

মেৰালয়ত আগতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা আনুমানিক পিয়ল কাৰ্যই এটা কথা সাব্যস্ত কৰে যে এই গোটেইখন পাৰ্বত্য ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় ২৫০০ টা হাতী বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন ভিন পৰিবেশত থলুৱাভাৱে বাস কৰি আছে। এই পাৰ্বত্য ভূভাগত ধাৰাবাহিকভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ অহা জুম খেতিৰ পৰিবেশত হাতী অধ্যয়িত এলেকাবিলাক ভিতাৱে খণ্ড বিখণ্ড হৈ বিকিণ্ড অৱস্থাত পৰিণত হ'ব

আৰু সাধাৰণতে আৰু পাতি বাস কৰা এলেকাবোৰ ফিডাৰে সৰ্বোচ্চ হৈ আহিল সেই পৰিস্থিতিত এই আটাইবোৰ হাতীক ধাৰণ কৰিব পৰা কৰভাও কৰি অহা পৰিলক্ষিত হ'ল। ভূপৰি অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্বীয়া ঠাইবিলাকত সচৰাচৰ আৰু পাতি বাস কৰা হাতীৰ পালবিলাকে সাময়িকভাৱে স্থান পৰিৱৰ্তন কৰি উত্তৰ ৰাজ্যতে সন্মুখৰে সন্মুখ হাতীৰ সংখ্যাৰিক্য সংখ্যা অথবা সৰ্বোচ্চিত অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে উত্তৰ ৰাজ্যৰ এনেবোৰ বনভূমিত সাধাৰণতে বাস কৰা হাতীৰ সংখ্যা সাময়িকিক ভাৱে সমান্তৰালভাৱে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰিলে প্রকৃত অৱস্থা ঠাৱৰ কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ বন্যপ্রাণীবিলাকে আন্তৰাজ্যিক আৰু আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি কেতিয়াও আশা কৰিব পৰা নাযায়। সি বিৱেই কি নহওক গোটেই মেঘালয়ৰ অন্তৰ্গত বিক্ষিপ্তভাৱে বাস কৰা হাতীৰ সংখ্যা সাময়িক-ভাৱে নিকৰ্ণ কৰিবৰ বাবে পিৰলৰ কাৰ্যসূচী যে ধাৰাবাহিকভাৱে অনুধাৱন কৰিব লাগিব এই কথা কোনোপধ্যে নুই কৰিব নোৱাৰি।

অসমৰ বেলিকাও বনবিভাগৰ তৰফৰ পৰা এইখন ৰাজ্যৰ হাৰি-বননিবিলাকত সচৰাচৰ বাস কৰা বনবীয়া হাতীবিলাকৰ স্থিতাবস্থা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ব্যৱস্থা হাওত লোৱা হৈছে। কোৱা বাহ্যক যে বনবীয়া হাতীবিলাকে হাবিৰ মাজত আৰু বান্ধি বান্ধি বাস কৰে। একো একোটা জাকত মতা-মাইকী আৰু বিভিন্ন বয়সৰ পোৱালিবোৰ লগ লাগি একেলগে চৰি ফুৰে। বনবীয়া হাতীবিলাকৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা এই জাক-টোক "চাহন" বুলি কোৱা হয়। এজনী প্ৰাপ্ত বয়সীয়া চাৰিগ বা মাইকী হাতীয়ে চাহনটোক হাবিৰ মাজত বাট দেখুৱাই লৈ ফুৰে। জাকটোত কেইবাটাও বিভিন্ন বয়সৰ মঁতাল আৰু মথনা হাতী থাকিলেও এটা প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ মঁতাল কিম্বা মথনাই প্ৰভুৰ বিত্তাৰ কৰি থাকে। মতাবিলাকৰ মাজত কেতিয়াবা ঋণ যুদ্ধও হয় আৰু এই যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰা মতা হাতীয়ে জাকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈ "একনুৱা" নাম লৈ হাবিৰ মাজৰ কোনোবা ঠাইত অস্থায়ীভাৱে অকলশৰীয়া জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হয়। জাকৰ মাজৰ পৰা খেদা খাই পলাই যোৱা দুটা হাতীয়ে কেতিয়াবা যোৰা পাতি নিসৰ্জ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হয়। তেনে ধৰণেৰে যোৰা পাতি বাস কৰা হাতীক "বালবুৰীয়া" নাচৰে অভিহিত কৰা হয়। দুটা হাতীভকৈ বেছি সংখ্যক জন্ত লগ লাগিও কেতিয়াবা "বালবুৰীয়া"ৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰে।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় এহেজাৰটামান বনবীয়া হাতী নিগাজীকৈ বাস কৰি আছে বুলি গণনাৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। অৱশী প্ৰকৃতিৰ বনশৰীল জন্ত যোৱাৰ বাবে ইহঁতৰ মাজৰ পৰা কোনো কোনো হাতী কেতিয়াবা বাহিৰলৈ ওচি যায় আৰু কিছুদিনৰ পাছত ইয়ালৈকে পুনৰ ঘূৰি আহে। বানাহ অভয়াৰণ্যত প্ৰায় ১২০০ মান বনবীয়া হাতী আছে বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। সীমান্বীয়া ঠাইবিলাকত বাস কৰা হাতীবিলাকে পৰিৱৰণ কৰি কৰি অৰুণাচল, মেঘালয় আদি ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলতো প্ৰৱেশ কৰে।

মানাহ অভয়াৰণ্য আৰু কাৰ্জিকতা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাস কৰা হাতীবিলাকৰ উপ-বিভাগটোই অসমত সংৰক্ষিত হৈ থকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলবিলাকত এছিয়া মহাদেশীয় হাতীৰ পাল কম-বেছি পৰিমাণে বিকল্প-সম্বন্ধেণ্ড বিভাগি লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বনৰীয়া হাতীৰ চাহনবিলাকৰ মাজৰ পৰা, ছেমেলি-ভেদেলি হৈ ওলাই অহা হাতীৰ সৰু-সুৰা পাল কেতিয়াবা সচৰাচৰ বাস কৰা অৰণ্যভূমিৰ পৰা বাহিবলৈ ওলাই আহে। এই হাতীবোৰে খেতিপথাৰ বা চাই-বাগিচাৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰি শস্যক্ষেত্ৰত অশেষ ক্ষতি সাধন কৰে। তদুপৰি মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি জনসাধাৰণৰ মাজত অৰ্পণীয় সন্তানৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বহুতো মানুহৰ প্ৰাণ বিলাশ কৰাৰ উদাহৰণ বিৰল নহয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা জনপূৰ্ণ নগৰ বা গাঁৱৰ মাজত দুই-এটা বনৰীয়া ওণা হাতীৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈ মানুহৰ ধাৱন-শোৱন নাইকিয়া কৰি পেলায়। এনে অস্বাভাৱিক আৰু অশোভনীয় পৰিস্থিতিত বেলা চিকাৰ পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতী ধৰাৰ নিয়ম সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰি দিয়াটো উচিত হোৱা নাই বুলি বহুতে নত প্ৰকাশ কৰিছে। বনৰীয়া হাতী ধাৰণ কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ পৰিস্থিতি সমতুল্য হ'ব নোৱাৰে বুলি অভিমত দাঙি ধৰা হৈছে। তদুপৰি স্বাভাৱিক পৰিবেশবিলাকৰ হাতী ধাৰণ শক্তি সংকোচিত বনভূমিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যথোচিত পৰিমাণৰ বনৰীয়া হাতী স্বাভাৱিক পৰিবেশত পালন কৰাৰ আপকাঠি নিৰ্ণয় কৰা একান্ত আৱশ্যক হৈ পৰিছে। নিম্নমুখী, উৰ্দ্ধগামী আৰু স্তম্ভিৰ সংখ্যা হাতীৰ ক্ষেত্ৰত থকা ঠাইৰ পৰিসৰ আৰু ধাৰ্য্য সামগ্ৰীৰ প্ৰচুৰতা আৰু অভাৱ গ্ৰন্থতাৰ ভিত্তিত পৰিচালনা ব্যৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত থকা পৰ্বতীয়া স্বাভাৱিক পৰিবেশবিলাকত সাধাৰণতে বাস কৰা হাতীৰ সংখ্যা একেটা ভিত্তিতে নিৰ্ণয় কৰা আৱশ্যক হৈছে। তদুপৰি অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত যি উমৈহতীয়া আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখা আছে সেই সীমাৰেখাই বনৰীয়া হাতীৰ প্ৰব্ৰজনত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি। সেইবাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ উমৈহতীয়া পৰিস্থিতি বুঢ়ীয়াভাৱে নিৰ্ণয় কৰাটো একান্ত আৱশ্যক বুলি বিবেচনা কৰিব লাগিব। অৰুণাচল প্ৰদেশত বাস কৰা সৰহ সংখ্যক হাতী দক্ষিণ কালৰ নাৰনি অঞ্চলতে পুজীভূত হৈ থাকে বুলি জনা যায় আৰু গোটেই ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা হাতীৰ সংখ্যাই অসমৰ সীমান্বৰীয়া অৰণ্যভূমিত মাজে-সময়ে প্ৰৱেশ কৰে। ঠিক সেইদৰে অসমৰ সীমান্বৰীয়া পৰিবেশত বিচৰণ কৰি কৰা বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যাই অৰুণাচলৰ থলুৱা ঠাটিতো প্ৰৱেশ কৰে। এই পৰিস্থিতিৰ পৰিধি-প্ৰসিদ্ধত দুয়োখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যত বাস কৰা বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যাই ঋতু অনুযায়ী নিম্নমুখী আৰু উৰ্দ্ধগামী ৰূপ ধাৰণ কৰা অস্বাভাৱিক বুলি ক'ব নোৱাৰি। বোটাৰীভাৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যা চাৰি হাজাৰৰ কম নহ'ব বুলি কোৱা হৈছে। জৰিণ কাৰ্য আৰু শিয়লৰ কবিলতে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰিলে একুশ অৱস্থা স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰিব পৰাটো সম্ভৱণৰ হ'ব নোৱাৰে।

বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যা সম্পৰ্কত নগালেণ্ডৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীৰে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। মিজোৰামত বাস কৰা হাতীবিলাকৈও সমধৰ্মী পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। নগালেণ্ডত বাস কৰা জনজাতীয় লোকসকলৰ বহুতে হাতী গোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থক পুষ্টিৰ আহাৰ যোগান ধৰিব পৰা অন্যতম অৱস্থাপে গণ্য কৰে। মানুহৰ খাদ্য যোগান ধৰিব পৰা অৱস্থিতিত পৰিগণিত হোৱাৰ বাবে পূৰ্বাঞ্চলৰ এই পাৰ্বত্য এলেকাৰ বনভূমিবিলাকৈও নিৰলে বাস কৰা বনৰীয়া হাতীবিলাকৰ নিৰাপত্তা সোলোকে-চোলোকে হ'ল। বহুতো বনৰীয়া হাতীয়ে ইতিমধ্যে মানুহৰ কোষ দৃষ্টৰ বলি হৈ জীৱন বিসৰ্জন দিবলগীয়া হ'ল। প্ৰায়শ্চিন্দে কিছুমান হাতীয়ে অসহন অৱস্থাত শিৱসাগৰ জিলাৰ বনাঞ্চলবিলাকৈও আশ্ৰয় ল'লে। পূৰ্বৰ নগা পাহাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বহুত দিন আগতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ইন্টাৰ্জি অভয়াৰণ্যত গোটাচেৰেক বনৰীয়া হাতী এতিয়াও বাচি আছে বুলি জনা যায়। দক্ষিণ ফালৰ গভীৰ অৰণ্যভূমিতো বিক্ষিপ্ত-ভাৱে বাস কৰি থকা বনৰীয়া হাতীৰ সৰু-সুৰা পাল হয়তো বাচি থাকিব পাৰে। আনহাতে মিজোৰামৰ পৰিস্থিতি বনৰীয়া হাতীৰ ক্ষেত্ৰত কম্পনা কৰিব নোৱাৰাকৈ শোকাবহ বুলি গণ্য কৰিব লাগিব। দুৰ্গম পৰ্বতীয়া বনভূমিবিলাকৰ কোনো এখনেও বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যা ধাৰণ কৰি আছে বুলি নিঃসংশয়ে ক'ব নোৱাৰি। সেই-কাৰণে বনৰীয়া হাতীৰ ক্ষেত্ৰত মিজোৰামৰ স্থান সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া হৈছে বুলি ক'ব পাৰি।

মণিপুৰ ৰাজ্যত বনৰীয়া হাতী বিক্ষিপ্তভাৱে বাস কৰি আছে বুলি জনা যায় যদিও তাৰ হাতীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই এখোন। মিজোৰামৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য হোৱা বাবে জনজাতীয় মানুহৰ হাতত মণিপুৰৰ বনৰীয়া হাতীবিলাকৈও লাঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। এছিয়া মহাদেশীয় হাতী বিশেষজ্ঞ দলৰ অন্যতম সক্ৰিয় সদস্য ডঃ এছ. কে. আচাৰ্জীই নগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামত বাস কৰি থকা বনৰীয়া হাতীবিলাকৰ স্থিতাবস্থা নিৰীক্ষণ আৰু অনুসন্ধান সাপেক্ষে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ভালেখিনি তথ্যপ্ৰাপ্তি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে। তেওঁ সংগ্ৰহ কৰা সমলৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে নগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ ৰাজ্যত বাস কৰি থকা বনৰীয়া হাতীৰ ভৱিষ্যত সিমান উজ্জ্বল নহয়। পশ্চিম বঙ্গৰ উত্তৰ ফালে থকা হিমালয় পৰ্বতমালাৰ নামনি অঞ্চলত যিবিলাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে তিস্তা নদীৰ দুয়োপাৰে অৱস্থিত এই বনাঞ্চলবিলাকৈ বনৰীয়া হাতী নিবাসৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিছে। সেই অঞ্চলত বাস কৰি থকা বনৰীয়া হাতীৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা দশতকৈ বেছি নহ'ব বুলি জনা যায়। কালিমপাং, কাছিয়াং আৰু বঙ্গা বন সংৰক্ষণ অঞ্চলত থকা বনভূমিয়ে বনৰীয়া হাতীৰ বাবে উপযুক্ত বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে। পশ্চিম বঙ্গৰ উত্তৰ ফালে অৱস্থিত অনুপম পাৰ্বত্য দেশ ভূটানৰ মাননি অঞ্চলত থকা বনভূমিত মানুহে খেতি পথাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাত থও বিথও ৰূপত বৃক্ষ শূন্য হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ফলশ্ৰুতিত পাৰ্বত্য পৰিবেশত

বাস কৰি থকা বনৰীয়া হাতীবিলাকৈ ভৈয়ামটৈ নাৰি আহিবলৈ বাধা হৈছে। সেই কাৰণে উত্তৰ বঙ্গৰ হাবিতলীয়া ৰাইজে বনৰীয়া হাতীৰ উৎপাতৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগে কেইবাটাও বনৰীয়া হাতী নিধন কৰিছে।

বিহাৰৰ পালামৌ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ডানমা অভয়াৰণ্যত নিগাজীকৈ বাস কৰা বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যা পিছলৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। এই দুখন অভয়াৰণ্যত বাস কৰা হাতীৰ সংখ্যা পালামৌৰ ক্ষেত্ৰত ৪০ আৰু ডানমাৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ২০ বুলি জনা যায়। উল্লেখযোগ্য যে বিহাৰৰ এই অভয়াৰণ্যবিলাকত নিগাজীকৈ বাস কৰা হাতীৰ মাজত দাঁতাল হাতী একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি। বিহাৰৰ চিং-ডুম সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো কিছু সংখ্যক বনৰীয়া হাতী স্থানীয়ভাৱে বাস কৰা দেখা যায়। উৰিষ্যাৰ চিম্‌লিপা; অভয়াৰণ্যত গিৰিাক বনৰীয়া হাতীয়ে পান পাতি বাস কৰি আছে সেইবিলাকৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা দুশৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ



বন্যপ্রাণী সংৰক্ষণ সপ্তাঙ্গ পালনৰ সময়ত শোভাযাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ
কৰিবলৈ সাজু হোৱা এজাক ঘৰচীয়া হাতী

কৰ্ণাটক নেচনেল পাৰ্ক, ৰাজ্যী অভয়াৰণ্য আৰু মতিচুৰ অভয়াৰণ্যত কিছু সংখ্যক বনৰীয়া হাতী আলেঙে আলেঙে বাস কৰা দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যৰকালে থকা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটক ৰাজ্যত ৭৫০০ সংখ্যক বনৰীয়া হাতী বাস কৰা দেখা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত কৰ্ণাটকৰ ৰাম্পিৰ নেচনেল পাৰ্ক, বাণাৰঘাটা নেচনেল পাৰ্ক, নাগৰহোল নেচনেল পাৰ্ক আৰু অন্যান্য কেইবাখনো অভয়াৰণ্য, কেৰালাৰ এৰাভি-কুলাৰ নেচনেল পাৰ্ক, পেৰিয়াৰ অভয়াৰণ্য, পৰদিকুলম্ আৰু নেমাৰ অভয়াৰণ্য প্ৰভৃতি অভয়াৰণ্যসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। তামিলনাডুৰ অন্তৰ্গত অৱস্থিত মধুমালি অভয়াৰণ্য আৰু আন্নামালি অভয়াৰণ্যত বাস কৰা বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যাও

কৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি। দক্ষিণ ফালে মহাশুভ্ৰৰ সিপাৰে অৱস্থিত শ্ৰীলঙ্কাতো জাকে জাকে বনৰীয়া হাতী বাস কৰে।

গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আৰু দক্ষিণ ফালে সাগৰৰ মাজত অৱস্থিত শ্ৰীলঙ্কাত যিবিলাক বনৰীয়া হাতী বাস কৰি আছে, সেইবিলাকৰ ভিতৰত থকা দঁতাল আৰু মথনা হাতীৰ অনুপাত সকলো ক্ষেত্ৰতে সমান নহয়। এই ব্যৱধানৰ মাজাই বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা বনৰীয়া হাতীৰ মাজত নিৰাজ কৰি থকা পৰস্পৰাগত বৈচিত্ৰ্যৰ ইঙ্গিত দিয়ে। অগমক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিবিলাক বনৰীয়া হাতী বাস কৰে সেইবিলাকৰ মাজত ষোড়শমুঠায়ে শতকৰা ৫০ ভাগ দঁতাল আৰু বাকী ৫০ ভাগ মথনা হোৱা দেখা যায়। বিহাৰৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা বনৰীয়া হাতীবিলাকৰ মাজত দঁতাল হাতীৰ সংখ্যা তেনেই সামান্য। ইয়াত শতকৰা ৯৫ ভাগ হাতী মথনা হোৱা দেখা যায়। উৰিষ্যাৰ চিমলিপাল অভয়াৰণ্য আৰু অন্যান্য ঠাইত যিবিলাক হাতী ব্ৰিগাজীকৈ বাস কৰি আহিছে সেইবিলাকৰ মাজত থকা মতা হাতীৰ শতকৰা ৯০ ভাগকে দঁতাল ৰূপে আৱৰ্ণকণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বাস কৰা বনৰীয়া হাতীবিলাকৰ সৰহ ভাগকে দঁতাল হোৱা দেখা যায়। সানহাতে শ্ৰীলঙ্কাৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক বনৰীয়া হাতী পাল পাতি জাকে ভাবে বিচৰণ কৰি ফুৰে সেই-বিলাকৰ মাজত দঁতাল হাতী নিচেই কম পৰিমাণে থকা দেখা যায়। ইহঁতৰ মাজত শতকৰা ৯৫ ভাগ মথনা আৰু বাকী ৫ ভাগ দঁতাল হোৱা দেখা যায়। বিভিন্ন ঠাইত কা দঁতাল আৰু মথনা সাংখ্যিক ব্যৱধাৱে জীব জগতত বিৰাজ কৰা বিস্ময় প্ৰতিপন্ন কৰে।

বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ আৰু পৰিচালনাৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চাই এছিয়া মহাদেশীয় হাতীৰ বিশেষত্বসকলে ক'ব খুজিছে যে এ বিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা সিমানে সম্ভাৱ্যজনক নহয়। সৰ্বভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী পৰিষদৰ সদস্য-সকলেও তদুপৰি অভিমত ব্যক্ত কৰিছে। গতাতোকৈ প্ৰেৰিত এক আন্তৰ্জাতিক ভিত্তিত বিবেচনা কৰি নাই প্ৰকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ ফালৰ পৰাও দোহানি দোহাৰি কোৱা হৈছে যে এছিয়া মহাদেশীয় হাতীৰ সংখ্যা বৰ্তমানে বহুত তললৈ নামি আহিছে। সেইবাবে এই বিধ প্ৰাণীক পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বিলুপ্ত হৈ যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আঙু ব্যৱস্থা হাতত লোৱাটো নিতান্ত আৱশ্যক হৈ পৰিছে। এই পৰিস্থিতিৰ সমাধান সুত্ৰ এটা উলিয়াবৰ বাবে এছিয়া মহাদেশীয় তথা ভাৰতীয় হাতী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকক বিপন্নগ্ৰস্থ প্ৰাণী বুলি আন্তৰ্জাতিক সন্থাই ঘোষণা কৰিলে। লগে লগে ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনত ভাৰতীয় হাতীক দ্বিতীয়খন তালিকাৰ পৰা প্ৰথমখন তালিকালৈ উন্নীত কৰা হ'ল। অন্য ভাষাত ক'ব পাৰি যে ভাৰতীয় হাতীক নিষিদ্ধ প্ৰাণী ৰূপে পৰিগণিত কৰা হ'ল। ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ল এনে বে দুৰ্দান্ত প্ৰকৃতিৰ বনৰীয়া হাতীক আগৰ দৰে অনুমতি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব।

তদুপৰি কুনুৰীৰ সহায়ত আগতে অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত মেলাটিকাৰ পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতী ধৰাৰ যি প্ৰথা প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হৈছিল সেই প্ৰথা সম্পূৰ্ণ ৰূপে উচ্ছেদ কৰি দিয়া হয়।

এই সৰ্বাঙ্গীন ব্যৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে অসমৰ জগসাধাৰণে লাভলৈ ভূগিবলগীয়া হ'ল এই কথাৰ পুনৰুন্নয়ন নিষ্প্ৰয়োজন। কাৰণ ধাৰণ শক্তিলে তুলনাত অসম আৰু মেঘালয়ৰ বনভূমি অঞ্চলত থকা বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যা বেছি পৰিমাণৰ হৈ আছে বুলি অসম আৰু মেঘালয়ৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিবেচনা কৰে। তদুপৰি হস্তী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকক সমগ্ৰ দেশতে প্ৰথমখন ভাঙি-কাটল উন্নীত কৰাৰ আগতে অসম আৰু মেঘালয়ৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ পৰা কোনো মতামত কিম্বা পৰামৰ্শ বিচৰা হোৱা নাছিল। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ কলত্ৰপ্ৰতি অসমৰ বহুতো গাঁৱলীয়া ৰাইজে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। বনৰীয়া হাতীৰ পানবোৰে অৰণ্যভূমিৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহি মানুহক উপহাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মানুহৰ শস্য ক্ষেত্ৰ আৰু চাহ বাগিচাবিলাকৰ মাজত সুবাই বনৰীয়া হাতীয়ে মানুহৰ ক্ষতি সাধন কৰাটো সাধাৰণ ঘটনাত পৰিণত হ'ল। বহুতো বনৰীয়া হাতীয়ে দুখীয়া ৰাইজৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি ঠায়ে ঠায়ে সন্ধানৰ সৃষ্টি কৰিলে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এয়ে যে বহুতো নিম্নাখিত মানুহে প্ৰতি বছৰে বনৰীয়া হাতীৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হ'ল। এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বিপদগ্ৰস্ত ৰাইজক সকাহ দিবৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে প্ৰদ্বাৰ্শ সহ বহুবাৰ প্ৰস্তাৱ আগ বঢ়োৱা হ'ল।

১৯৮১ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী পৰিষদত অসমৰ ফালৰ পৰা অতিৰিক্ত মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু মুখ্য বন্যপ্ৰাণী তত্ত্বাৱধায়কৰ পদে বহন কৰিবলগীয়া দায়িত্ব লৈ মই যোগদান দিবলগীয়া হৈছিল। সেই সভাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ মোৰ সৈতে মানাহ ব্যাঘ্ৰ যোজনাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শ্ৰীসঞ্জয় কুমাৰ দেৱবৰ্মা গৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী পৰিষদত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অন্য কোনো ৰেচেকাৰী সদস্য নাছিল। সেইকাৰণে অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিস্থিতি সভাত দাঙি ধৰাৰ ভাৰ মোৰ ওপৰতে পৰিছিল। অসমত বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যা যে আশাতীতভাৱে কম নাই আৰু বনৰীয়া হাতীৰ উপহাস যে অসমৰ প্ৰাণাঞ্চলত বাস কৰা ৰাইজৰ বহুতো দুৰ্গতি হৈছে সেই কথা বিভাগে বুজাই দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হ'ল। পৰিতাপৰ বিষয় যে সভাত উপস্থিত থকা পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ কোনোও মোৰ যুক্তিত পতিয়ন দিবলৈ আগবাঢ়ি নাছিল। বৰঞ্চ সকলো ফালৰ পৰা আপত্তিসূচক প্ৰতিবাদ উত্থাপন কৰি অসম চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱটো দাঙি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দাঙি ধৰা হ'ল। মই দৃঢ়তাৰে মোৰ বক্তব্যখিনি পুনৰ উত্থাপন কৰি ক'লো যে বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষণৰ মাজত নীতি অনুযায়ী প্ৰভেদ থকা

উচিত। স্থানীয় লোকৰ দুখ-দুৰ্গতি আওকাণ কৰি কোনো বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যাক নিৰ্দিষ্টকালত অৱস্থালৈ তৈলি দিয়াটো বাঞ্ছনীয় হ'ব নোৱাৰে। সমাজ কল্যাণৰ বাস্তৱীয় কাৰ্য্যকৰণ পৰিভ্ৰাম কৰি সংৰক্ষকসকলী ব্যক্তিগতকৈ গোৰুৱৰ মুকুট পৰিধান কৰি আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ যোৱা উচিত হ'ব নোৱাৰে।

উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ পৰিষদৰ স্থায়ী সভানেত্ৰী প্ৰধান মন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী নিজে। বন্যপ্ৰাণী তথা সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণৰ বিষয়ত বিশেষ তৎপৰতাৰে কাম কৰিবলৈ সকলোকে উদগনি দিয়া ৰাজনৈতিক নেত্ৰী হিচাপে তেখেতে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি লাভ কৰিব পাৰিছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰ ফলৰ পৰা বিবেচনা কৰিবলৈ হ'লে এটা কথা নুই কৰিব পৰা নাযাব যে সমগ্ৰ দেশৰ কৰ্ম-ৰাশি পৰাকীৰ্ণে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বিষয়ত তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব। সি যিগৈ কি লক্ষ্যক প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে সভানেত্ৰীৰ আসনৰ পৰা নুই উত্থাপন কৰা কাৰ্য্যকৰণ বিবেচনা যোগ্য বুলি গ্ৰাহ্য কৰিলে। তেখেতে ৰায় দিলে যে গোটেই বিষয়টো প্ৰতীকভাৱে অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে এখন উপ-সমিতি গঠন কৰিব লাগে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই উপ-সমিতি গঠন কৰা হ'ল নে নাই সেয়া বৰফল স্পষ্টভাৱে জনা নাযায়। কাৰণ ১৯৮৪ চনৰ এপ্ৰিল-মে'ই পৰ্যন্ত কোনো উপ-সমিতিৰ সদস্য এই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰিবৰ বাবে অসমলৈ অহা নাই। অৱশ্যে বিহাৰৰ অৱলম্বন মুখ্য ৰাষ্ট্ৰপতি সংৰক্ষক এছ. পি. সাহীৰ নেতৃত্বত এটা দল এই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ কথা জনা যায়।

১৯৮১ খৃষ্টাব্দৰ চেপ্টেম্বৰ মাহৰ ৪ আৰু ৫ তাৰিখে শিলঙত হাতী বিশেষজ্ঞ দলৰ পুৰাকলীয় শাখাৰ এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। পূৰ্ণাকলৰ আটাইকেইখন ব্যক্ত্যন্ত বাস কৰি থকা বনৰীয়া হাতীৰ সংৰক্ষণ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটোৱেই এই সভাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল।

পিয়লৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজ্যত বাস কৰি থকা বনৰীয়া হাতীসকলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা বিষয়ত কোনখন ৰাজ্যই কিমান দূৰ আগ বান্ধি পাৰিছে সেই বিষয়ৰ বাস্তৱীয় তথ্যপাতি সভাত উত্থাপন কৰা হ'ল। ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ প্ৰথমখন তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা এছিয়া মহাদেশীয় হাতীক দ্বিতীয়খন তালিকালৈ পুনৰ সবাই আনিব পৰা যায়নেকি সেই বিষয়ে সভাত বিষয়ভাৱে আলোচনা কৰা হ'ল। সবহ সংখ্যাক সদস্যই এই মতৰ বিৰোধিতা কৰিলে যদিও কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সভাই অনুমোদন জ্ঞাপন কৰিলে। বনৰীয়া হাতীৰ উপভৱৰ পৰা স্থানীয় কাইজক সকাহ দিবৰ বাবে উপভুক্ত এলেকাবিলাকত মাইক্ৰো মেনেইজমেন্ট আৰু ক্ষুদ্ৰতৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থাৰ আৰ্হিত হাতী ধৰিবলৈ অনুমতি দিবৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ আৱশ্যকতা প্ৰতিপন্ন হ'ল। ব্যৱসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী সমূলকৈ ত্যাগ কৰি বিভাগীয়ভাৱেহে হাতী ধৰিব পৰা যাব বুলি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল।

উপভুক্ত এলেকাবিলাকৰ পৰা বনৰীয়া হাতীৰ জাকবোৰক আঁতৰলৈ খেদাই দিবৰ

বাবে শস্যৰক্ষক বাহিনী সৃষ্টি কৰিবলৈ অনুমোদন আগ বঢ়োৱা হ'ল। এনে শস্য-
ৰক্ষক বাহিনী ৰাখিবৰ বাবে সি অৰ্পৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই খৰচ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন
কৰিব লাগিব বুলি সভাই অভিমত লিপিবদ্ধ কৰিলে।

উল্লেখযোগ্য যে শস্যৰক্ষক বাহিনী সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে বিভাগীয়ভাৱে কুনকীৰ
সহ যাঁয়ৰ ঘৰচীয়া হাতী কিছুমানো বিভাগে ৰাখিব লাগিব। তদুপৰি মাউত, ধাঁহী
আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জন্তুৰ বন বিষয়া এই কামৰ বাবে নিয়োগ কৰিব
লাগিব। নানা কাৰণত এই দীৰ্ঘ মাদী পৰিকল্পনাই এতিয়ালৈকে বাস্তৱ ৰূপ পোৱা
নায়। সি যিয়েই কি নহওক বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ পটভূমিত ভাৰতীয় হস্তী
গোষ্ঠীৰ আটাইবিলাক প্ৰাণীয়ে বৰ্তমান কালত ৰক্ষাবাহিনীৰ পূৰ্ণ মৰ্যাদা উপভোগ
কৰিছে। এই ব্যৱস্থা কিমান দিন জোৰাকৈ প্ৰৱৰ্তিত হৈ থাকিব লাগিব সেইটো
সদাহতে কোৱা টান। এই বিষয়ত এটা কথা উল্লেখ কৰি থকা পাৰি যে অসমত
অতীতৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ থকা মেলা চিকাৰ অনুষ্ঠান নিৰ্মূল হ'লে আমাৰ সামাজিক
ব্যৱস্থাত এটা আঘাত পৰিব। কালৰ কুলি গৰ্ভত নথ পোৱাৰ আগতে দেখা। দিয়া এই
হাতী চিকাৰৰ কাহিনীবোৰ তলত লিপিবদ্ধ কৰা হ'ল।

খেদা চিকাৰ

খেদা চিকাৰ পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতী ধৰাৰ নিয়ম অসমত আগতে প্ৰচলিত আছিল
বুলি জনা নাযায়। এই পদ্ধতিত হাতী ধৰাৰ নিয়ম বাংলাদেশৰ মৈমনচিং জিলাত
প্ৰচলিত আছিল। সেই সময়ত মৈমনচিং জিলাৰ হাতী অধ্যুষিত ঠাইসমূহ যে ভাৰত-
বৰ্ষৰে অঞ্চলবিশেষ আছিল এই কথা দোহাৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই। হাবিৰ মাজত উৎপন্ন
হোৱা দোণৰ পুং আৰু সাধাৰণতে বনৰীয়া হাতীৰ পালবোৰ অহা-যোৱা কৰা
পথবোৰ খেদা চিকাৰ পদ্ধতিত হাতী ধৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰি লোৱা হয়। এইদৰে
বনাঞ্চলৰ মাজত বনৰীয়া হাতী অহা-যোৱা কৰা পথবিলাকক হাতী-দন্দী বুলি কোৱা
হয়। বনৰীয়া হাতীৰ ডাকক বলাই নি কাঠৰ বেৰাৰ ভিতৰত স্তম্ভৰাৱৰ বাবে কাঠ
পুলিৰে ঘিৰোৱা পথ হাবিত নিৰ্মাণ কৰা হয় সেই পথবোৰক ক্ৰমে পুংগড় আৰু দন্দী-
গড় বুলি কোৱা হয়। নিমখ মিহলি পানী আৰু মাটি খাবৰ বাবে বনৰীয়া হাতীবোৰ
জাকে জাকে আহি দোণৰ পুঙত গোট খায়হি। এইদৰে গোট ৰোৱা হাতীবোৰকে
ছৰাই নি গড়ালৰ ভিতৰত স্তম্ভৰাৱৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হয়। সাঁজ লাগি যোৱাৰ
পাছতে এইদৰে হাবিত বনৰীয়া হাতী ধৰিবৰ বাবে আগতীয়াকৈ বাস্তৱীয় ব্যৱস্থা কৰা
হয়। নিমখৰ পুঙৰ ওচৰত থকা গছৰ ওপৰত কাঠ-বাঁহেৰে একোখন চাং সজা হয়।
পুঙৰ ওচৰত থকা গছৰ ওপৰত বনাই ৰখা চাঙক 'পুং-মাচাং' বুলি কোৱা হয়।
সাধাৰণতে নিমখৰ পুঙবোৰৰ প্ৰায় ৫৬ মিটাৰ আঁতৰত এজোপা ডালমেলা গছ নিৰ্বাচন
কৰি লৈ তাৰ ওপৰতে এখন মজবুত চাং নিৰ্মাণ কৰা হয়। আবশ্যক অনুযায়ী পুঙৰ
চাৰিওকাষে থকা কেইবাজোপা গছত একাধিক চাং নিৰ্মাণ কৰা হয়। যতোকখন

চাঙতে দুজন দুজন মানুহ বাঁহ থাকে। হাতীৰ ডালটোতে পুঙলৈ আহি নিমখৰ পানী খাবলৈ বৰোতেই পুং-নাচাঙৰ ওপৰত চুপে-চাপে বহি থকা মানুহকেইজনে তেওঁৰ জ্বলাই থাক হাই-উৰনি বৰি হাতীজাকক গড়ালৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰে খেদি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। খেদি নিয়া হাতী কে পান তানে হাঁহুনি নগৈ। তেওঁৰ ভিতৰত সোমাবলৈ যাতে বাধা হয় তাৰ বাবে গা পৰি আঁচিলা আঁচিলা সোমাই যেনে সৰু হৈ যোৱা বিধৰ বেয়া তৈয়াৰ কৰি থকা হয়। বনৰীয়া হাতীৰ ডালটোৱে যাতে বেদা খোৱাৰ পাছত আপোনা-আপুনি গৈ গড়ালটোৰ ভিতৰত সোমাই পৰিবলৈ বাধা হয় তাৰ বাবে বাটত থকা গছ-শাউলি হাবিবোৰেৰে এটা পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হয়। এইদৰে কাটি তৈয়াৰ কৰা পটোক চুনিয়া বাট বুজি যোৱা হয়। চুনিয়া বাট অতিক্ৰম কৰি বনৰীয়া হাতীৰ ডালটোৱে চৰেৰেহে সোমাই পৰি পৰাই যাব নোৱাৰা হৈ পৰে। পথৰ দুয়োকাষে সজোৱা বাটীৰ চাঙৰ ওপৰত বাঁহ থকা মানুহকেইজনেও হাতত জোৰ আদি লৈ হাতীজাকক গড়ালৰ ভিতৰত সোমাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। অৱশ্যে কুনকী হাতীয়ে বনৰীয়া হাতীজাকক যদি গড়ালৰ ভিতৰত সোমাই পৰিবলৈ বাধা কৰে।

কিছুমান ওপৰ ওখ গছৰ শাৰে গড়ালতো নিৰ্মাণ কৰা হয়। গড়ালৰ সন্মুখতো দুখন চাং দুয়োকাষে নিৰ্মাণ কৰি থকা হয় আৰু এই চাঙৰ ওপৰত দুজন দুজন মানুহ খাপ পাতি বহি থাকে। গড়ালৰ ভিতৰত গোটেইজাক বনৰীয়া হাতী সোমাই পৰাৰ লগে লগে কাঠ-বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা দুবাৰখনৰ বচিডাল টানি দি গড়ালটো বন্ধ কৰি দিয়া হয়। গোটেই জাক হাতী গড়ালটোৰ ভিতৰত বন্দ হৈ পৰিলে সিহঁত তাৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰা হৈ পৰে। তেতিয়া কুনকীৰ সহায়ত কম বয়সীয়া হাতীকেইজাক ফাল ফালি মাৰি গড়াল ভিতৰতে দৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। দুৰ্দ্দান্ত হাতী গড়ালৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলে, তাক শাসন কৰা টান হৈ পৰে। তেনে হাতীক পুনৰ হাবিলৈ যাবলৈ পথ দিয়া হয়। আৱশ্যক অনুযায়ী এনে হাতীক গুলি কৰি বধ কৰিবলগীয়া হয়। সাধাৰণ সৰু-সুৰা পোৱালি হাতীজাকৰ মাজত গড়ালত সোমাই পৰিলে গছকতে সি গুতা বৰন কৰে। এই পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতী ধৰাৰ নিয়ম বহুত দিন পূৰ্বেই উঠাই দিয়া হৈছিল।

সেনা চিকাৰ

সেনা চিকাৰ পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতী ধৰাৰ নিয়ম অতীজৰে পৰা অসমত চলি আহিছে। ইংৰাজৰ দিনত এই পদ্ধতিত হাতী চিকাৰ কৰিবৰ বাবে আইনসমূহ-ভাৱে নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। স্বামী নোন্ডৰ কালতো এই নিয়ম সিদিনাখনলৈকে অসমত প্ৰচলিত হৈ আছিল। এতিয়া অৱশ্যে সেনা চিকাৰ পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতী ধৰাৰ নিয়ম উঠাই দিয়া হৈছে। সেনা চিকাৰত বনৰীয়া হাতী ধৰিবৰ বাবে কুনকী হাতী নিয়োগ কৰা হয়। কুনকীৰ সহায়ত বনৰীয়া হাতী হাবিৰ পৰা বৰি অনা

হয় আৰু এইদৰে ধৰি অনা হাতী পৌৰালিক পিনৰানাত শিকা দিয়া হয়। শিকা লাভ কৰা বনৰীয়া হাতীয়ে মানুহৰ হাক-বচন মানি চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কাল-ক্ৰমত এইদৰে শিকা লাভ কৰা বনৰীয়া হাতীয়ে ঘৰত প্ৰতিপাল কৰি ৰখা ঘৰচীয়া জন্তুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। হাবিত বাস কৰা বনৰীয়া হাতীবিলাকৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি প্ৰকৃতিৰ ভাংসাম্যতা ৰক্ষা কৰাটো এই নিয়মত হাতী ধৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল। অৱশ্যে হাবিত বনৰীয়া হাতী ধৰিবলৈ অনুমতি পোৱা মহলদাৰসকল যে এই নিয়মৰ দ্বাৰা আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট লাভবান হৈছিল সেই কথা দোছাবিবৰ প্ৰয়োজন নাই। সাধাৰণতে চাৰে চাৰি ফুটতকৈ কম উচ্চতাৰ পোৱালি হাতীক ধৰিবলৈ দিয়া নহয়। মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ নেবা পোৱালিক নধৰিবৰ বাবে এই নিয়ম প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিবলগীয়া হৈছিল।

অসমৰ বনভূমি অঞ্চলত স্বাধীন মনেৰে চৰি থকা বনৰীয়া হাতীবিলাকৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আন এটা নিয়ম প্ৰচলিত আছিল। বনাঞ্চলৰ ধাৰণ শক্তিক অতিক্ৰম কৰাৰ ফলত হস্তী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰে যাতে মানৱ জাতিৰ অনিষ্ট সাধন কৰি মহা প্ৰমাণানৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত অভিনৱ ব্যৱস্থাসমূহ কেতিয়াবাবে পৰা অসমত প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হয়। যি যিহেই কি নহওক হাতীৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবৰ বাবে তেতিয়া সুদক্ষ চিকাৰীক গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ হাতীক গুলি কৰি বধ কৰিবলৈ অনুমতি পত্ৰ দিয়া হয়। বিনিময়ত দাঁতাল হাতীৰ দাঁতযোৰা চিকাৰীয়ে পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰে। অৱশ্যে দাঁতাল আৰু মথনা হাতীৰ অনুপাত সমভাৱে ৰাখিবৰ বাবে চিকাৰীয়ে ১৮ মাহৰ আগে পিছে এটা মথনা হাতীকো নিধন কৰিবলগীয়া হয়। কালক্ৰমত এই নিয়মত বনৰীয়া হাতী নিধন কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাত ৰাজ্যিক চনকাৰে অধিনিয়ম প্ৰয়োগ কৰি বনৰীয়া হাতী বধ কৰাৰ মাত্ৰা কমাই দিয়ে। এতিয়া অৱশ্যে এই নিয়মত হাতী বধ কৰাটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। মানুহক অত্যাচাৰ কৰা গুণ্ডা হাতীক নিধন কৰিবলগীয়া হ'লে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজপত্ৰ আৰু বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰা হয়। উপযুক্ত চিকাৰীয়ে তেনে উদগু স্বভাৱৰ হাতীকহে বধ কৰিব পাৰে।

বেলা চিকাৰ পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতী ধৰিবৰ বাবে চিকাৰীৰ দল কুন্‌কীসহ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে। বনৰীয়া হাতীৰ চাহনৰ সন্ধানত চিকাৰী দল গভীৰ অৰণ্য-ভূমিৰ ৰাজতলৈ যাবলগীয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে অলপ দূৰ হাবিৰ ৰাজত সোমোৱাৰ পাছতেই বনৰীয়া হাতীৰ পানৰ নগত চিকাৰী দলৰ তেটোতেটো হয়। চিকাৰী কুন্‌কীয়ে অতকিডে চাহনৰ ৰাজত প্ৰৱেশ কৰি এটা হলখুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে। তেতিয়া চাহনৰ ৰাজত থকা বনৰীয়া হাতীবোৰে ছেদেলি-ভেদেলি হৈ চাৰিওফালে পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। মাকৰ ওচৰৰ পৰা কালবি কাটি জাঁতৰি অহা পোৱালি হাতীৰ ভিত্তিলৈ কানীয়ে তেওঁৰ হাতত থকা মৰাপাটৰ বচিৰ ফালপাট দলিয়াই দিয়ে। সেই ফালপাট ভিত্তিত সৰি পৰিলে হাতী পোৱালিটো পলাব

নোৱাৰাহৈ পৰে। জেতিয়া তাক কুন্ধীৰ সহায়ত শিলখানালৈ বলাই আনি শিকা দিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয়। এইদৰে প্ৰায় এবাছ কাল শিকা লাভ কৰাৰ পাছত বনৰীয়া হাতীৰ পোৱালিটো জাতি হৈ পৰে।

বনৰীয়া হাতী বেলা চিকাৰত ধৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেকটো বন সংৰঙলৰ অন্তৰ্গত থকা হাতী অধ্যুষিত এলেকাবিলাক বহলৰ আকাৰত ভাগ কৰি নিৰ্দিষ্ট আহ্বান কৰা হয়। নিৰিদ্দাৰ সৰ্বোচ্চ নিৰিধৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মহলৰ আসনৰোৰ যোগ্য ব্যক্তিসকলৰ মাজত ভাগ কৰি দিয়া হয়।

গাঁত খান্দি হাতী ৰখাৰ নিয়ম

দক্ষিণ ভাৰতত বনৰীয়া হাতী অহা-যোৱা কৰা বাটত গাঁত খান্দি ৰাখি জাতী ধৰাৰ এটা নিয়ম প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হয়। এই পদ্ধতিত হাতী ধৰিবৰ বাবে হাতী অহা-যোনা কৰা পথত চিনিব নোৱাৰাকৈ একোটা গাঁত খান্দি ৰখা হয়। দীঘলৈ-বহলৈ প্ৰায় চাৰি মিটাৰ আকাৰৰ একোটা গাঁত খন্দা হয়। ঠিক সেই অনুপাতে গাঁতটোৰ দৰ পৰিমাণো প্ৰায় চাৰি মিটাৰমানত ৰাখি কৰা হয়। গাঁতৰ উপৰিভাগত প্ৰান্তৰীয়া বিধৰ বাঁহ-কাঠেৰে এখন চাং নিৰ্মাণ কৰা হয়। এই চাঙখনৰ ওপৰত এনে ধৰণেৰে কিছুমান বাঁহ-পাত বেলি ৰখা হয় যে বনৰীয়া হাতীবোৰে তাৰ তলতে এটা গাঁত আছে বুলি ধৰিবই নোৱাৰে। গাঁতটোৰ তলিত কিছুমান খেৰ, বাঁহ আদি ডাঠকৈ পাৰি ৰখা হয়। বনৰীয়া হাতীৰ কোনোবা এটাই নজনাকৈয়ে গাঁতৰ ওপৰত আগঠেং দূৰা পেলাই দিয়াৰ লগে লগে সি গাঁতৰ তললৈ সৰি পৰে। এবাৰ গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলে থিয় গৰাৰ ওপৰলৈ উঠি ওলাই আহিব নোৱাৰা হৈ পৰে। গাঁতৰ যি কোনো ফালে থকা থিয় গৰাৰ মাটিবোৰ কাটি কাটি জন্তুকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিবৰ বাবে সন্নিধা কৰি দিয়া হয়। লগে লগে তাৰ ভিত্তিত সৰি পৰাকৈ এডাল ৰচি পেলাই দিয়া হয়। ওপৰলৈ উঠি আহিব পাৰিলেও সি ৰচিডাল ছিঁড়ি পৰাই যোৱাৰ উপায় নাথাকে। এই পদ্ধতিত কৰায়ত্ত কৰা বনৰীয়া হাতী পাছত শিকা দি ঘৰচীয়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়।

জংগী চিকাৰ

নেপালত জংগী চিকাৰ পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতীক ৰখাতা স্বীকাৰ কৰোৱাৰ এটা অভিনৱ প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল। এই প্ৰথাৰে হাতী ধৰাৰ নিয়ম পৃথিৱীৰ অন্য কোনো ঠাইতে নাই। প্ৰকৃততে এই পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতীক বন মনাই ঘৰচীয়া কৰা বীতিক ৰাজকীয় সৰ্বস্ব দিয়া হয়। কোনো ঠাইত প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ দুৰ্গত হাতীৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'লেই মহাবজাৰ জনাব লাগে। মহাবজাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী

সেই দুৰ্গাৰ হাতীক ছলে-বলে-কৌশলে, বশ বনাৰ বাবে চিকাৰীৰ দল যথাস্থানলৈ ধৰণ কৰা হয়। হাবিৰ মাজত বিচৰণ কৰি কুৰা দুৰ্গাৰ হাতীটোক কেইবাটাও বৰচীয়া দাঁতাল হাতীয়ে বাউতৰ সহায়ত চাৰিওফালৰ পৰা বেৰি ধৰে। সিহঁতৰ মাজত ঋণ যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হয়। বৰচীয়া হাতীকেইটাৰ দাঁতৰ প্ৰচণ্ড আঘাতত বনৰীয়া হাতীটোৱে ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিবলগীয়া হয়। অৱশেষত ভাগৰি পৰি সি আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হয়।

ঔষধৰ সহায়ত হাতী ধৰাৰ নিয়ম

আধুনিক যুগত বন্দুকৰ ঔলিৰে বনৰীয়া জন্তুৰ গাত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি কিছু সময়ৰ বাবে অচেতন কৰিব পৰাৰ অভিনৱ প্ৰথা আৱিষ্কাৰ কৰি উলিওৱা হৈছে। এই ধৰণৰ বন্দুকক ট্ৰেকুলাইজাৰ গান বা অচেতন কৰিব পৰা গুণসম্পন্ন বন্দুক বুলি কোৱা হয়। এই ধৰণৰ বন্দুকেৰে গুলিবিদ্ধ কৰি জন্তু বিশেষৰ গাত যি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই ঔষধে জন্তুটোক অচেতন কৰি পেলায়। বাঘ, সিংহৰ নিচিনা মহা পৰাক্ৰমী চিংসাকুনীয়া জন্তুৰো এইদৰে অচেতন কৰি মানুহে হাতেৰে লৰা-চৰা কৰিব পৰা অৱস্থা কৰে। সেই সময়ত জন্তুটোৱে মৃতপ্ৰায় অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। তাৰ পাছত নিৰাময়মূলক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিহে জন্তুটোৰ চেতনা সুবাই অনা হয়। বিশেষতঃসকলে অভিমত প্ৰকাশ কৰে যে এই পদ্ধতিত বনৰীয়া হাতী কৰাৱৰ্ত্ত কৰি স্থানান্তৰ সাপেক্ষে অন্য পৰিবেশত মেলি দিব পৰা যায়।

বিবোৰ ঠাইত বনৰীয়া হাতীৰ সংখ্যা বেছি আৰু য'ত বাস কৰি থকা হাতীৰ উপদ্ৰৱত জনসাধাৰণৰ দুৰ্গতি হয় তেনেবোৰ ঠাইত ট্ৰেকুলাইজাৰ গান প্ৰয়োগ কৰি বনৰীয়া হাতীক অচেতন কৰিব পাৰি। তেনেদৰে অচেতন কৰা হাতীক টুকাত তুলি অন্য ঠাইলৈ নি বেছি পৰিমাণৰ হাতী ধাৰণ কৰিব পৰা বনভূমিত মেলি দিব পাৰি। উল্লেখযোগ্য যে বনৰীয়া হাতীক পুনৰ্স্থাপন কৰাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী-ভাৱে আজিলৈকে ক'তো প্ৰয়োগ কৰা হোৱা নাই। এই পদ্ধতিত হাতী ধৰা যে ব্যয়বহুল আৰু কষ্টসাধ্য হ'ব সেই কথা নকলেও হ'ব। তদুপৰি দুৰৱৰ পৰিমাণ কম হ'লে মেলি দৈ অহা ঠাইৰ পৰা বনৰীয়া হাতীবোৰ আগৰ ঠাইলৈকে আকৌ ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনাকো উলাই কৰিব নোৱাৰি।

ওপৰে ওপৰে লক্ষ্য কৰিলে এছিয়াৰ আটাইবোৰ হাতীকে দেখাত একে যেনেই লাগে। এটা হাতীৰ চেহেৰা-পাতিৰ লগত আন এটা হাতীৰ চেহেৰা-পাতিৰ কিম্বা যে পাৰ্থক্য আছে এই কথা ধৰিবলৈ টান হৈ পৰে। কিন্তু যিবিলাক মানুহে হাতীৰ লগতে লীলা-খেলা কৰি আহিছে সেইবিলাক মানুহে অতি সহজে এই ব্যৱধান ধৰিব পাৰে। সেহেৰ পঠন প্ৰণালীত প্ৰতিকলিত হোৱা ৰূপৰ তাৰতম্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই হাতীবিলাকক বেলেগ বেলেগ নামৰ দ্বাৰা চিনাক্তকৰণ হয়। যিবিলাক

হাতী সাধাৰণতে বেছি ওখ হয় আৰু বাৰ সন্মুখৰ ডাঙৰ বেহৰ পুছৰ ডাঙৰডকৈ ডালে-
খিনি ওখ হয় তেনে হাতীক 'মিৰিকা বান্ধ'ৰ হাতী বুলি কোৱা হয়। হাবিৰ বান্ধত
চৰি যুৱা ১২ বান্ধৰ হাতী দূৰৰ পৰা টল্টলকৈ ভিলিকি থাকে আৰু মিৰিকা বান্ধৰ
হাতী দেখোৱা উৱনি হয়। আন কিছুমান হাতীৰ গাটো অলপ খোপোকা হয় আৰু
এনে হাতীৰ দেহৰ আগভাগ আৰু পশ্চাৎৰ উচ্চতাত পাৰ্থক্য থকা দেখা নাযায়।
এই দিহাৰ হাতীবিনাকক 'কোমোৰা বান্ধ'ৰ হাতী বুলি অভিহিত কৰা হয়। তৃতীয়
বিধ হাতী চাপৰ আৰু গঁঠীয়া হয় আৰু এনে হাতীক 'গেৰা বান্ধ'ৰ হাতী বুলি কোৱা
হয়। হাতীৰ সাধাৰণতে ১৮ টাকৈ নখ থাকে। এনে হাতীক ১৮ নখীয়া হাতী
বুলি কোৱা হয়। ১৬ নখীয়া হাতীও কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ২০ আৰু
২২ নখীয়া হাতী অৱশ্যে অতি বিৰল।



কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চৰি ফুৰা এটা বনবীয়া হাতী।

মেঘালয়ৰ কোনো কোনো ঠাইত গঁঠীয়া ডাঙৰ আন এবিধ হাতী বাস কৰে
বুলি জনা যায়। এই বিধ হাতী তাত আলেঙে আলেঙে বাস কৰি বকাৰ সঠিক ধৰণ
এতিয়াও সাব্যস্ত হোৱা নাই। আকাৰত এই বিধ হাতী ইমান সৰু যে সিহঁতক
সাধাৰণ হাতীৰ একো একোটা পোৱালি বেনুহে লাগে। এনে হাতীক পিগৰি
এলিকেন্ট বা দুৱাৰ্ক এলিকেন্ট নামেৰে অভিহিত কৰিব পাৰি। সৰু আকাৰৰ এই বিধ
খিচুৱা হাতী আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াব পাৰিলে বন্যপ্ৰাণীৰ জগতলৈ এক অভিনৱ অৱ-
দান আহি পৰিব। ব্ৰহ্মদেশত এবিধ গুৰুতৰ হাতী বাস কৰে বুলি জনা যায়। তাৰ
মানুহে এই বগা বনবীয়া হাতীক পৱিত্ৰ জ্ঞান কৰে। বগা হাতীক এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ
জন্তু বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। তাত বাস কৰা সাধাৰণ বৰণৰ হাতীৰ পৰাই
কেতিয়াবা বগা হাতীৰ জন্ম হয়।

বনচীয়াতকৈ পুহি প্ৰতিপালন কৰা হাতীবিনাক সাধাৰণতে শুভ্ৰ-ভক্ত হ'লেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা সিহঁতৰ দুই-এটাই অতিশয় উগ্ৰ বৃত্তি ধাৰণ কৰে। তাৰি খোলাৰ সময়তে হাতীয়ে তেনে উগ্ৰ মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰে। এনে অৱস্থা প্ৰাপ্ত হাতীক শুভ্ৰ বুলি কোৱা হয়। কোনো কোনোৱে ইয়াক পগলা হাতী বুলিও ক'ব খোৱা হয়।

বনচীয়া হাতীৰ দুই-এটাই কেতিয়াবা বেতিয়া পগলাৰ নিচিনা হৈ উগ্ৰ বৃত্তি ধাৰণ কৰে তেতিয়া বাউত আৰু বাঁহীৰ (বাঁচীৰ) জীৱন বিপদাপন্ন হৈ পৰে। কাৰণ এই অৱস্থাত অকটোৱে বাউত-কাঁচৰ বাইক-বচন মানিব নোৱাৰে। অবাধ্য প্ৰকৃতিৰ হাতীটোৱে কেতিয়াবা আচৰিত হৈ বাউত বা বাঁহীক (উচ্চাৰণত বাঁচী বুলি কোৱা হয়) আক্ৰমণ কৰি তৎপুৰ্ব্বত বৃত্ত্যৰ বৃদ্ধি লৈ দিয়ে। শুনা যায় যে বাঁহীতকৈ বাউতলৈহে পগলা হাতীৰ আক্ৰোশ বেছি। সৰহ ভাগ ক্ষেত্ৰত বাউতেহে পগলা হাতীৰ বাৰা আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হয়। সাধাৰণতে বাউতেহে বনচীয়া হাতীক পৰিচালনা কৰি ইফালে-সিফালে লৈ ফুৰে। অন্যথা প্ৰকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হাতীক কেতিয়াবা এই বাউতেই নিৰ্ভৰতাৰে শাস্তি দিবলগীয়া হয়। আনহাতে দেখা যায় যে বাঁহীয়ে হাতীক খুৱাবৰ বাবে হাবিৰ পৰা বাঁহ-বন আদি সংগ্ৰহ কৰি আনে। সেইকাৰণে বাঁহীৰ প্ৰতি হাতীয়ে অলপ মৰম বা সহানুভূতি থকা যেন লাগে। অৱশ্যে খোৱা বস্তু (যেনে ধান, বটু মাছ ইত্যাদিৰ দৈনিক বেচন) সময় নতে দিয়াৰ অলপ হীন-ভেটি হ'লে বাঁচীৰ ওপৰতো কেতিয়াবা ই প্ৰতিশোধ লয়।

বনৰীয়া হাতীৰ চাহনৰ ৰাজত্ব কেতিয়াবা অকস্মাতে একোটা দুৰ্ভাগ্য হাতীৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এজনী ডাঙৰ আকাৰৰ হুই হাতীয়ে একোটা-চাহনক পৰিচালনা কৰি হাবিৰ ৰাজত্ব লৈ ফুৰে। বাকীবোৰ হাতীয়ে তাইকে অনু-সৰণ কৰে। মজা, মাইকী আৰু পোৱালিৰ সমাবেশত একোটা চাহনৰ সৃষ্টি হয়। সাধাৰণতে প্ৰায় ১০।১৫ টা হাতী একোটা চাহনত একেলগে চৰি কুৰা অৱস্থাত দেখা যায়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কেইবাটাও সৰু চাহন লগ হৈ একো একোটা ডাঙৰ চাহনৰ সৃষ্টি হয়। চাহনৰ ৰাজত্ব থকা যিটো হাতী আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী হয় সেইটো হাতীয়ে চাহনৰ ৰাজত্ব আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে। সাধাৰণতে এই প্ৰকাণ্ড হাতীটোৱে চাহনৰ ৰাজত্ব একেলগে চৰি কুৰা। অন্যান্য মজা হাতীবিনাকৰ প্ৰতি কোনো আক্ৰোশৰ ভাব প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা নাযায়। চাহনৰ ৰাজত্ব সিহঁতৰ উপস্থিতিয়ে তাৰ বাবে কোনো প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে। মাইকী হাতীৰ সন্মুখলৈ আহি পালে সি উলও বৈ পৰে আৰু চাহনৰ ৰাজত্ব থকা অন্যান্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী হাতীকেইটাক চাহনৰ ৰাজৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিবৰ বাবে সি যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত হয়। যুদ্ধত জয় লাভ কৰি সি চাহনৰ ৰাজৰ পৰা বাকী-কেইটা মজা হাতীক বাহিৰ কৰি দিয়ে। এনে ধৰণৰ বিজয়ী হাতীক চাহানীয়া শুভ্ৰ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়।

চাহনৰ ৰাজৰ পৰা খেদা খোৱা হাতীৰ দুই-এটাই অলপ আঁতৰলৈ গৈ অকল-পৰীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰে। তেনে ধৰণৰ শুভ্ৰ হাতীক "একমুখা" শুভ্ৰ বুলি কোৱা

হয়। চাহনৰ মাজত থকা অন্যান্য গুণ্য হাতীক “লক্ষ্য গুণ্য” নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা বুঢ়া বা জুতোৰিক গুণ্য হাতী লগলাগি মিলক জীৱন বাপন কৰিবলৈ লয়। এনে হাতীক “বালবুৰীয়া” নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। একনুৱা গুণ্য আৰু বালবুৰীয়া হাতীয়ে কেতিয়াবা হাবিৰ মাজৰ পৰা পলা কৈছেলৈ ওলাই আহি মানুহৰ অভিলাষন কৰেহি।

হাতীৰ দাঁতৰ মজ্জা

(১) দাঁতাল হাতীৰ দাঁতযোৰা যদি তলুকাদাঁতীয়া হাতীৰ দাঁতৰ দৰে মোটা নহৈ অলপ পাঁতাল চানেকীয়া হয় আৰু সেই দাঁতযোৰা যদি ধেনুভিৰীয়াটক মাটিৰফালে মুখ কৰি থাকে তেতিয়া সেই দাঁত পাঁতালপুৰীয়া দাঁত বুলি অভিহিত কৰা হয়।

(২) যিবিলাক দাঁতাল হাতীৰ মাত্ৰ এটাহে দাঁত থাকে তেনে হাতীক গণেশ বুলি কোৱা হয়।

(৩) যি হাতীৰ দাঁতযোৰা গুঁৰৰ তলতে লুকাই থাকে তেনে হাতীক মথনা বুলি কোৱা হয়।

(৪) কিছুমান মতা হাতীৰ একেবাৰেই বাহিবলৈ ওলাই পৰা দীঘল দাঁতৰ চিন-চাব নাথাকে। তেনে হাতীক মথা বুলি কোৱা হয়।

আমাৰ অসমৰ আচ্যৰত লোকে আগতে যবত হাতী পুহিছিল। সেই সময়ত হাতীক এক প্ৰকাৰ সন্মানৰ নিৰ্ধাৰন বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। অৱশ্যে আজি-কালিও বহুতো সমৰ্থবান লোকে হাতী পোহে আৰু সেই হাতীক নানা ধৰণৰ কামত নিয়োগ কৰি অৰ্প উপাৰ্জনৰ পথ উলিয়ায়। আজিকালি আগৰ দৰে হাতী পোহনীয়া কৰি প্ৰতিপালন কৰিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈ পৰিল। আগতে যিবোৰ ঠাই যবচীয়া হাতী চৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এতিয়া সেইবোৰ ঠাইৰ সৰহ ভাগ মুকলি পথাৰত পৰিণত হ’ল। জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ ফলত হাতীক প্ৰতিপালন কৰি ৰখা ঠাই সঙ্কোচিত হৈ আহিল। সেইবাবে হাতী পোহাৰ চৰ আজিকালি আমাৰ মানুহৰ মাজত কমি আহিছে।

এছিয়াৰ হাতীৰ পৰমায়ু ৬০।৭০ বছৰ বুলি জনা যায়। সাইকী হাতীয়ে ১৮ বাহমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২২ বাহ গৰ্ভত সন্তান ধাৰণ কৰে। সাইকী পোৱালিৰ কেৱলত প্ৰায় ১৮ বাহ আৰু বঁজা পোৱালিৰ বাবে ২১ বা ২২ বাহ সময় পোৱালি জগিবৰ বাবে আৱশ্যক হয় বুলি জনা যায়। প্ৰায় ১৩ বা ১৪ বছৰ বয়লত সাইকী হাতীয়ে প্ৰথম পোৱালি জগায়। প্ৰায় তিনি বছৰমান বয়ল পৰ্যন্ত পোৱালিয়ে মাকৰ গাৰীৰ খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। তাৰ পাছত সেই পোৱালিয়ে বাঁহত মুখ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বাঁহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পাছতো পোৱালিটোৱে বহুত দিনলৈ মাকৰ লগতে থাকে। জনা যায় যে দ্বিতীয় পোৱালি জন্মাবলৈ মাকজনীক প্ৰায় ৮ টামাহ বন্ধৰ ব্যৱধান আৱশ্যক হয়।

গঁড় জাতীয় প্ৰাণীবিলাক

প্ৰাক্ ঐতিহাসিক যুগত যিবিলাক বিভিন্ন জাতৰ বন্যপ্ৰাণী এই পৃথিৱীখনৰ ভিন্ন ভিন্ন ঠাইত বাস কৰিছিল সেইবিলাকৰ ভিতৰত বহুতো প্ৰকাৰৰ বিচিত্ৰ প্ৰাণী ইতিমধ্যে চিনদিনৰ বাবে নোপ পাইছে। জীৱ ভাগতৰ মাজত সংঘটিত হোৱা প্ৰৱহমান ক্ৰম বিকাশে প্ৰাণীজগতটো পৰিৱৰ্তনৰ সোঁত বোৱাই আনিলে। যল্লক্ষণে বহুতো জাতৰ প্ৰাণীৰ আওকাণ ঘটিল। আন কিছুমানে নতুন ৰূপত আৱৰ্ণকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কালৰ কুলি গঁড়ত নিৰ্ৰাপিত হোৱা প্ৰাণী কিছুমানৰ জীৱাশ্মবিলাক সূক্ষ্মভাৱে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি জীৱবিদসকলে লুপ্ত হোৱা প্ৰাণীবিলাকৰ বিষয়ে বহুতো তথ্য উদ্ঘাটন কৰিছে। নানা ৰাজ্য-প্ৰতিষ্ঠাতৰ পৰিৱৰ্তনক হেলাৰঙে আওকাণ কৰি যিবিলাক প্ৰাগ্-ঐতিহাসিক যুগৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে আজিকোপতি বসতি সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই আটাইবিলাকৰ ভিতৰত গঁড় নামেৰে পৰিচিত বিচিত্ৰ প্ৰাণীবিলাকলৈও আঙুলিয়াব পাৰি। তাৰ ভিতৰত যিবিধ গঁড় জাতীয় প্ৰাণীক অসমত বাস কৰা দেখা যায় সেই বিধক গ্ৰেইট্ ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ণড্ বাইনোচেৰাচ বা বৃহৎ আকাৰৰ এটা বৰ্গলম্পন্ন ভাবতীয় গঁড় বুলি অভিহিত কৰা হয়। এই বিধ গঁড় জাতীয় প্ৰাণীৰ বাহিৰে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশ দুখনত আন কেবাবিধৰো গঁড় বাস কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উল্লেখযোগ্য যে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ অন্য কোনো এখন মহাদেশত গঁড় জাতীয় প্ৰাণীক বনৰীয়া অৱস্থাত স্বাভাৱিক পৰিবেশত বাস কৰা দেখা নাযায়। আটাইবিলাক গঁড় জাতীয় প্ৰাণীক একত্ৰ কৰি বাইনোচেৰাচিডি নামৰ এটা কুল বা পৰিয়ালত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰখা হৈছে।

তুং আৰু পল্লৱভোজী প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা অন্যতম গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী-বিলাকে গঁড় জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ দেহত কিছুমান স্বতন্ত্ৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণৰ বিকাশ হোৱা দেখা যায়। সৰ্বপ্ৰথমে ক'ব পাৰি যে গঁড় জাতীয় প্ৰাণী-বিলাকক অকুণ্ঠা অংগুলিবিধি প্ৰাণীৰ বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। সেইকাৰণে সিহঁতক পেৰিচোভেউল্ল বা অকুণ্ঠ অংগুলি থকা প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। উল্লেখ-যোগ্য যে গঁড় জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে বোঁকা, গাধ, জেব্ৰা আদি প্ৰাণীয়েও অকুণ্ঠ চৰিত্ৰৰ আঙুলি ধাৰণ কৰে। গঁড়ৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইহঁতৰ ঠেঙৰ

আগভাগত তিনিটা তিনিটাকৈ খুৰা সদৃশ থকাও আকাৰৰ নৰৰ উৎপত্তি হয়। যোঁৰা প্ৰভৃতি প্ৰাণীবোৰৰ ঠেঙত মাত্ৰ এটাকৈ খুৰা থাকে।

সকলো ক্ষেত্ৰতে গঁড় জাতীয় প্ৰাণীবোৰৰ শৰীৰটো অভাৱনীয়ভাৱে মোটা হোৱা দেখা যায়। দেহৰ আকাৰৰ তুলনাত ইহঁতৰ ঠেংকেইখনে চুটি ৰূপ ধাৰণ কৰে। ইহঁতৰ গাত উৎপন্ন হোৱা ছালখন অতিপাত ডাঠ হয় আৰু এই ডাঠ ছালখনৰ উপবিভাগত ঠৰঙা বিধৰ সেবেঙা সেবেঙা নোম থাকে। ভিত্তি আৰু গম্ভীৰ মণ্ডহাল হয়। ঠিক সেইদৰে এইবিলাক বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ মূৰৰ আকাৰ ডাঙৰ হোৱা দেখা যায়। ইহঁতৰ মূৰৰ ওপৰিভাগত যি শিঙৰ উৎপত্তি হয় সেই শিঙক আঁহৰ ভাষাত শিং বুলি নটকৈ খৰ্গ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। ভাৰতীয় গঁড়ৰ ছালখনে বেকটা-মেকটা ৰূপ ধাৰণ কৰে। আফ্ৰিকা মহাদেশীয় গঁড়ৰ ছালত এই বৈচিত্ৰ্য পৰিলক্ষিত নহয়।

আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ অনুকূল পৰিবেশ কিছুমানে গঁড় জাতীয় প্ৰাণীৰ বসতি স্থানবোৰ অধিতীয়ভাৱে নিৰ্ণয় কৰিছে। বিবিট আকাৰৰ তৃণ-পল্লবভোজী তন্তু হোৱাৰ বাবে নিবিষে জীয়াই থাকিবলৈ ইহঁতক যথেষ্ট পৰিশোধৰ খাদ্য সামগ্ৰী লাগে। এই প্ৰাণীবিলাকে বাস কৰিবলৈ পোৱা স্বাভাৱিক পৰিবেশবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী থকাটো নিতান্ত আৱশ্যক। যোঁৰা, গাধ আদি অশ্বশ্ৰে অংগুলিবিশিষ্ট প্ৰাণীৰ দৰে এই গঁড় গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰক ডাকপাতি বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কেইবাটাও গঁড় একেডোখৰ ঠাইতে চৰি ফুৰা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গ'লেও সিহঁতৰ মাজত পাৰস্পৰিক আকৰ্ষণ আৰু জাক পাতি থকাৰ মনোভাৱ তীব্ৰ হোৱা দেখা নাযায়। প্ৰকাণ্ড অৱয়ৱৰ ভাৰাজাত প্ৰাণী হ'লেও গঁড়বোৰে অতি বেগত দৌৰিব পাৰে। ভাৰতীয় গঁড়ৰ মূৰত মাত্ৰ এটাকৈ খৰ্গৰ উৎপত্তি হয়। আফ্ৰিকা মহাদেশত যি কেইবিধ গঁড় বাস কৰে সেইকেইবিধ গঁড়ৰ কিন্তু দুটা দুটাকৈ খৰ্গ থাকে। এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণ পূবফালে থকা দেশবিলাকত যি কেইবিধ মঞ্জৰীয়া আকাৰৰ গঁড় বাস কৰে সিহঁতৰ মাততো দুটা খৰ্গ থকা এবিধ গঁড় বাস কৰা দেখা যায়।

ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্বাঞ্চলত বাস কৰা ডাঙৰ আকাৰৰ গঁড়ক বাইনোচেৰাছ ইউনিক-গিচ বুলি কোৱা হয়। এই বিধ গঁড়ৰ সবহ সংখ্যক প্ৰাণীক অসমতে বাস কৰা দেখা যায়। এটা খৰ্গ থকা আন এবিধ সৰু আকাৰৰ গঁড় পূৰ্বতে পূৰ্বাঞ্চলত দেখা গৈছিল।

এটা খৰ্গসম্পন্ন সৰু আকাৰৰ গঁড়ৰ বসতিস্থান পূৰ্বতে পশ্চিম বঙ্গৰ মুন্সৰিৰ বনাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ কোনো কোনো অৰণ্যভূমিলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছিল বুলি জনা যায়। বৰ্তমানে ভাৰতবৰ্ষত এই বিধ গঁড়ৰ চিনচাৰ পাখলৈ নাইকিয়া হৈ পৰিল। মালয়ছিয়াৰ অন্তৰ্গত থকা উদজং কুলন অভয়াৰণ্য নামৰ বন্যপ্ৰাণী অধ্যয়িত পৰিত্ৰভূমিত এই বিধ গঁড়ৰ গোটাচেৰেক এতিয়াও বৰ্তি আছেগৈ বুলি জনা যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষাত এই বিধ গঁড়ক বাইনোচেৰাছ চুলাইকাচ বুলি অভিহিত কৰা হয়। এছিয়া মহাদেশৰ কোনো কোনো ঠাইত আন এবিধ দুটা

বনসম্পন্ন সৰু আকাৰৰ গঁড় বাস কৰে বুলি জনা যায়। এই বিধ গঁড়ক ডাইনোব-
নোচেৰাচ্ চুমাআৰেকিচ্ বুলি কোৱা হয়। এই বিধ গঁড়ো আগতে অসমত
বাস কৰিছিল। এতিয়া বৰি-হাজি নাইকিয়া হ'ল।

আফ্ৰিকা মহাদেশত দুবিধ গঁড় জাতীয় প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা যায়। তাৰে
এবিধক কুৰুৰ্ণৰ গঁড় বা ক'লা গঁড় আৰু দ্বিতীয় বিধক শুকুৰ্ণৰ গঁড় বা বগা
গঁড় নামেৰে জনা যায়। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইহঁতৰ প্ৰথম বিধক ডাইনোচেৰাচ্ বাইক'নেচ
আৰু দ্বিতীয় বিধক ডাইনোচেৰাচ্ চাইমচ্ বুলি কোৱা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ হিমালয়
শৈলমালাৰ নামনি ভাগত শিৱালিক নামৰ এশাবী পৰ্বত আছে। এই পৰ্বতমালাৰ
আশে-পাশে থকা ঠাইবোৰত আন দুবিধ গঁড় অতীততে বাস কৰি আছিল। তাৰে
এবিধক বাইনোচেৰাচ্ চিলভেনচিচ্ আৰু দ্বিতীয় বিধক বাইনোচেৰাচ্ পোণ্ডান্সিকচ্
বুলি অভিহিত কৰা হয়। এই দুয়োবিধ প্ৰাণী এতিয়া নৃপ্ত হৈছে।

২টা ধৰ্গ থকা ভাৰতীয় বৃহৎ গঁড়

শ্ৰেণী—সন্মাপনী

বন—পেৰিচোটেক্টিভ

কুল—বাইনোটেক্টিভ

প্রজাতি—বাইন'চেবাচ ইউনিক'লিচ

যিবিধ গঁড় গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী অসমৰ চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত যুগ-যুগান্তৰৰ পৰা বাস কৰিছে সেই বিধ নিচিন্ত জন্তুৰে বনাঞ্চলী স্ৰাভত এক পৰম আশ্চৰ্যৰ অভিলেখ স্ৰষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সৰ্বসাধাৰণৰ ভাষাত এই বিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ আমাৰ মানুহে কেৱল “গঁড়” শব্দটোকে প্ৰয়োগ কৰে। ইংৰাজী ভাষাত এই ভাৰতীয় প্ৰাণী-বোৰক বুজাবলৈও বাইন'চেবাচ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অসমত এই ভাৰতীয় ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা বিধ গঁড়ক “গ্ৰেইট ইণ্ডিয়ান বাইন'চেবাচ” নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। ইংৰাজী ভাষাৰ লক্ষ্যভাৱে ইয়াত বহুবিধ পুৰাই আৰু অন্যান্য জাতীয় গঁড়বিলাকৰ লগত ইয়াৰ পাৰ্থক্য কৰি চানেকিৰে গুণাৱলী সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত সচলভাৱে বহুবিধ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ভাৰতীয় বৃহৎ গঁড়” নামেৰে নামকৰণ কৰিব পৰা বহুবিধ প্ৰজাতিৰ গঁড়ৰ প্ৰচলিত নিয়ম অনুযায়ী কেৱল “গঁড়” শব্দটোকে এই বিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আৰু আটাইকেইবিধ বিধৰ সৰ্বজন প্ৰতিপাদ্য কৰা বিষয়াত দীঘলীয়া শব্দভাৰীৰ সংযোগ অপৰিহাৰ্য্য বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰিব।

অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ যিবোৰ ঠাইত গঁড় জন্তুৰে বাস কৰিছে বিভাজ্য কৰি আছে সেইবিলাকৰ ভিতৰত কেৱল অসমৰ অনুকূল বাস স্থানতহে এই জন্তুৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক প্ৰাণী ধাৰণ কৰি আছে এই কথা অসমৰ বাসিন্দাৰ প্ৰতিপাদ্য হৈছে। যাচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ বাহিৰে কোৱাৰ টকৰ সৰ্বাধিক গোট-চেৰেক গঁড় বাস কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমৰ বাসিন্দাৰ অসম-পাৰা অভয়াৰণ্যত বাস কৰি থকা গঁড়ৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰায় ৩০ টাকৈ হৈছে। অসমৰ অনুকূল জনবাহুৰ পৰিবেশে ধাৰণ কৰা এই জাতীয় জন্তুৰ পৰিৱৰ্ত্তন সংখ্যা দুই হাজাৰৰ কম নহ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত বনাঞ্চলীৰ ধাৰণকৰ্ত্তা কৰ্ম্মবিধা বাহিৰে

উদ্যানতে প্ৰায় এহেজাৰটামান গঁড়ে খলুৱাভাৱে বসতি কৰি আছে। নগাঁও জিলাৰ উত্তৰ অঞ্চলত সংস্থাপিত লাওখোৱা অভয়াৰণ্যখনেও কিছু সংখ্যক গঁড় জাতীয় প্ৰাণী ধাৰণ কৰিছিল। এইখন জিলাৰে পশ্চিমৰ ফালে মায়াং অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠিত পৱিতৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ভালে কেইটামান গঁড়ে বসতি সাব্যস্ত কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। উত্তৰ পাৰে থকা ওৰাং অভয়াৰণ্যতো গঁড় জাতীয় প্ৰাণীয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব পাৰিছে। এই একেখন জিলাৰ অন্তৰ্গত উপস্থাপিত বৃদ্ধপুত্ৰৰ মাজত থকা বুঢ়াচাপৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু কাজিৰঙাৰ উত্তৰ ফালে থকা বৃদ্ধপুত্ৰৰ পাৰৰ পাণপুৰ বনাঞ্চলেও কিছু



কাজিৰঙাৰ হাবিত চৰি ফুৰা এটা গঁড় থকা নৃহৎ ভাৰতীয় গঁড়

সংখ্যক গঁড়ৰ বাবে বসতিস্থান নিৰ্ণয় কৰিছে। তদুপৰি মানাহ অভয়াৰণ্য তথা ব্যাঘ্ৰ যোজনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত এলেকাত কিছু সংখ্যক গঁড় স্থানীয়ভাৱে বসতি বিস্তাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আনহাতে গঁড়ৰ স্বাভাৱিক বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি কেৱল ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা বনভূমিবিলাকতহে সীমিত হৈ আছে সেই কথা সত্য বুলি ক'ব নোৱাৰি। কামৰূপ জিলাৰ কুৰুমা বনাঞ্চল, শিৱসাগৰ জিলাৰ পানীডিহিং বনাঞ্চল আৰু অন্যান্য চাপৰিবিলাকতো কম-বেছি পৰিমাণে গঁড় জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া কাজিৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পোন প্ৰথমতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল তেতিয়া তাত নল, খাগৰি, ইকৰা আদি ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদেৰে পৰিপূৰ্ণ বালিহঁহীয়া আৰু দ চানেকীয়া ঠাইবোৰত প্ৰায় ১২ টা মানহে গঁড় বাস কৰিছিল। কোৱা বাহুল্য যে এই বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নিকপ্ৰকপীয়া কৰিবলৈকে এই বনাঞ্চলৰ সীমাবেধা নিকপণ কৰিবলৈ তেতিয়া অবিপ কাৰ্য অসমৰ বনবিভাগে হাতত লৈছিল। যিজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মনিষ্ঠা বন বিষয়াই অপেষ পৰি-
শ্ৰম কৰি অবিপ কাৰ্য সম্পাদন কৰি কাজিৰঙাৰ মানচিত্ৰত ৰূপদান দিছিল সেইজনৰ নাম স্মৰণযোগ্যভাৱে আদৰণীয় হোৱা আৱশ্যক। সেইজন ক্ষণজন্মা বন বিষয়াৰ নাম আছিল স্বৰ্গীয় মুনী মিৰি। অকাল মৃত্যুৱে এওঁৰ জীৱন অকালতে নিৰাপিত কৰিলে। অসমৰ বনবিভাগে পাহৰণিৰ গৰ্ভত এই গৰাকী কৰ্মচাৰীক বিলীন হ'বলৈ নিদি কাজিৰঙাৰ দক্ষিণ ফালে ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষত থকা এটা টিলাত তেওঁৰ নামত এটা নিৰীক্ষণ স্তম্ভ প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁৰ ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। স্বদীৰ্ঘ কাল কাজিৰঙাৰ সামান্য সংখ্যক গড়ে নিৰাপত্তাৰ ভোগদক্ষ সাব্যস্ত কৰাৰ ফলশ্ৰুতি এতিয়া পৰিস্ফুটভাৱে প্ৰতীকমান হৈছে। কাজিৰঙা বনাঞ্চল এতিয়া কেবল অভয়াৰণ্য হৈয়েই থকা নাই। পূৰ্বাঞ্চলত থকা এই অভয়াৰণ্যখনত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূৰ্ণস্বত্ব আৰোপিত হৈছে। একান্তৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা সমস্ত অগমে বিশ্ব বন্যপ্ৰাণীৰ মানচিত্ৰত এখন উচ্চমানৰ আসন লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। তদুপৰি গড় জাতীয় জন্তুৰ বাহিৰেও অন্যান্য সকলো জাতৰ বিচিত্ৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে ইয়াত থিৰে মান কৰি থকাৰ দ্ৰুতিবা পাইছে।

গোলন্দৰ মাপ-কাঠিৰে জুখি চালে গঁড় জাতীয় প্ৰাণীবোৰক ধুনীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তুৰ পাচুৰ্বেদে ভৰপূৰ এই বি। প্ৰ. শীক প্ৰাণ ইতিহাসিক যুগত বাস কৰা জন্তুবিলাকৰ অন্যতম জীৱন্ত সাধন বুলি গণ্য কৰা হয়। কোটি কোটি বছৰৰ পূৰ্বে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ভিন ভিন পৰিবেশত সিবিলাক বৈচিত্ৰ্যময় প্ৰাণী বাস কৰিছিল অভ্যুৎপানৰ পটভূমিত সেইবিলাক জীৱৰ সৰহভাগ পৃথিৱীৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে বিৰাণ ল'বলগীয়া হ'ল। দৈহিক গঠন প্ৰণালীৰ ক্ৰমবৰ্দ্ধমান বিকাশে আন কিছুমানৰ অৱয়ৱলৈ বহুতো পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিলে। জীৱবিদ বিজ্ঞানীসকলে অভিমত প্ৰকাশ কৰিব খোজে যে গঁড় জাতীয় জন্তুৰ দেহলৈ নানি অহা শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক পৰিৱৰ্তন তেনেই সামান্য। সেইকাৰণে গঁড়বিলাকক প্ৰাচীন কালত পৃথিৱীত বাস কৰা প্ৰাণীবিলাকৰ অন্যতম প্ৰতিনিধি বুলি ক'ব পাৰি।

ভাৰতীয় গঁড়ৰ মাত্ৰ এটাকৈ শিং থাকে। অসমীয়া ভাষাত এই শিঙক খৰ্গ বোলা হয়। কপালৰ ওপৰৰ ফালে নাকৰ বিদ্ধা দুটাৰ উপবিভাগত শিঙৰ ঠাইত এপাট খৰ্গৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা যায়। খৰ্গৰ গুৰিভাগ জন্তুৰ সন্মুখৰ ডাঠ ছালৰ লগত লিপিত খাই থাকে। আগৰ অংশ ক্ৰমে ওপৰলৈ সৰু হৈ গৈ একেবাৰে আগলৈ অৱলম্বিত হোৱা ৰূপ ধাৰণ কৰে। খৰ্গপাটৰ গুৰিৰ লগত জন্তু-

টোৰ লাওখোলাত বিকশিত হোৱা হাড়ৰ কোনো যোগাযোগ পৰিলক্ষিত নহয়। ইয়াৰ ঊৰ্দ্ধপ্ৰান্তি ছালৰ উপবিভাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ বাবে হাড়ৰ লগত ইয়াৰ পোন-পটীয়া সম্পৰ্ক থকা দেখা নাযায়। জন্তুবিশেষৰ বয়স বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই বৰ্গপাট আকাৰত বাঢ়ি যায় আৰু ইয়াৰ দীৰ্ঘতাই সেই অনুপাতে বিকৃত ৰূপ ধৰণ কৰে। প্ৰতিবেশী আৰু প্ৰতিবন্দী গঁড়ৰ লগত যুঁজ-বাগৰত প্ৰবৃত্ত হ'লে বৰ্গপাটৰ কতিয়ামন বটে আৰু তাৰ ফলত বৰ্গপাট ভোঁটা হোৱাকৈ চুটি হৈ পৰে। সময় আগবাঢ়াৰ লগে লগে চুটি হৈ পৰা বৰ্গপাট নাহে নাহে ৰাফ্ৰিৰটৈ ধৰে। আগহাতে গঁড়ৰ বৰ্গক গৰু-ম'হৰ শিতৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা নাযায়। কিয়নো এই প্ৰাণী-বিলাকৰ শিতৰ দৰে গঁড়ৰ বৰ্গ কোনো এবিধ গোটা পুনৰ্ধৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হোৱা আৰু-বকাৰ সঁজুলি বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। কিছুমান চুলি বা নোম গোট মাৰি এই বৰ্গৰ ঊৰ্দ্ধপ্ৰান্তি হয়। শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে গঁড়ে এই বৰ্গপাট পোনপটীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা নাযায়। শত্ৰুক প্ৰহাৰ কৰি জখম কৰিবলৈ গঁড়ে পোন চাটেই দাঁত আৰু মুখৰ আগভাগ কামত লগোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ পাছত শিং বা বৰ্গ পাটেৰে উজাল মাৰি জন্তটোক দূৰলৈ ঠকুৱাই দিয়ে। গঁড়ৰ প্ৰত্যেক-খন ঠেঙেতে তিনিটা তিনিটাকৈ নখ থাকে। তৰ্জনী, মধ্যমা আৰু অনামিকা আঙুলিৰ আগভাগ কৰ্পাতৰিত হৈ নখৰ কপত বিকশিত হয়। বৃদ্ধ আৰু কনিষ্ঠ আঙুলি সম্পূৰ্ণ-ভাৱে অদৃশ্য হয়। খুৰাৰ নিচিনা অলপ বহল আকাৰৰ নখ থকা প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে গঁড় জাতীয় জন্তুকো আকোলেট গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ভাৰতীয় গঁড়ৰ ছালখন তৰপা-তৰপী হয়। গৰুখনৰ ওপৰৰ ফালে থকা ছালৰ চলংখন পিঠিৰ উপবিভাগলৈকে বিয়পি থাকে। পাছ তপিনা আঙুৰি থকা ছালখনৰ উপবিভাগত থকা নিচিনা ওখোৰা-মোখোৰা দাগ থাকে।

গঁড়ৰ ঠেঙকেইখন জন্তুটোৰ শৰীৰৰ তুলনাত চুটি বুলি ক'ব পাৰি। নিলগৰপৰা লক্ষ্য কৰিলে ইয়াক একাঙ আকাৰৰ এটা এন্দুৰ বা নিৰ্গনি জাতীয় প্ৰাণীৰ নিচিনা দেখি। দেখাত লেখেপা ধৰণৰ জন্তু হ'লেও ই বোকাখনৰ দৰে চানেকীয়া ঠাই-বোৰত অতি সহজে খোজ কাঢ়ি যাব পাৰে। আৱশ্যক হ'লে পানীৰ তলত ডুব গৈ থকা বোকাখন ঠাইবোৰতো পৌৰি যোৱাৰ নিচিনাকৈ অলপ বেগত পোজ কাঢ়ি বোৱাত ইয়াৰ অকণো অসুবিধা নহয়। দ-চানেকীয়া মুকলি ঠাইত থকা বাহনি পথাৰ-বিলাকত এই বিধ প্ৰাণীক মুকলি বগেৰে চৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা পানীৰ স্নাত্ত বা বোকাখন ঠাইত ই পৰি থাকে। বিহমেটেকা আদি উদ্ভিদেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা বিলৰ স্নাত্তত কি এখ এখ বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ থকা দ পানীত পৰি থাকিও সমৰ্থিনি অস্তিৰ হিত কৰি থকা অৱস্থাত ইয়াক দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিনৰ পাৰৰ বাহনিবোৰত কেতিয়াবা ভালেশান প্ৰাণী ওচৰা-ওচৰিকৈ চৰি ফুৰে। বাক-পোৱালি লগ লাগি চৰি ফুৰা অৱস্থাতো এই বিধ প্ৰাণীক দেখা ভো আশা কৰিব পাৰি। বয়স ভাটি দিয়া দুই-এটা প্ৰাণীয়ে মাজে-সময়ে অকল-খৰীয়াভাৱেও চৰি ফুৰে। প্ৰতিবন্দী গঁড়ে বাহীকী গঁড়ৰ সজ স্নাত্ত কৰিবলৈ বাবে ৰঙ

যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত হয় আৰু এনে যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰা বুঢ়া গঁড়ে নিলগলৈ আঁতৰি গৈ অকলশৰীয়াটক জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হয়। এইদৰে নিলগ জীৱন অভিজাহিত কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বুঢ়া গঁড়ৰ দুই-এটাই গাঁৱৰ ওচৰত থকা মুকলি ঠাইলৈ ওলাই আহি নিৰাপত্তাৰ বাবে মানুহৰ আশ্ৰয়ত বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে।

গঁড়ৰ খৰ্গত কিবা বিশেষ গুণ আছে বুলি বহুতো মানুহে বিশ্বাস কৰে। জনগণৰ মাজত এই বিশ্বাস ঘনীভূত হৈ থকাৰ বহুতা ভাৰতৰে জনা নাযায়। কাৰণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ কলত খৰ্গত কোনোউৰৰ সজুত উপকৰণ মিহলি হৈ থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা নাই। গঁড়ে সাধাৰণতে একে-ডোখৰ ঠাইতে মনভ্যাগ কৰে আৰু এইদৰে প্ৰতিদিনে মনভ্যাগ কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰি লোৱা ঠাইডোখৰলৈ একেটা পথেৰে গঁড়ে অহা-যোৱা কৰে। বিপ্ৰাণীক ভাৱে কিবা কাৰণত গঁড় ধৰিবলগীয়া হ'লে, গঁড় অহা-যোৱা কৰা পথত গাঁত খালি চিনিব নোৱাৰাকৈ তাৰ ওপৰখন বাঁহ-বন আদিৰে চাকি বধা হয়। কোনো গঁড়ে এই গাঁত চিনিক নোৱাৰি তাৰ ওপৰত ভৰি দিলে নাহেঁকৈ তললৈ সৰি পৰি ওলাব নোৱাৰা হৈ পৰে। তেতিয়া মানুহে এই গাঁতটোৰ একাধৰ পৰা নাহে নাহে মাটিবোৰ কাটি আঁতৰাই দিয়ে আৰু লগে লগে তাৰ মুখত এটা চকা লগোৱা গড়াল বহুৱাই দিয়া হয়। মজবুটকৈ কাঠেৰে নিৰ্মিত গড়ালটোৰ দুৱাৰখন, ওপৰফালে তুলি দিলে পলাই সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোতে গঁড়টো গড়ালত সুমাই পৰে। তেতিয়া হাতীৰ সহায়ত গড়ালেৰে সৈতে সেই গঁড়টো টানি নিয়া হয় আৰু নদীৰ পাৰৰ সুবিধাজনক ঠাইত আগতে নিৰ্মাণ কৰি বধা কাঠপুলিৰ মজবুত গড়াল এটাৰ ভিতৰত তাক বেলি দিয়া হয়।

প্ৰথম অৱস্থাত হাবিৰ পৰা নতুনটক ধৰি অনা গঁড়ে মানুহলৈ ভয় কৰে আৰু শৰীৰৰ সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰি গড়াল ভাঙি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। ওপৰৰ পৰা পেলাই যোগান ধৰা বাঁহ-পাত আদিত নাহে নাহে সি মুখ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মানুহৰ পৰা এইখিনি মৰম পালে সি নাহে নাহে ভয় ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মৰম লগা মাত্ৰেৰে বাঁহ আদি খাবলৈ বুলি গড়ালৰ একাধৰ পৰা আন কাষলৈ নাতিলে সি বিনা সত্ৰোচে সেইবোৰ খাদ্য বস্তু খাবলৈ আগবাঢ়ি আহে। আধুনিক যুগত টেক্সাইলাইজাৰ গান বা ঔমৰ মিহলুৱা বগলুৰ গুলিৰে বিদ্ধ কৰি বন্যপ্ৰাণীক অস্থায়ীভাৱে অচেতন কৰিব পৰাৰ নিয়ম ওলাইছে। এইদৰে অচেতন কৰা জন্তুক নাহেঁকৈ এটা গড়ালৰ ভিতৰত স্তম্ভুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। বহুতৰ পাহৰেই নিৰাময়গুচক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি জন্তুটোৰ গাঁলৈ চেতনা বুৰাই অনা হয়। তেতিয়া তাক যথাস্থানলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। বিশেষজ্ঞসকলে অভিনৱ পদ্ধতি অনুসাৰে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়।

মাইকী গঁড়ে এবাৰত মাত্ৰ এটাটক পোৱালি জগায়। নতুনকৈ জন্ম পোৱালি-টোৱে মাকৰ গাৰীৰ খাবৰ বাবে লগে লগে কুৰে। মাকে পোৱালিটোক বাঘজাতীয় হিংস্ৰকীয়া প্ৰাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থাকে। মাকৰ গাৰীৰ খাবলৈ এৰা পোৱালিকো বহুত দিনলৈ মাকৰ লগে লগে ঘূৰি কুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

ঘোঁৰা, গাধা, জেব্ৰা ইত্যাদি


ঘোঁৰা, গাধা আৰু জেব্ৰাবিলাকক একেলগে লগ লগাই ইকুইডি নামৰ এটা কুল বা পৰিয়ালত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে আৰ্জেন্টাইন বা খুৰা-সম্পন্ন প্ৰাণীবিলাকক আৰ্জাণ্ডেভেক্টা আৰু পোণ্টোভেক্টা নামৰ দুটা বৰ্গত ভাগ কৰা হৈছে। ঘোঁৰা, গাধা আৰু জেব্ৰাবিলাক মাত্ৰ এটাক আঙুলিৰ বিকাশ দৰ। এই 'নাঙুলি' আগভোগৰ এটা আৱৰণেৰে ঢাক খাই থাকে। সেই কাৰণে এইবিলাক প্ৰাণীক অযুগ্ম অংগনিসম্পন্ন প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। এই সম্পৰ্কত 'উনুকিয়াই' থ'ল পৰা যান যে গঁড় জাতীয় প্ৰাণীবিলাককো অযুগ্ম অংগনি বিশিষ্ট প্ৰাণী বুলি থাৰা গৈ হয়। অৱশ্যে গঁড়ৰ ক্ষেত্ৰত এটাৰ সলনি তিনিটাকৈ নখ বা খুৰা সম্পন্ন আঙুলি থাকে।

ভাৰতবৰ্ষত বনৰীয়া ঘোঁৰা আৰু জেব্ৰা গতানুগতিক কোনো প্ৰাণীক মুকলিৰূপীয়াকৈ স্বাভাৱিক পৰিবেশত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। জেব্ৰা আফ্ৰিকা মহাদেশীয় বন্যপ্ৰাণী। সেইখন মহাদেশত জেব্ৰা গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা একাধিক ছাত্ৰ প্ৰাণী নাম কৰা দেখা যায়। ক'ৱাণ্ডা নামৰ মান এবিধ জেব্ৰা গোষ্ঠীৰ বিচিত্ৰ প্ৰাণী সেইখন মহাদেশত পূৰ্বতে বাস কৰিছিল। এতিয়া সেই বিধ জন্তুৰ বংশধৰ তাত আছে নে নাই সেই বিষয়ে সঠিকভাৱে জনা নাযায়। বহুতো ছাত্ৰ বনৰীয়া ঘোঁৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে ধৰত পুহি প্ৰতিপালন কৰি আছে আৰু ভাৰতীয় জন্তু হিচাপে সিহঁতক নানা কামত লগায়। প্ৰচণ্ড বেগত একেলগেখাণ্ডিয়ে ভাগৰ নগণ্যকৈ দৌৰি দৌৰি যাব পৰাৰ ক্ষমতা থকাৰ বাবে মানৱ জাতিৰ জীৱনত ঘোঁৰা জাতীয় প্ৰাণীৰ শৱদান অপৰিহাৰ্য্যভাৱে আদৰণীয় হৈ আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে এছিয়া মহাদেশৰ মঙ্গোলিয়াৰ ফালে থকা বৃক্ষহীন বাঁহনি পথাৰবিলাকত এবিধ বনৰীয়া ঘোঁৰা স্থানীয়ভাৱে নিগাজীকৈ বাস কৰে। সমগ্ৰ পৃথিৱীত এই বিধ বনৰীয়া ঘোঁৰাকে এই জাতীয় একমাত্ৰ বনৰীয়া প্ৰতিনিধি বুলি জনা যায়। জনপ্ৰিয় ভাষাত এই বিধ বনৰীয়া ঘোঁৰা জাতীয় প্ৰাণীক জেভালফ্ৰিৰ ঘোঁৰা বুলি কোৱা হয়। দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পাম্পাচ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ প্ৰেইৰী ভূমিবিলাকত কিছুমান বনৰীয়া ঘোঁৰাক আৰু পাতি বাস

কৰা দেখিবলৈ পোনা যায়। এইবিলাক পোনা জাতীয় প্ৰাণীক কিছু প্ৰকৃ-
ততে বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ আখ্যা দিব নোৱাৰি। ঘনচীয়া ঘোঁৰা কিছুমান কেনেবাকৈ
মানুহৰ ঘৰৰ পৰা পলাই গৈ এই নিষ্ঠুৰ আক্ৰমণ মুকলিমূৰীয়া ঘাঁহনিবিলাকত বনৰীয়া
ৰূপে থাকিবলৈ ল'লেগৈ। প্ৰাচ্য অসমীয়া ভাষাত এইবিলাক ঘোঁৰাক
বন-ঘনচীয়াৰ আখ্যা দিব পাৰি। এনেবিলাক ঠাইত যাকে যাকে বিচৰণ কৰি ফুৰা
ঘোঁৰাবোৰ আমেৰিকাৰ মানুহে সংৰক্ষণ কৰি বগাব যাত্ৰীয় ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। সিহঁতৰ
কিছুমানক ঘনচীয়া ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি যোৱা মানুহে পেদি পেদি আনি বেৰি-কুৰি
ৰখা ঠাইত সোমাবলৈ দি পুনৰ ঘনচীয়া কৰে।

গাধ জাতীয় বন্যপ্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত কেইবিধমান এছিয়া মহাদেশত আৰু
আৰু এবিধক আফ্ৰিকাত বাস কৰা দেখা যায়। এছিয়া মহাদেশত বাস কৰা গাধ-
বিলাকৰ চেহেৰা গাধ ফৈদৰ ঘোঁৰা গোষ্ঠীৰ পৰা বৰ নগত বঢ়ি মিল খকা দেখা
যায়। ভাৰতবৰ্ষত যিবিধ ফৈদৰ গাধ বাস কৰে সেই বিধৰ ব্যতিষ্ঠা বাস্তৱ্যৰ বালি-
অঁহীয়া ঠাই কিছুমানত নিৰ্ভয় হৈছে। ভিতৰত কিয়া নামেৰে জনাজাত এণ্ডিৰ
বনৰীয়া গাধ বাস কৰে। আক্ৰান্ত এই বিধ গাধ আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি জনা যায়।
তদুপৰি দেখাতো এই বিধ গাধ বেছ বুনীয়া হয়। আফ্ৰিকা মহাদেশত যিবিধ
গোষ্ঠীৰ গাধ বাস কৰে সেই বিধ গাধৰ কণ দুখন তুল্যমূলকভাৱে দীঘল হোৱা
দেখা যায়। এই বিধ গাধৰ ঠেঙত উৎপন্ন হোৱা খুৰাবোৰ আকবো গৰু হয়।

প্ৰবৰ্ত্তী প্ৰবন্ধৰ সন্নিবেশত ভাৰতবৰ্ষত ভোমোনিৰ চাণিগামাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা
গাধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব।



এটা ভাৰতীয় বন্যজীৱ প্ৰাণ

ভাৰতৰ বনৰীয়া গাধ

শ্ৰেণী স্তন্যপায়ী

বৰ্গ— পেৰিচোডেটিকা

কূল—ইকুইডি

প্ৰজাতি—ইচ্চ হেমিওনচ্ বোৰ

বোৰা, গাধ আৰু জেব্ৰা এই তিনিবিধ প্ৰাণীক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে একেটা কুলতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইহঁতক এইদৰে একেলগে সামৰি বৰাৰ কাৰণ কেইবাটাও। পোন প্ৰথমতেই ক'ব পাৰি যে এই কেইবিধ প্ৰাণীৰ প্ৰত্যেকৰে ঠেঙত নখৰ সলনি এটা এটাকৈ খুৰাৰ উৎপত্তি হয়। স্তন্যপায়ী জন্তুবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচটা পাঁচটাকৈ আঙুলি থকাটো প্ৰকৃতিৰ সাধাৰণ নিয়ম। আনহাতে আটাইবিলাক প্ৰাণীৰে এই নম পূৰ্ণাঙ্গভাৱে বিকশিত হোৱা দেখা নাযায়। বোঁৰা, গাধ আৰু জেব্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল মধ্যমা আঙুলিটোৰে পূৰ্ণবিকাশ ঘটে আৰু এই আঙুলিটোকে সামৰি লৈ একোটাকৈ খুৰাৰ উৎপত্তি হয়। তৰ্কনী আৰু মধ্যমা আঙুলি দুটা অদৃশ্য হৈ থাকে আৰু বৃদ্ধ আৰু কনিষ্ঠৰ কোনো চিন চাব থকা দেখা নাযায়। এইবিলাক জন্তুৱেও গৰু-ম'হৰ দৰে গাঁহ পাণ্ডুলি পাণ্ডুলি খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। আগপাঁতবোৰৰ উপৰি ভাগ বহটা আৰু থলা-বমা হোৱাৰ বাবে সেই দাঁত-বাৰৰ সহায়ত ইহঁতে ঘাঁহ আদি ছিঙি আঁজুৰি মুখৰ ভিতৰলৈ নিয়াত অকণো অসুবিধা নহয়।

বনৰীয়া গাধ সোৱাল্লীৰ বাণ অৱ কচ্চ নামৰ বালি-বঁহীয়া ঠাইবিলাকত জাক পাতি পাতি বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিলীয়াৰ অন্তৰ্গত থকা অন্য কোনো ঠাইতে বাস কৰি থকা দেখা পাবলৈ আশা কৰিব নোৱাৰি। ভাৰত উপ-মহাদেশৰ ভিতৰত বেলুচিস্থানৰ ফালে এই বিধ জন্তুৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি সম্ভৱাৱিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

আমাৰ দেশৰ ভাটিৰ ফালৰ মানুহবিলাকে গাধ জাতীয় প্ৰাণী স্বৰূপে পুহি প্ৰতি-পালন কৰে। শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাৱলীত বনৰীয়া গাধ আৰু ঘৰচীয়া গাধৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বোঁৰা আৰু গাধৰ সংশ্লিষ্ট

বিবিধ প্ৰাণীৰ উৎপত্তি হয় সেই বিধ প্ৰাণীক খচ্চৰ বা মিউল নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। এই দুয়ো বিধ প্ৰাণীকে সেই ফালৰ মানুহবিলাকে ভাৰ বাহী জন্তু হিচাপে কামত লগায়। উল্লেখযোগ্য যে খচ্চৰ জাতীয় প্ৰাণীয়ে কোনো পোৱালি নজগায়। মানুহে বন্ধুৱা কামত নিয়োগ কৰা যিবিলাক খচ্চৰ জাতীয় প্ৰাণী আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ সেইবিলাক মৌনা আৰু গাধৰ সংমিশ্ৰণত উৎপত্তি হয়।

বনৰীয়া গাধৰ গাত হোৱা নোমবিলাকৰ বৰণ সাধাৰণতে মদৰুৱা হয়। এই নোমবোৰৰ উপৰিভাগত বিশেষ কাকৰ্কাৰী বিকশিত হোৱা দেখা নাযায়। পৰু জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে গাধৰ ডিঙিত কোনো গল বিচনী নাথাকে। কিন্তু কপালৰ ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গলধনৰ ওপৰ ভাগেদি পিঠৰ ফালৰ বাউসিৰ ওপৰলৈকে একোছা চুলি বা দীঘল দীঘল নোম থাকে। বৰণত এই চুলিখিনি ক'লা চানেকীয়া মুগা বঙৰ। পিঠৰ ওপৰেদি এই চুলিখিনি মেজৰ গুৰিলৈকে বাগৰি পৰা দেখা গ'লেও সেইখিনি ঠাইত এই চুলিখিনাক সিমানে দীঘল হোৱা দেখা নাযায়।

সোৱাদুৰ কচ্ছ অঞ্চলত বাস কৰা গাধবিলাকে নিচৰণ কৰিবৰ বাবে মুকলিমূৰীয়া আৰু বালিঅঁহীয়া ঠাইবোৰ বিচাৰি লয়। মৰুভূমি সদৃশ বৃক্ষহীন বালিয়া ঠাইবোৰৰ মাজে মাজে যিবলক সাৰুৱা ঠাইৰ উৎপন্ন হয় সেইবিলাককে মৰুদ্যানৰ আখ্যা দিব পাৰি। এনেবোৰ ঠাইত স্বাভাৱিকতে গজ দাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই বিধ প্ৰাণীয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। বাৰিষা কাল আহি পালে দ-চানেকীয়া ঠাইবোৰ পানীৰে উপচি পৰে। পানী শুকাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ পোহাবোৰ তাত গজিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া তাত থকা গাধবোৰে বাঁহৰ কুমলীয়া পাতবোৰ ছিঙি ছিঙি খাবলৈ বৰ ভাল পায়। দ-চানেকীয়া ঠাইবোৰ পানীৰে ভূৰ গৈ থকা সময়ছোৱাত তাত থকা বনৰীয়া গাধবোৰে ওপ ঠাই বিচাৰি টলো টলোকে ঘূৰি কুৰিবলগীয়া হয়। তাৰে কিছুমান ঠাইত বহুদূৰ গকলো সময়তে বাঁহ আদি উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হয় যদিও পানী শুকাই গ'লে গাধবিলাকে সেইবোৰ ঠাই পৰিত্যাগ কৰি আঁতৰলৈ গুচি যাবলগীয়া হৈ পৰে। সেই কাৰণতে বহুদূৰ সৰহখিনি সময়ত যিবোৰ দ-চানেকীয়া ঠাইত সাধাৰণতে পানী গোট খাই থাকে গাধৰ শ্বাকবোৰে তেনেবোৰ ঠাইত থাকিবলৈ উপযুক্ত পৰিবেশ নিৰ্বাচন কৰি লয়। এনে বিধক ঠাইত কেতিয়াবা বহুত সংখ্যক গাধৰ সমাবেশ পৰিলক্ষিত হয়।

গাধীৰ সন্ময় কাল আহি পালে জাকৰ মাজৰ পৰা লাহেকৈ আঁতৰ হৈ যোৱাৰ প্ৰবৃত্তি প্ৰদৰ্শন কৰে। এটা গাধই প্ৰতিবন্দী গাধবোৰক পৰাভূত কৰি তাইক অনুসৰণ কৰে। আগষ্ট, চেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহকেইটাত এই অভিনয়ে পূৰ্ণ বিকাশ লাভ কৰে। গৰ্ভধাৰণৰ সময় প্ৰায় ১১ মাহ। গাধীয়ে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জগায়।

গৰু, ম'হ, ছাগলী আৰু ভেড়া জাতীয় যিবিলাক স্তন্যপায়ী বন্যজন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰি থকা দেখা যায় সেইবিলাকৰ গাইগুটীয়া বিৱৰণ বিতংভাৱে আগ বঢ়োৱাৰ আগতে এই আটাইবিলাক প্ৰাণীৰ সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে থাউকতে আলোচনা কৰা যাবক। মানৱ দেহৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গবিলাকক যদি আলম স্বৰূপে লোৱা যায় তেন্তিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সকলো গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ ঠেঙত পাঁচোটা পাঁচোটাকৈ আঙুলি আৰু নখৰ উৎকৰ্ষ সাধন হয়। গৰু, ম'হ, ছাগলী আৰু ভেড়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সিহঁতৰ ঠেঙৰ হাতোৰাত নখৰ সলনি খুৰাৰ উৎপত্তি হয়। মানুহৰ হাত বা ভৰিৰ আঙুলিবোৰৰ দৰে এই স্তম্ভত বৰ্ণনা কৰা হস্তবিলাকৰ আঙুলিয়ে পূৰ্ণাঙ্গভাৱে বিকাশ লাভ কৰা দেখা নাযায়। মানুহ আৰু মান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ প্ৰত্যেকটো আঙুলিয়ে পূৰ্ণবিকাশ লাভ কৰে আৰু এই আঙুলিবোৰৰ আগ ভাগত একো একোটা নখৰ উৎপত্তি হয়। এই আঙুলিবিলাকক ক্ৰমে বৃহ, তৰ্জলী, মধ্যমা, অনামিকা আৰু কনিষ্ঠ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। গৰু, ম'হ, ছাগলী আৰু ভেড়া জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত থকা মধ্যমা আৰু অনামিকাৰ নাখিৰে বাকী কেইটা আঙুলিয়ে পূৰ্ণাঙ্গ-ভাৱে বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে। মধ্যমা আৰু অনামিকা আঙুলিৰ প্ৰত্যেক ঠেঙত একো একো খোৰা খুৰাৰ উৎপন্ন হয়। বাকী কেইটা আঙুলি অদৃশ্য হৈ মাংসৰ তলত লুকাই থাকে। তাৰে এটাই নিচেই সূক্ষ্ম ৰূপত ঠেঙৰ পিছৰ ফালে ওলাই থাকে। এই আটাইবিলাক প্ৰাণীক ফটা-খুৰা থকা প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়।

এই প্ৰবন্ধত উল্লেখ কৰা চতুৰ্দশী জন্তু কেইবিধৰ দেহত আন কিছুমান শাৰীৰিক গুণৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই জন্তুবিলাকে ঘাঁহ, খেৰ আদি খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ মুখত দিয়েই অলপমান সময়ৰ বাবে চোবাই পেটৰ প্ৰথম কুঠিলিটোতৈ প্ৰেৰণ কৰে। অৱসৰ সময়ত এই খাদ্য সামগ্ৰীখিনি পেটৰ প্ৰথম কোঠাৰ পৰা উগাৰি মুখলৈ উলিয়াই আনে আৰু সেইবোৰ পাঙলি পাঙলি চোবাই পুনৰ পেটলৈ পঠিয়াই দিয়ে। সেইকাৰণে ইহঁতক ঘাঁহ পাঙলি খোৱা জন্তু বুলি কোৱা হয়। ইহঁতৰ দেহৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে ইহঁত-বিলাক প্ৰাণীৰ মুখত ছিঙি খোৱা আৰু কুটি খোৱাৰ উপযোগী জোঙা দাঁত নাথাকে। ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ আৰু গছ-গছনিৰ পাতবোৰ আজুৰি খাবৰ বাবে ইহঁতক জোঙা আকাৰৰ দাঁত বা ইন্ চিচাৰ টিথৰ প্ৰয়োজন নহয়। বাঘ, শিয়াল আদি মাংসাহাৰী জন্তুবিলাকে হাড়ত লাগি থকা মাংসবোৰ ছিঙি ছিঙি আনিবলগীয়া হয়। তৃণভোজী আৰু পল্লৱসেৱী প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে গৰু, ম'হ, ছাগলী আদি প্ৰাণীয়ে হাড়ত লাগি থকা মাংসবোৰ দাঁতেৰে ছিঙি আনিবলগীয়া নহয়। সেইবাবে এইবিলাক প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত কেনাইন টিথ বা কুকুৰ দাঁত আৰু ইন্ চিচাৰ টিথ বা ছিঙি খোৱা দাঁতৰ উৎপত্তি সাধন হোৱা দেখা নাযায়। ইহঁতৰ আগদাঁতবোৰ জোঙা নহৈ চেপেটা ধৰণৰ হয় আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তলৰ পাৰি দাঁতৰ সলনি অলপ টান বিধৰ আলুৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা যায়।

এই জন্তুবিলাকৰ পাকস্থলীত এটাৰ ঠাইত দুটাকৈ আহাৰ খাদ্য কৰিব পৰা কুঠলি থাকে। বাঁহ, গছৰ পাত, খেৰ আদি খাদ্য-সামগ্ৰী মুখত দিয়েই এই জন্তুবোনে পাউন্দা নাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কোঠাটোৱে নোচোবোৱাকৈ প্ৰেৰণ কৰি দিয়ে। তুলনা-মূলকভাৱে পাকস্থলীৰ প্ৰথম কোঠাটো আকাৰত ডাঙৰ হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ ভিতৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ খোৱা বস্তু সঞ্চিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে জেগা থাকে। জিৰণিৰ সময়ত জন্তুটোৱে ডাঙৰ আকাৰৰ কোঠাটোৰ পৰা আহাৰখিনি অলপ অলপকৈ উগাবি মুখৰ ভিতৰলৈ উলিয়াই আনে আৰু সেই সামগ্ৰীখিনি গুৰি দাঁতেৰে চোবাই চোবাই পুনৰ গিলি পেলায়। মুখৰ লালটিৰ লগত মিহলি হৈ গ'লে এই ছিঙা ভঙা খাদ্যখিনি লোপ্‌থুপীয়া হৈ পৰে। তেতিয়া সেইখিনি খাদ্য পাকস্থলীত সহজে হজম হৈ যায়। পেটৰ প্ৰথম কোঠাত গোট খাই থকা গোটেইখিনি কেচা খাদ্য ঝঙ-ঝঙকৈ চোবাই শেষ নকৰা পৰ্যন্ত এই পদ্ধতিৰ পুনৰাবৃত্তি চলি থাকে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এইদৰে চোবাই চোবাই তৈয়াৰ কৰা খাদ্য সামগ্ৰীখিনি পাকস্থলীৰ দ্বিতীয়টো কোঠালৈ গুচি যায়গৈ। প্ৰথম কোঠাটোৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা দাৱণখনৰ কাষত মোচাকৰ দৰে খহটা বাকলি থাকে। এই কোঠাটোক বোটকিউলান্ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। পেটু-নাৰীৰ মাজত এই খাদ্যখিনিয়ে হেঁচা খাই খাই মিহলি হোৱাৰ ফলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। লডাৰ দৰে চোপোলা বান্ধি বান্ধি গঢ় লোৱা পদাৰ্থখিনি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ কোঠালৈ গুচি যায়। হজম হোৱাৰ আচল কামখিনি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ কোঠাত সম্পাদন হয়গৈ।

দাঁত আৰু নখ কিদৰা খুৰাৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত হোৱা শাবীৰিক গুণাৱলী আৰু পাকস্থলীৰ বিশিষ্ট আকাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা কাককাৰ্যৰ বাহিৰেও এই জন্তুবিলাকৰ গাত আন কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা যায়। এই বিশিষ্ট গুণবিলাক জন্তু বিশেষৰ শিঙৰ গঠন প্ৰাণালীৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলিত হয়। এই আটাইবিলাক জন্তুৰ মূৰত যে এবোৰা এবোৰাকৈ শিং থাকে এই কথা দোহাবিবৰ প্ৰয়োজন নাই। সাধা-ৰণতে মাইকী জন্তুৰ মূৰত শিঙ নগজে। এই শ্ৰেণীৰ জন্তুৰ শিংবোৰৰ গঠন প্ৰণালী গোটা চানেকীয়া হয় আৰু এই শিঙৰ ডিঙৰখন বাঁহৰ চুঙাৰ দৰে কোপোলা হয়। শিঙৰ বাকলিখনৰ ভিতৰত যিডোখৰ কোপোলা ঠাই থাকে সেই ঠাইডোখৰ মজ্জাৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী নলাই অৱকাৰ কৰে।

ভাৰতবৰ্ষত বিবিলাক প্ৰাণীয়ে এই স্তম্ভত উল্লেখ থকা জন্তুবোৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যুগ যুগান্তৰৰ সাধৰ বহন কৰি আহিছে সেইবিলাকৰ প্ৰজাতিগত বৰ্ণনা ভলৰ প্ৰবন্ধসমূহৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল।

গৌণ বা মেঠোন বা বনগৰ

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—আৰাট্‌ওডে ষ্টীলা

উপবৰ্গ—ৰোমিনেণ্টিয়া

কুল—বডিদি

প্ৰজাতি—বাইবচ্ গোবাচ্

গৌণ বা মেঠোন নামেৰে জনাজাত এবিধ বনৰীয়া জন্তুক বনগৰ গোষ্ঠী অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা প্ৰাণীবিলাকৰ একমাত্ৰ ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি বুলি গণ্য কৰিব পাৰি ইংৰাজী ভাষাত কোনো কোনোৱে এই বিধ প্ৰাণীক ভাৰতীয় বাইচন বুলি ক'ব খোজে। আনহাতে এই বিধ প্ৰাণীক বাইচন নামেৰে অভিহিত কৰিব নোৱাৰে বুলি বহুতো বন্যপ্ৰাণীবিদে অভিমত প্ৰকাশ কৰা দেখা যায়। ইউৰোপ মহাদেশত যিবিধ বাইচন গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী সেৰেঙা সেৰেঙাকৈ ঠায়ে ঠায়ে বাস কৰে সেই বিধ প্ৰাণীৰ লগত গৌণ নামৰ ভাৰতবৰ্ষীয় বন্যপ্ৰাণীৰ কোনো সাদৃশ্য থকা দেখা নাযায়। ইউৰোপীয় বাইচনবোৰক শান্ত প্ৰকৃতিৰ গৰু জাতীয় বন্যপ্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। সেই বিধ প্ৰাণীৰ কপালত একোছা দীঘল দীঘল কেশৰ সদৃশ চুলি বা নোম থকা দেখা যায়। আমেৰিকাতো বাইচন গোষ্ঠীৰ আন এবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰে। সেই বিধ প্ৰাণীক আমেৰিকাৰ মানুহে আমেৰিকাৰ বাইচন বুলি কয়। কোনো কোনো মানুহে আমেৰিকাত থকা বিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ বকেলো শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে আমেৰিকাবাসী বাইজে আমেৰিকাৰ বাইচনক বুজাবলৈ “বাইচন” আৰু “বকেলো” এই দুয়োটা শব্দ ঠাই অনুযায়ী স্থানীয়ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে। আমেৰিকাৰ প্ৰসিদ্ধ বন্যপ্ৰাণীবিদ্ দাৰৱাৰ্ড এলেনে আমেৰিকাৰ বাইচনক বৰ্ণনা এঠাইত এনেদৰে লিপিবদ্ধ কৰিছে। বহল দৃষ্টিভঙ্গীৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাই ভাৰতৰ গৌণ বা মেঠোন নামৰ প্ৰাণীক ইণ্ডিয়ান বাইচন বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। প্ৰেচাৰে লিখা বুক্ অৱ ইণ্ডিয়ান এনিমেলচ্ নামৰ পুথিতে ইণ্ডিয়ান বাইচন শব্দই গৌণ শব্দৰ লগতে স্থান পাইছে।

অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নগাভূমিৰ লোকসকলৰ কিছুমানে মেঠোন নামৰ এবিধ থকা জাতীয় প্ৰাণীৰ বৰত পোহে। ঘৰচীয়া প্ৰাণী হ'লেও এই বিধ মেঠোনক তেওঁলোকে

গোহালিত বান্ধি নাৰাখি হাবিত বেলি দিয়ে। সময় মতে নিজৰ নিজৰ মেঠোন হাৰিৰ মাজৰ পৰা ধৰি আনি ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰে। দুখন গাঁৱৰ মাজত বিবাদৰ সত্ৰপাত হ'লে মীমাংসাৰ বাবে এখন গাঁৱৰ মানুহে জৰিয়না স্বৰূপে এটা মেঠোন দিবলগীয়া হয়। কন্যাৰ মূল্য হিচাপেও কেতিয়াবা দৰাঘৰৰ ফালন পৰা কইনা ঘৰলৈ আগ বঢ়াবলগীয়া হয়।

ঘৰচীয়া মেঠোনৰ শিঙযোৰা বনৰীয়া গৌণ্ডৰ শিঙৰ তুলনাত দীঘল আৰু পাতলীয়া হোৱা দেখা যায়। তদুপৰি ঘৰচীয়া মেঠোনৰ দেহত উৎকৰ্ষ সাধন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ জন্তু অনুযায়ী বেলেগ শোৱা দেখা যায়। কিছুমান মেঠোন কজনা আৰু আন কিছুমান বিভিন্ন বৰণৰ। জীৱবিদসকলৰ বহুতে অভিন্নত একাংশ কৰে যে ঘৰচীয়াটো পালন কৰা মেঠোনবিলাক বনৰীয়া গৌণ্ডৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে।



গৌণ্ড বা বনগৰু

অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে সেই আটাইবিলাকতে কম-বেছি পৰিমাণে গৌণ্ডৰ নামৰ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সবহ ভাগ ক্ষেত্ৰতে ইয়াক গাইগুটীয়াভাৱে কিম্বা একাধিক প্ৰাণীৰ বিক্ষিপ্ত সমাবেশত অকস্মাত দেখা পাবলৈ আশা কৰিব পাৰি। হাবি বনবিলাকত নিৰলে বাস কৰা প্ৰাণীবিলাকৰ দুই-চাৰিটাই কেতিয়াবা বাহিৰৰ ফালে থকা খেতি পথাৰৰ ঠাইবোৰতো ভ্ৰমুকি মাৰেহি। তেনে অৱস্থাত ইহঁতৰ জীৱন বিপন্ন হৈ দুই-এটাই মানুহৰ অভিযাচৰত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হয়। আন

হাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ অভয়াৰণ্যত বি কেইটা গৌণৰ প্ৰাণী শান্তিপূৰ্ণভাৱে বাস কৰি আছে সেইকেইটা প্ৰাণীৰ জীৱনলৈ এনে ধৰণৰ বুৰ্গোগ আহি পোৱা দেখা নাযায়। সেইবিলাক ঠাইতো ইহঁতৰ সামাজিক বা পাৰি-বাৰিক জীৱনৰ গাঁথনি গভীৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এটা এটা পৰিয়াল বা আকৰ অন্তৰ্গত বৰ্গেট সংখ্যক প্ৰাণী একেলগে বাস কৰিলেও সিহঁতক বিক্ষিপ্ত-ভাৱে বিচৰণ কৰা দেখা যায়। উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত দৰং বন সংৰক্ষণৰ অন্তৰ্গত থকা চাৰ দুৱাৰ, ৰালিপাৰা, নদুৱাৰ, বিশ্বনাথ, বিহালি আদি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই জাতীয় প্ৰাণী বিক্ষিপ্তভাৱে বাস কৰা দেখা যায়। দৰং পূব আৰু দৰং পশ্চিম বন-সংৰক্ষণৰ দ্বাৰা অনুশাসিত আৰু পৰিচালিত এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলবিলাকত বাস কৰা গৌণৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ বিচৰণ ভূমি উত্তৰ কালে থকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হাৰি বননিষেধ-লৈকে বিস্তাৰিত হৈছে।

বৃদ্ধপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত যি কেইখন বনভূমিত গৌণৰ জাতীয় প্ৰাণী কেতিয়াবা অকস্মাতে দেখা পাবলৈ আশা কৰিব পাৰি সেইবিলাকৰ ভিতৰত লামডিং, ডিফু, ধনশিৰী আৰু লাংটিং যোপা বনাঞ্চলবিলাকৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ পশ্চিমফালে ক্ৰোমিং নামৰ যিখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে সেই বনাঞ্চল এটা বৃজন অংশ কপিলাী ভেলী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পই দখল কৰিলে। তাৰ পৰিণতিত এই ভিতৰুৱা বনাঞ্চলখনত নিখলৈ বাস কৰা বন্যপ্ৰাণী জগতত যি প্ৰচণ্ড আঘাত পৰিল সিয়েই ইয়াত থকা গৌণৰ জাতীয় জন্তুৰো যমকাল হ'ল। এইখন বনভূমিৰ অৱশিষ্ট অৱশ্যৰ মাজত এই বিধৰ বন্যপ্ৰাণী এতিয়ালৈকে বাচি আছে নে নাই সেই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে জনা নাযায়। নগাভূমিৰ অন্তৰ্গত থকা ইন্টাৰ্ভি অভয়াৰণ্য আৰু পুলি বদ্জে নামৰ অভয়াৰণ্যত কিছু সংখ্যক গৌণৰ জাতীয় বন্যপ্ৰাণী থলুৱাভাবে বাস কৰি থকাৰ কথা জনা যায়। মেঘালয়ৰ চিত্ৰ অভয়াৰণ্য আৰু বলফাৰাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ডালেমান সংখ্যক গৌণৰ জাতীয় প্ৰাণীয়ে স্থানীয়ভাৱে বসতি বিস্তাৰ কৰি আছে। পশ্চিমবঙ্গৰ উত্তৰ অঞ্চলত অৱস্থিত গৰুমাৰা, জলপাইগুৰি, মহানদী, অভয়াৰণ্য, জলদাপাৰা অভয়াৰণ্য আৰু চাৰামাৰি অভয়াৰণ্যত কিছুসংখ্যক এই বিধ বিচিত্ৰ বন্যপ্ৰাণী বিক্ষিপ্তভাৱে আছে বুলি জনা যায়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিষ্ঠিত অভয়াৰণ্য কেইখনৰ ভিতৰত নামলাফা অভয়াৰণ্য, ইটানগৰ অভয়াৰণ্য আৰু পাকুই অভয়াৰণ্যত কম-বেছি পৰিমাণে গৌণৰ জাতীয় বন্যপ্ৰাণী বাস কৰে।

বিহাৰৰ পালামৌ অভয়াৰণ্যতো গৌণৰ জাতীয় বন্যপ্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উৰিষ্যাৰ চাট্‌কুছিয়া গৰ্জা অভয়াৰণ্য, কুলদিহা অভয়াৰণ্য, কাৰলাপাট অভয়াৰণ্য, শম্ভুসুৰ্য অভয়াৰণ্য, কাপিলচ অভয়াৰণ্য, উছাকুঠি অভয়াৰণ্য, চিলিপাল অভয়াৰণ্য আৰু কালাচুনি অভয়াৰণ্য আদি বনভূমি বিলাকত কম-বেছি পৰিমাণে গৌণৰ বাস কৰা দেখা যায়। মধ্যপ্ৰদেশত স্থাপন কৰা অভয়াৰণ্য কেইবাখনতো গৌণৰ জাতীয় প্ৰাণীয়ে বসতি বিস্তাৰ কৰি থলুৱাভাবে বাস কৰে। তাৰ ভিতৰত ৰাজ্জৰগড় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ববী অভয়াৰণ্য, কুত্ৰী অভয়াৰণ্য, তাম্বুৰ পিগ্লা অভয়াৰণ্য,

পাহাৰ অভয়াৰণ্য, গোমাহী অভয়াৰণ্য, সীতানদী অভয়াৰণ্য আৰু বাগ্‌দাৰা অভয়াৰণ্যৰ দৰে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও আচানাক্‌দাৰ অভয়াৰণ্য, পাৰ্শ্ব অভয়াৰণ্য আৰু সিদ্ধাৰি অভয়াৰণ্যতো এই বিধ বিচিহ্ন বন্যপ্ৰাণী ধনুৱাভাৱে বাস কৰে বুলি জনা যায়। মহাবাহুৰ নাৰেঙ্গীও অভয়াৰণ্যত এই জাতীয় গোঁচাচেৰেক বন্যপ্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। তদুপৰি নাগপুৰৰ পৰা প্ৰায় ১৬০ কিলোমিটাৰ নিলগত নাজিৰা নাৰৰ বিধন অভয়াৰণ্য আছে তাতো গোঁচৰ জাতীয় প্ৰাণীয়ে বসতি বিস্তাৰ কৰি স্থানীয়ভাৱে বাস কৰিছে।

দক্ষিণ ভাৰতৰ তামিল নাডু, কেৰেনা, কৰ্ণাটক আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুকূল পৰিবেশবিলাকত গোঁচৰ জাতীয় বন্যপ্ৰাণীয়ে বসবাস কৰি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত কৰ্ণাটকৰ অন্তৰ্গত থকা বাম্পিপুৰ অভয়াৰণ্যৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। এইখন দক্ষিণ ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ ভিতৰত থকা অন্যান্য অভয়াৰণ্যবিলাকৰ কেইবাখনতো গোঁচৰ জাতীয় প্ৰাণী ধনুৱাভাৱে বাস কৰে। এই অভয়াৰণ্যবিলাকৰ ভিতৰত সোমেশ্বৰ অভয়াৰণ্য, নোণগো অভয়াৰণ্য, স্বাৰাৱাগি অভয়াৰণ্য, বিনিগিৰী অভয়াৰণ্য, ভৱ অভয়াৰণ্য, ছাটপালি অভয়াৰণ্য আৰু ভালেমনি অভয়াৰণ্যৰ নাম উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। কেৰেনাৰ অন্তৰ্গত থকা এৰাভিকুলম অভয়াৰণ্য, প দ্বিকুমান অভয়াৰণ্য আদি কেইবাখনো অভয়াৰণ্যকে কেন্দ্ৰ কৰি অন্যান্য ঠাইৰ উপযুক্ত পৰিবেশ কিছুমানত এই বিধ বিচিহ্ন প্ৰাণীয়ে নিগাজীকৈ বাস কৰিবলৈ উপযুক্ত পৰিবেশ নিৰ্বাচন কৰি গৈছে। তামিলনাডুৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা আমান্যাই অভয়াৰণ্যখনকে কেন্দ্ৰ কৰি আন কেইবাখনো অভয়াৰণ্য আৰু সংৰক্ষিত বনভূমিত গোঁচৰ জাতীয় বন্যপ্ৰাণী বাস কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আমান্যান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জতো গোঁচৰ জাতীয় প্ৰাণীয়ে বসতি বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা বৰ্ণনাৰ পৰা প্ৰমাণিত হয় যে পশ্চিমফালে অৱস্থিত, গুৱৰাট, ৰাজস্থান আদি ৰাজ্যৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় আটাইবিনাক ৰাজ্যতে গোঁচৰ জাতীয় বন্যপ্ৰাণী কম বেছি পৰিমাণে বাস কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ বাহিৰত এই বিধ বিচিহ্ন প্ৰাণীয়ে বুৰ্মদেশৰ মাজেদি থাইলেণ্ড পৰ্যন্ত বিস্তাৰ কৰি বাস কৰিছে।

গোঁচৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ আগভাগ ওখ আৰু বজ্জবুত হয়। ইয়াৰ গাটোৰ আগছোৱাৰ তুলনাত পাছৰ ছোৱা ক্ৰমে চিৰী হৈ যোৱাৰ নিচিনা দেখি। শৰীৰৰ সৰ্বাঙ্গীন অৱস্থাই এনে ধৰণৰ গঢ় লয় যে ইয়াক এটা অতি শাফ্ৰসম্পন্ন দেখনিয়াৰ জন্তু বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ মূৰ ভাগত বিঘোৰা ধুনীয়া আকৃতিৰ শিঙৰ উৎপত্তি হ'ব সেই শিঙৰোৰাৰ গুৰিভাগ বোটা আৰু আগফালে ক্ৰমে সৰু হৈ যোৱা বিধন হয়। শিঙৰ উপৰিভাগ অতি মিহি আৰু নিৰজ হোৱা দেখা যায়। ধনুভিৰীয়াটোৰ ডাঁড় খাই ক্ৰমে ওপৰমুৱা হৈ লাহেহেঁচ ভিতৰফালে দৌ খাই থকা শিঙৰোৱাটো অনুপৰি সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি কৰে। কোনো কোনো চৰাল মানুহে এই বিধ বিচিহ্ন জন্তু

বিতোপন শিঙেযোৰা কাঠ বা বাতু নিৰ্মিত ঠাচত বঢ়িয়াতৈ সজাহ বৈঠকখানাত জেউতি চৰায়। অন্যান্য জাতীয় গৰু-ম'হৰ শিঙেযোৰাৰ দৰে এই বিধ গো-গোষ্ঠীয় প্ৰাণীৰ শিঙাৰ তিতবৰ্ণৰ বাঁহৰ চুঙাৰ দৰে কোপোনা হয়। কোপোলা শিঙাৰ তিতবৰ্ণ অৱশ্যে একো-ডাল গজ্জাৰে নিৰ্মিত গোটা আকাৰৰ নলী থাকে। শিঙাৰ পৰি জন্তোত সামান্য ধৰণৰ খাঁজ কটা চিন থাকে। জন্তোটোৰ কপালৰ আগভাগ নোমৰ নিৰ্দিষ্টাৱলৈ অনুপ উঠা হয়। সৰল স্থিতিৰ অৱস্থাত, উঠা কপাল পৰি অনুভূতিগতকৈ পৰিধান কৰা ধুনীয়া শিঙেযোৰাৰে সৈতে এই বিধ পানী হঠাৎ এবিধ মাজত দেখিবলৈ পালে তাক বলবীৰ্য অনুপম নিৰ্ণয় কৰা পাৰে। সমগ্ৰ শৰীৰৰ উপবিভাগত বিনাজ ক'লা আৰু ঘন সৰু-সৰু গোটা বগুচুৱা বৰণৰ গোম্বাৰে সজুকৈ চকুত কপালক নিতৌপন কৰি থাকে। বনত এই গোম্বাৰি মুগা গাৰে পৰা হয় কিন্তু তাৰ উপবিভাগত



আদু-ঘৰচীয়া নেঠোনৰ মাল-পোৱালি

বঙা বহণে বিৰাজ কৰে। এই বিধ গো-গোষ্ঠীয় প্ৰাণীৰ অন্যতম শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে ইয়াৰ গলধনৰ উপৰি ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিঠিৰ মাজ ভাগলৈকে বিয়পি এটা দীঘলীয়া গঢ়ৰ ধনুভীয়া চুট থাকে। আঁঠুৰ অলপমান তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খুৰাৰ ওপৰ অঞ্চলত যিখিনি নোমৰ উৎপত্তি হয় সেই গোটেইখিনি নোমে শুক্ল বৰ্ণ ধাৰণ কৰে। ঠেঙেকেইখনত এই ধৰণৰ বগা বৰণীয়া নোমবোৰ থকাৰ বাবে জন্তোটোৰে প্ৰত্যেকখন ঠেঙত একোপাতকৈ দীঘল মোড়া পিদ্ধি থকা যেন লাগে। বয়স ভাটি দিলে গোটেইটো গাত গজা নোমবোৰ লাহে লাহে ক'ল হ'বলৈ ধৰে আৰু বুঢ়া বয়সত জন্তোটো সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লা হৈ পৰে

এই বিধ প্ৰাণীৰ চকুৰ মণি দুটা বৰণত মুগা চানেকীয়া হ'ব আৰু এই মুগা বৰণৰ চকুৰ মণিহাল নিলগৰ পৰা টল টলকৈ সিলিকি থকা দেখা যায়। এই মুগা বৰণৰ চকুৰ মণি দুটাত পোনপটীয়াকৈ সূৰ্যৰ পশ্চিম পৰিলে চকু দুটাৰ বৰণ নীলা হৈ পৰা যেন লাগে।

ভাঠ হাবিৰ নাজত থকা নিৰ্জন পৰিবেশত নিবনে বান কৰি থাকিবলৈ এই বিধ প্ৰাণীয়ে ভাল পায়। সাধাৰণতে মানুহৰ সন্ধানৰ পৰা ইহঁতে আঁতৰি থাকে। খোৱা বস্তুৰ সন্ধানত হাবিৰ নাজত পৰিভ্ৰমণ কৰি খুবি ফুলতে কেতিয়াবা হাবি বননিৰ কাষত থকা খেতি পথাৰৰ মাজত সোমায়হি। হাবিলৈ যাওঁ পৰা বাটপৰা নিচাৰি ইফাল-সিফাল কৰোতে ই প্ৰস্তুত হৈ কেতিয়াবা জনবসতিৰ মাজত থকা সৰু-সৰু হাবিৰ নাজত সোমাই পৰেহি। তেনে অবস্থাত সংশ্লিষ্ট বিতাপে সিহঁতক পেল পেলি কৰি পুনৰ হাবিৰ ভিতৰলৈ পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে।

সাধাৰণতে গাইগুটিয়াভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰা বিধৰ প্ৰাণী হ'লেও পোণত পুং থকা ঠাইবোৰত কেইবাটাও বস্ত্ৰৰ সমাবেশ ঠাই অস্বাভাৱী পৰিলক্ষিত হয়। পান গোৱাৰ সময় আঁঠি পাৰে বনলবোৰে গাইৰ মত-সুখ কামনা কৰি এবোতাবোৰ ঠাইলৈ গোট পায়হি। তেনে পৰিস্থিতি বলদহঁতৰ মাজত অবিষাৰ্থা ভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। যুঁজ-বাগৰত প্ৰবৃত্ত হৈ সিহঁতে খুনিয়া-খুন্দি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যুঁজত পৰাজয়ৰ বৰা বৰা বলদে মাটিত যাবলৈ বাধ্য হয়।

গো গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য প্ৰাণীবিলাকৰ দৰেই গোঁড়বিলাকে এবাৰত দুয়োটা এনাকৈ পোৱালি জন্মায়। পোনেই জগোতে পোৱালিৰ ক্ষেত উপায় মোকা নোহোৱাৰ দৰা বহুচুৱা হয়। কালক্ৰমত এই নোনবোৰৰ বং নাই লাগে সলনি হৈ স্বাভাৱিক বৰণলৈ পৰিণত হয়। অৱশ্যে কিছু সময় পাচতে পোৱালিটোৱে ইফাল সিফাল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তদুপ ভাঙৰ সৈ স্বাধীন মনোৱে ঘূৰি ফুৰাৰ উপায় মোহোৱা পৰ্যন্ত পোৱালিয়ে মাকৰ লগে লগে নেৰে।

চুঁৱৰী-গৰু

শ্ৰেণী--- কৃত্যপায়ী

বৰ্গ--- আৰুটিওডেকিলা

উপবৰ্গ--- নোমিনেনিচি

বুৰ্গ--- নভিচি

প্ৰজাতি---থোফেগাছ থোনিয়াৰ

চুঁৱৰী-গৰু নামৰ এবিধ গৰু জাতীয় বন্যপ্ৰাণী জন্তু হিমালয় শৈলমালাৰ বন্যভূমি ঠাইবিলাকত আনেও আনেও বাস কৰে। এইবিধ বন্যপ্ৰাণীক একতৃপ, কভাণ্ডাৰ খলুৱা এণী বুলি ক'ব নোৱাৰি। তিব্বতৰ মালভূমি অঞ্চলকে সামৰি নেচীন দেশৰ পশ্চিমফালে নিৰ্ভূত পাৰ্বত্য এলেকাত চুঁৱৰী-গৰুখ নিখোজাকৈ বাস কৰিবলৈ বাবে উপযুক্ত পৰিবেশ। অৱশ্যে কাশ্মীৰ আৰু নাডাখৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাকতো এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে মাজে সময়ে ভূমি নাপেহি। এইটো কাৰণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চুঁৱৰী-গৰু নামৰ জন্তুবিশেষক ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণীবিলাকৰ অন্যতম প্ৰতিনিধি বুলি গণ্য কৰিবলগীয়া হৈছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা চুঁৱৰী-গৰুৰ দুই এটাই শতক উপভাৱ পাৰ্বত্য ঠাইবোৰতো ভূমুকি মাৰেহি। অৱশ্যে ঘৰচীয়া অৱস্থাত এইবিধ প্ৰাণীক হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওপৰৰ ফালে অৱস্থিত বহুতো অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভূটান, নেপাল আদি ঠাইৰ বহুতো জনজাতীয় মানুহে এইবিধ প্ৰাণীক ঘৰচীয়া হিচাপে প্ৰতিপালন কৰি ৰাখে আৰু ইয়াক ভাৰবাহী জন্তু হিচাপে পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাকত এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বয়বন্ত কঢ়িয়াই নিয়া কামও নিয়োগ কৰে। ভূটানবিলাকে চুঁৱৰী-গৰুৰ নোৰাল নেজৰ ধোপাবোৰ কোছাকোছে কাটি আনি ভৈয়াৰৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰেহি। হিন্দুসকলে চুঁৱৰীৰ নেজৰ ধোপাক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰে আৰু পূজা-পাতলন্ত পূজাৰ বেদীৰ ওপৰত তৰি দিয়া চত্ৰতাপত আঁৰি দিয়ে। চুঁৱৰীৰ নেজেৰে ইষ্ট দেৱতাক বিচিও দিয়া হয়।

চুঁৱৰী-গৰুৰ অৱয়ৱটো অন্যান্য গৰু জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ দেহৰ তুলনাত দীৰ্ঘ-লীয়া। আনহাতে ঠোঁট চাৰিখন তুলনামূলকভাৱে চুটি হয়। ইয়াৰ গলধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বুৰৰ যাগ ভাগ মাটিৰকালে হাউলি থাকে। এইবিধ প্ৰাণীৰ শিং যোৰা অন্যান্য গৰু জাতীয় জন্তুৰ শিংৰ তুলনাত দীৰ্ঘল আৰু মোটা

স্নানেকীয়া হয়। গলধনৰ ওপৰত পিঠিবফালে হেলনীয়াটকৈ বৈ পৰা ধৰণৰ একো-
টাকৈ চুট থাকে। পিঠিৰ ওপৰিভাগত থকা ডাঁড়ত কোনো
প্রকাৰৰ কঁজ থকাৰ আভাস পৰিলক্ষিত নহয়। দুয়োটা শিঙৰ মাজৰ কপালৰ
অংশ উঠেই হৈ জিলিকি থাকে। তদুপৰি ভালুৰ পৰা একোছা চুলি
দীঘলীয়া হৈ তলদফালে ওলমি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গাটোৰ দুয়ো কাষৰ
পৰা কিছুমান চুলি বিশৃঙ্খলভাৱে বাটিনে ওলমি পৰাটকৈ ওলাই আহে। কেতিয়াবা
কেতিয়াবা এই গোসলিলাকৰ দীৰ্ঘতা ইমান বেছি হয় যে সেইবোৰৰ মাটিত চুঁচৰি
যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হয়গৈ।



হিৰানৰ শৈলমালাৰ নিবাসী চুঁতৰী-গৰু

এইবিধ প্ৰাণীয়ে খিয় গৰাৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত তললৈ সৰি পৰাৰ অকণো
নৰ্থকটকৈ অনাৱাসে খোজ কাঢ়িব পাৰে। জাবকালি আহি পালে এই প্ৰাণীবিন্যাসক

অতিপাত ঠাণ্ডা ঠাইত অতি কষ্টেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়াত পৰে। জনৰামুৰ
 প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ লগত যুঁজ-বাগৰ কৰি সিহঁতে জানকালি কটাই দিয়ে। বয়সপ্ৰাপ্ত প্ৰাণী-
 বোৰে এই যুদ্ধত জয়লাভ কৰিব পাৰিলেও কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ জগা
 পোৱালিৰ দুই-এটাই মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয়। গাত গজা দীঘল
 দীঘল নোমবোৰে শৰীৰৰ উত্তাপ সমভাৱে বৰাত তালৈখিনি সহায় কৰে।

এইবিধ প্ৰাণীয়ে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জগায়। শৰৎ-হেমন্ত কালত
 বলৰ আৰু গাইৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ চাৰ গভীৰ হয় বহাগ-জ্যৈষ্ঠ মাহত পোৱালি
 জগে।

বনৰীয়া ম'হ

শ্ৰেণী--স্তন্যপায়ী

বৰ্গ--আৰাট্টিওডেস্কিলা

উপবৰ্গ--ৰোমিনেণ্টিয়া


কুল--ৰডিডি

প্ৰজাতি--বুবাৰচ্ বুবাৰিচ্

তানতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত কিছুমান বনভূমিৰ অনুকূল পৰিবেশত বনৰীয়া ম'হজাতীয় প্ৰাণী আনেও আনেও বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ মানুহে যিবিলাক ম'হ পনটোফা হিচাপে প্ৰাপ্তপালন কৰি নানা কামত নিয়োগ কৰে সেইবিলাকক এতিয়ালৈকে হানি-বননি বিলাকত স্বাধীনচিঠীয়া হৈ বাস কৰা বনৰীয়া ম'হবিলাকৰে বংশধৰ বুলি ক'ব পাৰি। বনৰীয়া ম'হবিলাক সাধাৰণতে চেঙা হয় আৰু গিহঁতে মানুহক কাগ চাপিৰ নোখোজে। অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ অভয়া-ৰণ্যত বনৰীয়া ম'হ জাক পাতি থাকে। একোটা জাকত এটা শক্তিশালী মতা আৰু বিভিন্ন বয়সৰ পোৱালিৰে সৈতে কেইবাজনীও মাইকী ম'হ চৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানুহ অথবা অন্য কোনো শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণী ওচৰ চাপি অহাৰ উমান পালে নতুনকৈ জগা পোৱালিকেইটাক মাজত লৈ গোটেই জাক ম'হে ফেৰ পাতি থকা দেখা যায়। বনৰীয়া ম'হৰ প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ শিং যোৰাক আত্ম-ৰক্ষাৰ সজুলি আৰু শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। এই শিং যোৰাৰ সহায়ত ম'হে বাঘৰ নিচিনা ম'হা পৰাক্ৰমী আৰু দুৰ্দ্দান্ত প্ৰাণীকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নকৰে। সাধাৰণতে বাঘৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ এইবিধ প্ৰাণীয়ে যত্ন কৰে আৰু পোৱালিবোৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ নানা কৌশল অৱলম্বন কৰে।

কাজিৰঙা আৰু মানাহৰ বাহিৰে দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত ওৰাং অভয়াৰণ্য আৰু নগাঁও জিলাৰ লাওৰোৱা অভয়াৰণ্যতো কিছু সংখ্যক বনৰীয়া ম'হ জুম পাতি বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওদুপৰি উত্তৰ পাৰৰ অন্যান্য বনভূমিবিলাকৰ কিছুমানতো এইবিধ বন্যপ্ৰাণীয়ে বিক্ষিপ্তভাৱে ভিন ভিন পৰিবেশত বাস কৰে। তাৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাই-কপাই অভয়াৰণ্য আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পাত অভয়াৰণ্যকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব পাৰি। সোণাই-কপাই অভয়াৰণ্যৰ এটা বুজন অংশ সৈন্য বাহিনীৰ ছাউনীলৈ কপাতৰিত হোৱাত এই অভয়াৰণ্যত নিবলৈ বসবাস কৰা বন্যপ্ৰাণীবিলাকৰ ওপৰত যি প্ৰচণ্ড আঘাত পৰিল তাৰ পৰিণতিও সেই এলেকাৰ

বনৰীয়া ম'হকেইটাও নিলগলৈ আঁতৰি গান্ধীন বাধ্য হ'ল। অতীজতে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পাত অভয়ানগাৰন থলুৱাভাৱে ২২ দিনলৈ লোৱা বনৰীয়া ম'হক নিৰাপদে ৰাখিবৰ বাবেই প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। সেই সময়ৰ উদ্যোগী বন-বিষয়া মিঃ মিলৰয় চাহাবে এই বন্যপ্ৰাণক অভয়ানগালৈ কপোতভৰিত কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। অৱশেষত তেখেতৰ নাম চিৰস্মৰণীয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই অভয়ানগাৰ নাম মিলৰয় বকুলো চেঞ্চোৱাৰী নামেৰে অভিহিত কৰা হ'ল। এতিয়া ইয়াত বনৰীয়া ম'হৰ সমাগম অতি গামান্য বুলিয়েই ক'ব লাগিব। ৰিজাৰ্ভৰ চাৰিওফালে মানুহে বসতি বিস্তাৰ কৰি স্বাভাৱিক পৰিবেশৰ মাল-সন্নিবিষ্টাৱাত ম'হ ভাতীয়



বনৰীয়া ম'হৰ এটা পাল

প্ৰাণীবোৰৰ থকা ঠাইৰ পৰিমাণ সন্মুখিত হ'ল। পাত্ৰ অৰণ্যৰ পৰা এতিয়া অতীজৰ গোৰেৰে মেলনি মাগিছে।

অসমৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য কেইবাখনো ৰাজ্যত বনৰীয়া ম'হ জাতীয় প্ৰাণীয়ে পাল পাতি বাস কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এই আটাইবোৰ ঠাইতে নিগাজীকৈ বাস কৰা ম'হবিলাকৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাগুণৰ বিকাশত বিশেষ পাৰ্থক্য থকা দেখা নাযায়। পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত মেঘালয়ৰ পৰ্বতীয়া ঠাইৰ কোনো কোনো পৰিবেশত এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰি থকাটো প্ৰমাণিত হৈছে। ১৯৮১ চমৰ এপ্ৰিল-মে' মাহত গান্ধীপাহাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বলফাক্‌ৰাম প্ৰস্তাৱিত অভয়াৰণ্যত যি বন্যপ্ৰাণীৰ পিয়ল-কাৰ্য সম্পাদিত হৈছিল সেই পিয়লৰ গণনা অনুযায়ী এই পাৰ্বত্য এলেকাত সৰ্বমুঠ ২৪টা বিভিন্ন বয়সৰ বনৰীয়া ম'হ পোৱা হয়। সং-ৰক্ষণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰিলে এই অৰণ্যভূমিত নিৰলে বাস কৰা বনৰীয়া ম'হৰ সংখ্যাই উৰ্দ্ধমুখী গতি লাভ কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে বলফাক্‌ৰামৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতি মনোহৰ। ইয়াতে মহাদেউ গৰ্জ নামৰ যি গভীৰ জলাশয় চিন প্ৰৱাহমান জলৰাশিয়ে নিৰাজ কৰিছে তাৰ লগত পৃথিৱীৰ যি কোনো ঠাইৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশক মিছাব পাৰি। তদুপৰি বলফাক্‌ৰাম মানভূমিৰ আখ্যা পোৱা ঠাইৰ অনুপম পৰিবেশ আৰু চাৰিওফালৰ পাহাৰবিলাকে পৰিধান কৰা সেউজীয়া গছৰ চো কটা আচ্ছাদনে গোটেই এলেকাটোক স্বৰ্গপুৰী কৰি ৰাখিছে।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰশস্ত ভূমিখণ্ডকে কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ ভাৰতৰ যি কেইখন ৰাজ্যৰ মাজেদি পৱিত্ৰ প্ৰাণা গঙ্গানদী প্ৰৱাহমান হৈ আছে সেই ঠাইবোৰৰ নদীকুলীয়া অনু-কূল পৰিবেশেও কিছু সংখ্যক বনৰীয়া ম'হ ধাৰণ কৰিছে। মধ্য প্ৰদেশত ৰায়পুৰ নামৰ যিখন জিলা আছে সেই জিলাৰ অন্তৰ্গত থকা বনভূমিবিলাকৰ উপযুক্ত পৰিবেশবোৰত এইবিধ বন্যপ্ৰাণীয়ে নিগাজীকৈ বাস কৰিবৰ বাবে অনুকূল ঠাই বিচাৰি ল'বলৈ লক্ষ্য হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ বাহিৰে যি যি দেশত বনৰীয়া ম'হ স্বাধীনচিন্তীয়াভাৱে বাস কৰি থকাৰ কথা জনা যায় তাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ উত্তৰ ফালে হিমালয় শৈলমালাৰ বুকু স্পৰ্শিত কৰি ৰখা পৰম সৌন্দৰ্যময়ী নেপালৰ কথাও উল্লেখ কৰিব পাৰি।

চেহেৰা-পাতি আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাগুণৰ বিকাশত বনৰীয়া ম'হ আৰু ঘৰচীয়া ম'হৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য থকা দেখা নাযায়। সাধাৰণতে ঘৰচীয়াবিলাকতকৈ বনৰীয়া ম'হবোৰ অধিক বলবান আৰু দেখনিয়াৰ হয়। সিহঁত সাধাৰণতে নিপোটল আৰু নোদোকা হয়। স্বাধীন মনেৰে হাবিৰ মাজত ঘাঁহ আদি খাই জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ পোৱাৰ বাবেই সিহঁতৰ দেহলৈ অভূতপূৰ্ব শক্তিৰ জোৱাৰ নামি আহে বুলি ক'ব পাৰি। বিচৰণ-ভূমিৰ ব্যাপকতা, খাদ্য-সামগ্ৰীৰ উভৈনদী অৱস্থা আৰু অন্যান্য প্ৰাণীৰ লগত ঘটবলগীয়া সংঘাতৰ সূক্ষ্ম সম্ভাৱনাই এইবিধ বন্যপ্ৰাণীৰ স্বাস্থ্য অটুট

বৰাত পৰোক্ষভাৱে সহায় কৰে। মানাহ অভয়ানন্দৰ বেকী আৰু মানাহ নদীৰ পাৰৰ হাবিত নীয়া ঠাইবোৰত নিৰলে বাস কৰা বনৰীয়া ম'হৰ স্বাস্থ্য কাজিৰঙা সভ্যতাৰ বোকাময় ঠাইত বাস কৰা ম'হতকৈ বেছি উন্নত হোৱাৰ কাৰণ এই গৃহৰ খাবা বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কাজিৰঙা বাগ্ৰয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওবিনাকত বাস কৰা ঘৰচীয়া ম'হবোৰে উদ্যানৰ বনৰীয়া ম'হৰ লগত একেদৰে চৰি ফুৰে। বনৰীয়া মাইকী ম'হে ঘৰচীয়া মতাৰ লগ লগাৰ ফল স্বৰূপে এই বনৰীয়া ম'হবিলাকৰ স্বাস্থ্য আৰু বলশক্তিৰ অৱনতি হৈছে বুলি কোৱাৰ খন নথকা নহয়। আনহাতে বনৰীয়া মতা ম'হৰ সহযোগত ঘৰচীয়া মাইকী ম'হৰ যি পোৱালি জন্ম হয় সেই পোৱালি অৰিচ বলবান আৰু নোদোকা হোৱা দেখবলৈ পোৱা যায়। বনৰীয়া মতা ম'হৰ সহায়ত ঘৰচীয়া মাইকী ম'হে জপোৱা পোৱালিবোৰ সাৰাৰণতে চেঙা আৰু উদ্ভট প্ৰকৃতিৰ হোৱা দেখা যায়। এনে পোৱালিৰ দেহত বৰফাত হোৱা চাৰিত্ৰিক বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰমাণ কৰে যে সেই পোৱালি বনৰীয়া ম'হৰ সন্মিশ্ৰণৰ ফলত উৎপত্তি হৈছে।

বনৰীয়া ম'হৰ সব শৰীৰত গজা নোমবিলাকৰ বৰণ ক'লা হোৱাৰ বাবে গোটেই জন্তুটোৱে ক'লাকাৰ ধাৰণ কৰে। সাধাৰণতে ঘৰচীয়া ম'হবোৰো ঠিক সেইদৰে ক'লা হয়। অৱশ্যে আনাৰ ঘৰচীয়া ম'হবিলাকৰ মাজত কোঁতয়াৰা দুই-এটা বগা বৰণৰ ম'হো দৃষ্টগোচৰ হয়। বনৰীয়া ম'হৰ মাজত এই বৈচিত্ৰ্য পৰিলক্ষিত হোৱাৰ নিদৰ্শন নাই। হাতপূৰ্বে স্থানাঙ্কৰত উল্লেখ কৰা অহা হৈছে যে ম'হ জাতীয় প্ৰাণীৰ ঠেঙৰ আগভাগত নখৰ সন্ধান খুৱাৰ উৎপত্তি হয়। এই খুৱাই সো মাজতে দীঘলে দীঘলে দুফাল হৈ অন্ধ চন্দ্ৰাকৃতিৰ কপ ধাৰণ কৰে। খুৱাৰ আৱৰণ বা বাকলি দুখনে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত ওপৰিও হোৱা আঙুলি দুটাৰ ওপৰত লাগি থকা মজ্জা আৰু মাংস ভাগ ঢাক ধাৰে। কান্ঠ আঙুলিকেইটাই চেং কেইখনৰ পাছৰ ফালে আৰু খুৱাৰ ঠিক ওপৰতে সামান্য আকাৰৰ নখৰ কপ লৈ আৱৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে থকা ঠাইৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাই খুৱাৰ গঠন প্ৰণালীত বিশিষ্ট কপ উৎপাদন কৰাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আমাৰ অগ্নৰ ফালে বাস কৰা ম'হবিলাকে দ চানেকীয়া ঠাইবোৰ কামত ল'বলৈ বাচন কৰা হয়। বহুত সময়ত ইহতে পানীত নামি নামি বোৰাতে লুতুৰা-পুতুৰা হৈ থাকে। পিছৰ মাটিত খুৱাৰ সহায়ত ধোপনি পাত পাত ইহতে খোজ কাটি যাবলগীয়া হয়। বাবে ইহতৰ খুৱাৰ অলপ মেলাই কৰা ধাৰণ কৰে। মধ্যপ্ৰদেশৰ ফালৰ বনাঞ্চলবিনাকত বাচনৰ বাস কৰা থকা বনৰীয়া ম'হবিলাকে এনে অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। সেইকাৰণে সিহঁতৰ খুৱা-বোৰ মেলাই নহৈ চাপ খাই থকাকৈ গোটা হয়।

বনৰীয়া ম'হৰ শিং আৰু আমাৰ অসমৰ ঘৰচীয়া ম'হৰ শিঙৰ আকৃতি আৰু আকৃতিত বিশেষ পাৰ্থক্য থকা দেখা নাযায়। অৱশ্যে ভাৰতৰ ফালৰ মানুহে পোহা ঘৰচীয়া ম'হবিলাকৰ শিঙৰ আকৃতি বেলেগ হয়। এইবিলাক ম'হৰ শিংকোৰ আকাৰত ভেদেই সংক্ষিপ্ত হয় আৰু ইহঁতৰ শিঙত বনৰীয়া

আৰু দুৰ্ভাগ্য চৰিত্ৰৰ আভাস প্ৰস্ফুটিত হোৱা দেখা নাযায়। বনৰীয়াই হওক কিয়া যবচীয়া ম'হেই হওক এই শিংযোৰাক আমাৰ ইয়াৰ ম'হবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বল, শক্তি আৰু আত্মৰিক চৰিত্ৰৰ নিদৰ্শন বুলি গণ্য কৰিব লাগিব। আত্মবক্ষাৰ বাবে আৰু শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে এই শিং সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দুটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী ম'হে যুঁজ-বাগৰত প্ৰবৃত্ত বহ'লগীয়া হ'লে এই শিংযোৰাক যুঁজৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাইকী ম'হৰ সাহচৰ্য্যত একাধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবৰ বাবে দুটা গঁৰা ম'হৰ মাজত কেতিয়াবা যুঁজৰ সূত্ৰপাত হয়। বিজয়ী ম'হে মাইকী ম'হ জাকক নিজৰ ফলীয়া কৰি লয় আৰু যুঁজত পৰাজয় বৰণ কৰা ম'হ পলাই যাবলৈ বাধ্য হয়। বলবীৰ্য সম্পন্ন মতা ম'হৰ গাত এই অৰিয়াঅৰি ভাব সঞ্চিত হৈ থকাৰ সুবিধা লৈ আমাৰ মানুহে মাঘ বিহুৰ সময়ত পথাৰত ম'হ যুঁজৰ আয়োজন কৰে আৰু বহুতো বিহুবলীয়া মানুহে সেই যুঁজ চাই আনন্দ উপভোগ কৰে।

ম'হৰ শিঙৰ ভিতৰখন ফোপোলা হয়। সাধাৰণতে সেই শিং সৰি নপৰে। শিঙৰ গুৰিফালৰ উপৰিভাগত অলপ মেকটা-মেকটি বিধৰ পখালি পখালি দাগ অঙ্কিত হৈ থাকে। আগৰ ছোৱা অলপ মিহি হয়। প্ৰকাণ্ড শিং যোৰা মূৰৰ উপৰিভাগত ধনুভীৰীয়াটক ভিতৰৰ ফালে পাক খাই থাকে। কিছুমান বনৰীয়া ম'হৰ শিং যোৰাই মেলাহি কপ ধাৰণ কৰে। একেটা পালৰ ভিতৰতে দুয়ো প্ৰকাৰৰ শিং থকা ম'হ চৰি ফুৰা দেখা যায়।

মাইকী ম'হে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জগায়। নতুনকৈ জগা পোৱালিৰ গাৰ বৰণ অলপ মুগা হয়। বহুত দিনলৈকে পোৱালিয়ে মাকৰ লগ নেৰে। ঘাঁহত মথ দিব পৰা হ'লে ই লাহেকৈ স্বাধীন জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে।

বনৰীয়া ছাগলী

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—আৰ্চিওভেট্টা

উপবৰ্গ—ৰোমিনেণ্টিয়া

কুল—ৰভিডি

প্ৰজাতি—কেপ্ৰা হিব্ কাচ্

সসম আৰু অসমৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰেইখনত এবিধ বনৰীয়া ছাগলী বাস কৰে। এইবিধ প্ৰাণীক ছেৰাও বুলি কোৱা হয়। হিমালয় পৰ্বতমালাত আন এবিধ বনৰীয়া ছাগলী বাস কৰে। এই দ্বিতীয় বিধ বন্য প্ৰাণীক বুজাবলৈ গডান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই দুয়োবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ আমাৰ মানুহে পাউকতে দেও-ছাগলী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। জীৱবিদসকলে এই দুয়োবিধ প্ৰাণীক ছাগলী এণ্টেলপ নামৰ এটা বিশেষ গোষ্ঠীত অৱৰ্ত্তিত কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমফালে থকা হিমালয়ৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত আন এবিধ ছাগলী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰে। এইবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ কিন্তু বনৰীয়া ছাগলী শব্দ দুটাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

আধুনিক যুগৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত এইবিধ বন্যপ্ৰাণী নিম্নজীৱক বাস কৰি ৰতি আছে নে নাই সেই বিষয়ে সঠিকভাৱে জনা নাযায়। পাকিস্তানৰ সিন্ধুপ্ৰদেশত এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা যায়। বেলুচিস্তানৰ শিলাময় পৰ্বতীয়া ঠাই কিছুমানতো বনৰীয়া ছাগলী বাস কৰে। এছিয়া মহাদেশৰ পশ্চিম ফালে থকা কোনো কোনো ঠাইত আৰু পাশ্চাত্যৰ ফালে থকা কোনো কোনো ঠাইৰ অনুমান পৰিবেশত আন কেইবাখানাতকো বনৰীয়া ছাগলী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিলাক ছাগলীক আমাৰ দেশত বাস কৰা বনৰীয়া ছাগলীয়ে উপজাতি হিচাপে চিনাক্তকৰণ কৰা হয়।

দেখাত এইবিধ বনৰীয়া ছাগলীক মানুহৰ ঘৰত পোৱা ছাগলী জাতীয় ঘৰচীয়া জন্তুৰ নিচিনা দেখি। আকান্ধত কিন্তু ই আনি খবত পোৱা ছাগলী-যোৱাটোক ভালৈখিনি ভাঙৰ হয়। আমাৰ দেশত ৰাম ছাগলী নামৰ বিবিধ ডাঙৰ আকাৰৰ ঘৰচীয়া ছাগলী আছে বনৰীয়া ছাগলীবিলাক আকান্ধত কম, বেছি পৰিমাণে ঠিক সেই গোষ্ঠীৰ ছাগলীৰ সাদৰ্শ্যই হ'ল। একো একোটা পূৰ্ণবয়সীয়া বনৰীয়া ছাগলীৰ উচ্চতা প্ৰায় এক মিটাৰৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব। মুঠৰ ওপৰত ঘৰচীয়া

বান্ধ ছাগলীবোৰক বনৰীয়া ছাগলী পৰিচিহ্নিত সংৰক্ষণ বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। জীৱবিদসকলে ক'ব খোজে যে ঘৰচীয়া ছাগলীবোৰ আচলতে বনৰীয়া ছাগলীৰ বংশধৰ। বনৰীয়া নত্ন ছাগলীৰ এঘোৰা দীঘল চানেকীয়া আৰু দেখনিয়াৰ শিং থাকে। এই শিং যোৰা ধনুভীৰীয়াটক পাছৰ ফালে হেলনীয়া আকাৰত চাল খাই থাকে। শিঙৰ দ্বাৰা ভাগমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰ ভাগত থলপা-থলপা দাগ থাকে। গাত গজা নোমবোৰৰ বৰণ মুগা চানেকীয়া হয়। বাৰিষা কালত এই নোমবোৰ উজ্জ্বল হৈ পৰে। বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এই নোমবোৰ নোতা হয় আৰু বৃদ্ধ অৱস্থাত অলপো অলপো হৈ পৰে।



বনৰীয়া ছাগলী

এহাৰে ছাগলী জাতীয় প্ৰাণীৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰত বান্ধক্যৰ চিন প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। সেইকাৰণে এই জাতীয় প্ৰাণীৰ নোমৰ অৱস্থা পৰ্যবেক্ষণ কৰি জন্তোৰ আনুমানিক বয়স নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। তদুপৰি পূৰ্ণ বয়সীয়া বনৰীয়া ছাগলীৰ পিঠিৰ উপৰি ভাগেদি মেক্সওডানৰ খাজে খাজে নজৰ গুৰিনৈকে এডাল দীঘলীয়া পাটি বিয়পি থকা দেখা দিয়ে।

এইবিধ বনৰীয়া ছাগলীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক সীমাবেধা অতিক্ৰম কৰি পাকিস্থানৰ সিদ্ধু প্ৰদেশত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইহঁতে জাক বাছি একেলগে বাস কৰে। মতা, মাইকী আৰু পোৱালিবোৰক লৈ একোটা জাকত কেতিয়াবা বহুত সংখ্যক প্ৰাণীৰ সমাবেশ হয়। ঠেঙৰ আগভাগত উৎপন্ন হোৱা দুপতীয়া খুৰাৰ সহায়ত এইবিধ প্ৰাণীয়ে দুৰ্গম পৰ্বতীয়া ঠাইত অনায়াসে বগাই ফুৰিব পাৰে। থিয় গৰাৰ ওপৰৰ ফালে থকা নিচেই ঠেক পথবোৰ অনুসৰণ কৰি ইহঁতে দুৰ্গম ঠাইবোৰলৈ নিৰাপদে পৰ্বত বগাই যাব পাৰে। থিয় পৰ্বতৰ উচ্চ শিখৰত উঠি লৈ ইয়াৰ মতাটোৱে শত্ৰুৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰে। শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীৰ উমান পালে বিপদৰ সন্মুখত দি বাকী ছাগলীক পলাই যাবলৈ উলগনি দিয়ে।

এইবিধ ছাগলীয়ে বছৰত এবাৰকৈ পোৱালি জগায়। ইহঁতৰ একে বাৰতে তিনিটা-চাৰিটা পোৱালি হয়।

হিমালয়ৰ খাব

শ্ৰেণী—জ্ঞাপায়ী

বৰ্গ—আৰটিওভে ষ্টীল

কুল—বভিড়ি

প্ৰজাতি—হেনিট্টাগাছ জেম্‌লাজিকাছ

ভাৰত-বৰ উত্তৰখালে থকা হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওখ ওখ শিলাময় পৰিবেশত খাব নামৰ এবিধ বনৰীয়া ছাগলী আনেও আনেও বাস কৰা দেখা যায়। খাব নামেৰে জনাজাত বনৰীয়া ছাগলীবিলাকৰ বিশেষত্ব হ'ল এয়ে যে এইবিলাক ঢাগলীৰ কোনো ভাটি গছ দেখা নাযায় আৰু ইহঁতৰ শিং যোৰা চুটি আৰু পাচৰ ফালে তাঁজ খোৱা ধৰণৰ হয়। ভাৰতবৰ্ষত খাব ফৈদৰ দুবিধ ছাগলী বাস কৰে। তাৰে ভিতৰত যিবিধ খাব হিমালয় শৈলামালাৰ বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰে সেইবিধক হিমালয়ৰ খাব নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। পৰ্বতৰ ওপৰৰ যিবোৰ শিলাময় দুৰ্গম ঠাইটো অন্যান্য প্ৰাণী যাবলৈ ভয় কৰে সেইবোৰ ঠাইতে খাব নামৰ প্ৰাণীবিলাকে নিবলৈ বাস কৰে। পৰ্বতৰ ওপৰত থিয় গৰাৰে আঙুৰা পাখৰৰ চপৰাবোৰত ঠেঙৰ খুৰা পিছলি নপৰাকৈ এইবিধ প্ৰাণীয়ে অনায়াসে খোজকাঢ়ি অহা-যোৱা কৰিব পাৰে। দুই-এজন চিকাৰ বিলাসী আৰু মাংস নোভী মানুহৰ বাহিৰে অন্য মানুহে সেইবোৰ ঠাইত ভৰি দিব নোখোজে। আনহাতে খাববিলাকে সেই দুৰ্গম ঠাইবোৰকে নিৰাপদ ঠাই বুলি ভাবে আৰু সেইবোৰ ঠাই ওপৰতে আশ্বৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি লয়। ভীৰ জগতৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পটত বিকশিত হোৱা এই অভিনৱ ব্যৱস্থা গঁটাকৈয়ে চমকপ্ৰদ বুলি ক'ব লাগিব।

হিমালয়ৰ খাব নামৰ প্ৰাণী বিধক বিতোপন প্ৰাণীৰ আখ্যা দিব নোৱাৰি। আনহাতে এইবিধ বনৰীয়া ছাগলীৰ দেহত কিছুমান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকশিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দীঘল চানেকীয়া নোমৰ আৱৰণৰ এইবিধ ছাগলীয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰ গছীন গছীৰ কপত আত্ম প্ৰকাশ পায়। দীঘল দীঘল নোমেৰে আঙুৰা ছালখনেৰে সৈতে স্বৰূপ লৈবলৈ কৰা এইবিধ প্ৰাণীক নিজস্ব পথাৰেৰে ধুনীয়া যেনেই লাগে। গাত গজা দীঘল দীঘল নোমেৰে অৱশ্যে তেনে ধৰণৰ মিহি বা নিমজ্জ হোৱা দেখা নাযায়। ঘৰচীয়াটক পোতা ভেৰা জাতীয় প্ৰাণীৰ গাত বিকশিত হোৱা নোমবোৰ নতুন খাবৰ নোমবোৰ দিশ্ৰুত হৈ থাকে। জন্তুটোৰ

শৰীৰৰ তুলনাত মূৰটো সৰু হয় আৰু এই মূৰত গজা শিং যোৰাও দিক
সেইদৰে আকাৰত সৰু আৰু চুটি হয়। সৰু আকাৰৰ শিং যোৰাই সামান্যভাৱে
ওপৰৰ ফালে ডাঁজ লৈ ধনুভিৰীখাকৈ পাচৰ ফালে হাউলি থাকে। ইয়াৰ কাণ দুখনো
বৰ বেছি ডাঙৰ হোৱা দেখা নাযায়। মুখৰ আগৰ ফালে যিবোৰ নোমৰ উৎপত্তি হয়
সেই নোমবোৰক তুলনামূলকভাৱে মিহি আৰু নিমজ বুলি ক'ব পাৰি। গাত গজা
নোমবোৰৰ বৰণ বগুচুৱাকৈ মুগা হয়। জন্তুভেদে এই নোমবোৰৰ বৰণৰ গভীৰতাত
ভাৰতম্য পৰিৱৰ্তিত হয়।



হিমালয়ৰ পাহাৰ

হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওপৰ ফালে থকা কিছুমান মাত্ৰ ডাঙৰ আকাৰৰ গাভ-
গছনি থকা দেখা নাযায়। তেনেবোৰ ঠাইত ঘাঁহ দ্ৰাউয় উঠিলে প্ৰাধান্য লাভ কৰে।
পাহাৰ নামৰ ঢাওনীবিলাকে পৰ্যাপকত এগেৰিলাক মুকলি ঠাইলৈ ওলাই আহি চাৰি-
বটলৈ ভাল পায়। আচৰতে এই ধৰণৰ মুকলি ঠাইবোৰৰ কামে পাহাৰে
যিবিলাক কাঠনি বাদী আছে সেই ছালিবোৰৰ নাঙতে উঠতে সময়খিনি অতিৰিক্ত
কৰিবলৈ ভাল পায়। বৰক বেখাৰ তলৰ ফালে থকা এই ছালিবোৰলৈকে অ'ক

পাইন আদি গছৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে। খাৰবিলাকে সচৰাচৰ বাস কৰিবৰ বাবে, এনে ধৰণৰ হাবিবোৰকে নিৰ্বাচন কৰি লয়। পোৱালিৰে সৈতে মাইকী খাৰৰ দুই চাৰিটা প্ৰাণী মুকলি ঠাইলৈ ওলাই আহি খাহত মুখ দিয়েহি যদিও ভোবোলা মতাবোৰে সাধাৰণতে মুকলি ঠাইলৈ ওলাই আহিব নোখোজে। ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত আৰু পাছবেলা মতা খাৰবিলাকে কিছু সময়ৰ বাবে মুকলি ঠাইবিলাকলৈ ওলাই আহিলেও দিন দুপৰাত নিহঁতে বাৰিৰ মাজত আত্মগোপন কৰি থাকিবলৈহে ভাল পায়। ৰাতিপুৱা আৰু ভাৰেদি সময়খিনিত এই মতাবোৰে মুকলি ঠাইলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হ'লে সিহঁতে পৰ্বতৰ ওপৰত ফালে থকা ওখ ওখ পাথৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীৰ আকোচ লৈ খৰ্চ কৰিবলৈ। শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীক নিলগতে দেখা পালে চতুৰীৰ দৰে পহৰা দিয়া মতাবোৰে বিপদৰ সঙ্কেত দি পলাই গাবলৈ বাকীবোৰ খাবক সতৰ্ক কৰি দিয়ে।

অন্যান্য বিধৰ বগলীয়া চাগলীবোৰৰ দৰেই খাৰবিলাকে সাধাৰণতে জুম পাতি বাস কৰিবলৈ ভাল পায়। মতা-মাইকী আৰু বেলেগ বেলেগ বয়সৰ পোৱালিবোৰক সামৰি লৈ একোটা জুগলৰ সৃষ্টি হয়। পান খোৱাৰ সময় আহি পালে ভোবোলা মতাবোৰৰ মাজত অহিয়া-অহিৰ ভাব সৃষ্টি হয়। মাইকী ছাগলী বা খাৰক নিজৰ ফলীয়া কৰি ল'বৰ বাবে পৈনত বয়সৰ মতাৰ মাজত যুঁজ-বাগৰৰ সৃষ্টি হয়। যুঁজত জয় লাভ কৰা মতা একোটাই মাইকী খাৰবিলাকৰ মাজত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে। পৰাজয় নবন কৰা খাৰে সেই ঠাই ত্যাগ কৰি আঁতৰলৈ গুচি যাবলৈ বাধ্য হয়। যুঁজ-বাগৰত প্ৰবৃত্ত হোৱা দুই-এটা খাৰে কেতিয়াবা ওখ গৰাৰ পৰা গভীৰ তলিত গৰি পৰি প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হয়।

এইবিধ চাগলী জাতীয় বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে সাধাৰণতে বাৰিষা কালত পোৱালি জগায়। পাৰ্বত্য অঞ্চলত বাস কৰা মানুহবিলাকে নানা কৌশল অৱলম্বন কৰি খাৰ জাতীয় প্ৰাণী কিছুমানক নিৰ্ভাৱে হত্যা কৰে। তেওঁলোকে এইবিধ বগলীয়া চাগলীৰ মাংস ভুতি-বুদ্ধি লগাই পায়। এইবিধ চাগলী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ মাংসবোৰ খাবলৈ লিকা হয় বুলি জনা যায়। তদুপৰি এই মাংসৰ পৰা হেনো এক প্ৰকাৰৰ অকটা গোন্ধ বাহিৰ হয়। মাইকী খাৰ-চাগলীৰ মাংসবোৰ কিন্তু কোমল হয় আৰু তাৰ পৰা কেৱল প্ৰকাৰৰ গোন্ধ নোলায়। সেইকাৰণে সেই ফালৰ মানুহে মাইকী খাৰৰ মাংস খাবলৈ ভাল পায় বুলি জনা যায়।

নীলগিৰি খাৰ

শ্ৰেণী— স্তন্যপায়ী

বৰ্গ— দাৰ্জিলিংভেটিলা

উপবৰ্গ— বোম্বেনেষ্টিয়া

কুল— বডিডি

প্ৰজাতি— হেমিট্ৰাগছ হাইল'ক্সিডাছ

ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক বনৰীয়া ছাগলী আৰু ছাগলী, এণ্টেলপ্ৰ'গছবি প্ৰাণী বাস কৰি আছে সেইবিলাকৰ গচবাচৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি হিমালয় শৈলমাৰ্গৰ সুউচ্চ পৰ্বতভূ-ভাগ আৰু ইয়াৰ নামনি অক্ষদণ্ডে কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই প্ৰাণীবিলাকৰ বিচৰণ ভূমি দক্ষিণৰ কালে যিৱপি থকা বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগলৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱা দেখা নাযায়। ইয়াৰ পৰা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰি যে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওল ওল ঠাই আৰু এই পৰ্বতমালাক পৰিবেষ্টিত কঢ়ি থকা নামগিৰি সমভূমি আৰু পৰ্বতীয়া পৰিবেশে এই প্ৰাণীবিলাকৰ বাবে অসুকন বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে।

আনহাতে দাক্ষিণাত্যৰ ফালে নীলগিৰি নামৰ যি পৰ্বত মানাই বিস্তাৰ লাভ কৰি আছে সেই পৰ্বতমালাৰ ওপ-চাপৰ ঠাইবোৰত "নীলগিৰি খাৰ" নামেৰে জনাজাত আন এবিধ বনৰীয়া ছাগলী জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। অকলশৰীয়াভাৱে মাত্ৰ এবিধ বনৰীয়া ছাগলীয়ে দাক্ষিণাত্যত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা কথাটোৱে ভাৰতবৰ্ষত এই পোষ্টীৰ বন্যপ্ৰাণী বিতৰণত এক অভিনৱ অভিলেখৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। সি যিয়েই কি নহওক এই বিগমত এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে গোটেই ভাৰতভূমিত দুই প্ৰজাতিৰ খাৰ নামেৰে জনাজাত বনৰীয়া ছাগলী বাস কৰে। তাৰে এবিধক হিমালয়ৰ খাৰ আৰু আনবিধক নীলগিৰিৰ খাৰ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। হিমালয় পৰ্বত-মালাত বসতি কৰা খাৰ নামৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আশোচন্য কৰি অহা হৈছে। হিমালয়ৰ খাৰ দক্ষিণ ভাৰতত বাস কৰা দেখা নাযায়। সেইবিলাক ঠাইত হিমালয়ৰ খাৰক নীলগিৰি খাৰ নামৰ বনৰীয়া ছাগলীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এইবিধ বন্য-প্ৰাণীৰ গচবাচৰ বসতিস্থান নীলগিৰি পৰ্বতমালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিমফাল পৰ্বত-লৈকে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে।

বিভিন্ন জাতৰ অন্যান্য বনৰীয়া ছাগলীবোৰৰ লৰেই নীলগিৰি খাৰে আৰু পাতি বাস কৰিবলৈ ভাল পায়। দিল্লী-মুম্বাই পথৰ ব'দৰ উত্তাপৰ পৰা

হাত সাৰিবলৈ ইহঁতে গছৰলৈ গিচিনা পাখৰৰ তলত আশ্ৰয় লৈ সময় অতিবাহিত কৰে। আবেলি পৰত যেতিয়া বেলিটোৱে পশ্চিম আকাশত মাৰ যাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ইহঁতে মুকলিমূৰীয়া ঠাইবোৰলৈ জাক বান্ধি ওলাই আহে আৰু তাত স্বাভাৱিকতে উৎপন্ন হোৱা ঘাঁহ-বনা আদি খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। সন্ধিয়াৰ আগে আগে সিহঁত আঁতৰি গৈ স্তম্ভধাজনক ঠাইত পুনৰ আশ্ৰয় নষ্টগৈ। পিছদিনা বাতিপুৱা হাবিৰ মাজৰ পৰা সিহঁত জাক বান্ধি পুনৰ ওলাই আহে আৰু দুপৰীয়া নোহোৱা পৰ্যন্ত মুকলি ঠাইত চৰি ফুৰেহি। মাইনী খন্দৰ সঙ্গ লিচৰা সত্ৰাবোৰৰ মাজত কেতি-



নীলগিৰি খাৰ

মাৰা খণ্ডযুক্ত আৰম্ভ হ'ব। যুঁজ-বাগলত পৰাজয় বৰণ কৰা পাখে কেতিয়াবা নিসঙ্গ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হয়। নীলগিৰি খাৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা গ্ৰহেজ্ঞাধৰ বেছি নহ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। সাধাৰণতে এইবিধ প্ৰাণীৰ মাইকী-বোৰে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জগায় যদিও একেবাৰতে দুটাকৈ পোৱালি জগোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়।

মাৰখৰ

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—আৰাচিওৰ্ডেট্টা

উপবৰ্গ—ৰোমিনেণ্টিয়া


কুল—ৰডিডি

প্ৰজাতি—কেপ্ৰা ফেলক'গেৰি

ভাৰত উপমহাদেশৰ অন্তৰ্গত চাৰ্কাছ গোষ্ঠীৰ যি কেইবিধ বনৰীয়া জন্তু 'মাৰখৰ' নামেৰে জনাজাত প্ৰাৰ্হায়েই দেখা দিয়া যায় সেই আটাইকেইবিধৰ ভিতৰত মাৰখৰ নামেৰে জনাজাত প্ৰাৰ্হায়েই দেখা দিয়া আটাইতকৈ মনোমোহা বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ দীঘলীয়া শিংবোৰা দেখাত অতি মনোহৰ। অনিয়মিতভাৱে দীঘল আকৃতিৰ শিংবোৰা পছন্দ কৰে বনুভিৰীয়াই আঁঠু খাই থাকে। প্ৰত্যেকটো শিংৰ ওপৰ ভাগত পৰানি পাৰ্শ্বিক আশৰ ফালে খাচ কটাব নিচিনা দাগ থাকে। ভিড় ভাগত নিখিনি ডাঙৰ নিচিনা দীঘল দীঘল নোম বা চুলিৰ উৎপত্তি হয় সেই নোমখিনিয়ে আঁঠু ঠেং দুখন আঁঠু পৰ্যন্ত বিস্তাৰ লাভ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পেটৰ তলৰ ফালে থকা নোমখিনিকেও অলপ দীঘল ৰূপ ধাৰণ কৰে। সাধাৰণতে জন্তুটোৰ গাৰ নোমখিনিক বৰষুণ চানেকীয়া হ'লেও জাৰৰ দিনবোৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে এই নোমখিনিক বৰণ সলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ত নোমবোৰ জঁটৰ নিচিনা হয় আৰু এইদৰে জঁটগা নোমখিনি বৰণ হোৱা চানেকীয়া হৈ পৰা দেখা যায়। গৰম কালি আহি পালে গাৰ নোমবোৰে আকৌ মিহি ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু তেতিয়া জন্তুটোৰ গাত থকা বগুচুৱা মুগা বৰণখিনি আগৰ দৰে জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কম বয়সীয়া পোৱালিবোৰৰ গাত গজা নোমখিনি চুটি হৈ থাকে। বয়স যোৱাৰ লগে লগে এই নোমবোৰ লাহে লাহে দীঘল হ'লৈ আৰম্ভ কৰে। পূৰ্ণ বয়সৰ মাৰখৰগাত গজিবলগীয়া আটাইবোৰ নোমৰ উৎপত্তি হৈ জন্তুটোৱে যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আৱৰ্ণকাল কৰে তেতিয়া তাক আমাৰ মানুহে হৰত পোহা এটা ভোৰোলা ছাগলী যেন দেখি। বাইকী মাৰখৰখিনিক মতাতকৈ আকাংক্ষিত কৰা হয় আৰু সিহঁতৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমখিনিক বৰণ অলপ ক'লা চানেকীয়া হোৱা দেখা যায়।

থকা ঠাইৰ বিভিন্নতা আৰু জলবায়ুৰ বৈচিত্ৰ্যই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ পৰিৱেশিত মাৰখৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ কেইবাটাও উপজাতিক বেলেগ বেলেগ ঠাইত লগ পাবলৈ

আশা কৰিব পাৰি। এই উপজাতিবিলাকৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা জন্তুৰ শাৰীৰিক পাৰ্ধক্য ইমান নগণ্য যে সিহঁতক বেলেগ উপজাতিৰ প্ৰাণী হিচাপে চিনাক্তকৰণ কৰা কাম সহজ বুলি ক'ব নোৱাৰি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি জীৱবিদ বিজ্ঞানীচাৰ্যসকলে ইহঁতৰ মাজত বিকশিত হোৱা পাৰ্ধক্যখিনি বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। মাৰখৰৰ দৰে একাধিক উপজাতিৰ বেষ্ট বিকশিত হোৱা অন্যান্য কেইবাবিধো জন্তু ভাৰত উপমহাদেশৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে মণিপুৰ ৰাজ্যত থলুৱা প্ৰাণী হিচাপে বসবাস কৰা চাঙ্গাই বা ধনুশিঙীয়া হৰিণ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰিবেশত স্থানীয়-ভাৱে বসতি কৰি অহা দল হৰিণ নামৰ প্ৰাণী দুবিধৰ নাম এই সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰিব



মাৰখৰ

পাৰি। ধনুশিঙীয়া হৰিণৰ তিনিটা উপজাতি আছে। মণিপুৰত থকা চাঙ্গাই নামৰ প্ৰাণীবিধেৰে তাৰে এটা উপজাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। থামিল নামেৰে জনাজাত আন দুটা উপজাতিৰ ধেনুশিঙীয়া হৰিণৰ বসতিস্থান ব্ৰহ্মদেশ আৰু থাইলেণ্ডৰ কালে মহল্লাবিত হৈছে।

হিমালয় শৈলমালাত কাশ্মীৰৰ কালে যিবোৰ পৰ্বতীয়া ঠাই আছে তাতে সন্মুখ পৃষ্ঠৰ উচ্চতাই নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা অনুকূল পৰিবেশবিলাকত দুটা উপজাতিৰ মাৰখৰ জাতীয়

প্ৰাণী বাস কৰে। নিম্নস্তৰৰ সামুদ্ৰিক উচ্চতাই প্ৰাধান্য লাভ কৰা ঠাইবোৰত সচৰাচৰ বাস কৰা মাৰখৰবিলাকৰ শিংঘোৰাই অলপ মেলাহি ৰূপ ধাৰণ কৰে। ইহঁতৰ বিচৰণ ভূমি আৰু স্বাভাৱিক পৰিবেশ উচ্চ-স্তৰৰ পৰ্বতমালালৈ বিস্তাৰিত হোৱা দেখা নাযায়। এইবিধ মাৰখৰৰ শিংঘোৰাৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে প্ৰত্যেকটো শিঙৰ গঠন প্ৰণালীত নেৰটা-মেৰটি ৰূপ প্ৰতিফলিত হয়। এই পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ ওপৰৰ ফালে থকা বৰক বেখাৰ চুবুৰীয়া ঠাইবোৰত মাৰখৰ জাতীয় বনৰীয়া ছাগলীৰ শিংঘোৰা মেলাহি নহৈ তিতৰৰ ফালে চক্ৰ আকাৰত ঘূৰ খোৱা হয়। 'ডুপুৰি এই উপজাতিৰ প্ৰাণীৰ মূৰত উৎপত্তি হোৱা শিঙত আগৰ বিষৰ শিঙৰ দৰে কেইবাটাও তাঁজ থকা দেখা নাযায়। প্ৰত্যেকটো শিঙে মাত্ৰ দুটা দুটা তাঁজত যেন খাই আগৰ ফালে হাউলি থাকে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই দুই উপ-প্ৰজাতিৰ মাৰখৰক ক্ৰমে কেপ্ৰা ফেলক'নেৰি ফেলক'নেৰি আৰু কেপ্ৰা ফেলক'নেৰি কাম্বীয়েনচিচ নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছে। আনগোত্ৰে আফগানিস্তানৰ ভোগোলিক সীমাবেধাই যিখিনি পাৰ্বত্য ঠাই অধিকাৰ কৰি আছে সেইখিনি ঠাইত সচৰাচৰ বাস কৰা মাৰখৰ-বিলাকৰ শিঙৰ বেলেগ ৰূপ প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। নিজস্ব বিচিত্ৰ ৰূপত এই উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ শিংঘোৰাৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা যায়। ইহঁতৰ শিংঘোৰে খাঁজ কটা, বিষৰ পকোৱা-পকি ৰূপ ধাৰণ কৰে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এইবিধ মাৰখৰক কেপ্ৰা ফেলক'নেৰি মেগাচেৰাচ্ নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছে। চুলেইমানৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত খলুৱাভাৱে বসবাস কৰা উপ-প্ৰজাতিৰ মাৰখৰ শিঙত এইমাত্ৰ উল্লেখ কৰি অহা দুবিধ মাৰখৰৰ শিঙৰ বৈচিত্ৰ্য বিকশিত হোৱা দেখা নাযায়। এই পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত সচৰাচৰ বাস কৰিবলৈ উপযুক্ত পৰিবেশ নিৰ্বাচন কৰি লোৱা উপ-প্ৰজাতিৰ মাৰখৰক কেপ্ৰা ফেলক'নেৰি ফাৰদিনি নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছে।

মাৰখৰবিলাকৰ গাত অন্যান্য বনৰীয়া ছাগলী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ চাৰিত্ৰিক গুণসমূহ বিকশিত হোৱা দেখা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে ক'ব পাৰি যে অন্যান্য বনৰীয়া ছাগলী জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে মাৰখৰবিলাকেও জাকৰুৱাভাৱে বাস কৰে। এই বিধ প্ৰাণীয়ে কিন্তু চিৰকাল বৰফৰ তলত পোত খাই থকা পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত বাল কৰিবলৈ ভাল নাপায়। বৰফ-বেখাৰ নামনিভাগত অৱস্থিত যিবোৰ পাৰ্বত্য এলেকাত গছ-গছনিৰ উৎপত্তি হয় আৰু য'ত বিৰাট বিৰাট পাখৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত খলা-বমা পৰিবেশে প্ৰাধান্য লাভ কৰে তেনেবোৰ ঠাইতে উপযুক্ত স্থান নিৰ্বাচন কৰি লৈ মাৰখৰ-বিলাকে সময় অতিবাহিত কৰে। মতা, মাইকী আৰু বিভিন্ন বয়সৰ পোৱালিবোৰক একেলগে সামৰি লৈ একো একোটা মাৰখৰৰ জুম বা জাকৰ সৃষ্টি হয়। একোটা জাকৰ মাজত সাধাৰণতে বাস কৰি থকা ভোবোলা মতা মাৰখৰবোৰে গৰম কালি জাকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি আহি গাই-গুটীয়াভাৱে নিসৰ্জ জীৱন যাপন কৰিবলৈ লয়। জাকৰ দিন কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে মতা মাৰখৰবোৰে পুনৰ জাকৰ মাজত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইখিনি সময়তে ভোবোলাহঁতে মাইকী মাৰখৰৰ লগ লৈ সৱৰিখিনি অভিযান্ত্ৰিক কৰে। গৰমৰ দিনবোৰ পুনৰ কাষ চাপি আহোঁতে লৈ

আহোঁতেই মাইকী মাৰখৰবোৰে পোৱালি জগাবলৈ আৰম্ভ কৰে। সাধাৰণতে মাইকী মাৰখৰবোৰে এবাৰত দুটাকৈ পোৱালি উৎপাদন কৰে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এবাৰত মাত্ৰ এটা পোৱালি জগোৱাহে দেখিবলৈ পোৱা যায়।

আইবেক্স

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—আৰ্চিওডেণ্ডিলা

উপবৰ্গ—ৰোমিনেণ্টিয়া

কুল—ৰভিডি

প্ৰজাতি—কেপ্ৰা আইবেক্স চাইবিৰিকা

পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বনৰীয়া অৱস্থাত বাস কৰা ছাগলী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত আইবেক্স নামৰো জনাজাত প্ৰাণীয়ে এখন বিশিষ্ট আসন লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আইবেক্স শব্দটো পশ্চিমীয়া আৰু সেইবাবে এই শব্দৰ উৎপত্তি ইউৰোপ মহাদেশেই বুলি ক'ব লাগিব। গোটেই পৃথিৱীখনত সৰ্বমুঠ ন নিধমান আইবেক্স সংপ্ৰদায়ৰ জন্তু এতিয়াও বনৰীয়া অৱস্থাত স্বাধীনচিহ্নীয়াকৈ বাস কৰি থকাৰ কথা জনা যায়। তাৰ ভিতৰত কেইবিধমান এছিয়া, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশত আৰু এবিধ পশ্চিম গোলার্দ্ধৰ উত্তৰ অঞ্চলত বসতি কৰে বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। পশ্চিমীয়া হ'লেও আইবেক্স শব্দই আজিকালি পৃথিৱী জোবাকৈ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ এবিধ প্ৰাণী হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওখ ওখ ঠাইবোৰত নিগাজীকৈ বাস কৰে। যিবিধ আইবেক্স হিমালয় শৈলমালাৰ অনুকূল পৰিবেশত বাস কৰে সেইবিধ প্ৰাণীক কাশ্মীৰৰ মানুহে চাকিন আৰু কাইল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত থকা কুল অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে টাংৰল নামেৰে অভিহিত কৰে। জনপ্ৰিয় ইংৰাজী ভাষাত ইয়াক হিমালয়ান আইবেক্স বুলি কোৱা হয়। অসমীয়া ভাষাত সংক্ষেপতে ইয়াক আইবেক্স বুলি ক'ব পাৰি।

আইবেক্স পংক্তিত্ত্ব ছাশানীবিলাকৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল এনে যে সকলো ক্ষেত্ৰতে ইহঁতৰ শিংযোৰা আকাৰত অস্বাভাৱিকভাৱে দীঘল হয়। এই শিংযোৰা মূৰৰ ওপৰতৈ উঠি গৈ পাছৰ ফালে ধনুৰ্ভিবীয়াকৈ ঘূৰ খাও খাবে। পাছৰ ফালে হাউনি থকা শিংযোৰাই সেনাহি ৰূপ ধারণ কৰে আৰু জন্তুটোক মিলগৰ পৰা ভিলিকি থকাকৈ দেখুনিয়াব কৰি বাবে। মতা আইবেক্সবিলাকৰ খুঁতৰিত দীঘল দীঘল ডাঙৰ উৎপত্তি হয়। মাইকীৰ ক্ষেত্ৰত এনে বৰণৰ ডাঙি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শিঙৰ আকাৰ পৰ্য্যাপ্তিক ত্ৰিবেণীয়া হয় আৰু বসন্তৰটো শিঙৰ ওপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আগলৈকে সমান্তৰালভাৱে কটা খলপা ৰূপে খাও খাকে। সমস্ত শাৰীৰত বিদ্য-



হিমালয়ৰ আইবেক্স

মান হৈ থকা নোননোৰৰ বৰণ মুগা হয় আৰু তাৰ উপৰি ভাগত ক'লা চানেকীয়া ছিটিকনিৰ আভাসে কম-বেছি পৰিমাণে বিৰাজ ৰবে। তদুপৰি নোমৰ আৱৰণপ্ৰণত কিছুমান চকুৰে ভালদৰে মনিৰ নোৱাৰা চৰণা-চকল দাগ থাকে। গ'মৰ দিনত এই ধৰণৰ বিচিত্ৰ দাগবোৰ বেছিকৈ জ্বিলিকি উঠে। শিতকালত। পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত যেতিয়া অতিপাত ঠাণ্ডা

পৰে ভেতিয়া এই নোমবোৰৰ স্বাভাৱিক বৰণ পৰিৱৰ্তন হয়। মুগা বৰণীয়া নোমবোৰে গোকৰা ৰূপ ধাৰণ কৰে। তাৰ ওপৰত সামান্যভাৱে ৰঙচুৱা চামনিৰ উজ্জ্বল চিক মিকনি দেখা যায়। মিহি নোমৰ আৱৰণখন ভেতিয়া অলপ বহুটা আৰু ঠন্ডা হৈ পৰে। এই ঠন্ডা নোমবোৰৰ ভিতৰফালে ছালৰ ওপৰত লাগি থকা এচৰকা কোমল কোমল নোমৰ সৃষ্টি হয়। কপাহৰ নিচিনা এই নোমৰ আচ্ছাদনখনে জন্তুটোৰ শৰীৰৰ উত্তাপৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে।

অৰ্ধনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিবেচনা কৰি চালে দেখা যায় যে আইবেক্স নামৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে কাশ্মীৰত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবিধ প্ৰাণীৰ গাত উৎপন্ন হোৱা দীঘল নোমবোৰৰ তলৰ ফালে এক প্ৰকাৰৰ কপাহ সদৃশ কোমল কোমল নোমৰ উৎপত্তি হয়। কাশ্মীৰৰ মানুহে এই নোমবোৰৰ পৰা এক উন্নত পৰ্যায়ৰ উল সূতা তৈয়াৰ কৰে। তুপৰি ইয়াৰ পান ছালখন বস্ত্ৰনিৰ্মাণৰ বাবে পৰা এবিধ উত্তম ধৰণৰ ছামৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ নোমৰ পৰা যি উল বা ঔণসূতা উৎপাদন কৰা হয় সেই উলৰ নানা ধৰণৰ গৰম বোজা, হাত বোজা, চুয়েটাৰ আদি গৰম বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। কপাল, চান্দৰ, গজাবান আদি লাগু-ভিদ্ৰাল কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা কামতো এইবিধ উল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কপাল, চান্দৰ আদি ব্যৱহাৰী কাপোৰৰ ভিতৰফালে আইবেক্সৰ কোমল কোমল নোমবোৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা এডৰপ চামনি লগাই দি এবিধ উন্নত পৰ্যায়ৰ গৰম কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। এইবিলাক সামগ্ৰীৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ বাবে কাশ্মীৰৰ মানুহে বহুতো সংখ্যক আইবেক্স নিধন কৰিবলগীয়া হৈছিল। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত এইবিধ বিচিত্ৰ জন্তুৰ সংখ্যা স্বাভাৱিক পৰিৱেশত আশাতীতভাৱে কমি অহাৰ উপক্ৰম হ'ল। বন্য প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ আৰু সুপৰিচালনাৰ নীতি-নিয়মবিলাক প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পাছৰ পৰা এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

তাড়াল বা নীলাভেড়া

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—আৰাচিওডেণ্ডিলা

উপবৰ্গ—ৰোমিনেণ্টিয়া

কুল—ৰডিডি

প্ৰজাতি—চিউইচ্ নাহাৰ

হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওপৰৰ ফালে থকা দুৰ্গম পৰিবেশত যি কেইবিধ বনৰীয়া ভেড়া কৈদা প্ৰাণী আনেঙে আনেঙে বাস কৰে সেই কেইবিধৰ ভিতৰত তাড়াল বা নীলাভেড়া নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীক অন্যতম বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। শৈলমালাৰ ওপৰ অক্ষাত ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান আহল বহল পথাৰ থাকে আৰু সেইবোৰ ঠাইত ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ বাহিৰে ডাঙৰ আকাৰৰ গছ-গছনি থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নীলা ভেড়া জাতীয় প্ৰাণীয়ে এইবোৰ মুকলি মূৰীয়া ঠাইকে বাস কৰিবৰ বাবে সাধাৰণতে নিৰ্বাচন কৰি লয়। সিহঁতে বৰফৰ সীমাবেখাবোৰ অতিক্ৰম কৰি বৰকাছল উচ্চ শিখৰত উঠিব নোখোজে। মুকলিপথাৰবোৰত লহপহকৈ গজা ঘাঁহবোৰ টানি আজুৰি খাই ইহঁতে জাক পাতি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে। চুটি চাপৰ গছৰ কুঁহিপাত, পাখৰ উপৰি ভাগত উৎপন্ন হোৱা শেলুৱৈ গোষ্ঠীৰ উদ্ভিদ আদিয়ে ইহঁতৰ বাবে বিকল্প খাদ্য-সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰে। সাধাৰণতে হেলনীয়া ঠাইবোৰত ঘূৰি পকি ফুৰা বিধৰ প্ৰাণী হ'লেও নীলা ভেড়াবিলাকে পাখৰ, শিল আদিয়ে পৰিপূৰ্ণ দুৰ্গম পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত থকা উচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰিবলৈ অকণো ভয় নকৰে। ফটা খুৰাৰ ঠেঙেৰে ধোপনি লৈ ইহঁতে নিৰ্ভয়ে এইবোৰ ভয়াবহ পৰিবেশত খোজ কাঢ়ি ফুৰিব পাৰে। শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজকে ৰচাই ৰাখিবলৈ ইহঁতে উচ্চ শিখৰলৈ আৰোহণ কৰিবলগীয়া হয়। পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত ঘূৰা ঘূৰি কৰি ফুৰা অৱস্থাত ইহঁতে মাজে সময়ে স্তম্ভাৰ্জনক ঠাই বিচাৰি লৈ তাতে শুই ৰহি খন্তেক জিৰণি লয়। কিছু সময় এইদৰে জিৰণি লোৱাৰ পাছত পুনৰ চৰিবৰ বাবে ইফালে সিফালে ঘূৰা-ঘূৰি কৰি ফুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইহঁতৰ গাত উৎপন্ন হোৱা মুগা বৰণীয়া নোমখিনিৰ সৈতে সেই ঠাইত থকা শিলাময় পৰিবেশৰ বৰণ এনেভাৱে মিলি যায় যে নিলগৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিলে সিহঁতক সহজে চিনি উলিওৱা টান হৈ পৰে।

নীলাভেড়াবিলাকক আচলতে দেখাত ছাগলী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী যেন লাগে। ইয়াৰ শৰীৰত ভেড়া আৰু ছাগলী—এই দুয়ো বিধ প্ৰাণীৰ শাৰীৰিক লক্ষণ সংমিশ্ৰিত-

ভাৱে বিকাশ হোৱা দেখা যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিত অৰিকল ছাগলী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ নিচিনা হ'লেও ইয়াৰ খুঁতৰিত আন আন জাতীয় নতুন ছাগলীবোৰৰ দৰে ভাৰ্য্যৰ নিচিনা দীঘল নোমৰ উৎপত্তি নহয়। তদুপৰি ছাগলী জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ গাৰ পৰা যি গোন্ধ ওলায় তেনে গোন্ধ এইবিধ প্ৰাণীৰ গাৰ পৰা ওলোৱা দেখা নাযায়। ভাড়াৰ প্ৰত্যেকখন ঠোঙৰ খুৰাত সংলগ্ন হৈ থকা একো একোটা মাংসগ্ৰহী থাকে। ছাগলী জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ এই গুণ থাকিলেও সি কেৱল আগঠোং দুখনতে গীমাৰু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শাৰীৰিক গুণাগুণত এনে বিসদৃশ লক্ষণ থকালৈ লক্ষ্য ৰাখি এইবিধ প্ৰাণীক মোটা-মুটিভাৱে ভেড়াৰ বশত স্থান দিয়া হৈছে।



ভাড়া বা মীলাভেড়া

ভাড়াৰ শিং যোৰাৰ গঠন প্ৰণালীত ছাগলী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ শিঙৰ গঠন প্ৰণালীৰ লগত মিল হৈ থকা দেখা যায়। ইত্যাদি কাৰণত এইবিধ বন্যপ্ৰাণীৰ দেহত কিছুমান বৃদ্ধিৰ নোৱাৰা গুণাবলীৰ বিকাশ সাধন হৈছে বুলি জীৱবিদসকলে ক'ব খোজে।

উবিয়া, চাপু বা বাজাকী ডেকা

ধেবী—তন্যপাৰী

বৰ্গ—আৰু চিত্তেতি টল

উপবৰ্গ—বোৰিনেটিকা

কুল—বতিতি

প্ৰজাতি—অ'ডিচ্ অবিৰেণেটিকা

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিওফালে অৰ্দ্ৰগত কেইবাখিনো ডেকা বা কোণ হ'ল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বনৰীয়া অৱস্থাত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁ ডিঙৰত পজাৰ আৰু কাৰীৰৰ ফালে বাস কৰা উবিয়া নামৰ এবিধ বন্যপ্ৰাণীৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। পজাৰৰ মানুহে ইয়াক উবিয়া বুলি কয় আৰু কাৰীৰৰ ফালৰ মানুহবিলাকে এই একেবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ চাপু বুলিটো ব্যৱহাৰ কৰে। তদুপৰি এইবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ কোনো কোনো ঠাইৰ মানুহে লাডাকী ডেকা বা লাডাকী ছাগলী বুলি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। তেওঁ আৰু পাকিস্থানৰ আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখা অতিক্ৰম কৰি এইবিধ প্ৰাণীক পাকিস্থানৰ সিদ্ধু-প্ৰদেশত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাকিস্থানৰ সিকানে বেলুচিস্থানৰ পাৰ্শ্বত জু-তানডো লাডাকী ছাগলী বাস কৰে। সিদ্ধুপ্ৰদেশ আৰু বেলুচিস্থানত এইবিধ বন্যপ্ৰাণীক বুজাবলৈ “কাৰ” আৰু “গেল” বুলি ব্যৱহাৰ কৰে। সাধাৰণতে ডেঙাৰ বুজাবলৈ “কাৰ” আৰু ডেঙীক বুজাবলৈ “গেল” বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবিধ ডেঙাৰ সচৰাচৰ বাসস্থান আৰু বিচৰণ ভূমিৰে ভাৰত উপ মহাদেশখনৰ চাৰিওফালে অতিক্ৰম কৰি উত্তৰে তিব্বত বালভুনি আৰু উত্তৰ-পশ্চিমৰ ফালে পৰ্বত বিহীন আছে বুলি জনা যায়।

আকাৰত উবিয়াবিশাক অন্যান্য ডেকা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীসকলকৈ তুলনামূলকভাৱে সৰু হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ তিনিটা উপ-প্ৰজাতি আছে।

বিভিন্ন জনবান্ধু আৰু সৰু পূৰ্বৰ পৰা তুলনামূলক উচ্চতায় বাহাই প্ৰজাৰ বিভাজন কৰা যি কোনো উন্নত পৰিবেশত এই গোষ্ঠীৰ ডেকাবিলাকে কৃতকাৰীভাৱে বাস কৰি জীৱন গিৰাহ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে জনবান্ধুৰ প্ৰভাৱে ইহঁতৰ দেহত উপপন্ন হোৱা মোহোৰৰ বৰণৰ গভীৰভাৱত হীন-ডেঙি ৰচাৰ। পানীমিক পানীৰ জলীয়ামত ইহঁতৰ মাজত কিছুমান লেখত ল'বলগীয়া পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়। পানীমিক

আৰু চাৰিত্ৰিক গুণত প্ৰতিফলিত হোৱা ভিয়া প্ৰকাশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা তিনিটা উপ-প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰকাশ আকাৰৰ গছ-গছনিৰে পৰিপূৰ্ণ গভীৰ অৰণ্যভূমিত লাডাকী-ভেড়াবিলাকে বাস কৰিবলৈ ভাল নাপায়। লাডাকীৰ ফালে হিমালয় শৈলমালাৰ উচ্চ-তৰৰ পৰ্বতীয়া ঠাইত যিবিলাক বৃক্ষহীন সুকলি ঘাঁহী পথাৰ আছে লাডাকী ভেড়াবিলাকে তেনেবোৰ ঠাইতে থাকিবলৈ অনুকূল পৰিবেশ বিচাৰি লয়।



উৰিয়াল বা চাপু

উৰিয়ালবিলাকক গৰল, নিৰ্জু আৰু ভয়াতৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। ইহঁতে মানুহৰ ছাটেই সহ্য কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে জন বসতিৰ ওচৰৰ ঠাই-বোৰত বাস কৰিবলৈ ইহঁতে ভাল নাপায়। পৰ্বতৰ ওপৰৰ ফালে থকা ধিয় গৰাৰ পাহাৰবোৰ বগাই বগাই শিখৰৰ ওচৰৰ ভয়াতৰ ঠাইবোৰলৈ ইহঁতে অনায়াসে আৰোহণ কৰিব পাৰে। লাডাখ অঞ্চলত বাস কৰা উৰিয়ালবিলাক তুলনামূলকভাৱে অলপ ভাতৰ হয়। ইহঁতৰ শিংবোৰা মূৰৰ ওপৰিভাগতে উৎপত্তি হৈ পিছৰ ফালে পাক খাই ধনুৰ আকাৰে ঘূৰি পিঠিৰ ওপৰ ভাগত শেষ হয়গৈ। শিঙৰ ওপৰ ভাগত খাজ কটা দাগ থাকে।

সেই শিংঘোৰাৰ গঠন প্ৰণালী লক্ষ্য কৰিলে এনে ভাৱ মনলৈ আহে যেন কোনোবাৰে শিং ঘোৰা ঋণ ঋণ্টক কাটিবৰ বাবে এখন কটাৰীৰে দাগ দি দি ৰাখিছে। বেলেগ বেলেগ স্বাভাৱিক পৰিবেশত বাস কৰা উৰিয়ালৰ শিংও বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনকি একে ঠাইতে একেলগে জাক বান্ধি চৰি কুৰা উৰিয়াল জাতীয় ভেড়াৰ শিংও জন্তু ভেদে বেলেগ বেলেগ ৰূপৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। জাবকালিৰ দিনবোৰ আহি পালে মতা ভেড়াবিলাকে ডেড়ীহঁতৰ সঙ্গ-স্থল লাভ কৰিবলৈ একে ঠাইতে থুপ ৰাখি। ভেড়াবোৰে একেবাৰতে কেবাটাও পোৱালি জগায়।

বনৰ বা টিকালে বনৰীয়া ডেড়া

শ্ৰেণী—তল্যপাৰী

বৰ্গ—আৰ্টিষ্টেডেটিল

উপবৰ্গ—বোম্বিনেণ্টিৱা


কুল—বভিতি

প্ৰজাতি—অতিচ্ অৰন্ হচ্ চনি

বিহাৰৰ বৈষ্ণৱীয়াৰ বিজিয়া পৰিবেশত বাস কৰা তিন্ তিন্ জাতৰ বনৰীয়া ডেড়া বিলাকৰ ভিতৰত মনন নাগেহে জগাজাত ডেড়াক আকাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি জমা যায়। এইবিধ তিতি প্ৰাণীৰ দেহত কিছুমান নিম্ন শাৰীৰিক আৰু চাৰি-ত্ৰিক ওপ বিকশিত হোৱা দেখা যায়। আচলতে এইবিধ ডেড়া দেখাত তুলনামূলক ভাৱে অন্যসকল ডেড়া জাতীয় প্ৰাণী বিলাকতকৈ ডুৱনি হয় আৰু ইয়াৰ গাঁটোও আন-বিলাক ডেড়াৰ দৰে দেখেহে নহয়। এই বিধৰত এণ্টেলপ পোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰৰ লগত মননক তুলনা কৰিব পাৰি। এণ্টেলপ বিলাকৰ দৰে এইবিধ প্ৰাণীৰ গাঁটো লিহ-লিহীয়া হয়। ইয়াৰ শিং মোৰাৰ ওপৰিভাগ অভাৱনীয় ভাৱে মোটা আৰু নিপোতল হয়। মূৰৰ ওপৰ ভাগৰ পৰা মোটা আকাৰৰ শিংবোৰা ওলাই আহি পাছৰ ফালেদি পাক দাৰি দুবি কাপ দুখনৰ তলত লেপ হয়হি। প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ শিং মোৰাৰে সৈতে অলংকৃত হৈ থকা জন্তোটক দেখিলে মনত এনে ভাবৰ উদয় হয় যেন ই দুপাত ভৰকাৰীয়া জন্তুৰ পৰিহাৰ কৰি ক'বাতলৈ গাজি কাছি যাবলৈ ওলাইছে। এই শিং দুপাতৰ উপৰিভাগ বাঁজ বাঁজ কৈ কটা বিধৰ পখালি মুঠা দাগেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে। বাঁজ কটা শিং মোৰাৰ গঠন প্ৰণালীয়ে কিছুমান আঙঠি লগলগাই গাঁঠি লোৱা মালাৰ বকৰ প্ৰদৰ্শন কৰে।

মজা ডেড়াবিলাকৰ দেহৰ উপৰিভাগত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাকে হালধীয়াটক সুগা বা কপিল কৰণ দানৰ কৰে। জন্তোটৰ পাৰ্শ্বভাগত বিকশিত হোৱা নোমবোৰে কৃষ্ণ বৰ্ণৰ ৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰে। পেটৰ তলৰ ফালে থকা নোমবোৰৰ বৰণ বগলী পাখিৰ দৰে শুকুমা হয়। ঠিক সেইদৰে পলখনৰ আগৰ ফালে থকা ঠাইত যিবোৰ নোমৰ উৎপত্তি হয় সেই মোকবোৰেও শুকুৰ্ণ দানৰ কৰে। পাছ-ভগিনা আৰু নেজডালৰ ওপৰি চানিওকাৰে পুতীকৃত হৈ থকা নোমবোৰৰ বৰণেও ঠিক সেইদৰে বগা ৰূপত আৱ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। মজা ডেড়া বিলাকৰ বয়স ডাঠি দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে সিহঁতৰ ভিত্তিৰ পৰা ওলাই পৰা কিছুমান জট লগা নোমৰ উৎপত্তি

হয়। এই ধৰণেৰে বিকশিত হোৱা জপৰা নোমৰ আৱৰণখন অৱশ্যে বছৰটোৰ আটাই কেইটা মাহতে জন্তোৰাৰ পাত প্ৰকাশ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। জাৰৰ দিনতহে এই জপৰা নোমখোৱা উলম্ব মানহে হয় আৰু পৰমৰ দিনাবোৰ ক্ৰমে আগ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে এই গোটবোৰ মাটিৰ ফাল পৰি গোটেই জালোৱাৰটোৰ বেহ-কপ ঠিক আগৰ নিচিনা হৈ পৰে। ভেড়াই দেহত এইখিনি নানানিক বৈচিত্ৰ্যৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা গৈছে। সেইবাবে দেহত এনেবিধৰ ভাঙুজপীয়া নোমৰ উৎপত্তি হ'লেও সেই নোমৰ নিৰ্মাণ একেদৰে সামান্য হয়। কোনো কোনো ভেড়াই ক্ষেত্ৰত এই পৰমৰ নোম পৰা এনেদৰে লক্ষ্যকৰণ হোৱা নাযায়।



নয়ন বা শিবগুৰুৰ বনবীয়া ভেড়া

নয়ন মানহেৰে জমজমত বনবীয়া ভেড়া প্ৰকৃতিতে হাডেহিনজুৰে ত্ৰিবাৰ মানভূমিৰ পৰ্বতীয়া ঠাইত বাস কৰা পৰম বন্যপ্ৰাণী বুলি জনা যায়। তিব্বত পাহাৰে পৰা লাগি থকা গিৰিবাড় হিমালয় পৰ্বতমালাৰ উচ্চ শিখৰ বিলাকৰ চোপাশে থকা ঠাইনোকলৈও এইবিধক বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ দুই চাবিটা মাজে সময়ে আঁঠি অহাৱী ভাৱে বাস কৰেহি। ভাৰত ভূমিৰ উত্তৰ প্ৰান্তত যি আকাশ চুৱী হিমালয় পৰ্বতমালাই দণ্ডায়মান হৈ যুগ-যুগান্তৰৰ বুৰঞ্জী লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছে সেই পৰ্বতমালাই এতিয়া মহাদেশখণ্ডক পূবা-পশ্চিমাকৈ বিভক্ত কৰি ইয়াৰ দুয়োফালে বাস কৰি থকা বন্যপ্ৰাণী বিলাকৰ বাবে দৃশ্যমান প্ৰাচীৰক

(Visible Barrier) সৃষ্টি কৰিছে। সেই বাবে হিমালয়ৰ উত্তৰে বাস কৰা বহুতো জাতৰ স্থলবাসী (Terrestrial) বা ভূচৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে প্ৰব্ৰজন (Migration) কৰিব নোৱাৰাকৈ সিপাৰতে চিৰকালৰ বাবে বাস কৰি থাকি যাব লগীয়া হ'ল। ঠিক সেইদৰে ভাৰত ভূমিত থলুৱা ভাৱে বাস কৰা বহুতো জাতৰ ভূচৰ প্ৰাণীয়ে উত্তৰৰ কালে প্ৰব্ৰজন কৰিব নোৱাৰিলে। প্ৰব্ৰজনৰ পথত বাধা প্ৰাপ্ত হোৱা বন্যপ্ৰাণীবিন্যাসকে এইদৰে বিচিত্ৰতাৰ পৰিবেশ গঢ়ি তুলিছে। নয়ন নামেৰে জনাজাত ভেড়া জাতীয় বন্যপ্ৰাণী এই স্বাভাৱিক বিষয়ৰ অন্যতম নিদৰ্শন বুলি আঙুলিয়াব পাৰি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা অৱশ্যে নয়ন বা তিব্বতীয় ভেড়া গোটাচেৰেক প্ৰাণীয়ে দৃশ্যমান প্ৰাচীৰৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি হিমালয় পৰ্বতমালাৰ উচ্চ শিখৰ বিন্যাসত প্ৰবেশ কৰেহি। হিমালয় পৰ্বতৰ কিছুমান অনুকূল পৰিবেশত এইবিধ ভেড়াক কিছু সংখ্যক প্ৰাণীয়ে স্থায়ীভাৱে বাস কৰি থকাৰো উমান পোৱা গৈছে।

পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ যিবোৰ ঠাইত ডাঙৰ জাতীয় বিন্যাসগ্ৰাম গছৰ উৎপাদ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু য'ত মজলীয়া আকাৰৰ গছ আৰু ঝাঁহ জাতীয় উদ্ভিদে প্ৰাধান্য লাভ কৰি অনুপান শীতল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে নয়ন বা তিব্বতীয় ভেড়া জাতীয় প্ৰাণীয়ে ফেনেবোৰ ঠাইতে নিগাজীকৈ বাস কৰিবলৈ অনুকূল পৰিবেশ বিচাৰি লয়। আৰু কালি এইবোৰ পৰ্বতীয়া ঠাইতো মহা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হয়। তেতিয়া এইবোৰ ঠাইত বৰফ পৰি মাটিৰ উপৰিভাগ বৰফৰ চামনিৰে ঢাকি পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ত এই বিধ জন্তুৱে মহা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হয়। গোটেইটো অঞ্চল বৰফৰ চপাবোৰৰ তলত সোমাই পৰিলে জন্তুবোৰে বুটিল খাবলৈ ঝাঁহ এডাল নাইকিয়া হৈ পৰে। তেতিয়া সিহঁতে নামনিৰ ফালে থকা বৰফহীন ঠাইবোৰলৈ জাক বান্ধি বান্ধি নামি আহিবলৈ বাধ্য হয়। গৰমৰ দিনত তাৰে কিছুমান ঠাইত থকা বৰফৰ চামনিবোৰ লাহে লাহে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰ ফলশ্ৰুতিত বৰফৰ চামনিৰ তলত চেপা খাই থকা ঝাঁহবন কিছুমানে মূৰ ডাঙি ওপৰলৈ উঠি আহে। নয়ন জাতীয় ভেড়াই সেইবোৰ টানি আঁজুৰি খাই মহা সঙ্কটৰ দিনবোৰ কোনো বৰফে অতিৰাহিত কৰি জীৱনটো ৰক্ষা কৰে। বৰফৰ চামনিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে গলিলে যেতিয়া সমস্ত পৰিবেশ বৰফ শূণ্য হৈ পৰে তেতিয়া তাত নানা জাতীয় ঝাঁহবনে সজীৱনী শক্তি লাভ কৰি সেউজীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰে। নানাবিধ ঝাঁহ বনৰ বিতোপন কুলে বমক জমক পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে। নয়ন গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰে তেতিয়া অপাৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ ঝাঁহত মুখ দি দি ইকালে সিকালে ঘূৰি ফুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। নেপাল আৰু ছিক্কিমৰ মোহময়ী পৰ্বতীয়া পৰিবেশ বিলাকেও এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে।

আৰু কালি যেতিয়া হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওপৰৰ ফালে থকা উচ্চ শিখৰ বিলাক বৰফৰ চামনিৰে ঢাকি পেলায় তেতিয়া নয়নৰ জাকবোৰে একেলগে গোট খাই খাই নামনিৰ বৰফহীন ঠাইবোৰলৈ নামি আহে। বাতিপুৰা ভাগতে জিৰণি লোৱা ঠাইবোৰৰ পৰা সিহঁতে লাহেকৈ ওলাই ঝাঁহবনৰ অনুৰণত ইকালে সিকালে অনাই বনাই ঘূৰি

কুৰে। ভৰ দুপৰীয়াৰ সময়খিনিত সিহঁতে জিৰণি লৈ গছৰ তলত কিম্বা তেনে ধৰণৰ আওহতীয়া ঠাইত পৰি থাকে। আবেলি পৰত বেলিটোৱে পশ্চিম আকাশত নাৰ বাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময় নহালৈকে সিহঁতবোৰে আকৌ খাদ্য দ্ৰব্যৰ উৰাদিহ লৈ পৰিভ্ৰমণ কৰে। বৰফৰ চামনি সম্পূৰ্ণভাৱে গলি গৈ শেষ নোহোৱা ঠাইত পৰিভ্ৰমণ কৰিব লগীয়া হ'লে এইবিধ প্ৰাণীয়ে ঠেঙৰ খুৰাৰ সহায়ত শুকানমূৱা ঠাইত থকা বৰফ গলা ঠাইবোৰ খুচৰি বাঁহৰ-ৰ আগবোৰ উলিয়াই লয়। তেনেবোৰ ঠাইতে ইটোৱে সিটোৰ গাতে গা লগাই গোটেই নিশা পৰি থাকে।

বসন্ত কাল আহি পালে মতা ভেড়া বিলাকে মাইকী হাঁতৰ সঙ্গ স্নেহ পৰিত্যাগ কৰি জাকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যায়। বৰ্ষাকাল আহি পালেও ইহঁতে নিসঙ্গ জীৱন যাপন কৰি উদাসীন প্ৰবৃত্তি প্ৰদৰ্শন কৰি থাকে। যেতিয়া জাব কালিৰ দিনবোৰ ওচৰ চাপি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ভেড়াবোৰে ভেড়ীহাঁতৰ সঙ্গ স্নেহ বিচাৰি উদঙ চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে। গোৱালি জগাবৰ বাবে ভেড়ীহাঁতে কেইবাটাও মাহ অপেক্ষা কৰিব লগীয়া হয়। পৰ্বতৰ ওপৰৰ ফালে থকা স্নেহা অনক ঠাই বিচাৰি লৈ মাইকী জনীয়ে তাতে পোৱালি জগায়।



হৰিণ গোটীৰ প্ৰাণী

গৰু, ব'হ, ছাগলী আৰু এনেলোপ গোটীৰ প্ৰাণীবোৰৰ লগত হৰিণ গোটীৰ প্ৰাণীৰ বহুতো বিষয়ত মিল আছে। এই আটাইবিলাক প্ৰাণীৰ দেহত কিছুমান উল্লেখযোগ্য শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণৰ বিকাশ সাধন হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বাহ-পাত আদি উদ্ভিদজাত খাদ্য সামগ্ৰী ভোজন কৰি এই আনোৱাৰ বিলাকে জীৱন ধাৰণ কৰে। বাহ আদি পাণ্ডুলি পাণ্ডুলি বাহি হজম কৰাটো এই জন্তুবিলাকৰ আন এটা চাৰিত্ৰিক গুণ বুলি ক'ব পাৰি। এই আটাইবিলাক জন্তুৰে মূৰত শিং গজে। গৰু, ব'হ আদিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সিহঁতৰ শিংবোৰ এখন বাকলি সন্মূৰ আৱৰণৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। এই বাকলিৰ ভিতৰত কোমল ধৰণৰ শাহৰ এডাল নলীৰ উপস্থিতি হয়। এইবিলাক শিং কেতিয়াও সৰি নপৰে আৰু জন্তুটো আকাৰত ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই শিং যোৰা ক্ৰমে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে। হৰিণ গোটীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ মূৰত যি শিঙৰ উপস্থিতি হয় সেই শিঙৰ ভিতৰখন গৰু ব'হৰ শিঙৰ ভিতৰৰ দৰে কোপোলা হোৱা দেখা নাযায়। গোটেইটো শিং গোটা পদাৰ্থৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হয়। এই শিং বিলাকত একাধিক শাখা প্ৰশাখাৰ উপস্থিতি হয়। তদুপৰি হৰিণৰ শিং মাজে সময়ে সৰি পৰে আৰু তাৰ ঠাইত নতুন শিঙৰ উপস্থিতি হয়। নতুন শিঙৰ আগ ভাগ ভেলভেটৰ নিচিনা কোমল নোমৰ দ্বাৰা আবৃত হৈ থাকে। শিং ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এই ভেলভেটৰ নোমবোৰ লাহে লাহে সৰি পৰে। তেতিয়া শিংবোৰৰ পূৰ্ণবিকাশ সাধন হয়।

হৰিণ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকে সিহঁতৰ শিংবিলাক আৱৰণকাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে। অৱশ্যে গৰু, ব'হ, ছাগলী আদি জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো এই গুণৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰপত্ৰ, দহহৰিণ আদি জন্তুৰ শিংবোৰা অতিপাত ডাঙৰ আৰু ডাঙৰেয়া আকৃতিৰ হোৱাৰ বাবে হাবি বননিত ঘূৰি ফুৰোঁতে এইবিলাক জন্তুৰে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হয়। শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীয়ে খেদি আহিলে ইহঁতৰ বিৰূদ্ধে শিংবোৰা গ'হ লতাত লাগি ধৰে। এনে পৰিস্থিতিত কোনো কোনোটো হৰিণে শত্ৰু হাতত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগীয়া হয়। হৰিণীহঁতৰ ওপৰত একাধিপত্য লাভ কৰিবলৈ কেতিয়াবা সমবয়সীয়া পুৰুষ হৰিণৰ মাজত খণ্ড যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হয়। এই খণ্ডযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে ইহঁতে বিৰূদ্ধ আকাৰৰ শিং যোৰা কামত লগাব লগা হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুটা হৰিণৰ শিঙত ভোতাপুতি লাগি একেদৰে নোৱাৰা হৈ পৰে। অৱশেষত সিহঁতৰ দুয়োটাই এনে অৱস্থাতে কেইবাদিনো পৰি থাকি মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ বাহিৰে অন্য পথ নাইকিয়া হৈ পৰে। ●

শব-পহ

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—আবষ্টিগুৰুত্ববিলাক

উপবৰ্গ—বোবিনেন্টিয়া

গোত্ৰ—চাবডিডি

প্ৰজাতি—বোজা ইউনিকলৰ

এচিয়া মহাদেশৰ বিভিন্ন দেশৰ অনুকূল পৰিবেশ বিলাকত বাস কৰি থকা স্তন্যপায়ী স্তন্যবিলাকৰ ভিতৰত শব পহ নামেৰে জনাজাত হৰিণৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। আকাৰত এইবিধ হৰিণক এচিয়া মহাদেশীয় পহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। অসমৰ বনভূমি বিলাকতো এইবিধ হৰিণ বাস কৰা দেখা যায়। অতীততে যেতিয়া অসমৰ সৰহ ভাগ ঠাই হাবি বননিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল তেতিয়া এইবিধ হৰিণক য'তে ত'তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এতিয়া নানা কাৰণবশতঃ এই বনভূমি বিলাকৰ পৰিসৰ গছোচিহঁত হোৱাত শবপহৰ থকা ঠাইবোৰ লাহে লাহে কমি আহিল। তদুপৰি মাংসলোভী মানুহে যথেষ্ট ইয়াক নিধন কৰিবলৈ ধৰাত অল্প সংখ্যা আশীত ভাৱে কমি আহিল। বৰ্তমানে কাজিৰঙা, বান্দীয়া উপ্যান, মানাহ অভয়াৰণ্য আদিৰ বাহিৰে বাকীবিলাক ঠাইত এইবিধ হৰিণ দুৰ্ঘাপ্য হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য বহুতো ঠাইত এইবিধ হৰিণ বাস কৰা দেখা যায়। অ্যান্য ৰাজ্যৰ মানুহবিলাকে ইয়াক চাষাৰ নামেৰে অভিহিত কৰে। ভাৰতৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি এচিয়া মহাদেশৰ আন কেইবাখনো দেশলৈ এইবিধ হৰিণে বণতি বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছে। তাৰ ভিতৰত পাকিস্থান, শ্ৰীলঙ্কা, বাংলা দেশ, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়েছিয়া আৰু ইন্দোনেছিয়াৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। এইদৰে বিভিন্ন দেশৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰা শব পহৰ শাৰীৰিক গুণাগুণত সামান্য পৰিৱৰ্তন পৰিণামকৃত হয়। এই দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিবেচনা কৰি শবপহ প্ৰজাতিৰ হৰিণ বিলাকক কেইবাটাও উপ-প্ৰজাতিত স্থান দিয়া হৈছে। শ্ৰীলঙ্কাত যি প্ৰজাতিৰ শব পহ বাস কৰে সেই প্ৰজাতিৰ শবপহক জীৱবিদ বিজ্ঞানী সকলে বোজা ইউনিকলৰ ইউনিকলৰ নামেৰে অভিহিত কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰত বাস কৰা বিধ শবপহক বিজ্ঞান সম্মত ভাৱে বোজা ইউনিকলৰ নাইট্ৰাচ আৰু মালয়েছিয়াৰ ফালে থকা বিধক বোজা ইউনিকলৰ ইকুইণ্ট নাম দিয়া হৈছে। এই তৃতীয়বিধ শবপহক অসমতো বাস কৰা দেখা যায়।

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যি প্ৰজাতিৰ শৰপহ বাস কৰে সেই প্ৰজাতিৰ শৰপহৰ শাৰীৰিক গুণাগুণতো বিভিন্ন ৰূপ পৰিলক্ষিত হয়। তাৰ ভিতৰত পশ্চিম ভাৰতৰ অন্তৰ্গত থকা ৰাজ্যসমূহত বিবোৰ শৰপহ বাস কৰে সেইবোৰ শৰপহ দেখাত অতি মনোৰম বুলি কোৱা হয়। দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে বাস কৰা বিধ শৰপহৰ শিংযোৰা আটাইতকৈ ধুনীয়া বুলি কোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মালয়েছিয়া আৰু ইন্দো-নেছিয়াৰ ফালে বাস কৰা শৰপহৰ গাত এনে সৌন্দৰ্যৰ বিকাশ হোৱা দেখা নহয়।



শৰপহ

যি যিয়েই কি নহওক শৰপহ জাতীয় হৰিণৰ দেহত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইয়াৰ নোমৰিলাক মিহি বা নিমজ হোৱা দেখা নাযায়। এই নোমবোৰ ঠাণ্ডা আৰু খহটা বিষৰ হ'লেও প্ৰকৃত শিং মোহাৰে সৈতে বিৰাট আকাৰৰ জন্তুটো ভাৰত জিলিকা হয়। শৰপহৰ গৰ্ভধনত একোছা দীঘল চানেকীয়া নোমৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা যায়। এই নোমক শৰপহৰ কেশৰ বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি।

শৰপহৰ দেহত উৎপত্তি হোৱা নোমবোৰৰ বং ধোৱা বৰণীয়া বা বঙচুৱাকৈ মুগা বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু তলপেটৰ ফালে গজা নোমখিনি দেখিব অন্যান্য ঠাইত গজা নোমৰ বৰণৰ তুলনাত অলপ শেঁতা হোৱা দেখা যায়। মাইকী শৰপহক আঁহৰ মানুহে ভেলেঙী বুলি কয় আৰু শৰপহৰ তুলনাত ভেলেঙীৰ গাত গজা নোমবোৰৰ বৰণ পাতলীয়া আৰু শেঁতা হয়। তদুপৰি ভেলেঙীৰ মূৰত কোনো প্ৰকাৰৰ

শিঙৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা নাযায়। আনহাতে মতা শব পছৰ শিংবোৰাটি প্ৰকাণ্ড ৰূপ ধাৰণ কৰে। শিংবোৰাত ডাল আৰু শাখা ডালৰ উৎপত্তি হৈ ভসকাৰুণীয়াটোক আকৰ্ষণীয় হোৱা দেখা যায়। এনে ধৰণেৰে ডাল পাত মেলি বিকশিত হোৱা শিঙৰ ইংৰাজী ভাষাত শিং বা হৰ্ণ বুলি নটেক এন্টলাৰ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। অসমীয়া ভাষাত ডালমেলা শিং বুলি সংক্ষেপতে কৈ থব পৰা যায়। শিঙৰ শুবিৰ পৰা সন্মুখৰ ফালে ওলাই অলপ দূৰত ওপৰৰ ফালে ধনুভিৰীয়াটোক উঠি যোৱা এডাল শাখা শিঙৰ উৎপত্তি হয়। মূল শিং ডালক “বাণ্টাইন” বুলি কোৱা হয়। প্ৰত্যেক ডাল মূল শিং সামান্য ভাৱে পাছৰ ফালে হাউলি গৈ ওপৰমুৱা হয়। ওপৰ ছোৱাত এই মূল শিংডাল দুটা ডালত বিভক্ত হৈছে।

শব পছৰে দিন দুপৰত গভীৰ অৰণ্য ভূমিত প্ৰবেশ কৰি সময়খিনি অতিবাহিত কৰিবলৈ ডাল পায়। গছৰ চাঁয়াত ইহঁতে চেপেটা মাৰি পৰি থাকে আৰু মতা হৰিণে শত্ৰুৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি থাকে। আবেলি সময়ত হৰিণ আকৈ লাহেকৈ হাবিৰ মাজৰ পৰা মুকলিমুৰীয়া ঠাইবোৰলৈ ওলাই আহে আৰু কুমলীয়া বাঁহ, কুঁহিপাত আদিত মুখ দি দি চৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সন্ধিয়াৰ সময়খিনি কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে ইহঁতে পুনৰ হাবিৰ মাজত প্ৰবেশ কৰি আত্মগোপন কৰিবলৈ যত্ন কৰে। বাতাব্যতি হাবিৰ মাজতে আশ্ৰয় লৈ থাকে। প্ৰাচু সিনা ৰাতিপুৱা বেলেটো ওপৰলৈ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে শবপছ বিলাকে আকৌ চৰিবলৈ ওলাই আহে।

এইবিধ হৰিণৰ দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত মহৎলৈও বৃদ্ধি আৰু শ্ৰৱণ শক্তি অতিশয় বৰল হোৱা দেখা হয়। হৰিণসমূহ অকণো সাক্ষৰ শব্দৰ উৎপত্তি নকৰাকৈয়ে এইবিধ প্ৰাণীয়ে আনেতে আনেতে পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰিব পাৰে। পানীত সাঁতুৰি যোৱা বিষয়তো এইবিধ হৰিণে অভূতপূৰ্ব পানদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। পানীত ওপঙি ওপঙি সাঁতুৰি যোৱা সময়ত এইবিলাক হৰিণে মূৰটো পানীৰ ওপৰলৈ উঠাই ৰাখে। মুখখনৰে সৈতে মূৰটো পানীৰ উপৰি ভাগত ওপঙাই বৰাব ফলত প্ৰকাণ্ড শিংবোৰা পানীৰ তলত ডোব যোৱাৰ কোনো ভয় লাখাকে। প্ৰতি বছৰে এই জাতীয় হৰিণৰ শিংবোৰা মাটিত সৰি পৰে আৰু তাৰ ঠাইত নতুন শিঙৰ উৎপত্তি হয়। শিংবোৰ সৰি পৰাৰ পাছত শিঙৰ শুবিৰ কোমল মজ্জাখিনি ওলাই পৰে। নতুনকৈ গজা শিঙৰ উপৰিভাগত ভেলভেটক নিচিনা আলমুৱা নোমৰ উৎপত্তি হয়। এই সময়খিনিত শবপছৰে অতিশয় সজল অৱস্থায় কৰি প্ৰাণীৰ সঙ্গীতা হয়।

এইবিলাক হৰিণ কৈমৰ প্ৰাণীয়ে আকৰ্ষকীয় সমাজ পাতি ৰাস কৰে। এই দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা বিবেচনা কৰি চালে শবপছক সমাজপ্ৰিয় প্ৰাণীৰ আখ্যা দিব পাৰি। ভেলভেটী আৰু সিক্তিৰ বয়সৰ পোৱালি লগ লাগি একো একোটা আৰু বা জনৰ সৃষ্টি হয়। একোটা আকৰ্ষক এটা ডাঙৰ আকাৰৰ মতা হৰিণে প্ৰভৱ বিস্তাৰ

কবে । সম বয়সের অন্যান্য মতা হবিণে আহি যাতে তার পারিবারিক জীবনত আলৈ আহুকানর সৃষ্টি কবির নোৱাৰে তার বাবে সি বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কবির লগা হয় । যুঁজ বাগবত প্রবৃত্তি হৈ সি মাইকী হবিণ আকক নিজৰ ফলীয়া কবি ল'বলৈ চেষ্টা কবে । যুঁজত পৰাজয় বৰণ কৰা হবিণে জুৱৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈ জনপ আঁতৰত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হয় । কাতি-আষাঢ় মাহত মতা-মাইকী হবিণৰ সঙ্গম ঘটে । সঙ্গম কাল আৰু ঋতুৰ অৱস্থান ঘটিলে মতা হবিণে ভেঙ্গেঙী-হঁতৰ সাধচৰ্য ত্যাগ কৰি কেৱলীয়া জীবন যাপন কৰিবলৈ আবদ্ধ কবে । গৰমৰ দিনত ভেঙ্গেঙীহঁতে পোৱালি জগায় । এবাৰত এজনী হবিণে এটাক পোৱালি দিয়ে ।



দল হৰিণ

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---আৰ্চিওডেণ্ডিলা

উপবৰ্গ---ৰোমিনেণ্টিয়া

কুল---চাৰ্ভিডি

প্ৰজাতি---ৰোচাৰডাচ্ ডেডোচিলি

অসমৰ জনবায়ু আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিবেশে যি কেইবিধ হৰিণ জাতীয় প্ৰাণীক ধাৰণ কৰিব পাৰিছে সেই কেইবিধৰ ভিতৰত দলহৰিণ অন্যতম। অসমৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যত এইবিধ হৰিণে ৰসতি বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ ভিতৰত মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত কান্‌হা মেচনেল পাৰ্কখনৰ নাম বিশেষ-ভাৱে উল্লেখযোগ্য। উত্তৰ প্ৰদেশৰ তেৱাহী অঞ্চলত এইবিধ হৰিণে ৰসতি কৰিবলৈ অনুকূল পৰিবেশ নিৰ্ধাৰণ কৰি দা'ব পাৰিছে। পশ্চিমবঙ্গত সুন্দৰবন নামৰ যিখন সাগৰপৰীয়া অভয়াৰণ্য আছে সেই অভয়াৰণ্যখনতো এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। দেখিবলৈ পোৱা যায়। উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম বঙ্গৰ সুন্দৰবন অভয়াৰণ্য, অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অন্যান্য দ চানেকীয়া ঠাইবোৰত সচৰাচৰ বাস কৰা দল হৰিণৰ ঠেঙৰ খুৰা বহল হয়। পানীয়ে গৰকা বোকাৰয় পৰিবেশত বাস কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে খুৰাৰ আকাৰ এনে হয়। আন হাতে মধ্য প্ৰদেশৰ শুকান আৰু কঠিন মাটিত বাস কৰা দল হৰিণৰ খুৰা গোটা হৈ পৰে।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ-চানেকীয়া বিলৰ পাৰত এইবিধ হৰিণক জাক বান্ধি কুৰা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃনিৰ পাৰৰ ঘাঁহনিত ইহঁত জাক বান্ধি চৰি কুৰে। বাঘ আৰু অন্যান্য শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীৰ উৰান পালে ইহঁত সঠক হৈ পৰে আৰু বিপদৰ হাত সাৰিবলৈ দৌৰি পলায়। হাতীৰ পিঠিত উঠি যোৱা দৰ্শন-প্ৰাৰ্থীসকলক ইহঁতে এনেদৰে লাগি চায় যেন গোটেই জাকে অতিথিক আদৰ্শণিহে জনাইছে। ইহঁতৰ কাষ চাপিবলৈ গলে হৰিণ জাক তাকেই আঁতৰি যায়। কেতিয়াবা যদি হাতীৰ পিঠিত উঠি দৰ্শন প্ৰাৰ্থীয়ে হৰিণ জাকক অনুসৰণ কৰাৰ উৰান পায়

তেতিয়া গোটেই জাতিয়েই ওচৰতে থকা ওখ ওখ ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ সাজত আত্মগোপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতে পানীত বুৰ গৈ থকা দ পথাৰতো চৰি ফলে। এই বিশেষ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ কাৰণেই এইবিধ হৰিণক মানহে দল হৰিণ বুলি কয়। দল পাতি পাতি বাস কৰা প্ৰকৃতি থকাৰ বাবেও হয়টো এইবিধ প্ৰাণী, দল হৰিণ বুলি কোৱা হয়। হিন্দী ভাষাত দল হৰিণক বাব-শিঙা' বোলা হয়।

দল হৰিণৰ ব গ মুগ চানেকীয়া হয়। শৰপহৰ দৰে ইয়াৰ ডিঙি ভাগতো একোছা দীঘল চুলি বা নোম থাকে। গৰমৰ দিনত গাঁৱ নোমবোৰ শেঁতা পৰে। তেতিয়া জন্তুবিশেষৰ গাঁৱ নোমত সামান্য ভাৱে ফুটকা-ফুটকা দাগৰ উৎপত্তি হয়



দল-হৰিণ

নতুনকৈ জগা পোৱালিৰ গাঁতো তেনে ধৰণৰ ফুটকা-ফুটকা দাগৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পোৱালিবোৰ ক্ৰমে ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে এই দাগবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অৱশেষত সম্পূৰ্ণভাৱে অদৃশ্য

হয়। মতা হৰিণৰ ভাল বেলা শিং থাকে। মাইকী হৰিণৰ ক্ষেত্ৰত এনে ধৰণৰ শিঙৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা নাযায়। মতা হৰিণে এই শিং বোৰা সবৰসীয়া বা বিভিন্ন বয়সৰ প্ৰতিবেশী হৰিণৰ সৈতে যুঁজ-বাগৰ কৰোঁতে আৰু শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীৰ আক্ৰমণক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰে। আনহাতে হাৰিৰ মাজত কুবোতে দল হৰিণক প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ শিংবোৰাই যথেষ্ট আকৰ্ষণত পেলায়। ডাঠ হাৰিৰ মাজেৰে দৌৰি যাওঁতে গছৰ ডালেপাতে শিঙৰ ঠাল-ঠেঙুলিবোৰ লাগি ধৰিলে ই হাৰি ফালি আঁঠু বাঢ়িৰ নোৱাৰা হৈ পৰে। বাঘ, বাং কুকুৰ আদি শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীয়ে এট নুৰোগতে জন্তুটোৰ ওপৰত অপিয়াই পৰি তাৰ প্ৰাণবায়ু বাহিৰ কৰি দিয়ে।

আটাইবিলাক দলহৰিণৰ শিঙৰ গঠন-ভঙ্গী একে নহ'লেও সিহঁতৰ মাজত অতি সামান্য পাৰ্থক্য হৈ দেখা যায়। দল হৰিণৰ শিঙক দুটা বিশেষ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ শিং মূৰৰ ওপৰত গছাৰ পিছত পাছৰ কালে ছেল-নীয়াটক তাঁজ লৈ আগৰ ফালে ধনুভিৰীয়াক আগ বাঢ়ি পুনৰ ওপৰমুখা হয় মাজ ভাগতে মূল শিং ডাল কেইবা ভাগতো ভাগ হৈ শাখা প্ৰশাখাৰ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিধ শিঙৰ বিশেষত্ব এয়ে যে ইয়াৰ মূল ঠাৰি দুডালে মূৰৰ সমতলৰ পৰা সম-কৌণিক ভাৱে থিয় হৈ লাহেকৈ ধনুভিৰীয়া হৈ বহুতলি ন ঠাই আঙুৰি থাকে। প্ৰথম প্ৰকাৰৰ শিং বোৰাতকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ শিংবোৰ দেখনিয়াৰ। সেই কাৰণে বৈঠক গানাত, ঘনৰ বেৰ, খুটা আদিত স্থলৰ ভাৱে সজাই ধৰা বাবে এই বিধ শিং মানুহে পছন্দ কৰে।

শৰ পছৰ দৰে দলহৰিণেও সমাজ পাতি বাস কৰিবলৈ ভাল পায়। মতা মাইকী আৰু বিভিন্ন বয়সৰ পোৱালিবোৰক লৈ একো একোটা জুম বা জাকৰ সৃষ্টি হয়। এটা বৃহৎ আকাৰৰ মতা হৰিণে বহুতো সংখ্যক মাইকী হৰিণক লৈ একো একোখন সংসাৰ পাতি নি মেলে। সাধাৰণতে আটাইবিলাক হৰিণে মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰে যদিও সজমৰ সময় আহি পালে বতাবোৰৰ মাজত কান্দিয়া পেচালৰ সৃষ্টি হয়। বিজয়ী হৰিণে হৰিণীহঁতৰ সঙ্গ সুখ ভোগ কৰে আৰু পৰাজয় বৰণ কৰিব লগীয়া হোৱা হৰিণে স্থান ত্যাগ কৰি নিসঙ্গ জীৱন অতিবাহিত কৰে। এইবিধ হৰিণক নিশাচৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব নোৱাৰি। অৱশ্যে বাতিও ইহঁতক চৰি কুৰা দেখা যায়। বাতিপুৱা আৰু আবেলিৰ শীতল পৰিবেশত ইহঁতে চৰি কুৰে আৰু দিন-মুপৰত গছৰ ছাঁত জিৰণি লয়। ইহঁতৰ শ্ৰাণশক্তি প্ৰবল। দৃষ্টি আৰু শ্ৰৱণৰ ক্ষেত্ৰত কমলীয়া। বহুবেকত জাহকালি মাইকী হৰিণে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি দিয়ে।



কুটুকী হৰিণ

শ্ৰেণী---সন্ধ্যাপাঠী

বৰ্গ---আৰুটিওডে ষ্টীলা

উপ-বৰ্গ---ৰোমিনেণ্টিয়া

কুল---চাৰ্ভিডি


প্ৰজাতি---এক্সিচ্ এক্সিচ্

আমাৰ দেশৰ হৰিণ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত কুটুকী হৰিণেই আটাইতকৈ
গুৰু। হিন্দী ভাষাত এইবিধ হৰিণক চিতল আৰু ইংৰাজী ভাষাত 'স্পটেড দিয়ৰ'
নামেৰে জনা যায়। গোটেই গাতে কুটুকা-কুটুকী দাগ থকাৰ বাবে অসমীয়া ভাষাত
ইয়াক কুটুকী হৰিণ বোলা হয়। অসমৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইতো এইবিধ
হৰিণ বাস কৰা দেখা যায়। তাৰ ভিতৰত পশ্চিম বঙ্গ, বিহাৰ, উৰিষ্যা, উত্তৰ প্ৰদেশ,
মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, কৰ্ণাটক, কেৰেলা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিল নাডু আৰু গুজৰাটৰ নাম
এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিব পাৰি। মুঠতে ক'ব পাৰি যে উত্তৰে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ
নামনি ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণলৈকে আৰু পূবে অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিমৰ
কালে গুজৰাটলৈকে এইবিধ বিচিত্ৰ পহুৰ বসতিস্থান বিয়পি আছে। অসমৰ চাৰি
সীমাৰ ভিতৰত কুটুকী হৰিণক দেখা যায় যদিও ইয়াৰ বিচৰণ ভূমি নামনি অসমতে
সীমাবদ্ধ বুলি ক'ব লাগিব। উজনি আৰু মধ্য অসমত কুটুকী হৰিণ দেখিবলৈ পোৱা
নযায়। কাছাৰ জিলা আৰু পাৰ্বত্য অঞ্চললৈ ইয়াৰ বসতি সম্প্ৰসাৰিত হোৱা নাই।
গোৱালপাৰা জিলাৰ চিৰাং আৰু মানাহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এইবিধ হৰিণক নিক্ৰান্ত
ভাৱে থকা দেখা যায়। সংখ্যা হিচাপে অসমত কুটুকী হৰিণৰ উৎপত্তি তেনেই
সামান্য বুলি ক'ব লাগিব। ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ ধাৰা অনুযায়ী এইবিধ
হৰিণক নিষিদ্ধ জন্তু বুলি গণ্য কৰা হৈছে।

বৰ্গ। কুটুকা-কুটুকী আৰু গোণবৰণীয়া মূগা বৰণৰ এইবিধ হৰিণক অপকণ
লৌলৰ্ধৰ প্ৰতীক বেন লাগে। শৰীৰৰ পাৰ্শ্বভাগত শাৰী শাৰীকৈ থকা কুটুকা-কুটুকী
দাগবোৰৰ সাজে সাজে আঁত হেৰাই যায়। কুটুকী হৰিণৰ শিং যোৰ গুৰিতে দুটা
ভাগত বিভক্ত হয়। মূল শিঙৰ ওপৰি পৰা এডাল শাখা শিং আগৰ কালে ওলাই আহে।

এই শাখা শিং দুডাল গন্মুখৰ কালে বাঢ়ি গৈ ওপৰমুৱা হয়। ধনুভীৰীয়াতকৈ ওপৰ মূৰা হোৱা শিং দুডাল ঘাই শিঙৰ মাজভাগ মানতে শেষ হয়গৈ। ঘাই শিং বোৰা কেটীয়াতকৈ অলপ পাছৰ কালে বাঢ়ি মেলাহিভাৱে ওপৰমূৰা হয়। এই মূল শিঙৰ আগ ভাগত চুটি আকাৰৰ শাখা শিং একোডালৰ উৎপত্তি হয়। হৰিণীৰ শিং নাথাকে।

ফুটুকী হৰিণে সাধাৰণতে ছাঁয়াযুক্ত হাবিৰ মাজত থাকিবলৈ ভাল পায়। বেছি ঘাঁহনি থকা ঠাইতে এই হৰিণৰ কসতি ঘন। হাবিৰ মাজত থাকি ভাল পোৱা প্ৰাণী হলেও মাজে সময়ে জাক পাতি পাতি ইহঁতে মুকলি বুৰীয়া ঘাঁহনি পৰ্য্যাবলিকলৈ



ফুটুকী হৰিণ (মতা)

ওলাই আহে। দুপৰীয়া সময়ত ইহঁতে গছৰ তলত শুই থাকে। আবেলি আৰু বাতিপুৱা ভাগত চৰিবৰ বাবে মুকলি ঠাইটো জাক পাতি ওলাই আহে। কোক্‌ৰাঝাৰ জিলাৰ চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত থকা বানবাৰী নামৰ আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে থকা মুকলি ঠাইডোখৰত ফুটুকী হৰিণ জাকে জাকে চৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। জোনাক নিশা ইহঁতৰ একোটা ডাক চৰি ফুৰা দেখা গৈছিল। আজি কালি সেই বিলাক ঠাইত ফুটুকী হৰিণ দেখিবলৈ নোহোৱা হ'ল। নামনি অসমৰ বনভূমি বোৰতো ফুটুকী হৰিণৰ সংখ্যা আশাতীতভাৱে হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে।

ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইত এইবিধ প্ৰাণীক এতিয়াও জাক পাতি ফুৰা অৱস্থাত

ডালভৰ বসৰীয়া জৰ

১. যাৱ। একো একোটা জাকত পোন্ধৰ বিশ্ৰুটা লৈকে হৰিণ থকা দেখা যায়। জাকত থকা সবছ সংখ্যকেই নাইকী হৰিণ। ডালপাত বেলে শিং দেৱে দেখিয়েই পোৱালি আৰু নাইকী নখাৰ মাজত মতা হৰিণক সহজে চিনি উলিয়াব লাগিব। একো একোটা জাকত থকা মতা আৰু নাইকী কুটুকী হৰিণৰ সংখ্যাৰ অনুপাতৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে শৰ পছৰ দৰে এইবিধ হৰিণৰ মতাবোৰৰ মাজতো যুঁজ-বৰ্গ হয়। যুঁজত জয়লাভ কৰা হৰিণেই নাইকী নখাৰ ওপৰত একাধিপত্য বিস্তাৰ কৰে আৰু পৰাজয় বৰণ কৰা হৰিণে সেই ঠাই ত্যাগ কৰি অলপ আঁতৰত অকলশৰীয়াতকৈ জীৱন কটাব লগীয়া হয়। মানুহে বসতি কৰা গাওঁতুঁইবিলাকৰ আশে-পাশে থকা অৰণ্যভূমিত এইবিধ হৰিণক প্ৰায়েই দেখা যায়। বাঘ, আদি শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ এইবিধ হৰিণে এনে ব্যৱস্থা লয় বুলি অনুমান হয়। অৱশ্যে বছৰত সময়ত ইহঁতৰ কিছুমানে নিষ্ঠুৰ মানুহৰ হাততো প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগীয়া হয়। অন্যান্য জাতীয় হৰিণ আৰু বালৰ আদি প্ৰাণীৰ সহযোগত বাস কৰিও এইবিধ প্ৰাণীকে শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কাৰণ শত্ৰু জাতীয় কোনো প্ৰাণীৰ ওচৰলৈ আহাৰ উমান পালে এই জন্তুবিলাকে সত্বেট সূচক শব্দ কৰি হৰিণবোৰক পলাই সাৰিবলৈ সঁচক কৰি দিয়ে।

বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত কুটুকী হৰিণে শিং সলায়। পূৰ্ণ শিং বোৰা মাটিত সৰি পৰে আৰু তাৰ ঠাইত নতুন শিং গজি উঠে। নতুনকৈ ওলোৱা শিঙৰ আগ ভাগ পাতলীয়া নোমৰ আৱৰণেৰে ঢাক খাই থাকে। এই হৰিণবিলাকে সেই সময়ত অতি সাৱধানভাৱে থাকিব লগীয়া হয়। কাৰণ অন্যান্য হৰিণৰ লগত যুঁজ বৰ্গত প্ৰবৃত্ত হ'বলগীয়া হ'লে এই কোমল আৱৰণত যা লাগি দুৰাৱস্থা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কুটুকী হৰিণে এবালত দুটা বা তিনিটা পোৱালি জগায়।



ধনু শিঙীয়া হৰিণ বা চাঙ্গাই

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---আৰ্চিওডেণ্ডিলা

উপবৰ্গ---ৰোমিনেণ্টিয়া

কুল---চাৰ্ভিডি

প্ৰজাতি---চানভাচ্ এল্ডি এল্ডি

ভাৰতবৰ্ষৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত মণিপুৰ ৰাজ্যত 'ব্ৰাও এণ্টলৰ্ড দিয়েৰ' বা চাঙ্গাই নামেৰে জনাজাত এবিধ বিচিত্ৰ হৰিণ বাস কৰে। 'চাঙ্গাই' শব্দটো মণিপুৰী ভাষাৰ পৰা আহিছে। এই শ্ৰেণীৰ হৰিণকে আন এটা উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীক বুজাবলৈ ব্ৰহ্মদেশৰ মানুহে 'থামিন' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে। অসম আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্য কোনো এখন ৰাজ্যতো এইবিধ আপুৰুগীয়া হৰিণক স্বাভাৱিক অৱস্থাত দেখা নাযায়। সমগ্ৰ ভাৰতৰ অন্য কোনো ঠাইতে এই হৰিণৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন হোৱা নাই। সেই বাবে মণিপুৰ ৰাজ্যত চাঙ্গাই হৰিণে এক অস্থিতীয় অভিলেখৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। অসমীয়া ভাষাত এইবিধ হৰিণক ধনু-শিঙীয়া হৰিণ বোলা হয়। অৱশ্যে চাঙ্গাই নামেৰে এই হৰিণ জনাজাত। ধনুশিঙীয়া হৰিণৰ তিনিটা উপপ্ৰজাতি থকাৰ কথা জনা যায়। মণিপুৰৰ বনাঞ্চলত থকা সেই উপ-প্ৰজাতিক বিজ্ঞান সন্মতভাৱে "চানভাচ্ এল্ডি এল্ডি" বুলি কোৱা হয়। ব্ৰহ্মদেশত বাস কৰা উপ-প্ৰজাতিৰ চাঙ্গাইক "চানভাচ্ এল্ডি থামিন" আৰু থাইলেণ্ডৰ ফালে সচৰাচৰ বাস কৰা ধনু-শিঙীয়া হৰিণ বা চাঙ্গাই হৰিণক 'চানভাচ্ এল্ডি চিয়ামেঞ্চি' বোলা হয়। বৰ্তমান অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই তিনিওটা উপ-প্ৰজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা প্ৰাণীবোৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই আহিছে। ফলত ইহঁত দুৰ্লভ জন্তু হৈ পৰিছে।

বিখ্যাত লগুটাক হ্ৰদ মণিপুৰতে অৱস্থিত। এই সৰোবৰলৈ মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলৰ পৰা যাব পাৰি। চাৰিওফালে কৰ্দ্দৈ-সীৰিয়া পাহাৰে পৰিবেষ্টিত এই সৰোবৰৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোৰম। এই সৰোবৰৰ এটা অংশত ধনুশিঙীয়া হৰিণ যুগযুগান্তৰৰ যাত প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰি নিৰলে বাস কৰি আহিছে। এই ঠাইৰ স্বাভাৱিক পৰিবেশে ধনুশিঙীয়া হৰিণৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে।

ল টাক সৰোবৰৰ অন্তৰ্গত এডোখৰ অলপ আহল-বহল ঠাইত ধনুশিঙীয়া হৰিণৰ-কেইটামান পাল চৰি কুৰা দেৰিবলৈ পোৱা যায়। এই ডোখৰ বন্য প্ৰাণী প্ৰধান ঠাইক কেইবোল্ লামঝাও' নামেৰে জনা যায়। চাক্কাই জাতীয় হৰিণবোৰক নিৰাপদে প্ৰতিপাল কৰি বাৰি ইয়াৰ জন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে এই ডোখৰ পৰিত্ৰ ভূমিক 'কেইবোল্ লামঝাও' ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। এই তলৰ উদ্যানখনক ওপঙি



ধনুশিঙীয়া হৰিণ

থকা উদ্যান বুলি কোৱা হয়। আগতেই উল্লেখ কৰা অহা হেতে যে কেইবোল্ লামঝাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কপুটীক সৰোবৰৰ একাংশত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। সানোবৰৰ অৱশিষ্ট অংশৰ দৰে উদ্যানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা ঠাইবোৰো বছৰে বছৰে ভাগ সময় পানীৰ তলতে ডুৰ গৈ থাকে। উদ্যানৰ নাত ভাগত দুই এটা ওপ চানেকীয়া

টিলা আছে। বাৰিষা কালত এই টিলা কেইটা পানীৰ ওপৰত জাহি থকা যেন দেখি। ইয়াৰ ভিতৰৰে এটা ডাঙৰ ওখ টিলাত মণিপুৰৰ বনবিভাগে এটা বৰ্ণনোপযোগী নিৰীক্ষণ স্তম্ভ নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে। এই নিৰীক্ষণ স্তম্ভৰ সোঁ মাজত থিয় হৈ চাবিও কালে লক্ষ্য কৰিলে ওপঙা উদ্যানৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰি। এই মনোমোহা টিলাটোৱে নারেবেহে যাব পাৰি। হৰাটো ওখ ওখ বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদে বেটু মৰাটক চাকি বন্ধাৰ বাবে নিৰীক্ষণ নাও চলাই ৰাখি নোৱাৰি। সেইবাবে টিলাটোত থকা নিৰীক্ষণ স্তম্ভলৈ বোৱাত পথটোক সুবিধা দিবৰ বাবে ওপতি থকা বাঁহবোৰ উঠাই ৰাখি এটা পানী পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।

খৰালি কালত যেতিয়া হৰদৰ পানী শুকাবলৈ ধৰে তেতিয়া ৰাখ ঠাইবোৰ একেবাবে শুকাই যায়। চাক্কাই হৰিণৰ পালবোৰে তেতিয়া গছৰ তলত আশ্ৰয় লৈ সময় কটায়। বাঁহনিত শুই থকা অৱস্থাত নিলক্ষ্য পৰা গিহঁতক চিনি পোৱা টান। বাৰিষা কালত ওখ বাঁহবনবোৰ শিপাৰে সৈতে পানীৰ ওপৰলৈ উঠি আহি উপতি থকা উদ্যানত পৰিণত হয়। শিপাৰ কোছাবোৰত শেনুটৈ, মেটেকা আদিৰ ডাঠ চামনি পৰি গোটেই গোপা একেলগে কলগছৰ ডুৰৰ মৰ্দ্দ উপতি পৰে। শিপাৰ চামনিবোৰ ইমান ডাঠ হয় যে তাৰ উপৰি ভাগত চাক্কাই বিনাকৈ হেলানতে বিচৰণ কৰি ফুৰিব পাৰে। উপতি থকা চামনিখন বতাহত লৰচৰ কৰিবলৈ ধৰিলে অলপ দূৰৈৰ হৰিণবোৰক আলাসতে নাচি থকা যেন লাগে। সেই বাবে ব্ৰাণ্ড এন্টলার্ড দিয়েৰ বা চাক্কাই নামৰ হৰিণবোৰক নাচনী হৰিণ বুলিও কোৱা হয়। ৰাইৰ শিপাৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ওপঙা আৱৰণ খনক মণিপুৰী ভাষাত কুম্ভি বুলি কোৱা হয়।

মণিপুৰ ৰাজ্যৰ স্বাভাৱিক পৰিবেশত থকা চাক্কাই হৰিণৰ পৰিস্থিতি সন্তোষজনক বুলি ক'ব নোৱাৰি। কেইবোলা নামৰাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাস কৰা চাক্কাই হৰিণৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা এশতকৈ বেছি হয় নে নহয় সন্দেহজনক। পানীত উপতি থকা উদ্যানখনত বাস কৰাৰ বাবে খোজ কাঢ়ি বা নাৱৰ ওপৰত উঠি চাক্কাইৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। মণিপুৰ চৰকাৰৰ বৰ্ণিতাগে সেই কাৰণে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত কেইবোলা নামৰাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত থকা চাক্কাইৰ পিয়লকাৰ্য্য সম্পাদন কৰাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে হাতত লৈছে। উদ্যানৰ চাৰিওফালে ধান খেতিৰ উপযোগী দ মাট খলাত স্থানীয় লোকে উদ্যানৰ ভিতৰত থকা মাটিতো বেদৰ্শন আঁত্ৰ কৰিছে। তদুপৰি খাদ্যৰ উপযোগী নোভনীয়া প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে এইবিধ প্ৰাণীক মনে মনে বধ কৰা দেখা যায়। অনুশাসন আৰু পৰিচালনা ব্যৱস্থা নিয়াবিতক প্ৰৱৰ্তন কৰি সংৰক্ষণ কাৰ্য্যকটীয়া কৰিব নোৱাৰিলে এইবিধ আপুৰুগীয়া প্ৰাণীয়ে অচিনে পৃথিৱীৰ পৰা ত্ৰোমনি মাগিব মাগিব।

ব্ৰহ্মদেশত এতিয়ালৈকে ৰাতি থকা খামিন নামৰ ব্ৰাণ্ড এন্টলার্ড দিয়েৰ বা ধনু-শিঙীয়া হৰিণৰ ভবিষ্যত উজ্জ্বল বুলি ক'ব নোৱাৰি। সেই দেশৰ চৰকাৰে চাক্কাইৰ সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে স্পষ্ট ভাবে জনা নাযায়।

তৃতীয় উপপ্ৰজাতিৰ প্ৰাণীবিলাকৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ বিভিন্ন দেশ বুলি জানিব পৰা গৈছে। থাইলেণ্ড, লাওচ আৰু কাছোভিয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত এই বিধ প্ৰাণীয়ে পূৰ্বতে বাস কৰিছিল বুলি জনা যায়। সেই কেইখন দেশত থকা পৰ্ণ-নিপাতিহাৰি বননিয়ে এইবিধ প্ৰাণীৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ক্ৰমান্বয়ে হাৰি বননিবোৰ কাটি-ছিঙি এইবিলাক ঠাইত মানুহে খেতি পথাৰ কৰিবলৈ লোৱাত ইহঁতৰ সচৰাচৰ বসতি স্থানৰ সংকোচন ঘটিবলৈ গৈছে। অৱশেষত সৰহ ভাগ ঠাইৰ পৰা এইবিধ প্ৰাণী সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হ'ব লগীয়া হ'ল। বহুতো হৰিণে চিকাৰীৰ হাতত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগীয়া হ'ল।

এই দেশবিলাকত পূৰ্বতে বাস কৰা উপ-প্ৰজাতিৰ ধনু-শিঙীয়া হৰিণৰ বংশবৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে ইতিপূৰ্বে থাইলেণ্ড চৰকাৰে কাম হাতত লৈছিল বুলি জনা যায়। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দত থাইলেণ্ডৰ ৰাজকীয় বনবিভাগে এই জাতৰ এজনী মাইকী হৰিণ সংগ্ৰহ কৰি ঘৰচীয়াটক প্ৰতিপালন কৰিছিল। যথত জগোৱা পোৱালিৰে বংশ বৃদ্ধি কৰাৰ আশাপ্ৰদ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰি জন্তুবিষয়ৰ ভবিষ্যত উজ্জ্বল কৰিবলৈ এওঁলোকে যত্ন কৰিছিল। যথত তুলি-তালি ডাঙৰ কৰা হৰিণবোৰ পুনৰ স্বাভাৱিক পৰিবেশনত মেলি দিয়া-টোৱেই এইখন আঁচনিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল। এই আঁচনি সফল কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে মতা পহৰো যোগাৰ কৰিছে। ইয়াৰ ফল স্বৰূপে উৎপাদন হোৱা পোৱালি কেইটা বেছি দিন বাচি নথকাত গোটেই পৰিকল্পনাটোৱেই ওলটু পালটু হৈ পৰিল। অৱশেষত থাইলেণ্ডৰ বনবিভাগে এই আঁচনি বাদ দিবলৈ বাধ্য হ'ল।

পেৰিচৰ চিৰিয়াখানাত এনে ধৰণৰ এটা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। ১৯৭৮ চনত এই চিৰিয়াখানাত শ্যাম দেশীয় থামিনৰ মাত্ৰ এটা পোৱালি জগিছিল। কিছু দিনৰ পাছত এই পোৱালিটোৰ মৃত্যু হোৱাত সেই চেষ্টাও বিফল হ'ল। থাইলেণ্ডৰ বন্যপ্ৰাণী বিভাগে ৱাচিংটন চিৰিয়াখানাত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা এহাল হৰিণ হৰিণী খাও থিয়াও অভয়াৰণ্যত বংশ বৃদ্ধিৰ বাবে মেলি দিছিলহি। সিহঁতৰ পোৱালি হৈছিল যদিও কালক্ৰমত সেই পোৱালি কেইটাৰো মৃত্যু হয়। খাও থিয়াও অভয়াৰণ্যত প্ৰাকৃতিক শিক্ষা কেন্দ্ৰ নামৰ যিটো অনুষ্ঠান খোলা হৈছে সেই অনুষ্ঠানৰ ভাৱপ্ৰাপ্ত বিষয়া মি: ফাইৰত চাইলাৰ্টপদ্ধাৰ ব্যক্তিগত তথ্যৰদানত ১৯৮১ চনৰ ১২ অক্টোবৰ তাৰিখে এজনী হৰিণে এটা পোৱালি জগায়। তেওঁ অনুধাৱন কৰা উচ্চাভিলাসী আঁচনিয়ে এতিয়াও পূৰ্ণ বিকাশ লাভ কৰিব পৰা নাই। সি যিয়েই কি নহওক ইতিমধ্যে থাইলেণ্ডৰ ৰাজকীয় চৰকাৰে এইজন অনুৰাগী ব্যক্তিক পুৰস্কৃত কৰি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে।

মণিপুৰ-বাসী চাক্কাই জাতীয় উপ-প্ৰজাতিৰ পছৰে অৱশ্যে ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা ধৰণৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হোৱা নাই। কেইবোলা লাম্ৰাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়াও কিছু সংখ্যক চাক্কাই আছে। তদুপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চিৰিয়াখানাত এইবিধ হৰিণক আখ-বেখে প্ৰতিপালন কৰি বংশবৃদ্ধিৰ আঁচনি সফলকাম।

কৰিব পাৰিছে। গতিকে মণিপুৰ নিবাসী ধনুশিঙীয়া হৰিণৰ ভবিষ্যত এতিয়াও অন্ধ-
কাৰ হোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে স্বাভাৱিক পৰিৱেশত ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ
অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাটো অতি আৱশ্যকীয় বিষয় হৈ পৰিছে।

ধনুশিঙীয়া হৰিণৰ গাৰ নোমবোৰ ঋহট। আৰু ঠাণ্ডা হোৱা দেখা যায়। এই
নোমবোৰ ৰঙচীয়াতকৈ পীত বৰ্ণ হয়। ধনু ভিৰীয়া শিং যোৰাৰে সৈতে জুড়টো দেখাত
সুন্দৰন। মাইকী হৰিণৰ শিং নাথাকে। মতা পহৰ শিং যোৰাৰ গঠন প্ৰাণালীত
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটি ওলায়। মূল শিং দুডাল গুৰি ভাগতে মেন্‌লাহি ৰাই ধনু-ভিৰীয়াতকৈ
ওপৰৰ ফালে চক্ৰাকৰে বাঢ়ি যায়। বছৰৰ বেই কোনো সময়তে এইবিধ হৰিণে
পোৱালি জগায়।



খটীয়া হৰিণ

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—আৰ্ টিওডেট্টেলা

উপবৰ্গ—ৰোমিনেণ্টিয়া

কূল—চাৰ্ ভিডি

প্ৰজাতি—এক্সিচ্ পচিনচ্

এচিয়া মহাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা হৰিণ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত খটীয়া হৰিণ বা হৰ্ণ-দিয়ৰ নামৰ হৰিণ অন্যতম । আকাৰত এইবিধ প্ৰাণী শৰপহু, দলহৰিণ, হাঙ্গুল আদিতকৈ সৰু আৰু স্নগৰী পহতকৈ ডালেখিনি ডাঙৰ হয় । এইবিধ হৰিণৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল, শৰপহু, দলহৰিণ আদিৰ দৰে ইহঁতে হাবি-বননিত জুম পাতি বাস নকৰে । অনুকূল পৰিবেশত দলে দলে বাস কৰা অন্যান্য হৰিণ থকা কাষৰীয়া ঠাইবোৰত এইবিধ হৰিণৰ গোটাচেৰেকক স্বাধীন মনেৰে চৰি ফুৰা দেখা যায় । অন্যান্য হৰিণৰ সাহচৰ্যত প্ৰতিবেশী হিচাপে থকা শ্ৰেণীৰ প্ৰাণী হ'লেও বহুত সময়ত ইয়াক অকলশৰীয়াকৈ চৰি ফুৰা দেখা যায় । জুম পাতি বাস নকৰিলেও ইহঁতক উদাসীন জীৱন যাপন কৰা প্ৰাণী বুলি ক'ব নোৱাৰি । কেতিয়াবা নিচেই ওচৰা-ওচৰিকৈ আৰু কেতিয়াবা অলপ আঁতৰি ইহঁতে আপোন মনেৰে ঘাঁহ আদি খাই ফুৰে । অন্য জাতীয় হৰিণৰ জুমৰ মাজত বিপদ সঙ্কেত দিয়াৰ উমান পালে ওচৰত চৰি থকা খটীয়া-হৰিণ কেইটাও সটম হৈ পলায়ন মুখি পালক লগতে ছিটিকি পলাই আত্মৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

পশ্চিমফালে থকা পঞ্জাব, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অসম আৰু অন্যান্য ৰাজ্যলৈ ইয়াৰ বসতিস্থান বিয়পি আছে । ভাৰতৰ বাহিৰে শ্ৰীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ব্ৰহ্মদেশ, পাকিস্তান আদিতো ইয়াক কম-বেছি পৰিমাণে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় । অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ ব্যাঘ্ৰে যোজনাৰ অন্তৰ্গত থকা বিলুপ্ত এলেকা ওলাং অভয়াৰণ্য আদিত এইবিধ হৰিণক বিক্ষিপ্ত ভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰা দেখা যায় । সাধাৰণতে ওখ-চাপৰ ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদেৰে পৰিপূৰ্ণ মুকলি-মুৰীয়, ঠাই, সেৰেঙা হাবি আৰু নদীনালা আদিৰ পাৰত থকা আওহতীয়া ঠাইবোৰত খটীয়া-হৰিণে বসবাস কৰে । পশ্চিম বঙ্গৰ উত্তৰ অঞ্চলত থকা জলুদাপাৰা অভয়াৰণ্য, গৰুম্বা জলপাই-

গুৰি অভয়াৰণ্য, মহানদী অভয়াৰণ্য আদিত এইবিধ হৰিণক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৰাবট নেচনেল পাৰ্ক, দুধৰা নেচনেল পাৰ্ক আদিকে কেন্দ্ৰ কৰি অন্যান্য বহুতো ঠাইলৈকে এইবিধ হৰিণৰ বসতি স্থান বিয়পি আছে। পাকিস্তানত থকা সিন্ধুনদীৰ অৱবাহিকা অঞ্চলত যিবোৰ মুৰলি হাৰি আছে সেইবোৰতো এইবিধ হৰিণৰ বসতিস্থান বিয়পি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ পূবৰ ফালে এই বিধ হৰিণৰ বিচৰণ ভূমি টেনাচিৰি পৰ্যন্ত বিয়পি আছে। দক্ষিণ ভাৰতত এইবিধ হৰিণক দেখা নাযায়। অৱশ্যে শ্ৰীলঙ্কাত ইয়াক বাস কৰা দেখা যায়।



এটা কম-বয়সীয়া খটীয়া হৰিণ

খটীয়া হৰিণৰ গা অলপ দীঘলীয়া আৰু নোদোকা হয়। ঠেং কেইখন তুলনামূলক ভাৱে চুটি হোৱাৰ বাবে জুটোক দেখাত ধোপীয়া যেন লাগে। এই হৰিণৰ গোটেই গাতে নোমৰ বৰণ মুগা-চানেকীয়া হয়। অৱশ্যে বয়স চাৰি দিবলৈ ধৰাৰ লগে লগে হৰিণ আৰু হৰিণীৰ গাৰ নোমবোৰ ক'লা হ'বলৈ ধৰে। নোমৰ আগত বগা আৰু বঙা বঙা জিলিকনি থকা বাবে বদন্ত থকা সময়ত ইয়াৰ গটোত তিব্বতিবিধি উঠা দেখা যায়। কাণ দুখনৰ ভিতৰফাল আৰু চুটি নেজডালৰ আগত

ধকা নোমখিনি বগা বৰণৰ হয়। গৰমৰ দিনত সিহঁতৰ গাত গজা নোমবোৰ শেঁতা পৰিবলৈ ধৰে। জাৰ কালি সেই নোমবোৰ আগবদৰে উজ্জ্বল আৰু মিহি হৈ পৰে। তেতিয়া জন্তুটো মৰম লগা হয়। নতুনকৈ জগা পোৱালিবোৰৰ গাত গজা মুগা বৰণীয়া নোমবোৰৰ মাজত বগা বঙৰ ফুটুকা-ফুটুকী দাগ থাকে। তেতিয়া এই পোৱালি হৰিণটোক এটা ফুটুকী হৰিণৰ পোৱালি যেন লাগে। পোৱালিটো অলপ ডাঙৰ হোৱালৈকে তাৰ গাত এই ফুটুকী দাগবোৰ থাকে। জন্তুটো ডাঙৰ হ'লে এই বগা দাগবোৰৰ চিন-চাব একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰে। অৱশ্যে কেতিয়াবা বয়সীয়া ঋতীয়া হৰিণৰ গাতো পাতলীয়াতকৈ ফুটুকী-ফুটুকী দাগ দেখা যায়। এই দাগবোৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই জাতৰ একোটা হৰিণক চিনাক্ত কৰি উলিওৱাত সহায় কৰে।

ঋতীয়া হৰিণৰ শিংখোৰা অন্যান্য জাতীয় হৰিণৰ শিঙৰ তুলনাত চুটি আৰু সৰু। ষাই শিং ডাল হাড়ৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহে আৰু এই শিঙৰ গুৰি ভাগ পাতল চানেকীয়া কোমল নোমেৰে ঢাক খাই থাকে। মূল শিঙৰ গুৰি ভাগৰ পৰা এডাল এডাল শাখা শিঙৰ উৎপত্তি হয় আৰু এই চুটি আকাৰৰ শাখা শিং দুডাল ওপৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকে। মূল শিং ডাল পাছৰ ফালে ঢাল খাই গৈ আগ ভাগত ওপৰমুৱা হয়। আগ ভাগত এই মূল শিং ডাল দুভাগত বিভক্ত হয়।

ঋতীয়া হৰিণৰ খোজ-কাটল গাহৰি জাতীয় প্ৰাণীবোৰৰ খোজ-কাটলৰ দৰে। সেই বাবে ইংৰাজী ভাষাত এই বিধ হৰিণক হগ-দিয়েৰ বোলা হয়। গাহৰিৰ দৰে খুচ-খুচাই খুচ-খুচাই এইবিধ হৰিণে ঘাঁহ খাই খাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে। কিবা কাৰণত দৌৰ দি যাব লগীয়া হ'লে ই তল-মূৰটোঁক যায়। অন্যান্য হৰিণৰ দৰে ঋতীয়া-হৰিণে দৌৰোতে জপিয়াই নাযায়। আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে ঋতীয়া হৰিণে জুম পাতি বাস নকৰে। গাইগুটীয়া ভাৱে আপোন মনেৰে চৰি ফুৰে। অৱশ্যে একেডোৰৰ ঠাইতে কেইবাটাও হৰিণ চৰি ফুৰে। এইদৰে থাকিয়েই সিহঁতে জাতিগত একতাৰ বান্ধোন প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়।

শিচেই ৰাতিপুৱা বা গধূলি পনত ঋতীয়া হৰিণ চৰিবৰ বাবে ওলায়। দিন দুপৰতে ইহঁতক চৰি ফুৰা দেখা যায়। এপ্ৰিল মে'ই মাহত সাধাৰণতে ঋতীয়া হৰিণে পোৱালি জগায়। গৰ্ভধাৰণৰ কাল প্ৰায় আঠ মাহ বুলি জনা যায়।



সুগৰী পহু

শ্ৰেণী---সুত্ৰপায়ী

বৰ্গ---আৰ্টিওডেক্সিলা

উপবৰ্গ---ৰোমিনেনটিয়া

কুল---চাৰ্ভিডি

প্ৰজাতি- মুন্যিয়াকচ মন্ট জাক

অগমৰ হাবিত থকা হৰিণ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত সুগৰী পহু আকাৰত আটাইতকৈ সৰু। এই বিধ পহু আমাৰ মানুহৰ বৰ চিনাকি। বাৰণ সুগৰী হৰিণক কম-বেছি পৰিমাণে অগমৰ প্ৰায়বিলাক হাবি বননিত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই হৰিণ ৫০ চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা ৮০ চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত ওখ হোৱা দেখা যায়। পিঠিৰ উপৰিভাগ ধনুভিৰীয়া যেন দেখি। মতা সুগৰী পহুৰ শিং চুটি আৰু সৰু। মূল শিং ডাঙ ১২ বা ১৩ চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি দীঘল হোৱা দেখা নাযায়। মাইকী সুগৰী পহুৰ শিং নগৰ্জে। মতা পহুৰ শিঙত মাত্ৰ এডাল শাখা শিঙৰ উৎপত্তি হয়। এই শাখা শিং দুডাল দুয়োডাল মূল শিঙৰ মাজৰ ফালে সুক্ষ্মকৌণিক ভাৱে ডাঁজ লৈ থাকে। মূল শিঙৰ অৱশিষ্ট অংশতকৈ শাখা শিং ডালোমানখিনি চুটি। মূল শিঙৰ গুৰিত অলপ ওপৰলৈকে পথালিকৈ গোঁলাকাৰত নোমাল ছালৰ আৱৰণ থাকে। চকু-কাণৰ ওপৰৰ ফালে শিঙৰ গুৰি ভাগ দীঘলীয়াতকৈ উঠুৱা হৈ থাকে। মূগৰ আগ ফালৰ গঠন প্ৰণালী এনে ধৰণৰ হোৱাৰ বাবে ইংৰাজী ভাষাত এষ্টবিধ হৰিণক বিব্ৰেচেড্ দিৱেৰ বুলিও কোৱা হয়। অন্যান্য পহুৰ শিঙৰ দৰে সুগৰীয়েও বছৰৰ মূদত শিং সলায়। মূৰৰ শিং মাটিত সৰি পৰে আৰু তাৰ ঠাইত নতুন শিং গজে।

সুগৰী পহুৰে সাধাৰণতে অলপ ডাঠ ধৰণৰ হাবিত থাকিবলৈ ভাল পায়। ইহঁতে ৰাতি হাবিত লুকাই থাকে আৰু দিনত মাজে সময়ে মুকলি ঠাইলৈ ওলাই আহি ঘাঁহ বন খাই মুকলি মনেৰে চৰি ফুৰেহি। হাবিৰ মাজত চৰি ফুৰোতে সুগৰী পহুৰে মাজে মাজে দীঘলীয়া উকি মাৰে আৰু এই উকিৰ ধ্বনি অলপ আঁতৰৰ পৰাই শুনিবলৈ পোৱা যায়। উকিৰ ধ্বনিৰ পৰাই এখন হাবিত সুগৰী হৰিণ থকা নথকাৰ কথা

সহাজ জানিব পাৰি। যিবিলাক অৰণ্যত শৰপহ, দল হৰিণ আদি পহ জাকে জাকে চৰি ফুৰে তেনে হাবিত স্তগৰী পহৰেও এই জাকবোৰৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ অলোঙে আলোঙে চৰি ফুৰে। বাঘ আদি হিংসাকুবীয়া প্ৰাণীয়ে যাতে সিহঁতক সহজে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু কেনেবাকৈ আক্ৰমণ বৰিলেও যাতে সিহঁত অকলে বলিৰ পাঠা হ'ব নগীয়া নহয় তাৰ বাবে ইহঁতে এইদৰে অন্যান্য পহৰ জাকৰ কাষে কাষে থাকিবলৈ বিচাৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ বিলবিলাকৰ পাৰত আৰু অন্যান্য মুকলি পথাৰত বহুতো স্তগৰী পহ এইদৰে আন জাতীয় হৰিণৰ সৈতে চৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গঁড় নানীয়া ম'হ আদি তৃণ পল্লৱভোজী জন্তুৰ সহযোগেতে



স্তগৰী পহ

ইহঁতৰ কিছুমানে এইদৰে চৰি ফুৰে। ওখ চাপৰ গছ-গছনি থকা মুকলি হাবিত দুই চাৰিটা স্তগৰী পহক বিক্ষিপ্ত ভাৱে ঋতীয়া হৰিণৰ সৈতে চৰি ফুৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানাহ আৰু ওবাং অভয়াৰণ্যতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ স্তগৰী পহ অকল-শৰীয়াতকৈ নতুবা জাক পাত্ৰ চৰি ফুৰা দেখা যায়।

ৰাজপুতানাৰ মৰুভূমি অঞ্চল আৰু হিমালয় শৈলমালাৰ বৰফে গৰকা ওখ ওখ ঠাইবোৰক বাদ দি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় সকলোখিলাক হাবিতে কম-বেছি পৰিমাণে স্তগৰী পহ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চিত্ৰকলীয়া ঘৰবৰেখাৰ নামনি ভাগত

থকা পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰৰ কোনো কোনো ঠাইতো এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। ভাৰত-বৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ বাহিৰে এই বিধ পহৰ বিচৰণ ভূমি চীন দেশ, জাপান, ফৰ্মুছা আদিতৈল সম্ভাৰিত হৈছে। বাংলাদেশ আৰু পাকিস্থানৰ উপৰি শ্ৰীলঙ্কাতো সুগৰী পহ বাস কৰা দেখা যায়। থকা ঠাইৰ বিভিন্নতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বাস কৰা তিনিটা উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীয়ে ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সন্মৰ্থ হৈছে। বিভিন্ন উপপ্ৰজাতিৰ সুগৰী পহক বিজ্ঞানসন্মত ভাৱে পৰিচয় কৰি দিবৰ বাবে জীৱ-বিদ্ বিজ্ঞানী সকলে বেলেগে বেলেগ উপ-প্ৰজাতিৰ নামেৰে ইহঁতক নামকৰণ কৰিছে। সাধাৰণতে দিন-দুপৰত চৰি ফুৰা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হ'লেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা জোনাক নিশা ইহঁতৰ কিছুমানক চৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেনেবাকৈ ভয় খোৱাৰ আগন্তুক হ'লে এই বিধ হৰিণে উধাতু খাই ছিটিকি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। পলায়ন মুখী সুগৰী পহৰে এক প্ৰকাৰৰ চিঁ চিঁ শব্দ উচ্চাৰণ কৰে। কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ মুকলি ঠাইবোৰত চৰি ফুৰা সুগৰী পহ বিলাকে মানুহলৈ সিমানে ভয় নকৰে। হাতীৰ পিঠিত উঠি উদ্যানত প্ৰবেশ কৰা দৰ্শন-প্ৰাৰ্থী সকলে নিচেই ওচৰৰ পৰাই সুগৰী পহ চাব পাৰে।

এইবিধ হৰিণে বছৰৰ সকলো সময়তে পোৱালি জন্মায়। সাধাৰণতে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জগে। নতুনকৈ জগা পোৱালিৰ গাত বগা বগা বৰণৰ দাগ থাকে। প্ৰায় এবছৰৰ ভিতৰতে এই বগা দাগবোৰ নাইকিয়া হয়।



কাশ্মীৰি হৰিণ বা হাঙ্গুল

শ্ৰেণী----স্তন্যপায়ী

বৰ্গ----আৰ্চিওডেক্সিলা

উপবৰ্গ-- -পেমিগেনিটয়া

কুল----চাবডিডি

প্ৰজাতি - -চানডাছ ইলিফাচ্ হাঙ্গুল

কাশ্মীৰত হাঙ্গুল নামৰ এজাতি হৰিণ বাস কৰে । ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য কোনো ঠাইতে এইবিধ হৰিণ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । হাঙ্গুলক ইউৰোপ মহাদেশত থকা 'বেড্ দিয়ৰ' নামৰ হৰিণৰ ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি বুলি ক'ব পাৰি । ইউৰোপীয় 'বেড্ দিয়ৰ' হৰিণৰ বহুতো উপ-প্ৰজাতি আছে বুলি জনা যায় । এই উপ-প্ৰজাতিবোৰৰ সচাচা বাসস্থান আৰু বিচাৰ ভূমি ইউৰোপ, এচিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । আনহাতে দেখা যায় যে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ কেৱল উত্তৰ অঞ্চলতহে বেড্ দিয়ৰে বসতি বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছে । এচিয়া মহাদেশৰ বেড্ দিয়ৰবিলাকে হিমালয় শৈলমালাৰ দক্ষিণত বসতি কৰিব পৰা নাই । সেই কাৰণে কাশ্মীৰৰ হাঙ্গুলক ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণীৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ বুলি ক'ব লাগিব । উল্লেখযোগ্য যে বেড্ দিয়ৰ শ্ৰেণীৰ হৰিণ পশ্চিম গোলার্ধৰ উত্তৰ অঞ্চলতো আছে । এই সম্পৰ্কত ক'ব পাৰি যে ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী জগতলৈ হাঙ্গুল জাতীয় প্ৰাণীয়ে অমূল্য বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰিছে । কাশ্মীৰৰ হাঙ্গুলে পশ্চিম সীমান্তত আৰু মণিপুৰৰ চান্দাই হৰিণে পূব সীমান্তত প্ৰহৰীৰ দৰে ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণীৰ সন্মাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ।

হাঙ্গুল হৰিণ আকাৰত আমাৰ অসমৰ দলহৰিণৰ সমান । শাখা প্ৰশাখাৰে সৈতে সৈতে সুশোভিত শিঙৰ গঠনত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায় । গাৰ নোমবোৰ বৰণত এদনীয়াতকৈ মুগা হয় । বৰ্ষাকালত নোমবোৰ শেঁতা পৰি অলপ বগা বৰণ ধৰে । শীতকালত সেই নোমবোৰ পুনৰ জিলিকি উঠি ধনীয়া হৈ পৰে । নতুনকৈ জগা পোৱালিৰ নোমত ফুটুকা-ফুটুকী দাগ থাকে । বয়স হোৱাৰ লগে লগে দাগবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা হয় । পূৰ্ণ বয়সীয়া হৰিণৰ গাত ফুটুকা-ফুটুকী দাগৰ চিন নাথাকে । বয়স ভাটি দিলেও হৰিণৰ গাত বগা চিন দেখা যায় । এইবিধ হৰিণৰ শিঙত পাঁচডাল পাঁচডাল শাখা শিঙৰ উৎপত্তি হয় ।



কাশ্মীৰি হৰিণ

হাঙ্গুলে সাধাৰণতে সেনেঙা হাবি বনমিত চৰি ফুৰে । কেতিয়াবা অকলশৰীয়াটক আৰু কেতিয়াবা জাকপাতি ইহঁতক হাবিৰ মাজত চৰি ফুৰা দেখা যায় । ভালেনমান হৰিণ লগ লাগি একোটা পান বা জুমৰ সৃষ্টি হয় । মতা, মাইকী আৰু বিভিন্ন বয়সৰ পোৱালিক একেলগে এটা পানত থকা দেখা যায় । গ্ৰীষ্মকালত হাঙ্গুলে পৰ্বতৰ ওখ ঠাইত অস্থায়ী ভাৱে থাকিবলৈ লয়গৈ । শীতকালত এই ওখ ওখ ঠাইত অতিপাত

ঠাণ্ডা পৰে আৰু বৰফৰ চামনিয়ে সৰহভাগ ঠাই ঢাকি পেলায়। শীতৰ পৰা নিজকে বক্ষা কৰিবৰ বাবে হাঙ্গুলে তলৰ ঠাইলৈ নামি আহে আৰু হাঁহনি পথাৰবিলাকত মুকলি নেনেৰে চৰি ফুৰেহি। অন্যান্য জাতীয় হৰিণৰ দৰেই ইহঁতৰো শিং সৰি পৰে আৰু তাৰ ঠাইত নতুন শিং গজে। শিং সৰি পৰিলে শিঙৰ গুৰিৰ কোমল অংশ ওলাই পৰে আৰু নতুনকৈ গজা শিঙৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰৰ কোমল ডেল্‌ডেটৰ সৃষ্টি হয়। এই অৱস্থাত অন্য হৰিণৰ সৈতে কোনো প্ৰকাৰৰ যুঁজ-বাগৰত লিপ্ত নহ'বলৈ জন্তুটোৱে চেষ্টা কৰে। এনে দুৰ্যোগৰ পৰা নিজকে বক্ষা কৰিবৰ বাবে বাবে বয়সীয়া মতা হাঙ্গুলে কেতিয়াবা বৰফাবৃত ওখ শিখৰলৈ উঠি যায়। হৰিণীহঁতৰ ওপৰত এটা মতাই প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবৰ বাবে পৈনত বয়সৰ মতা হৰিণৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ হয়। শিঙে শিঙে জোঁটাপুটি লাগি সিহঁতৰ ভিতৰত ভীষণ যুঁজ লাগে। যুঁজত জয়লাভ কৰা হৰিণটোৱে হৰিণীহঁতক নিজৰ ফলীয়া কৰি ল'বলৈ সমৰ্থ হয়। পৰাজয় হোৱা হৰিণে আঁতৰি গৈ নিঃসঙ্গ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হয়। শিঙৰ প্ৰচণ্ড আঘাতত দুই এটা হৰিণে কেতিয়াবা প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হয়।

হাঙ্গুল জাতীয় হৰিণৰ বক্ষণাবেক্ষণ কটকটীয়া কৰিবৰ বাবে কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে ডাচিগাম অভয়াৰণ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এই বাবস্থাৰ প্ৰৱৰ্তনে হাঙ্গুলৰ ভবিষ্যত উজ্জল কৰিছে। সাধাৰণতে বহাগ জেঠ মাহত মাইকী হৰিণে পোৱালি জগায়।



নিগনি হৰিণ

শ্ৰেণী----স্তুন্যপায়ী

বৰ্গ----আৰটিওডেক্সিলা

উপবৰ্গ----ৰোমিনেন্টিয়া

ফৈদ----ট্ৰেগোলিনা

কুল----ট্ৰেণ্ডলিডি

প্ৰজাতি----ট্ৰেণ্ডলাছ মেৰিনা

হৰিণ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ ভিতৰত নিগনি হৰিণ বা মাউচ দিয়ৰ আকাৰত সৰা-
তোটকৈ সৰু হয়। এই শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীক 'ছেম্বোটেইন' বুলিহে জনা যায়। এই প্ৰাণীৰ
দাঁত আৰু ঠেঙৰ খুৰাত বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। ঠেঙৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ আঙুলি
কেইটাৰ আগভাগত খুৰাৰ উৎপত্তি হয়। এই খুৰা লাগি থকা হাড়ডাল অসমাপ্ত
ভাৱে জোৰা লাগি থাকে। এই বিশেষ শাৰীৰিক গঠনৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰাণী
ঘাঁহ পাণ্ডুলি খোৱা অন্যান্য প্ৰাণীবিলাকতকৈ লামান্য ভাৱে বেলেগ। তৃতীয় আৰু
পঞ্চম আঙুলি থকা হাড় দুডাল লগ লাগি থাকে। তদুপৰি এইবিলাক প্ৰাণীৰ পাক-
স্থলীত গৰু, ম'হ, ছাগলী আদিৰ দৰে তিনিটা কুঠলি থাকে। তিনিটা কুঠলিৰ তৃতীয়
স্থানত থকা কুঠলিৰ স্বৰূপ এই হৰিণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে বিকাশ হোৱা দেখা নাযায়।
ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰাণীৰ কোনো শিং নগৰ্জে। আগফালে ওপৰ পাৰিত থকা কুকুৰ-দাঁত
বা ছিঙি খোৱা দাঁত দুটাৰ ৰূপ বিশেষ ভাৱে লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। হাতীৰ দাঁতৰ
দৰে ওপৰ পাৰিৰ দুটা আগদাঁত বাহিৰলৈ ওলাই আহি তলৰ ফালে ওলমি থকা
দেখিবলৈ পোৱা যায়।

এচিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশতে ছেম্বোটেইন বা নিগনি হৰিণৰ বাসস্থান আৰু
বিচৰণ ভূমি সীমাবদ্ধ। এই বিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী আকাৰত ইমান সৰু হয় যে সিহঁতক
শহাপহু জাতীয় প্ৰাণীৰ লগতহে তুলনা কৰিব পৰা যায়। নিগনি হৰিণৰ দৰেই
কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী বিভিন্ন ঠাইৰ অৰণ্যত আছে বুলি জনা যায়। এচিয়া আৰু
আফ্ৰিকা মহাদেশৰ গ্ৰীষ্ম মণ্ডলে প্ৰভাৱান্বিত কৰা কিছুমান ঠাইত এইবিলাক প্ৰাণীৰ
বসতিস্থান। দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মদেশ, বৰ্ণিও আৰু ফিলিপাইনত তাৰে দুবিধ
মান প্ৰাণী বাস কৰে। জাভা দ্বীপৰ ফালে বাস কৰা নিগনি হৰিণক "নাপু" নামেৰে
জনা যায়। পূব এচিয়াৰ অৰণ্যত থকা নিগনি হৰিণৰ গাঁৱ নোমৰ বৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে

মুগা বঙচুৱা হয়। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পশ্চিম অঞ্চলত থকা নিগনি হৰিণৰ গাত বগা বৰণৰ চেলাপতীয়া দাগ দেখা যায়। এই বিধ খাদ্যী সাধাৰণতে পানীৰ কাষৰীয়া ঠাইবোৰত বাস কৰা দেখা যায়। এই বিধ নিগনি হৰিণ পানীত সাঁতুৰিব আৰু বুলি মাৰিব পৰা কামত পাটকল হোৱা দেখা যায়।

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাবিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা, যিবিধ নিগনি হৰিণ দেখা যায় সেইবিধৰ ব্যতিহাৰ আৰু বিচলিত ভূমি দক্ষিণ ভাৰতৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলতে



এটা নিগনি হৰিণে সাৱধানৰে শত্ৰুৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিছে।

সীমাৰক্ষ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যক্তি খীলকালৈ বিয়পি আছে বুলি জনা যায়। নেপালতো এই নিগনি হৰিণ আছে বুলি জীৱবিদসকলে অভিমত প্ৰকাশ কৰিব খোজে। এইবিধ নিগনি হৰিণৰ শিং সামান্য ভাৱেহে পৰিলক্ষিত হয়। এই শিঙাৰ আকাৰ ইমান সৰু যে প্ৰকৃত পক্ষে ইহঁতৰ শিং আছে বুলি ক'বলৈ

টান লাগে। ইহঁতৰ ঠেং কেইখন আকাৰত তেনেই সৰু হয়। জন্তুটোৰ পাছৰ অংশ আগ ভাগতকৈ তুলনামূলক ভাৱে ডাঙৰ আৰু মঙহাল হয়। নেজডাল একে-বাৰে চুটি হয়। ইহঁতৰ গাঁৱ নোমৰ বৰণ বঙচুৱাকৈ মুগা হয়। এই বঙচুৱা নোমত দেহৰ দুয়োকাষে পথালি পথালিকৈ অঙ্কন কৰি বখা দীঘলীয়াটক চেলাপতীয়া আঁচ থাকে। নিগনি হৰিণৰ ডিঙিতও তিনিডাল তিনিডালকৈ বগা বৰণৰ দেখাৰ উৎপত্তি হয়। পেটৰ তলৰ ফালে থকা নোম সম্পূৰ্ণ ভাৱে বগা হয়।

এই বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ নোমৰ বৰণ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ লগত ইমান সুন্দৰ ভাৱে মিলি থাকে যে ওচৰতে চেপেটা খাই পৰি থাকিলেও ইয়াক সহজতে বিচাৰি পোৱা টান হৈ পৰে। শত্ৰু প্ৰাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পৰাৰ এইটো এটা অভিনৱ প্ৰাকৃতিক কৌশল বুলি ক'ব পাৰি। ঘাঁহ-বনেৰে ঢাকি বখা পৰ্বতীয়া ঠাইত ইহঁতে সাধাৰণতে আশ্ৰয়লৈ গৈপনে থাকে। ডোকনোকালিতে আৰু গন্ধিয়া ইহঁতে আহাৰৰ বাবে আশ্ৰয় লোৱা ঠাইৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই আহে। দিন দুপৰৰ ব'দৰ জ্বলিঙনিত আৰু ৰাতিৰ আন্ধাৰত আত্মগোপন কৰি থাকে। আহাৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰা সময়ত শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীৰ উমান পালে ইহঁতে বিজুলি বেগেৰে পলাই গৈ গছৰ ধোন্দ বা পাথৰৰ ফাকত লোমাই আত্মৰক্ষা কৰে। এইবিধ নিগনি হৰিণে সাধাৰণতে বছৰত এটাকৈ পোৱালি জগায় বুলি জনা যায়।



কস্তুরী হৰিণ

শ্ৰেণী----স্তন্যপায়ী

বৰ্গ----আৰ্টিওডেট্টিলা


কুল----চাৰ্ভিডি

প্ৰজাতি---মচ্ কচ্ মুচিফেৰচ্

হিমালয় শৈলমালাৰ বুকুত পশ্চিমফালে কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূবে নেপালৰ মাজেদি ভূটান আৰু ছিক্কিম্ পৰ্যন্ত যিবিলাক ওখ ওখ পৰ্বতীয়া ঠাই আছে সেইবোৰ ঠাইৰ বিভিন্ন পৰিবেশত কস্তুরী হৰিণ নামৰ এবিধ বিচিদ্ৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। এইবিধ প্ৰাণীৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাগুণত কেইটামান বিশিষ্ট ৰূপ পৰিলক্ষিত হয়। কস্তুরী হৰিণৰ কোনো প্ৰকাৰ শিং গজা দেখা নাযায়। দ্বিতীয়তে অন্যান্য হৰিণ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে এইবিধ হৰিণৰ মুখ মণ্ডলত কোনো প্ৰকাৰৰ মাংসগ্ৰন্থি বা টেমুনা হোৱা দেখা নাযায়। শিঙৰ পৰিবৰ্তে ইয়াৰ ওপৰ পাৰি দাঁতৰ আলুৰ পৰা দুটা দীঘল দাঁত ওলাই আহি তলৰ ফালে ভাঁজ খাই থাকে। এইবিধ প্ৰাণীৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে মতা কস্তুরী হৰিণৰ নাভিদেশত এটুকুৰা নোমেৰে আৱৰা মাংসগ্ৰন্থি থাকে আৰু এই মাংসগ্ৰন্থিকে আমাৰ মানুহে কস্তুরী বুলি কয়। অন্য ভাষাত ইয়াক গান্ধ-কলাই বোলা হয়। নেজৰ তল ভাগতো এনে ধৰণৰ মাংসগ্ৰন্থিৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা যায়। কেচা অৱস্থাত এই মাংসগ্ৰন্থিৰ পৰা এক প্ৰকাৰৰ অকটা গোন্ধ বাহিৰ হয়। শুকাই কণকণীয়া মাৰিলে ইয়াৰ পৰা গান্ধ-কলাইৰ নিজস্ব গোন্ধ বাহিৰ হয়। এই গান্ধ-কলাই ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি জনা যায়। ভূটানাসকলে অন্যান্য পণ্য সামগ্ৰীৰ লগতে গান্ধ-কলাই ভূটান পাহাৰৰ পৰা ভৈয়ামলৈ আনে আৰু সীমামূৰীয়া ঠাইত থকা বজাৰবিলাকত বিক্ৰী কৰেহি।

কস্তুরী হৰিণৰ ঠেঙৰ খুৰা কেইটা গোটা হোৱাৰ বাবে পাহাৰীয়া ঠাইত জন্তুটোৱে অনায়াসে খোজ কাঢ়ি যাব পাৰে। হিমালয় শৈলমালাৰ বুকুত সাধাৰণতে যিবি প্ৰকাৰৰ বিশেষ জাতৰ গছ-গছনি গজে সেইবিলাক গছৰ ভিতৰত সৰল বা পাইন জাতীয় গছকে প্ৰথম স্থান দিব পাৰি। হিমালয়ৰ পৰ্বতীয়া ভূ-ভাগত কেবা জাতৰো পাইন জাতীয় গছ-গছনিয়ে অভূতপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সমুদ্ৰৰ পৃষ্ঠৰ পৰা তুলনামূলক

উচ্চতা আৰু মাটিৰ লগত মিহলি হৈ থকা বসায়নিক উপকৰণৰ নিয়মীয়া মাত্ৰাৰ বাবে গছ-গছনিবোৰ ডাঠকৈ গুজি উঠিছে। পৰ্বতৰ নামনিত বহল বহল পাতৰ গছ বেছিকৈ হয়। সেই কাৰণে হিমালয়ৰ মাজ ভাগত নানা ধৰণৰ আপুৰুগীয়া গছ-গছনি



কস্তুরী হৰিণ

গুজি উঠিছে। এহেজাৰ মিটাৰ মান ওখ ঠাইবোৰত ডাঙৰ গছ-গছনি হোৱা দেখা নাযায়। তেনেবোৰ ঠাইত সৰু-সুৰা গছ-গছনি আৰু তৃণ জাতীয় উদ্ভিদেই

বেছি হোৱা দেখা যায়। তাৰ ওপৰত থকা পৰ্বতৰ শিখৰ আৰু কৰ্দৈ-সিৰীয়া পৰ্বতবোৰ বহুৰৰ সৰহখিনি সময় বৰফৰ চামনিৰ তলতে ডুব গৈ থাকে।

হিমালয় পৰ্বতৰ এনে মনোমোহা পৰিবেশত বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে আপোন মনেৰে বিচৰণ কৰে।

সবল জাতীয় গছ-গছনিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰা ঠাই অতিক্ৰম কৰি যিবোৰ ঠাই বহল পতীয়া গছ-গছনিৰে ভৰি থাকে তেনেবোৰ ঠাইতেই কস্তুৰী হৰিণ থকা দেখা যায়। ইহঁতক কিন্তু জাক বান্ধি থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সাধাৰণতে ইহঁতে অকলশৰীয়াটক হাৰিৰ মাজৰ অনুকূল পৰিবেশত চৰি ফুৰে। দিন-দুপৰত গছ গছনিৰ তলৰ সুবিধাজনক ঠাইত চেপেটা মাতি পৰি থাকি ইহঁতে সময় কটায়। আবেলি সময়ত লাহেটক ওলাই আহে আৰু নানা এবাৰৰ মিহিমিহি আহাৰ দিচাৰি থাবলৈ ধৰে। ঘাঁহ-বন, শেলুৱৈ, কুঁহিপাত আদি উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যই কস্তুৰী হৰিণে খায়। বাৰিষা কালতে মাইকী কস্তুৰী হৰিণে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জগায়।



এন্টেলোপ্ আৰু গেজেল জাতীয় প্ৰাণী

এন্টেলোপ্ আৰু গেজেলক গৰু, ম'হ, ছাগলী, পহু আদি জন্তুৰ লগত সাধাৰণে নৈ বভিডি কুলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গৰু, ম'হ আদি জন্তুৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণৰ দৰ্শন গেজেল আৰু এন্টেলোপ্ জাতীয় প্ৰাণীৰ সাদৃশ্য থাকিলেও বহুতো ক্ষেত্ৰত এই দুবিধ প্ৰাণীৰ গাত কিছুমান নিজস্ব শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণ প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। ইহঁতৰ গাত বিশেষ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণ বিকাশ হোৱাতেনে লক্ষ্য ৰাখি জীৱবিদ বিজ্ঞানীসকলে ইহঁতৰ বাবে কেইবাটাও উপ-বিভাগ বা উপ-কুলন সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এন্টেলোপ্ আৰু গেজেল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ সবছ ভাগকেই আফ্ৰিকা মহাদেশত পোৱা যায়। সেই মহাদেশত বাস কৰা এই শ্ৰেণীৰ জন্তু বিলাক জাত অনুযায়ী বিভিন্ন ৰূপৰ হয়।

এই শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ বিশেষত্ব হ'ল এয়ে যে ইহঁতৰ শিং যোৰা পহু জাতীয় প্ৰাণীৰ শিঙৰ দৰে ভাল মেলা নহৈ এডলীয়া হয়। তাৰোপৰি এই শিংবিলাক পকোৱা-পকি অথবা ঝাপ-কটা যেন দেখি। কিছুমানৰ শিং কৰ-বেছি পৰিমাণে পোন হয় আৰু আন কিছুমানৰ শিং যোৰাই ধনুভিৰীয়াটক পাছৰ কালে হাউলি থাকে। কিছুমান প্ৰাণীৰ এই শিং সন্মুখৰে তলমুৱা হয় আৰু ধনুভিৰীয়াটক ওপৰমুৱা হয়। দুই এবিধ প্ৰাণীৰ শিং যোৰাই ম'হৰ শিঙৰ দৰে দুয়ো কালে বাঢ়ি গৈ পুনৰ ওপৰ-মুৱা হয়। শিংবোৰ ফোপোনা নহৈ গোটা হয়। কিছুমান প্ৰাণীৰ মতা আৰু মাইকী উভয়েই শিং আছে যদিও সবছভাৱে ক্ষেত্ৰত কেৱল মতাৰেই শিং থকা দেখা যায়।

এন্টেলোপ্ আৰু গেজেল জাতীয় প্ৰাণীবোৰক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতিভূৰ্তি বুলি ক'ব পাৰি। এন্টেলোপক যদি সুলভ বোনা হয় তেন্তেই গেজেল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক অপূৰ্ণ সুলভৰ মূৰ্ত্তপ্ৰতীক বুলিব লাগিব। দুয়োবিধ প্ৰাণীকে বিভিন্ন আকৃতিৰ জন্তুৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এন্টেলোপ্ জাতীয় প্ৰাণীৰ শিংবিলাক সাধাৰণতে দীঘলীয়া আৰু বুৰলীয়া আকৃতিৰ হয়। আতি ভেদে শিঙৰ গঠন প্ৰণালীও যেনেদৰে দেখা যায়। বেছি ভাগৰ ক্ষেত্ৰত এই শিঙৰ গঠন দীঘল-পহীয়াটক পোন বা সামান্যভাৱে ধনুভিৰীয়া হ'লেও আতিভেদে এই শিঙত সপিলৰূতি দেখা যায়। বেছি ভাগ মতা আৰু মাইকী এন্টেলোপৰ শিং থাকিলেও কিছুমানৰ কেৱল মতাৰেই শিং থকা দেখা যায়। তদুপৰি এই শিংবিলাকত পৰাণীটক কটাৰ দৰে সমান্তৰাল আঙঠি

থাকে। গেজেলৰ মতা আৰু মাইকী উভয়ৰে শিং গজা দেখা যায়। গুৰিবৰপৰা আগলৈকে এই শিংবিলাকত আঙঠিৰ নিচিনাকৈ পখালিয়ে পখালিয়ে কটা দাগ থাকে। গেজেলৰ গাঁৱ নোমৰ বৰণ সাধাৰণতে মুগ। চানেকীয়া হয় আৰু তাত অন্য বৰণ থকা দেখা নাযায়। আনহাতে এন্টেলোপৰ গাঁত বিভিন্ন বৰণৰ বং দেখা যায়। এন্টেলোপৰ চকুৰ তল ভাঙুত এক প্ৰকাৰৰ মাংসগ্ৰন্থি হয়। গেজেলৰ এনে মাংসগ্ৰন্থি হোৱা দেখা নাযায়। কিন্তু ইহঁতৰ গাঁৱৰ দুয়ো কাষে বগা বৰণৰ চেলাউৰিৰ দৰে দাগ থাকে।



কুকুৰাৰ বা ব্ৰেক্‌বাক্,

শ্ৰেণী---জলপায়ী

বৰ্গ---আৰ্টিওভেটিভা

উপবৰ্গ---নোমিনেটিভা

কুল---এণ্টিলোপিনি

প্ৰজাতি---এণ্টিলোপ্ জাভিকেকা

কুকুৰাৰ বা ব্ৰেক্‌বাক্ নামৰ বন্যপ্ৰাণী এণ্টিলোপ্ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ ভিতৰত পৰে। এইবিধ প্ৰাণীৰ বাহিৰেও ভাবতৰ্ভৰ্ত আৰু কেবাখিৰো এণ্টিলোপ্ জাতৰ প্ৰাণী ভিন্ ভিন্ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিলাক প্ৰাণীৰ ভিতৰত নীলগাঁই আৰু চাৰিখিটীয়া এণ্টিলোপ বা জাভিকাকাক নামৰ দুবিধ প্ৰাণীয়েই বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। এই আটাই কেইবিধ প্ৰাণীৰ ভিতৰত কুকুৰাৰ নামৰ প্ৰাণীবিধেই দেখাত আটাইতকৈ বুলীয়া। আচলতে এণ্টিলোপ্ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ দেখত প্ৰকাশ পোৱা চাৰিত্ৰিক গুণসমূহ কুকুৰাৰ দৰে সম্পূৰ্ণভাৱে পৰি-স্কৃষ্ট হোৱা দেখা যায়। এই জাতৰ এণ্টিলোপৰ দেহৰ সোঁতলোৱাৰ বৰণ বহুভাৱকৈ বুলীয়া হয়। চকু কেইটাৰ চাৰিওকাষে এচটা বৰাৰবৰীয়া চকুৰ চিন দেখা যায়। বুতৰিৰ ওলং অংশ আৰু নাকৰ চাৰিওকাষে থকা চুটি চুটি সোঁতলোৱাৰ বৰাৰ হয়। ইহঁতৰ নেজ চুটি আৰু নেজভাগৰ ওপৰৰ ফালে থকা সোঁতলোৱাৰে সম্পূৰ্ণ বৰা। ওলংপেট আৰু বুকুৰ ওলংত থকা সোঁত সোঁপাত বৰা হয় আৰু এই বৰা সোঁতলোৱাৰ চেনাপতীয়াতকৈ ঠেঙৰ ভিতৰৰ ফালে বিয়পি থাকে। বহুভাৱকৈ আৰু বুলীয়া মোকৰ জালৰ বাবে অসুখটোক বৰ ভয়নি দেখি। বাইকী বুকুৰ পিছৰে থকা দেখা পাবাৰ। আনহাতে মতা কুকুৰাৰ বুকুত এডালীয়া পিছৰে থাকে। পিছ দুডাল পোন মটুৱা মোকটো-মোকটী ভাৱে ওপৰলৈ বাঢ়ি যায়। ওলংপৰি প্ৰত্যেক ডাল পিছত পোকোটা-পৰি পোকোটা জিৰিকি থকা দেখা যায়।

কুকুৰাৰ সৰ্বাঙ্গস্থিত প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। বহুতো সংখ্যক জন্তু কুকুৰাৰি এটো এটোটা জাক বা জুৰৰ বন্তি হয়। এইবোৰ একেলগে বাস কৰে। প্ৰাণীবিজ্ঞানে পাবাৰিক আৰু পাবাৰিক প্ৰাণীৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা

কেবাটাও জাকৰ কৃষ্ণগাবোৰ একেডোখৰ ঠাইতে লগ লাগি একো একোটা ধকাও জুমৰ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ যিবোৰ মুকলি মূৰীয়া বনভূমিত এইবিধ প্ৰাণীৰ উৎপত্তি বেছি হয়, সেইবোৰ ঠাইত কেতিয়াও এশৰ ওচৰাওচৰি জন্তু গোট খাই অভূতপূৰ্ব পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে। কিন্তু এই সমাবেশ দীৰ্ঘস্থায়ী হোৱা দেখা নাযায়। কিছুদিন একেলগে বাস কৰি ঘূৰি ফুৰাৰ পিছত সিহঁতে পুনৰ ভাগ ভাগ হৈ আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ভাগ হৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইহঁতে নিজৰ নিজৰ জুমৰ মাজত আগতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা মৃগবিলাক কেনেকৈ বাচি বাচি উলিয়াব পাৰে সেই বহুগা ভেদ ক'বোৰ সহজ নহয়। অৱশ্যে নানুহে নিজৰ পৰিয়াল বা সমাজৰ সদস্য সকলক চিনি উলিয়াব পৰাৰ দৰে ইহঁতেও হয়তো লগৰ কৃষ্ণগাবোৰক চিনি উলিওৱাত কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়।



কৃষ্ণগাব

কৃষ্ণগাব জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ সামাজিক আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বিষয়ে কেইটামান আশ্চৰ্যজনক কথা আছে। যদিও একোটা পৰিয়াল বা জাকৰ মাজত একাধিক মতা কৃষ্ণগাব থাকে তথাপি সিহঁতৰ মাজৰ এটা বলবীৰ্য সম্পন্ন

কৃষ্ণাৰেহে মাইকী কৃষ্ণাৰবোৰৰ ওপৰত একাধিপত্য বিস্তাৰ কৰে। বাকীবিলাকে বণত পৰাজয় বৰণ কৰি নিবন হৈ থাকিবলগীয়া হয়। পাৰিবাৰিক জীৱনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা মতা কৃষ্ণাৰে কেতিয়াবা সমাজ ত্যাগ কৰি কেৱল মতা প্ৰাণীৰে গঠিত হোৱা একোটা উদাসীন পৰিয়ালত একেলগে থাকিব লগীয়া হয়। বনবীয়া জন্তু জগতত এনে প্ৰক্ৰিয়া অৱশ্যে বিৰল নহয়। কিন্তু মৰহ সংখ্যক মতা জন্তু একেলগ হৈ এখন বেলেগ সংসাৰ সৃষ্টি কৰি থকাতো সচাকৈ কৌতুহল জনক।

দক্ষিণ ভাৰতৰ কিছুমান ঠাইৰ মানুহে কৃষ্ণাৰ নিধন কৰি তাৰ মাংস ভক্ষণ কৰে। কৃষ্ণাৰ বধ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে বন্দুক, ধনুৰ্কাঁড় আদি সাৰাৱক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ জাতীয় জন্তুৱে কৃষ্ণাৰক চিকাৰ কৰি বধ কৰে। মুকলি হাবি বননি আৰু গ্ৰামাঞ্চলত বাস কৰা ভগনীয়া কুকুৰ কিছুমানেও ইহঁতক কেতিয়াবা খেদি পেদি মাৰে আৰু তাহাতৰ মাংসবোৰ টাঙি আতুৰি খায়। এনেবোৰ কাৰণতেই এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি অহাৰ উপক্ৰম হৈছিল। বৰ্তমান ইহঁতৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কটকটীয়াকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰাত পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা দেখা গৈছে।

ৰাজস্থানৰ কোনো কোনো ঠাইত “বিচনই” সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বাস কৰে। এওঁলোকে সাধাৰণতে নিগাজীকৈ বাস কৰা গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে থকা হাবি বননি বিলাকত কৃষ্ণাৰ জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰে। বিচনই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কৃষ্ণাৰবিলাকক মৰম আৰু ভক্তিৰে চায়। তেওঁলোকে এইবিধ প্ৰাণীক কেতিয়াও বধ নকৰে। আনকি বাহিৰৰ পৰা অহা চিকাৰীকো কৃষ্ণাৰ মাৰিবলৈ নিদিয়। এই পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে ২৩ খন “বিচনই” সম্প্ৰদায়ৰ লোক থকা গাঁৱক সামৰি এটা নিষিদ্ধ এলেকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এইটো এলেকাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ কৃষ্ণাৰে থলুৱা ভাৱে বাস কৰে। সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা এলেকাটোক “ডলি নিষিদ্ধ এলেকা” নামেৰে ঘোষণা কৰা হৈছে। এইখন মৰুভূমিয়ে গৰকা ৰাজ্যত “মৰুভূমি অভয়াৰণ্য” আৰু “সীতামাতা অভয়াৰণ্য” নামৰ দুখন অভয়াৰণ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। সেই দুখা অভয়াৰণ্যত কিছু সংখ্যক কৃষ্ণাৰ আছে। কৃষ্ণাৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে মধ্য প্ৰদেশত “দেউলগাওঁ শ্ৰেষ্ঠ ৰাক্ চেকোৱাবী” নামৰ এখন অভয়াৰণ্যও স্থাপন কৰা হৈছে। এইখন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত কান্‌হা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু শিৱপুৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যথেষ্ট সংখ্যক কৃষ্ণাৰ বাস কৰা দেখা যায়। কৰ্ণাটকৰ “ব্ৰহ্মভদ্ৰা অভয়াৰণ্য” আৰু “বালকুট ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যত” যথেষ্ট সংখ্যক কৃষ্ণাৰ আছে। বিহাৰত থকা “বকুল-বন অভয়াৰণ্যতো” কিছু সংখ্যক কৃষ্ণাৰ বাস কৰা দেখা যায়।

কৃষ্ণাৰে বছৰৰ যেই কোনো সময়তে পোৱালি জগায়।



চাৰিখণ্ডীয়া প্লটেমোপ, বা চাঙচিমা

শ্ৰেণী—তন্য়াপাৰী

বৰ্গ—আব্ টিওডে টিলা

উপবৰ্গ—লোৰিনেলিটমা

কুল—বজ্জিদি

উপকুল—ব'চিমাফিনি

প্রজাতি—টেটুচেমাচ্ কোৱাজি-কৰ্ণিচ্

চাৰিখণ্ডীয়া এণ্টেলোপ্ বা চাঙচিমা নামৰ প্ৰাণী বিশেষকৈ নক্ষিত ভাষত, বহুপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ কালে বাস কৰা দেখা যায়। চাৰিখণ্ডীয়া গুণাগুণত এইবিধ এণ্টেলোপ আৰু মীৰগাইৰ মাজত-বহুভাষিনি সামান্য থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই কাৰণে জীৱবিদসকলে এই দুয়োবিধ ভাষিতলীয়া এণ্টেলোপ্ শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীক একেলগে সামৰি লৈ ব'চিমাফিনি নামৰ এটা উপকুল-বা উপ-পৰিৱৰ্ত্ত অৱৰ্ত্তন কৰিছে। বহুপ্ৰদেশৰ কান্‌হা নেচনেল পাৰ্ক, ৰাজস্থানৰ নেচনেল পাৰ্ক, নিৰপুৰী নেচনেল পাৰ্ক আৰু কুত্ৰী হাইল্ড ৰকেলে চেফোৱাৰী নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অন্তৰ্জাতীয় ৰেইখল্ড এইবিধ বিভিন্ন প্ৰাণীয়ে নিপাতীকৈ বাস কৰিবলৈ বাবে উপ-যুক্ত-পৰিবেশ ৰাচি নৈতে। ৰাজস্থানৰ চাৰিখা অন্তৰ্জাতীয় কিছু সংখ্যক চাৰি-খণ্ডীয়া এণ্টেলোপ্ বা চাঙচিমা বাস কৰা দেখা যায়। গুজৰাটৰ গীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰতো এইবিধ এণ্টেলোপৰ কিছুমান জন্ম বাস কৰে। কৰ্ণাটকত বালিপুৰ সান্দেৱে জলাভাও বিহল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই উদ্যান বন্যতা কিছুমান চাঙচিমা আছে। ইয়াৰ পাৰ্শ্বিকত কৰ্ণাটকৰ “সান্‌ৱাৰি উপত্যকা-অন্তৰ্জাতীয়” চাঙচিমা জাতীয় এণ্টেলোপ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ “পানীকলা অন্তৰ্জাতীয়” চাঙচিমা থকা দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য যে পূব ভাৰতৰ কোনো এখন ৰাজ্যতো এইবিধ প্ৰাণীক বৰ্ত্তীয়া অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।

চাৰিখণ্ডীয়া এণ্টেলোপ্ নামটোৰ পৰাই সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে ইহঁতৰ অৱস্থান চাইল্ড কুমাৱাটক শিঙৰ উৎপত্তি হয়। প্ৰকৃতি কালে হোৱা প্ৰথম বোৰা শিং আকাৰত তেনেই সৰু হয়। সেই কাৰণে আঁতৰৰ পৰা জন্তটোক বিচৰণ কৰিব খণ্ডীয়া হ'লে এই সৰু আকাৰৰ শিং বোৱা ভালকৈ ৰখিব গোৱাৰি। নুবৰ অলপ ওপৰৰ কালে কাল মুখৰ ঠিক তল ভাগতে বি বোৱা শিং হয় সেই বোৱা দিক্‌কো

আকাবত দীঘল আৰু ডাঙৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি। পাছৰ কালে অৱস্থিত এই শিং
বোৰৰ দীৰ্ঘতা ১০ চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি হোৱা দেখা নাযায়। আগৰ কালে থকা
সৰু শিং বোৰা ইমান নগণ্য যে প্ৰায় এক দুই চেণ্টিমিটাৰ মানহে বুৰৰ বাহিৰলৈ
ওলাই থকা দেখা যায়। চাওচিঙ্গা নামৰ এণ্টেলোপৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল ইহঁতৰ



শিঙৰ উপবিভাগ পাৰ কটা বা আঙঠি পহীয়া নহৈ সমান বা নিহি ধৰণত হয়।
নীলগাহৰ শিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এনে সাধুশা দেখা যায়। অন্যান্য জাতীয় এণ্টেলোপৰ
ক্ষেত্ৰত কিন্তু শিঙৰ উপবিভাগ পথালি পথালিকৈ সাজ কটা থাকে। এই গুণৰ ব্যতিক্ৰমে
নীলগাহ আৰু চাৰিশিঙীয়া এণ্টেলোপ নামৰ প্ৰাণী দুবিধক পৃথক ভাৱে পৰিচয়
কৰিবলৈ যোৱা যোগাইছে। চাওচিঙ্গাৰ আন এটা শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে

যে ইয়াৰ পাছ ঠেং দুখনৰ খুৰাৰ ওপৰত এবোৰা এবোৰা বাংসৱ্ৰজিৰ উৎপত্তি হয়। এনে ধৰণৰ বাংসৱ্ৰজিৰ বিকাশ সাধন হোৱা অন্য কোনো সমগোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। হাইকী চাওচিঙ্গাৰ কোনো শিং নাথাকে।

চাৰিশিঙীয়া এণ্টেলোপ্ বিলাকে সাধাৰণতে সৰুসুৰা পাহাৰ আৰু টিলা আদিৰে পৰিপূৰ্ণ মুকলি বিশ্বৰ হাৰিৰ মাৰুত সোমাই থাকিবলৈ ভাল পায়। এনে বাতাবৰণত বিহিলাক বাঁহ-বাঁ ডাতীয় উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হয় আৰু ব'ত চুটি চাপৰ গছ আৰু লতা আদিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰে। ভেনেৰোৰ ঠাইতে এইবিধ প্ৰাণীয়ে মুকলি মনেৰে চৰি কুৰে। আমাৰ এই ফালৰ ঠাইবোৰত বাস কৰা স্তৰ্গৰী পহুৰ দৰে এইবিধ প্ৰাণী-দ্বৈও এক প্ৰকাৰৰ সূহসিৰি নিচিনা শব্দ উচ্চাৰণ কৰি লগৰী বিলাকক ওচৰলৈ মাতি আনিবলৈ চেষ্টা কৰে। এই জাতীয় এণ্টেলোপে সাধাৰণতে গাই-গুটীয়া ভাবে আৰু কেতিয়াবা কেইবাটাও জন্তু ওচৰাওচৰিকৈ থাকি আপোন মানুহে চৰি কুৰিবলৈ ভাল পায়। বাৰিষাৰ সময়খিনি আহি পালে মতা আৰু গাইকী এণ্টেলোপ্ বিলাকৰ মাজত প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। এইবিধ প্ৰাণীয়ে সাধাৰণতে এবাৰত এটাকৈ আৰু কেতিয়াবা অকস্মাতে দুটাকৈ পোৱালি জগায়।



নীলগাই

শ্ৰেণী—স্তুপ্যপায়ী

বৰ্গ—আৰ্ টিওডে ষ্টিল

উপবৰ্গ—ৰোমিগেন্টিয়া

কুল—বভিডি

উপকূল—ব'চিলেকিনি

প্ৰজাতি—ব'চিলাফচ্ ট্ৰেগোকেনেলচ্

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাহিলীয়াৰ অন্তৰ্গত যি কেইবিধ এণ্টেলোপ্ গোটীৰ প্ৰাণী বাস কৰে সেই আটাই কেইবিধৰ ভিতৰত নীলগাই নামেৰে জনাজাত প্ৰাণী-বিধেই আকাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ হয়। এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বসতি স্থান হিমালয় পৰ্বতমালাৰ নামনি ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণাত্যৰ ৰাজ্যসমূহলৈ বিয়পি আছে। এণ্টেলোপ্ গোটীৰ প্ৰাণী হ'লেও হিন্দু সকলে এই প্ৰাণীক গৰু সদৃশ পৰিচিত্ৰ জ্ঞান কৰি কেতিয়াও বধ নকৰে। সেই বাবে ভাৰতবৰ্ষত এইবিধ প্ৰাণীৰ বক্ষণাবেক্ষণ অতি পুৰণি কালৰে পৰা স্বতঃসিদ্ধ ভাৱে প্ৰৱৰ্তিত হৈ আহিছে। পশ্চিম বঙ্গৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰ্ণাকলৰ ৰাজ্য সমূহত এইবিধ প্ৰাণীক সাধাৰণতে বনৰীয়া অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বিহাৰৰ হাজাৰিবাগ অভয়াৰণ্য, কাইমূৰ অভয়াৰণ্য আদি আছুতীয়াতকৈ সুৰক্ষিত কৰি বনা প্ৰাণীৰ পৰিচিত্ৰ বনভূমি বিলাকত এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উদ্যোগৰ চাট্‌কছিয়া গৰ্জা অভয়াৰণ্যতো কিছু সংখ্যক নীলগাই গোটীৰ প্ৰাণী বাস কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৰবেট্‌ ৰাষ্ট্ৰীয়-উদ্যান, দুধৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ৰাজাজী অভয়াৰণ্য, মতিচুৰ অভয়াৰণ্য, কিচান পুৰ অভয়াৰণ্য, চন্দ্ৰপ্ৰভা অভয়াৰণ্য, বীৰ নৰ্ভবাগ অভয়াৰণ্য, বীৰ ভোঁনাৰ হেনী অভয়াৰণ্য আৰু বহুতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্যত এইবিধ প্ৰাণীক স্বাধীন-চিহ্নীয়া ভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহ্যপ্ৰদেশৰ কান্‌হা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু শিৱপুৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে কেন্দ্ৰ কৰি অন্যান্য বহুতো বনভূমিত এইবিধ বন্যপ্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, কেৰেলা, কৰ্ণাটক আদি ৰাজ্যসমূহৰ অনুকূল পৰিৱেশত নীলগাই বাস কৰা দেখা যায়। গুজৰাটৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় সিংহ সংৰক্ষণৰ বাবে গাঁৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামৰ এখন বনভূমি আছুতীয়াতকৈ বৰা হৈছে তাতো নীলগাই বাস কৰে।

নীলগাই দেখাত গৰু জাতীয় প্ৰাণীৰ দৰে হ'লেও ইয়াৰ মূৰ আৰু মূৰবগল ঘোঁৰা জাতীয় প্ৰাণীৰ মূৰৰ লগত হৈ বিল হৈ থকা দেখা যায়। মতা নীলগাইৰ মূৰত গজা শিংযোৰা এডলীয়া হোৱা দেখা যায়। মাইকী নীলগাইৰ শিং থকা দেখা নাযায়। মতাবোৰৰ গালৰ দুয়োকাষে এচটা এচটা দীঘল চানেকীয়া বগা দাগ থাকে আৰু ইহঁতৰ গল-ধনতো আঙঠিৰ নিচিনা বগা দাগ দেখা যায়। তনুপৰি ইহঁতৰ নেত্ৰৰ ভিতৰ ফাল, ওঠৰ চাৰিও কাষ আৰু খুতৰিত গজা নোৰযোৰা বগা হোৱা দেখা যায়। মতা আৰু মাইকী উভয়ৰ ডিঙিত আৰু গলধনৰ উপৰি



নীলগাই

ভাগত ঘোঁৰাৰ নিচিনাকৈ চেলাপতীয়া নোম থাকে। মতাবোৰৰ ডিঙিত একোটা ক'লা বৰণীয়া নোম হয়। মতা নীলগাইৰ শিঙৰ ওঁৰি ভাগ ত্ৰিকোণীয়া হয়। শব্দ বিশেষৰ বয়ল আৰু আকাৰ অনুযায়ী শিং যোৰা ১৫ চেন্টিমিটাৰ মানলৈ পৰা ২০ চেন্টিমিটাৰলৈ দীঘল হয়। মতা নীলগাইৰ কাণৰ ভিতৰৰ ফালে গজা নোম-খিনিও বগা হয়। শিং যোৰাৰ উপৰি ভাগ মিহি আৰু সমান হয়। ইয়াত অপালি পখালিকৈ কটা কোনো দাগ নাথাকে। শিং যোৰা পাছফালে ধনুভৰীয়া হৈ থাকে।

নীলগাই জাতীয় প্রাণীবিলাকে সাধাৰণতে ডাঠ ছাৰিৰ মাজত থাকিবলৈ ভাল নাপায়। সেৰেঙা ছাৰিবিলাকত থাকিবলৈ উপযুক্ত ঠাই বাচি লয়। সৰুসুৰা টিলাৰে ভৰি থকা পাহাৰী ঠাই আৰু সমভূমিৰ জোপোহা ছাৰি থকা পাতলীয়া বনভূমিয়ে ইহঁতৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে। বাতিপুৰা খেলি ওলাই অহাৰ সময়তে ইহঁতে জিৰণি লোৱা ঠাইৰ পৰা লাহকৈ ওলাই আহে আৰু মুকলি সুৰীয়াটক ছাৰি বননিত চৰি ফুৰে। ব'দ বৰষুণক আগুকাণ কৰি ইহঁতে আপোন মনেৰে ইকালে গিয়ালে ঘূৰি ফুৰে। হাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ আৰু পাত, নভা আদি খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। ভালেশাং নিশাতলৈকে ইহঁতে চৰণীয়া ঠাইবোৰত নিশ্চিন্ত মনেৰে চৰি ফুৰে। ছাৰিত উৎপন্ন হোৱা বগৰ্হ জাতীয় গছৰ ফলবোৰ ইহঁতে ছিঙি ছিঙি খায়। আনকি মাটিত সৰি পৰা বগৰ্হীবোৰো ইহঁতে বুটলি খায়। ইহঁতে একে লেঠাবিৱে বহুত দিন পানী নোখোৱাটক থাকিব পাৰে।

শত্ৰু জাতীয় প্রাণীয়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহাৰ আগতকৈ দেখিলে নীলগাই নিলাকে ছিটকি পলাই সাৰিবলৈ যত্ন কৰে। দৌৰি পলাই বোৱা সময়ত ইহঁতে এক প্রকাৰৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰে। ইহঁতে দ্ৰুত গতিত দৌৰিব পাৰে। মল ত্যাগ কৰিলে লগীয়া হ'লে গুড় জাতীয় প্রাণীৰ দৰে নীলগাই বিলাকেও প্ৰতিদিনে একে ডোখৰ ঠাইলৈকে যায়। এইদৰে একে ঠাইতে বহুতদিন ধৰি মলত্যাগ কৰাৰ ফলত কোনো কোনো ঠাইত একোটা দৰৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়।

নীলগাইক সমাজপ্ৰিয় প্রাণী বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ ইহঁতে গাইওঁচীয়া ভাৱে চৰি নুফুৰি ভাককুৱা হৈ চৰণীয়া ঠাইত একান্ত মনেৰে চৰি ফুৰে। মতা, মাইকী আৰু বিভিন্ন বয়সৰ গোৱাতিৰাৰ লগ লাগি একোটা জাক বা জুৰৰ সৃষ্টি হয়।

বছৰৰ যেই কোনো সময়তে নীলগায়ে এখাবত এটালৈ পোৱালি জন্মায়।



চিন্কাৰা বা ভাৰতীয় গেজেল

শ্ৰেণী----স্তুন্যপায়ী

বৰ্গ----আৰ্ টিওডে ঙ্গিলা

উপবৰ্গ----ৰোমিনেন্টিয়া

কুল----ৰডিডি

প্ৰজাতি----গেজেলা বেনোটি

ভাৰতবৰ্ষত গেজেল শ্ৰেণীৰ মাত্ৰ এবিধ প্ৰাণীহে থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াক চিন্কাৰা বা ভাৰতীয় গেজেল বোলা হয়। ইয়াৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান পশ্চিম ভাৰত আৰু মধ্যভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা দেখা যায়। দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে চিন্কাৰাৰ বসতি স্থান থকা দেখা নাযায়। অৱশ্যে কৰ্ণাটকৰ কোনো কোনো ঠাইত এইবিধ প্ৰাণীয়ে বাস কৰি আছে। পূব আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ক'তো বনৰীয়া চিন্কাৰা দেখা নাযায়। সেইবাবে অসমৰ মানুহে এইবিধ প্ৰাণীৰ ছাঁটোকো বনৰীয়া অৱস্থাত দেখিবলৈ নাপায়।

মধ্য প্ৰদেশৰ বান্ধৱগড় আৰু শিৱপুৰী নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুখনত চিন্কাৰা নামৰ গেজেল বাস কৰা দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰিও নবী অভয়াৰণ্য, নৰদেহী অভয়াৰণ্য, গান্ধিপুৰ অভয়াৰণ্য আদি যিবিলাক পৱিত্ৰ ভূমি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে উদ্ভূত কৰি ৰখা হৈছে সেইবিলাক ঠাইতো এইবিধ প্ৰাণীক মিনালে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গুজৰাটৰ গীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অন্যান্য জাতীয় তৃণভোজী বন্যপ্ৰাণীৰ সহযোগত চিন্কাৰাই নিগাজীকৈ বাস কৰিবলৈ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি লৈছে। ৰাজস্থানৰ মৰভূমিয়ে গবকা মুকলি-মূৰীয়া মৰন্দানখিলাকতো সেৰেঙাকৈ এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা যায়। তদুপৰি ৰাজস্থানৰ চাৰিদ্ৰা ব্যাঘ্ৰ যোৰ্ঘনা এলেকা, জয়চামাণ্ড অভয়াৰণ্য, জৱাহৰ সামৰ অভয়াৰণ্য, ডলি নিঘেৰ এলেকা, সীতা-মাতা অভয়াৰণ্য আৰু মৰভূমি অভয়াৰণ্য আদিয়ে সামৰি ৰখা বিভিন্ন অঞ্চলত এইবিধ বন্যপ্ৰাণীক মিনালে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহৰাষ্ট্ৰৰ পাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ইয়াৰান অভয়াৰণ্য আৰু কিন্ ৱাট অভয়াৰণ্যতো চিন্কাৰা নামৰ গেজেল থকা দেখা যায়।

চিন্কাৰাৰ শাৰীৰিক গঠন প্ৰণালী সম্পৰ্কে ক'বলৈ গ'লে এইবিধ প্ৰাণীৰ গাতো

অন্যান্য ভাৰতীয় হৰিণ আৰু এণ্টেলোপৰ তুলনাত একেবাৰে পাতল হয়। দেহৰ ওপৰৰ নোমৰ বৰণ বঙচুৱাকৈ মুগা হয়। পাৰ্শ্বভাগত গছা নোমবোৰ অলপ বেছি বঙা হয়। পাছ-ঠেঙৰ তপিনাৰ নোমবোৰো বঙচুৱা হোৱা দেখা যায়। মুখ বঙলৰ দুয়োকাষে বগা বৰণৰ দাগ থাকে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য যে আফ্ৰিকা মহাদেশত



চিন্কাৰা

বাস কৰা অন্যান্য জাতৰ গেজেলৰ মুখৰ আগভাগতো এনে ধৰণৰ বগা দাগ হয়। নাকৰ বিদ্ধা দুটাৰ ওপৰৰ ফালে এডোখৰ ধোঁৱা বৰণীয়া দাগ থাকে। সন্মুখৰ কালৰ পৰা জন্তটোক পোনপটীয়াকৈ নিৰীক্ষণ কৰিলে তাৰ শিং দুটাত কোনো প্ৰকাৰৰ ডাঁড় নাই বেন অনুমান হয়।

কাৰণপৰা কেটীয়াটক লক্ষ্য কৰিলেহে ধৰিব পাৰি যে জন্তুটোৰ শিং দুটা বাঁহ গছৰ পাৰ এটাৰ দৰে চিৰাচিৰি পোন নহয়। ইংৰাজী ভাষাৰ এছ (S) আখৰ টোৰ দৰে চিন্কাৰা জাতীয় বৃগৰ শিং যোৰাও হাকোটাৰ দৰে দেখা যায়। চিন্কাৰাৰ প্ৰত্যেক ডাল শিঙৰ ওৰি ভাগত আঙঠিৰ নিচিনা কিছুমান খাঁজ কটা দাগ থাকে। বাইকী চিন্কাৰাৰ নুৰত সাধাৰণতে শিং দেখা নাযায়। তাৰে ভিতৰত দুই চাৰিজনী বাইকী চিন্কাৰাৰ সাধাৰণ আকাৰৰ শিং গছা দেখা যায়।

বুলি বুৰীয়া হাবি বননি বিনাককই চিন্কাৰা জাতীয় প্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বাসস্থান বুলি ক'ব পাৰি। গভীৰ অৰণ্যত ইহঁতে থাকিলে ভাল নাপায়। বকতুমিয়ে গৰকা বালি-বঁহীয়া ঠাইত ভাট হাবি নহয়। বাজ-পুতনা বকতুমিৰ আশে পাশে থকা পাত-নীয়া হাবি-বনলি কিছুমানত এইবিধ প্ৰাণী দেখা যায়। তাত তৰু-বা-কদম জাতীয় এবিধ ছিৰিলি-পতীয়া গছৰ উৎপত্তি হয়। সিজু, নাগকণা, শণ, আৰুণ আদি কোমল জাতীয় উদ্ভিদ এইবোৰ ঠাইত হোৱা দেখা যায়। গ্ৰেইট ইণ্ডিয়ান বাটাৰ্ড বা গোদাবন নামৰ এবিধ উলুৰ বা (ক্লেবিকাণ) জাতীয় ডাঙৰ পক্ষী এইবোৰ ঠাইত নিগাহীটক থাকে। এনেবোৰ ঠাইতে চিন্কাৰাকো আনেতে আনেতে চৰি ফুৰা দেখা যায়। বৰ্ষাৰ কালত কুকা আৰু কাডেবী নদীৰ পাৰ পৰ্বত এইবিধ প্ৰাণীয়ে কপতি বিতাৰ কৰি আছে। উত্তৰ ভাৰতৰ কোনো কোনো বনাঞ্চলত এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতি বৰ পাতলীয়া দেখা যায়।

সমুদ্ৰ উপৰি ভাগৰ তুলনাত যিবোৰ পৰ্বতীয়া ঠাইৰ উচ্চতা বেছি নহয় আৰু ব'ত গভীৰ অৰণ্যৰ কাষেৰে জোন-বোনিৰ পোহৰ ভালদৰে নপৰে তেনেকুৱা ঠায়ে চিন্কাৰাৰ বাবে অধিক পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে। উত্তৰ ভাৰতৰ কালে এনেকুৱা ঠাই আছে। গাওঁ-ভূইৰ আশ-পাশৰ বন-জুৰা হাবি-বনলিত থকা চিনকাৰা জাতীয় প্ৰাণীয়ে মানুহৰ উপস্থিতিত আতঙ্কিত কৰি খেতি-পথাৰত সোৰাই নস্যৰ ক্ষতি সাধন কৰে।

চিন্কাৰাৰ লৰাজ ব্যৱস্থা আৰু সাংসাৰিক জীৱনৰ বিষয়ে জানিব লগীয়া কথা-খিনিৰ এতিয়া অলপ আলোচনা কৰা যাওক। কৃষ্ণসৰ (Black-buck) দৰে ইহঁতে আক পাতি বাস নকৰে। দিনৰ ভাগত ইহঁতে অকলশৰীয়াটক নাইবা কেইটা-মান জন্তুৰে ধোপোহা বা বৰ্জীয়া আকাৰৰ ছিৰিলি-পতীয়া গছৰ তলত শুই বহি কটায়। আবেলি পৰত আন্ধৰ লোৱা ঠাইৰ পৰা নাহেটক ওলাই আহি বাঁহ বন বিচাৰি অ-নাই বনাই খুৰি ফুৰে। বাতিপুৱাৰ শীতল পৰিবেশতো ইহঁতে এনেদৰেই খুৰি ফুৰে। ইহঁতক চেঙা আৰু ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব লাগিব। বন-জাতীয় প্ৰাণী বা মানুহৰ উমান পালেই ইহঁতে উজাপু খাই চাৰিও কালে ছিটিকি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিছুদূৰ দৌৰি পলাই যোৱাৰ পিছত চিন্কাৰা জাতীয় প্ৰাণীয়ে এঠাইত থক লাগি বৈ উভটি চাৰিগৈ। ভয় বোৱাৰ আচল কাৰণটো উপলব্ধি কৰিলেই ইহঁতে সেই সময়ত এনেকৈ বৰপে। এইবিধ প্ৰাণীৰ প্ৰৱণ-শক্তি অতিশয় প্ৰবল হোৱা দেখা যায়। কাৰণ বন পক্ষৰ পৰা বিপদই কাপত নপৰক

লগে লগে ভক্তবোৰে চাৰিও ফালে ছিটিকি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইবিধ প্ৰাণীৰ দৃষ্টি শক্তিও তদনুযায়ী তীক্ষ্ণ হোৱা বেন অনুমান হয়। দূৰৈৰ শত্ৰুজাতীৰ প্ৰাণী দৃষ্টি-পোচৰ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে পলাই পত্ৰং দি নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় লয়গৈ। পোক-ভাপৰ উমান লৈ ইহঁতে শত্ৰু ওচৰ চাপি অহা নহাৰ কথাটো সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে। এইবিধ প্ৰাণীৰ শ্ৰৱণ আৰু দৃষ্টি শক্তিৰ দৰে শ্ৰাণ শক্তিও উন্নত বুলি অনুমান হয়।

চিন্কাবা বিলাকে ঘাঁহবন, গছৰ কুমলীয়া পাত আৰু কল-মূল আদি খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। পানী নোখোৱাকৈয়ে ইহঁতে একে নেঠাৰিয়ে বহুত দিন ধাঙিৰ পাৰে। বৰফুৰি অকলৰ খাটিত বা ঘাঁহবনৰ ওপৰত কুঁৱলি পৰি পৰি গোট খোৱা নিয়মৰ চৌপালবোৰ চিন্কাবাবিলাকে ডিডাবে চেলেকি চেলেকি খাব লগীয়া হয়। কৃষ্ণ-সাৰৰ দৰে মাইকী মৃগৰ সজস্বৰ্থ কামনা কৰি মতা চিন্কাবাৰ মাজত কোনো অবিয়া-অৰি ভাৱৰ স্ফুট হোৱা দেখা নাযায়। এইবোৰ কাৰণতে চিন্কাবা বিলাকক সবল, শান্ত আৰু নিৰ্ভু প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি।

মাইকী চিন্কাবাই এবাৰত সাধাৰণতে এটাক পোৱালি জন্মায়। কেতিয়াবা অৱশ্যে একে বাৰতে একাধিক পোৱালিও জন্ম দিয়া দেখা যায়।



ছাগলী-এণ্টেলোপ্, কৈদৰ প্ৰাণী-সমূহ

শেহতৰ আগ ভাগত খটা আকৃতিৰ খুৰা থকা পুণ্যপাণী জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত গৰু, বাঁহ, চাগলী, ভেড়া, পহু, এণ্টেলোপ্ আৰু গেজেল জাতীয় প্ৰাণীবিলাকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এই তৃণ-পল্লৱ-ভোজী প্ৰাণীবিলাকে খাদ্য সামগ্ৰী পাণ্ডুলি পাণ্ডুলি খাই হজম কৰে। সেই কাৰণে ইহঁতক বোমিনেণ্ট বা বাঁহ পাণ্ডুলি খোৱা জন্তু বোলা হয়। এইবিলাক প্ৰাণীৰ আন এটা শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল ইহঁতৰ শেহত নখৰ গননি খুৰাৰ উপস্থিতি চয়। সেই কাৰণে ইহঁতক 'আংগোলোপ' বা খুৰাবিশিষ্ট প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। এই আটাইবোৰ প্ৰাণীৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক লক্ষণ জাত অনুযায়ী ইতিপূৰ্বে বৰ্ণনাত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ছাগলী আৰু এণ্টেলোপ্ নামৰ দুবিধ প্ৰাণী আছে সিহঁতৰ গাতো কিছুমান শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিছুমান কন্যাপ্ৰাণীৰ দেহত আংশিক ভাৱে ছাগলী আৰু আংশিক ভাৱে এণ্টেলোপ্ জাতীয় প্ৰাণীৰ গুণাগুণ দেখা যায়। জীৱবিদ সকলে এনে ধৰণৰ প্ৰাণীক ছাগলী-এণ্টেলোপ কৈদৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব খোজে।

ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত তিনি জাতৰ ছাগলী-এণ্টেলোপ্ বুলি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সিহঁতক ক্ৰমে ছেৰাও, গড়াল আৰু টাকিন বুলি কোৱা হয়। অসমৰ মানুহে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰা দুবিধ প্ৰাণীক 'দেও ছাগলী' বুলি কয়। তৃতীয়বিধ প্ৰাণীক কেৱল অসমীয়া ভাষাত কোনো নাম ব্যৱহাৰ হোৱা নাই।

টাকিন জাতীয় প্ৰাণীও হিমালয় শৈলমালাৰ পাহাৰৰ বাবে অসমীয়া ভাষাত এইবিধ প্ৰাণীৰ নাম লুপকাটো কোনো আকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি কয়।

পৃথিৱীৰ অন্যান্য ঠাইত ছাগলী-এণ্টেলোপ্ নামৰ কেইবাবোৰো প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ ভিতৰত ইউৰোপ মহাদেশত খৰা, কৰা চাৰাই নামৰ এবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। এতিয়া বহুদেশৰ উত্তৰৰ কালে থকা পাৰ্বত্য অঞ্চলত আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ চানুইট নামৰ প্ৰাণীবিধক বাস কৰা দেখা যায়। উত্তৰ আমেৰিকাৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত বাস কৰা বকি মাউণ্টেন গ'ট নামৰ আন এবিধ বিশেষ জন্তুক ছাগলী-এণ্টেলোপ্ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ প্ৰাণী বুলি ধৰিব পাৰি। কথা গুলত ক'ব পাৰি যে বকি মাউণ্টেন গ'ট বা শিয়াময় পৰ্বতবাসী

ছাগলীৰ পাৰ গোটেই নোমবোৰ বগা হয়। গ্ৰীষ্মলগত মাঙ্ক--অঙ্ক নামৰ আন এবিধ ছাগলী-এণ্টেলোপ্ জাতিৰ প্ৰাণী বাস কৰে।

ছাগলী এণ্টেলোপ শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীবোৰৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল মতা মাইকী নিৰ্বিশেষে এইবিলাক প্ৰাণীৰ মূৰত এযোৰা এযোৰাকৈ শিং হয়। পৃথিৱীৰ অন্য ছাগলী বা এণ্টেলোপ্ জাতীয় প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এই বৈশিষ্ট্য দেখা নাযায়। গুৰি ভাগত আঙঠিৰ নিচিনা কিছুমান দাগ থকাৰ বাহিৰে এই শিংবোৰত অন্য কোনো দাগ বা চিন নাথাকে। ইহঁতৰ ওলাই অহা শিং যোৰা ওপৰ--মূৱা হৈ পিছৰ ফালে ধনুৰীয়াতকৈ ভাঁজ খাই থাকে। চামুইচৰ শিং আগৰ ফালে ভাঁজ খাই হাকোটাৰ দৰে দেখা যায়। ওপৰে ওপৰে লক্ষ্য কৰিলে এই আটাইবিলাক বিচিত্ৰ প্ৰাণীক ছাগলী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বেন লাগে। ইহঁতৰ দাঁতবোৰৰ গঠন প্ৰাণীত কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহঁতৰ নেজবোৰ ছাগলী জাতীয় প্ৰাণীৰ নেজৰ দৰে চুটি হয়। আটাইবিলাক প্ৰাণীয়েই পৰ্বতৰ ওপৰৰ শিলাময় পৰিবেশত থাকিবলৈ ভাল পায়। চামুইচৰ মূৰৰ ওপৰ ভাগত একোটাকৈ বসযুক্ত মাংসগ্ৰন্থি থকা দেখা যায় আৰু পাল খোৱাৰ সময়ত এই মাংসগ্ৰন্থি ওখহি ডাঙৰ হয়। ছেৰাও আৰু গড়াল জাতীয় প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এনে বিশেষত্ব দেখা নাযায়। মূৰৰ মাংসগ্ৰন্থিৰ পৰিবৰ্তে সিহঁতৰ ঠোঁটত এক প্ৰকাৰৰ বসাল মোনাৰ উৎপত্তি হয়।

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ অন্তৰ্গত আৰু বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা ছেৰাও, গড়াল আৰু টাৰ্ণ নামৰ তিনি বিধ ছাগলী-এণ্টেলোপ্ জাতীয় প্ৰাণীৰ জীৱন বুৰঞ্জী সুকীয়া সুকীয়া ভাৱে তলত উল্লেখ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হ'ল।



ছেবাও বা দেওছাগলী

শ্ৰেণী----স্তুন্যপায়ী

বৰ্গ----আৰ্টিওডে ক্লে।

উপবৰ্গ----ৰোমিনেন্টিয়া

কুল----বতিদি

উপকুল----ৰোপ্ৰকৈপ্ৰিনি

প্ৰজাতি----কেপ্ৰিকণিচ চ্‌মাত্ৰায়েন্‌ চিচ্‌

ছেবাও বা দেও-ছাগলী নামৰ এবিধ বনৰীয়া জন্তুক ছাগলী-এণ্টেলোপ জাতি প্ৰাণীৰ অন্যতম প্ৰতিনিধি বুলি কোৱা হয়। অসমৰ কিছুমান পাৰ্বত্য অঞ্চলত এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা যায়। তাৰ ভিতৰত কাৰ্বি-আংলং জিলাৰ অন্তৰ্গত মিকিৰ পাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই পৰ্বতীয়া জিলাখনৰ অন্যান্য বনভূমি অঞ্চলতো এইবিধ প্ৰাণীয়ে অ'ত ত'ত বাস কৰে বুলি জনা যায়। উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো এইবিধ প্ৰাণীৰ বাসৰ বাবে উপযুক্ত পৰিবেশ আছে। কিন্তু দেও ছাগলীৰ সংখ্যা ইমান নগণ্য যে বিভিন্ন বনাঞ্চলৰ অনুকূল পৰিবেশত নিবলে বাস কৰা দেওছাগলীক সহজে বিচাৰি পোৱা নাযায়। তৃণ-পল্লবভোজী এইবিধ বন্য প্ৰাণীক মাংসাহাৰী জন্তুৱে পালেই ভক্ষণ কৰে। তদুপৰি মানুহে পালেও ইয়াক সতকাই এবি নিদিয়ে আৰু নানা কৌশলেৰে বধ কৰি মাংসৰ জুতি লয়। জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে জুম খেতিৰ অন্তৰালত হাবি বগনিবোৰ মুকলি হ'বলৈ ধৰাত এইবিধ প্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি বোৰ পাতল হৈ পৰিছে।

অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ বাহিৰেও পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্য কেইখাতো ঠাই অনুযায়ী দেওছাগলী অ'ত এটা ত'ত এটাকৈ থকা দেখা যায়। অন্য আৰু যোৰা-লয়ৰ সীমামুৰীয়া বনাঞ্চলত কেতিয়াবা অকস্মাতে দুই চাৰিটা দেওছাগলী দেখা যায়। নেৰালয় ৰাজ্যখনত সংৰক্ষিত বনভূমি নিচেই কম। এতিয়ালৈ মুঠ মাটি কালিৰ প্ৰায় ৩.৬ শতাংশ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। বাকী বনাঞ্চল জিলা পৰিষদে পৰিচালনা কৰে। খাচিয়া পাহাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বনভূমি অঞ্চলৰ মালিকীস্বত্ব চিহ্নসমূহ, লিংডো প্ৰভৃতি সমাজৰ মূলস্বীকৰণ। আন কিছুমান বনভূমি জনসাধাৰণে বাইজৰ

উন্নততীয়া সম্পত্তিকপে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। গাৰো পাহাৰ জিলাত থকা অসংখ্য বনাঞ্চল সমূহৰ মালিকীস্বত্ব নক্সা মুৰব্বী সকলৰ। এই বিলাক ঠাইত জনজাতীয় ৰাইজ জুম খেতি কৰে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এই বনাঞ্চলবিলাকৰ পৰিণত কমি আহিছে আৰু হাবি-বননিবোৰ খণ্ড খণ্ড হোৱাত বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ স্বাভাৱিক বসতি স্থান আৰু বিচৰণ ভূমি নোহোৱা হৈছে। এই সংসৰুখী পৰিবেশৰ কাৰণে থলুৱাকৈ ঠায়ে ঠায়ে বাস কৰা বিভিন্ন জাতৰ বন্যপ্ৰাণী বিলাকৰ নাঅল-নাথল অৱস্থা হৈছে। দেওছাগলীৰ নিচিনা নিম্নাধিত বন্যপ্ৰাণীৰ অৱস্থাও শোক লগা। এই পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয়ৰ বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা দেওছাগলীৰ সংখ্যা এতিয়া বহু পৰিমাণে কমি আহিছে।



দেওছাগলী

মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰ জিলা পুখ্ৰাল অঞ্চলত বনফাক্‌বাং নামৰ এখন অসুৰ ক্ষত্ৰৰ বনাঞ্চল আছে। এই অৰণ্যভূমিত বহুতো প্ৰাচীন আপুৰুগীয়া বন্যপ্ৰাণী আৰু আৰু নানা শ্ৰেণীৰ দুৰ্লভ উদ্ভিদ আছে। সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নহ'লেও এই পৰিৱেশ অৰণ্যভূমিত ণিগা কৈ পকা বন্যপ্ৰাণী আৰু উদ্ভিদে বহুত দিনৰ আগতে পৰা সংৰক্ষণ মূলক নৰ্যাস লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত মানুহৰ বসতি তেনেই পাতলীয়া। সেই কাৰণে অন্যান্য ঠাইৰ দৰে ইয়াত বন্যপ্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ স্বল কাৰ্যও হোৱা দেখা নাযায়। এই অৰণ্যভূমিৰ সোঁ মাজত থকা বনফাক্‌বাং নামৰ বনাঞ্চল সদৰ আহল বহল শিমাথয় ঠাই ডোৰৰক গৈ জনজাতীয় লোকসকলে পৰিৱেশ জ্ঞান কৰে। গাৰো জনজাতীয় লোকসকলে বহুতে বিশ্বাস কৰে যে কোনো মানুহৰ

মুখ্য হ'ল বৃভকৰ আতাই পোম প্ৰদৰ্শতে বলকাৰ্কাৰ নামৰ ঠাই ভোখবলৈ বিচাৰৰ বাবে যায়। বৃভকৰ আতাই লগত এটা গৰু লৈ বাৰ লাগে। বলকাৰ্কাৰত এখন ভূত পিৰাচৰ বজাৰ আছে আৰু এই বজাৰখনক “বেবাং আতে” (পিৰাচৰ বজাৰ) বোলা হয়। বৃভকৰ আতাই গৰুটো এজোপা মাক্ৰি শাল বা ডে গছত পথা এডালেৰে বান্ধি পিৰাচৰ বজাৰখনত দূৰা দূৰি কৰে। বৃভাৰাই চিলামক (কলীয়া পানীৰ কালিকা বগা পুৰী) নামৰ পুৰীত হাগ কৰি বেবাং নক্ কান্টেত (পিৰাচৰ ডেকাচাং) কিছু গৰবৰ গাঁয়ে জিবৰি লৈ যিহে আলালতৰ (পিৰাচৰ আদালত) আগত হাজিৰ হ'ব লাগে। যিহে আলালতত বৃভাৰাৰ বিচাৰ আৰম্ভ হয়। পত্ৰিত আৰু নিশাপী আত্মবিলাকক পোনে পোনে কৰিলে বাবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। পাপী আতাই স্বীকৰণ কালৰ কৰ্মফল অনুযায়ী শূলৰ জন্ম ন'বলৈ পৃথিৱীলৈ উভটি বাৰ লগা হয়। মহা পাপী বিলাকে ইতৰ প্ৰাণী হিচাপে পৃথিৱীত শূলৰ জন্ম ন'ব লাগে।

বলকাৰ্কাৰ মালভূমিৰ মিকালে এডোখৰ অটল গভীৰ ঠাই আছে। চাৰিওফালে থিৰ থিৰ গাঁয়ে পৰিসংকীৰ্ত্ত হৈ থকা এই আহল বহল গছবৰ পাবত থিয় হৈ তলৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে তাল তলত গোট খাই থকা ক'লা বৰণীয়া পানী একোডোঙাৰ বাহিৰে অন্য কোনো বস্তু স্পষ্টভাৱে চকুত নপৰে। থিৰ গৰা কেইটাক নানা বিধৰ বৃক মঙাই আৱৰি মাথিছে। প্ৰকৃতিৰ এই অনুপম দৃশ্য দেখিলে মনত এনে ভাবৰ উত্থাপন হয় যেন ভগৱানে প্ৰকৃতিৰ সকলো সৌন্দৰ্য ইয়াতে ধূপ খুৱাই ৰাখিছে। সেই কাৰণে বলকাৰ্কাৰ জৰণ্যভূমিক পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ অন্যতম নিদৰ্শন বুলি ক'ব পাৰি। এই অটল গভীৰ পুৰীটোক মহাদেউ গৰ্জ বোলা হয়। এনে ভূবলিত পৰিবেশৰ কাৰণে বলকাৰ্কাৰ এলেকাত থলুৱা ভাৱে বাস কৰা বন্য প্ৰাণীৰ সংখ্যা অটুট হৈ আছে। পিৰলত প্ৰবাণিত হৈছে যে বলকাৰ্কাৰত থকা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ ভিতৰত প্ৰায় একুৰি মান বিভিন্ন বন্য আৰু আকাৰৰ দেও-ছাগলীও আছে। এই পত্ৰিত ভূমিক এতিয়া বাস্তৱ উল্গান পৰ্যায়লৈ কৰাওঁতৰ কৰা হৈছে।

হেৰাও নামৰ দেও-ছাগলীবিধ পোহনীয়া ছাগলীবোৰতকৈ বহুত পৰিমাণে ডাঙৰ হোতা দেখা যায়। দেখাত এইবিধ প্ৰাণী চুৱলী মহুৰ। ইহঁতৰ দেহত কিছুমান স্বতন্ত্ৰ গুণ দেখা যায়। হেৰাওৰ সোমৰ বনৰ বগা আৰু অলপ ঠাৰঙা। এই প্ৰাণীৰ নেজ ডাল লম্বীয়া হ'লীয়া সোমৰ দৰেই একেধাৰে চুটি। শিং দুটা পাছৰ ফালে ভাঁজ খাই অলপ বুলুঙীয়া হয়। শিং বোখাৰ গুৰি ডাগত পখালি পখালিকৈ আঙুঠিৰ নিচিনা ভাঁজ থাকে আৰু এই আঙুঠিবোৰ গুৰিৰ পথা শিত্ৰৰ আধালৈকে বিয়পি থকা দেখা যায়। দ্বিত্তি আৰু গলধনৰ গুণৰ ভাৰ্য মঙহাল আৰু লকত হয়। গলধনৰ গদা আৰম্ভ কৰি অহুটোৰ আৰম্ভণি মাচিৰ ফালে হাঙলি থকা দেখা যায়। সাধাৰণতে পৰ্বতীয়া ঠাইৰ গছ গছলি নোহোৱা পিৰাচৰ পৰিবেশেই ইহঁতৰ বাসৰ উপযোগী। কেতিয়াবা কেতিয়াবা পিৰাচৰ ঠাইৰ পাখৰৰ ফাক আৰু গছবৰ দৰে স্ক্ৰুঙাবোৰত এইবিধ প্ৰাণীয়ে আশ্ৰয় লৈ থাকে। মিচেই বাতিপুৰা ভাগতে আহাৰৰ সন্ধানত এইবিধ প্ৰাণীয়ে জিবৰি খোজা ঠাইৰ পৰা ওলাই আহে। আহাৰৰ পৰতো ইহঁতে আহাৰ বিচাৰি

কুবে । দুপবীয়াৰ প্ৰথম ব'দৰ উত্থাপ ইহঁতে সহ্য কৰিব নোৱাৰে । সেই কাৰে এই সময়তে ইহঁতে আশ্ৰয় উপযোগী ঠাই বোৰত লোৱাই থাকে ।

দেও-ছাগলীক সাধাৰণতে আক বাতি বকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । ইহঁতে অকলশৰীয়াটোক চৰি কুবে । অৱশ্যে কেতিয়াবা ওচৰা-ওচৰিকৈ আগোন কৰে কেবাটাও দেও ছাগলীক চৰি কুৰা দেখা যায় । বড় আৰু বাইকী উভয়েই খেঁও কৰে । সেই কাৰে হাবিত চৰি কুৰা অৱস্থাত বড় আৰু বাইকী দেও-ছাগলীক খাচি উলিওৱা টান । হাবিৰ মাজত বা শিলাৰ পৰ্বতীয়া ঠাইত আঁঠি সহজে ইহঁতে দৌৰি দৌৰি ঘূৰি কুৰিব পাৰে । শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণী কিম্বা মানুহৰ উত্থান পালে ইহঁতে টলকতে পিঠি পলাই নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় লবলৈ বহু কৰে ।

বাইকী দেও-ছাগলীয়ে এবাৰত মাত্ৰ এটাক পোৱালি জন্মায় । অৱশ্যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম দেখা যায় ।



গড়াল

শ্ৰেণী---তৃত্যপায়ী

বৰ্গ---আৰ্ট'ওডে'ক্লা

উপবৰ্গ---বোম্বিনেটিকা

কুল---বডিদি

উপকুল---বোম্বিকোপ্ৰিনি

প্ৰজাতি---বৃন্দকাচ্ নেক্সিকলৰ

গড়াল নামৰ এবিধ ছাগলী-এণ্টেলোপ গোষ্ঠীৰ বন্যপ্ৰাণী হিমালয় পৰ্বত পল্লব পূৰ্ব প্ৰান্তত বাস কৰে। ছেবাও আৰু গড়ালক আগৰ ভাষাত 'দেও ছাগলী' বোলা হয়। অলৰৰ ভৈয়্যৰ অঞ্চলত গড়াল নামৰ প্ৰাণীবিধ বাস কৰাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ নাই। পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া ৰাজ্য কেইখনত এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে নে নকৰে সেই বিষয়ে সঠিকভাৱে জ্ঞান নাথায়। হিমালয় শৈলমালাৰ বিভিন্ন পৰ্বতীয়া পৰিবেশত গড়ালৰ বসতিস্থান সীমিত হৈ থকাৰ কথা জ্ঞান যায়। পশ্চিমৰ ফালে কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূবৰ ফালে থকা অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰ্যন্ত গড়ালৰ বসতিস্থান বিক্ষিপ্ত হৈ আছে বুলি প্ৰমাণ পোৱা যায়।

এই ছাগলী-এণ্টেলোপ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰক দুটা উপ প্ৰজাতিত বিভক্ত কৰা হৈছে। গোটেই দেহৰ নোমৰ বৰণৰ বাবে দুয়ো উপ-প্ৰজাতিৰ মাজত আংশিক ভাৱে পাৰ্থক্য তাৰতম্য লক্ষ্য কৰা যায়। কাশ্মীৰৰ পাৰ্বত্য অৰণ্যভূমিত বাস কৰা গড়ালৰ নোমৰ বৰণ নীলাগায়েক হালধীয়া হয়। মধ্য আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত সাধাৰণতে বাস কৰা গড়ালবিলাকতকৈ তুলনামূলক ভাৱে আকাৰতো এইবিধ প্ৰাণী সৰু হয়। মধ্য আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা গড়ালৰ নোমবোৰ বৰণ মুগা হোৱা দেখা যায়। দুয়োটা উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীক পৃথকভাৱে বৈজ্ঞানিক নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। কাশ্মীৰৰ পৰ্বতাঞ্চলত বাস কৰা গড়ালক "নোমৰ হেডচ্ গড়াল গড়াল" বোলা হয়। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ বিভিন্ন ঠাই বাস কৰা নিম্ন গড়ালৰ বৈজ্ঞানিক নাম "নোমৰহেডচ্ গড়াল হড্‌চনি।"

কাশ্মীৰৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলক কেন্দ্ৰ কৰি হিমালয় শৈলমালাৰ পশ্চিমাংশত যিবিলাক গড়াল বাস কৰে সিহঁতৰ নোমৰ বৰণ হালধীয়া হয়। এই নোমৰ ওপৰত চিটিকনিৰ

দেবে এক প্রকার ক'লা বৰণীয়া দাগ দেখা যায়। জন্তু ভেদে এই নোমৰ বৰণত তাৰতম্য থাকে। শূত্ৰৰি আৰু গালৰ নোমবোৰ বগা হোৱা দেখা যায়। দ্বিতীয় বিধ গড়ালৰ নোমত ক'লা বগাৰ ছিটিকনি থকা দেখা নাযায়। ইহঁতৰ পিঠিৰ ওপৰেদি ৰাজহাড় ডালৰ তাঁছে তাঁছে নেজৰ গুৰিলৈকে ৰিয়পি এডাল দীঘল চানেকীয়া পট্ট থাকে।

গড়ালৰ সচৰাচৰ বসতি স্থানে ভাৰতৰ ভৌগোলিক চাবিশীমা অতিক্ৰম কৰি পূবৰ ফালে ব্ৰহ্মদেশৰ কিছুমান ঠাইলৈকে ৰিয়পি পৰিছে। ব্ৰহ্মদেশত গাধাবণতে বাগ কৰা গড়ালবিনাকৰ নেজডাল অলপ দীঘল হয়। হিমালয় পৰ্বতৰ শিলাময় ঠাইতো গড়ালে বাস কৰিবৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশ বিচাৰি পায়। এনেবোৰ শিলাময় ঠাইত গছ-গছনি বৰ পাতল। পাখৰৰ ফাঁকে ফাঁকে থকা মাটিবোৰৰ পৰা যিবোৰ গছ ওপৰলৈ



ওলাই আছে সেইবোৰ গছৰ ছায়াই ঠাইডোখৰ শীতল কৰি ৰাখে। কিছুমান ঠাইত পাখৰৰ চটাবোৰ হেলনীয়াটক বাহিৰৰ ফালে ওলাই থকা অৱস্থাত দেখা যায়। এনেবোৰ ঠাইতে আশ্ৰয় লৈ জিহণিৰ সময়হিমা নিৰলৈ অতিবাহিত কৰে। বাতিপুৱা বেলি ওলোৱাৰ লগে লগেই ইহঁতে আশ্ৰয় লৈ থকা ঠাইৰ পৰা লাহেহেঁচ ওলাই আহি ঘাঁহ-বন বিচাৰি ইফালে-সিফালে ঘূৰি ফুৰে। ডৰ দুপৰীয়া ইহঁতে জিহণি ল'বৰ বাবে সুবিধাজনক ঠাই বিচাৰি লয়। আবেলি পশ্চিম আকাশত বেলি নাৰ যোৱাৰ আগে আগে গড়ালবোৰে আকৌ চৰিবলৈ ওলাই আহে। সন্ধিয়াৰ আগে আগে পুনৰ নিজৰ ঠাইত জিহণি লয়গৈ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতৰ দুই এটাক অকলশৰীয়াটক ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়। কেতিয়াবা কেইবাটাও গড়াল লগ লাগি একোটা দল বা জাকৰ সৃষ্টি হয়।

এইবিধ প্ৰাণীৰ মাইকীজনীয়ে এবাৰত মাত্ৰ এটাক পোৱালি জন্মায়। কেতিয়াবা অৱশ্যে এই নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়।

টাকিন

শ্ৰেণী----স্তন্যপায়ী

বৰ্গ----আৰ্ টিওডেণ্টিনা

উপাবৰ্গ----বেমিনেণ্টিয়া

কুল----বডিদি

উপকুল----ৰোথিকৈপ্ৰি:

প্ৰজাতি----বুদৰকাচ্ টেজিকলৰ

টাকিন নামৰ এবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ফালে থকা হিমালয় প্ৰিবিমালাৰ পৰ্বতীয়া ঠাইত বাস কৰে। ঠাই অনুযায়ী ইয়াৰ কেবাটাও উপ-জাতি বাস কৰাৰ কথা জনা যায়। তাৰ ভিতৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মিছিমি পাহাৰ অঞ্চলত বাস কৰা উপ-প্ৰজাতিক “মিছিমি টাকিন” বোলা হয়। সেৱাৰ গৰুৰ নিচিনা হ’লেও এইবিধ প্ৰাণীক ছাগলী--এণ্টেলোপ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। ভাৰতবৰ্ষত ছেৰাও আৰু আৰু গড়ালক লৈ টাকিনৰে সৈতে সৰ্ববৃদ্ধ তিনিবিধ ছাগলী--এণ্টেলোপ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰে। ছাগলী--এণ্টেলোপৰ দেহৰ পৃষ্ঠৰ প্ৰাণীৰ সন্পৰ্কে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি অহা হৈছে। আমেৰিকাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ বৰকে গৰুকা ঠাইবোৰত “মাক্স অল্ল” নামৰ এবিধ সন্গোষ্ঠীৰ বন্যপ্ৰাণী বাস কৰে। সেই প্ৰাণীৰ লগত টাকিনৰ বহুতথিনি সাদৃশ্য থকা দেখা যায়। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মুকলি মূৰীয়া হাবি খননি বিলাকত নু বা ৱাইল্ড বিষ্ট নামৰ যিবিধ প্ৰাণী বাস কৰে সেইবিধ প্ৰাণীৰ লগতো টাকিনৰ বহুতথিনি সাদৃশ্য থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৱশ্যে “নু” নামৰ প্ৰাণী বিধ এণ্টেলোপ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বুলিহে গণ্য কৰা হয়। দেও-ছাগলী, টাকিন আৰু মাক্স অল্লক ছাগলী--এণ্টেলোপ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বুলি ধৰা হয়।

টাকিন জাতীয় প্ৰাণীৰ দেখাত শুৱনী এই বিচিত্ৰ আকাৰৰ প্ৰাণীবিনাকৰ বৈশিষ্ট্য এইবিধ প্ৰাণীৰ দেহত বিকশিত হোৱা গুণাৱলীয়ে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছে। মিপোতল পৰ্বীৰ আৰু চুটি-চাপৰ ঠেং চাৰিখনৰে সৈতে ইয়াক এটা শক্তিয়ান জন্তু বুলি ক’ব পাৰি। ইয়াৰ ভিত্তি আৰু গনধন অস্বাভাৱিকভাৱে মোটা আৰু বঙহাল হয়। মূৰৰ অৰ্দ্ধাংশ আৰু কপালখনৰ গঢ় গৰুৰ নিচিনা। জন্তুৰ গঢ়ৰ সৈতে অধিকল মিল দেখা যায়। ইয়াৰ শিং বোৰা এক প্ৰকাৰৰ বস্তুভীয়া হয়। মূৰৰ ওপৰত থকা শিং বোৰাই দুয়ো-কালে কেনে ঠাইলৈ সৰুকোণী ভাৱে ওপৰ মূৰা হৈ জনপ পাহৰ ক’ল দাল ৰাই

থাকে। অস্ত্রটোৰ নাক মুখৰ চাৰিওফালে থকা নোমহীন ঠাই ভোখবৰ বাহিৰে শৰীৰৰ অন্যান্য ঠাইত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বং ডাৰ বৰণীয়া হোৱা দেখা যায়। আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে টাকিনৰ কেইবাটাও উপপ্রজাতি আছে। তাৰ ভিতৰত মিছিমি টাকিন নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি ভূটান আৰু চিন্তিনৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিনানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত থকা মিছিমি পাহাৰলৈ বিয়পি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চানিগীয়া অতিক্ৰম কৰি এইবিধ টাকিনৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি পূবে ব্ৰহ্মদেশৰ কোনো কোনো বনভূমিৰ মাথটোকে সম্ভ্ৰাসাবিত হৈছে।



টাকিন গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকে সাধাৰণতে বিয় পৰাৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিনাকত আপোন মনেৰে বিচৰণ কৰি কুৰিৰলৈ ডাল পাৰ। নিম্নোৰ পৰ্বতীয়া ঠাইত নানা বৰণৰ গছ-গছনিৰ উৎপত্তি হয় আৰু ব'ত মানুহৰ সন্মুখৰ নিচেই কম ভেনেবোৰ ঠাইকে নিগাজী-টক বাস কৰিবৰ বাবে টাকিনবিলাকে নিৰ্বাচন কৰি লয়। হিমালয় শৈলমালাৰ বৰক বেখাৰ নামনি ভাগত থকা পৰ্বতীয়া ঠাই কিছুমানত বৰ ডাঙৰ আকাৰৰ গছ থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ভেনেবোৰ পৰ্বতীয়া ঠাইত বোভোভেজৰ প্ৰভৃতি বৰলীয়া আকাৰৰ অচিনাকি গছ কিছুমানৰ উৎপত্তি হয়। নিৰ্ভল সেবেকা বতাহে এনেবোৰ পৰ্বতীয়া

ঠাই চিৰকাল শীতল কৰি ৰাখে। টাকিন জাতীয় কিছুমান জানোৱাৰে এনেবোৰ ঠাইটো আৰোহণ কৰি গৰমৰ দিনবোৰ অতিবাহিত কৰে। এইবিধ প্ৰাণীকো জাক পাতি সমূহীয়াকৈ ৰাস কৰা দেখা যায়। গৰমৰ দিনত সৰু সৰু জাকবোৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা প্ৰাণীবিলাকে এনেবোৰ আওহতীয়া ঠাইতে গোটপিট খাই একো একোটা প্ৰকাণ্ড জাক বা জুনৰ সৃষ্টি কৰে। জাৰ কালি আহি পালে ইহঁতে পুনৰ সৰু সৰু জাকত বিভক্ত হৈ স্বাধীন মনেৰে বিচৰণ কৰি ফুৰে। ডাঙৰ জাক একোটাৰ মাজত চিনিব নোৱাৰাকৈ মিহলি হৈ পৰিলেও খুদ্ৰ জাকৰ প্ৰাণীবোৰে পুনৰ লগ হৈ জাকটোৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি অহাত অকণো অসুবিধা নহয়।

চ'ত বহাগ মাহত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ মাইকীৰোবে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি অগোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।



গাহৰি ফৈদৰ প্ৰাণী

গাহৰি আৰু পিকাৰি নামেৰে জনাজাত দুবিধ গম্ভীৰ প্ৰাণীক জীৱ অঙ্গতত এখন সচীয়া আসাদিয়া দেখুওৱা হয়। এই দুই কৃষ্ণৰ কাৰণে স্থাননিৰ্ণয় কৰা পৰিয়ালটোক 'চুইদি' বোলা হয়। পিকাৰি নিদ্ৰুমান বিশেষ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণ ভিন্নৰূপে প্ৰকাশ পোৱাত ইয়াৰ নাম পিকাৰি নামৰ এটা উপ-পৰিয়ালৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। গাহৰিৰ ঠেঙৰ আগ ভাগত নখৰ পৰিবেৰ্তে খুৰা থাকে আৰু গৰ, ম'হ, ছাগলী, ভেড়া আদি পৰিৱৰ্তে হস্তৰ প্ৰত্যেকটো ঠেঙত দুটাকৈ খুৰা থাকে। এইবিলাক প্ৰাণীয়ে অৱশ্যে বাল্যগামত্ৰী পাওৱা নাহয়। সেইবাবে সিহঁতৰ পাণ্ডুলি খোৱা প্ৰাণী বোলা নহয়।

গাহৰিৰ বৰঙতা হৈছে আঢ়ৈ আৰু বিভিন্ন জাতৰ বনৰীয়া গাহৰিক এচিয়া ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বিভিন্ন পৰিবেশত বাসকৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনহাতে পিকাৰি গোষ্ঠীৰ আটাইবোৰ প্ৰাণীয়েই পশ্চিম গোলার্ধত পোৱা যায়। সকলো গাহৰিৰ নখৰ দৰে ঠেঙৰ পাছফালে আঁঠুতেও থাকি থকা খুৰাৰ পূৰ্ণবিকাশ নহয়। গাহৰিৰ ওপৰ পাবিত দুটাকৈ দীঘল দাঁত থাকে। এই দাঁত দুটাই হাতীৰ দাঁতৰ দৰে বিশিষ্ট ৰূপ ধৰিণ কৰে।

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা বনৰীয়া গাহৰিৰ শাৰীৰিক গুণৰ ভিন্নতাৰ বাবে কেইবাটাও প্ৰজাতিত ভাগ কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষ আৰু শ্ৰীলঙ্কাৰ গাহৰিক ইউৰোপ মহাদেশৰ গাহৰিৰ উপ-প্ৰজাতি বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা গাহৰিক একেটা প্ৰজাতিতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। কিন্তু আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত থকা দুবিধ গাহৰিক বেলেগ বেলেগ বৈজ্ঞানিক নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। ঠিক সেইদৰে শ্ৰীলঙ্কাৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা গাহৰি জাতীয় প্ৰাণীবোৰক এটা বেলেগ বৈজ্ঞানিক নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে পিগ্মি হগ বা নলগাহৰি নামেৰে এবিধ সৰু আকাৰৰ গাহৰি জাতীয় প্ৰাণী অসমৰ পূৰ্বাঞ্চলত দেখা যায়। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ গাহৰি জাতীয় বনৰীয়া প্ৰাণী কেইবিধৰ ভিতৰত "বাৰ্চ হগ" নামেৰে জনাজাত গাহৰি বিধ দেখাত গুৱনি নহয়। ইয়াৰ বাহিৰে চাহাৰা বৰুভূমিৰ দক্ষিণ অঞ্চলত আন তিনিবিধ বনৰীয়া গাহৰি বাস কৰে। এই তিনিবিধ গাহৰিক ক্ৰমে বুচ-পিগ, বিভাৰ হগ আৰু ফৰেষ্ট হগ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়।

আমেৰিকা মহাদেশত পিকাৰি শ্ৰেণীৰ কেইবিধমান প্ৰাণীয়ে গাহৰি জাতীয় প্ৰাণীবোৰৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে।

নল-গাহৰি

নল---গাহৰি

শ্ৰেণী---সুন্দৰপাৰী

বৰ্গ---আৰাট ৩ ডেইলি

কুল---চুইদি

প্ৰজাতি---


(১)- পৰকুল। চাল্‌ডানিয়াচ

(২) চাচ্‌ চাল্‌ডানিয়াচ

বৃক্ষপ্ৰৱৰ উত্তৰ পাৰৰ কিছুমান বনভূমিত নল-গাহৰি নামৰ এবিধ সৰু আকাৰৰ গাহৰি আলোঙে আলোঙে বাগ কৰা দেখা যায়। পৃথিৱীত আজিকোপতি জীৱিত অৱস্থাত থকা গাহৰি আতীয়া শ্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত নল-গাহৰি বা পিগ্মি হগ নামৰ শ্ৰাণীবিধেই আকাৰত আটাইতকৈ সৰু বুলি জনা গৈছে। আকাৰত এইবিধ গাহৰি ইমান সৰু হয় যে প্ৰকৃতপক্ষে ইয়াক বনৰীয়া গাহৰিৰ এটা ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ বুলি ক'ব পাৰি। হাৰিৰ মাজত হুৰি ফুৰা নল-গাহৰি কেইটামান দেখা পালে সেই কেইটা শ্ৰাণীক বনৰীয়া গাহৰিৰ পোৱালি যেন লাগে। ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ এইবিধ গাহৰিক পিগ্মি হগ বোলাটো সৰীচীন হৈছে। তাকে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত বাওনা গাহৰি অথবা গঁঠীয়া গাহৰি নামেৰে নামকৰণ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। ইতিমধ্যে নল-গাহৰি শব্দটোৱে স্বামীভাৱে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাত তাকে আমাৰ ভাষাত গহণোপযোগী বুলি বিবেচনা কৰা হ'ল। জন্তুটোৰ অঙ্গপ্ৰত্যঙ্গৰ আকৃতি-প্ৰকৃতিত নল-গাহৰিৰ কিছুমান নিজস্ব গুণ প্ৰকাশ পোৱা দেখা যায়।

নল-গাহৰিৰ দেহৰ সন্মুখৰ ভাগ পাছৰ ভাগতকৈ তুলনামূলকভাৱে অলপ কীণ। সেই অনুপাতে জন্তুটোৰ পাছফালৰ অংশ অলপ বেছি শক্ত বেন লাগে। আমাৰ এই ফালৰ ছানি-বলনিবিলাকত থকা বনৰীয়া গাহৰিৰ দেহৰ গঠনত এইবোৰ গাহৰিৰ সাদৃশ্য দেখা নাযায়। বনৰীয়া গাহৰিৰ দেহৰ আগ ভাগ বেছি বৰ্জাল বাবে শক্ত দেখি। নল-গাহৰিৰ আন এটা শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল বনৰীয়া গাহৰিৰ মূৰৰ তুলনাত নল-গাহৰিৰ মূৰটো অলপ চুটি; আৰু আঁৰফালে জৰে সৰু হৈ বোৱা বাবে দীঘলীয়া দেখি। অনুপৰি ভাঙৰ আঁতৰ বনৰীয়া গাহৰিৰ নেজডালৰ তুলনাত নল গাহৰিৰ নেজডাল চুটি।

আচলতে নল-গাহবিৰ নেজডাল ইমান চুটি যে পোন ছাটেই ইয়াৰ নেজৰ চিনচাব আছেনে নাই ঠাৱৰ কৰা টান। তদুপৰি নল-গাহবিৰ মাজে তিনি বোৰাকৈ পিৱাহ থাকে। সাধাৰণ আভৰ বনবীয়া গাহবিৰ বুকুত কিন্তু চাৰি বোৰাকৈ পিৱাহ থকা দেখা যায়। এইখিনি শাৰীৰিক গুণৰ বৈষম্যলৈ লক্ষ্য ৰাখি কোনো কোনো জীৱবিদে মত প্ৰকাশ কৰে যে নল-গাহবিক এটা জাতিগত নামেৰে বৈজ্ঞানিকভাৱে পৰিচয় কৰা আবশ্যিক। সেই কাৰণে যদিও পূৰ্বতে এই জন্তুবিধক পৰকোলা চালভানিয়াচ' নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল, আধুনিক যুগৰ জীৱবিদসকলৰ বহুতে ইয়াক চাচ্ চালভানিয়াচ্' নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগ বঢ়াইছে। দুয়োকুল ৰক্ষা কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে কোনো কোনো জীৱবিদে এইবিধ জন্তুৰ বুজাবলৈ চাচ্ (পৰকোলা) চালভানিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰা উচিত হ'ব বুলি বিবেচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।



নল-গাহবি

জন্তুটোৰ সন্মুখ ভাগৰ ওপৰ অংশত থকা নোৰ বোৰ অলপ বিঠা বৰণী-য়াতকৈ বগা হয়। তদুপৰি শৰীৰৰ সন্মুখৰ ফালে থকা নোৰবোৰ তুলনামূলকভাৱে চুটি যোৱা দেখা যায়। জন্তুটোৰ গলধন আৰু ডিঙিৰ ওপৰ অংশত সাধাৰণ বনবীয়া গাহবিৰ দৰে দীঘল নোৰ বা কেশৰৰ দৰে ফাল থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শাৰীৰিক গুণত এইখিনি ভাবভাৱ থকাৰ বাবে নল গাহবি জাতীয় প্ৰাণীৰ চিনাক্তকৰণ সহজসাধ্য হৈছে। কঁকাল আৰু বুকুৰ মাজ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শৰীৰৰ পাছৰ অংশত গজা নোৰ অলপ দীঘলীয়া হোৱা দেখা যায়। কাছৰ পাছৰ অংশত থকা নোৰবোৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া আৰু অসংখ্য বকৰে ঠুৰঙা হোৱা দেখা যায়। মূৰৰঙলৰ ঠিক পাছৰ ফালে গজা নোৰ-বোৰ অলপ ক'লা হয়। জন্তুটোৰ লম্বা দেহৰ আটাইবোৰ নোৰ নেজৰ ফালে দি

খাই থকা দেখা যায়। এই জাত গাহৰিৰ চুটি নেজডালত নিচেই পাতলটক চুটি চুটি নোম থকা দেখা যায়। নেজডাল ইয়ান চুটি যে মিলগৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে জন্তুটোৰ কটি দেশত যে এডাল নেজ আছে সেই কথা ঠাৱৰ কৰা টান হৈ পৰে। কাণদুখনৰ ওলত আৰু তাৰ দিক পাছৰফালে থকা সামান্য অংশত নোম গজা দেখা নাযায়।

নল-গাহৰিক ঘৰচীয়া জন্তুৰূপে ৰখা দেখা নাযায়। দুই এটা প্ৰাণীক সৰুতে জঙ্গলৰ পৰা ধৰি আনি মৰামেৰে বালন পালন কৰিলে সি যে পোহ মানৱ মনোবুদ্ধি প্ৰদৰ্শন কৰে সেই কথাৰ অৱশ্যে প্ৰমাণ পোৱা যায়। সন্তৰ দৰ্শকৰ শেষ ভাগমান ন মানাহ ব্যায় যোজনান সঞ্চালক এীসজয় কুমাৰ দেৱ ৰয়ে বৰপেটা ৰোডত থকা তেওঁৰ বাস-ভৱনত অতি মৰমেৰে এটা নল-গাহৰি প্ৰতিপাল কৰি ৰাখিছিল। জন্তুটোৰ গাও পোহনীয়া জন্তুৰ আটাইখিনি গুণ দেখা গৈছিল। তেওঁ এই প্ৰাণীটোক কোনো গডাল বা সজাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি নবখাটকয়ে মুকলি যৱস্থাত ঘৰত প্ৰতিপাল কৰি ৰাখিছিল। জন্তুটোৱে গিৰিহঁতৰ বাইক-বচন মানি চলিব প্ৰবৃত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। আনকি গিৰিহঁতে ওচৰলৈ মাতিবলৈ সি মৰম পোৱাৰ আশাত কাঁচাপি আহিছিল আৰু ঘৰচীয়া কুকুৰ-মেকুৰীৰ দৰে গাতে গা লগাই ৰহিছিল।

মানৱ জাতিয়ে অতি পুৰণি কালৰে পৰা নানা জাতিৰ বনৰীয়া জন্তুক ঘৰচীয়া কৰি পুহিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে। এই চেষ্টা এতিয়ালৈকে অব্যাহতভাৱে চলি আছে বুলি ক'ব পাৰি। নল-গাহৰিনো কিয় ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হ'বলগীয়া হ'ল সেই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে জনা নাযায়। এইবিধ প্ৰাণীৰ স্বাভাৱিক বাসস্থান আৰু বিচৰণ ভূমিৰ অন্তৰ্গত বাস কৰি থকা কোনো থলুৱা লোকে এইবিধ প্ৰাণীক ঘৰচীয়াকৈ পোহাব এৰে। প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। জন্তুবিলাক ক্ৰমে দুপ্ৰাপ্য হ'বলৈ ধৰাত আৰু লাহে লাহে ইহঁত পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বিলুপ্ত হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখাত ইয়াক ঘৰচীয়া কৰা কপাটো ক্ষীণ হৈ আহিবলৈ উপক্ৰম কৰিলে। এই সম্পৰ্কত গাহৰি আৰু পিকানি

গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰাণীৰ বিশেষজ্ঞ দলৰ সদস্য উইলিয়ামচন অলিভাৰৰ মন্তব্য মন কৰিবলগীয়া। তেওঁ সংকলন কৰা 'পিগমি হগ' নামৰ পুস্তিকাত উল্লেখ কৰিছে যে ১৯১৪-১৫ খ্ৰীষ্টাব্দত বালিনৰ চিৰিয়াখানাত মাত্ৰ এটা সৰু আকাৰৰ গাহৰি শ্ৰেণীৰ প্ৰাণী প্ৰতিপালন কৰি ৰখা হৈছিল। চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই এই মাইকী গাহৰিজনীক পিগমি হগৰ আদিবাসী প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰাৰ মনোভাৱ পোষণ কৰিছিল। পূৰ্ব এতিয়াৰ কালৰ কোনো কোনো মানুহে ঘৰত পোহ। এবিধ গাহৰি এই পিগমি হগৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে বুলি তেওঁলোক প্ৰত্যয় গৈছিল। কালক্ৰমত এই ধাৰণা সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। কিয়নো নল গাহৰিৰ প্ৰাৰম্ভিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাবলী এই গাহৰি জনীৰ দেহত প্ৰতিফলিত হোৱাৰ পোনপটীয়া প্ৰমাণ পোৱা নগ'ল।

লণ্ডনত থকা বৃটিছ প্ৰাকৃতিক বুৰঞ্জী সংগ্ৰহালয়ৰ ভূতপূৰ্ব সঞ্চালক চাৰ্লচ টানে বিগেনে সংকলন কৰা আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৩৬ চনতে প্ৰকাশ পোৱা প্ৰাকৃতিক বুৰঞ্জীৰ বৃহৎ গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰিছে যে নল গাহৰিৰ সচৰাচৰ বসতি স্থান আৰু বিচৰণ ভূমি নেপাল আৰু ভূটানৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত বুলি ক'ব পাৰি। পৰৱৰ্তী কালত এইবিধ

প্ৰাণীৰ বসতিস্থান উত্তৰ বঙ্গ আৰু অসমৰ পশ্চিমাংশলৈ বিস্তাৰিত হৈ থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। খেতি পথাৰৰ বাবে পৰ্বতৰ কাষৰ হাৰি-বননিৰোৰ অফালৰ পৰা কাটি কাটি যোৱাৰ বাবেই যে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক বিপদা সংস্থানলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল সেই কথা দোহাবিবৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমৰ পশ্চিমাংশত থকা শালনি হাৰিবোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৰং জিলাৰ বৰনদী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰ্যন্ত থকা বনভূমিবিলাকৰ কিছুমান নল-গাহৰি থকাৰ কাৰণে উপযুক্ত ঠাই। নল, খাগৰি, হকৰা আদি ঔষধিৰ গাঁহ-জাতীয় উদ্ভিদে প্ৰাধান্য লাভ কৰা সন্নিৱিষ্ট এইবিধ প্ৰাণীয়ে বাস থকা দেখা যায়। মানাহ অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত ইবৰাণি আৰু বনতানিৰোৰত নলগাহৰি থকাৰ অপৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ স্থানীয় বনকৰ্মচাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে।

১৯৭১ খ্ৰীষ্টাব্দত দৰং জিলাৰ বৰনদী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ গাঁতে গা ভাগি থকা আখাৰিখেট চাহ-বাগিচাত গোটাচেৰেক নল গাহৰি জীৱিত অৱস্থাত কৰায়ত্ত কৰা হৈ বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি অনুৰাগী ব্যক্তিসকলে গম পালে যে এইবিধ প্ৰাণী দেখোন এতিয়াও নাইকিয়া হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাত আটোমটোকাৰিতক এটা আবেষ্টনী নিৰ্মাণ কৰি তাত এইবিধ আপুৰুকীয়া প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ আঁচনি লোৱা হ'ল। সেই আঁচনি ফলৱতী হোৱাৰ পোনপটীয়া প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে সাব্যস্ত হোৱা নাই। ইংলণ্ডৰ জাচি বন্যপ্ৰাণী ন্যাস সমিতিৰ তফাৰ পৰাও চুইডাৰলেণ্ডৰ জুৰিক চিৰিয়াখানাত তদনুকূপ ব্যৱস্থা হাতত ল'লে। আৱ্যাকীয়া মাইকী নল-গাহৰিৰ অভাৱত সেই গাঁচনিও ফলৱতী হোৱা নাই। অসম উপত্যকা বন্যপ্ৰাণী সমিতিয়ে গুৱাং অভয়াৰণ্যত প্ৰতিষ্ঠা দৰা আহল বহল প্ৰাকৃতিক আবেষ্টনীত কেইটামান নল গাহৰি মেলি দি বংশ বৃদ্ধিৰ বাবে যি আঁচনি প্ৰবৰ্তন কৰিছিল সিও ফলৱতী হোৱা নাই এণোন।

বৰনদী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কিমান সংখ্যক নল-গাহৰি আছে সেইটো ভালদৰে জনা নাগায়। অৱশ্যে ইতিমধ্যে এই বনভূমিক অভয়াৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি নল-গাহৰিৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মানাহ অভয়াৰণ্যত প্ৰায় চাৰিশাল নলগাহৰি আছে বুলি কোৱা হৈছে। এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'লে বন্যপ্ৰাণী জগতত এক নতুন অভিলেখৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি।



বনবীয়া গাহবি

শ্ৰেণী—তৃতীয়া

বৰ্গ—আৰটিওভেট্টা

গোত্ৰ—চুইবি


প্ৰশাস্তি—চাচ্ স্ক্ৰফা ক্ৰেট্টাচ্

অসমৰ তাৰি-বুননিবিলাকৰ কোনো কোনো ঠাইত এবিধ বনবীয়া গাহবি বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ কিছুমান মানুহে পোহা গাহবি বিধৰ লগত হাবিত থকা গাহবি বিধৰ বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। অৱশ্যে আকাৰত প্ৰায় সমান হ'লেও বনবীয়া গাহবিৰ দেহত কিছুমান বৃহত্তৰ শাৰীৰিক গুণ দেখা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ দ চানেকীয়া আৰু ঘাঁহ-বন জাতীয় উদ্ভিদে প্ৰাধান্য লাভ কৰা পৰিবেশত এইবিধ প্ৰাণী পোৱা যায়। দিন-ৰাতিৰ কোনো ভেদাভেদ নৰখাটক এইবিধ প্ৰাণীয়ে আহাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত ইফালে-সিফালে ঘূৰি ফুৰে। সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি সময়ত ইহঁতে বুকলি মূৰীয়া ঠাইলৈ ওলাই আহে। সন্ধিয়া আৰু ৰাতিপুৱাৰ ডোকমোকালিৰ সময়ত ইহঁতে শস্য ক্ষেত্ৰত সোমাই শস্যৰ ছানি-বিধিনি ঘটায়। খেতিয়কসকলে বনবীয়া গাহবিৰ পৰা শস্য বৰ্ণা কবিবৰ বাবে গছৰ ওপৰত টিঙি কৰ সাজি দিনে-নিশাই গাহবি খেদাৰ বাতৰু কৰে। সপ্তৰত্নলত বগুৰুকেৰে গুলিবিদ্ধ কৰিও অভিন্ন চিকাৰীয়ে গাহবি বধ কৰে। এইদৰে বৰা গাহবিৰ মাংস সকলোৱে বিনিজুলি খায়।

বনবীয়া গাহবি জাতীয় প্ৰাণীৰ শৰীৰত গছা সবুজ নোমবোৰ ঠাৰঙা হয়। এই নোমবোৰ ইমান পাতল যে ক'লা বনবীয়া ছালখনৰ ওপৰত এই নোমৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা কঠিন হৈ পৰে। তদুপৰি ছালখনৰ বৰণ ক'লা হোৱাৰ বাবে নোমৰে সোঁত পোটেইটো প্ৰাণী একপ্ৰকাৰৰ বগা-ক'লা বনবীয়া হয়। সুৰৰ সন্মুখ ভাগৰ পৰা বাজ-হাড়ৰ ওপৰলৈ দেখা বৰা ভাগলৈ কিছুপি একোছা নোম উৎপত্তি হয়। গলখনৰ ওপৰত গছা এই ঠাৰঙা নোমৰ বাবেই জন্তোটক সহজে চিনিব পাৰি। অৱশ্যে অলপ নিলগৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা উপবিভাগত এসে ধৰণৰ নোম থকা দেখাটো ভালদৰে বৰিষ নোৱাৰি। কম বয়সীয়া গাহবিৰ গাভৰু ক'লা নোমৰ বগা বৰৰ দানাল্য চিটি-কমি দেখা যায়। বয়স হোৱাৰ লগে লগে গোটেই গাঁৱ নোমবোৰ ক'লা হোৱা দেখা

যায়। নতুনকৈ জগা পোৱালি গাহৰিৰ নোমৰোৰ সুগা বৰণীয়া হয়। এই নোমৰ উপৰি ভাগত একপ্ৰকাৰৰ দীঘল পহীয়া পাৰি থকা দেখা যায়। ক্ৰমে ক্ৰমে এই পট্টবোৰ গাইকিয়া হৈ হৈ অৱশেষত সম্পূৰ্ণৰূপে অদৃশ্য হয়। যত গাহৰিৰ এযেনেটক-হাতীৰ দাঁতৰ নিচিনা বাহিৰলৈ ওলাই অহা দাঁত থাকে। এই দাঁতবোৰে চাৰি গিৰী-মাকে চেপেটা ৰূপ ধাৰণ কৰে। অনজাতীয় ভিৰাতো বিছুমান এই দাঁত অংকনৰূপে ডিঙিত পৰিধান কৰে।

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সচৰাচৰ থকা বনৰীয়া গাহৰিক ইউৰোপ মহাদেশীয় বনৰীয়া গাহৰিৰ অন্যতম প্ৰতিভূ বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ মানুহে যদ্যত পোহা গাহৰিৰ জাতৰ গাহৰি এই বনৰীয়া গাহৰিৰ বংশধৰ বুলি বিশেষত্বসকলে ক'ব খোজে। ভাৰতৰ



বনৰীয়া গাহৰি

ভৌগোলিক সীমাবেধা অতিক্ৰম কৰি ভাৰতৰ বনৰীয়া গাহৰিৰ বাসস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি এচিয়া মহাদেশৰ অন্যান্য কেবাখনো দেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। তাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মদেশ, থাইলেণ্ড, মালয়চিয়া আদি দেশৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। তদুপৰি বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলঙ্কাতো এইবিধ গাহৰি দেখিবলৈ পোৱা যায়।

ঠাই অনুযায়ী বাস ক'ৱা বনৰীয়া গাহৰিৰ গাত কিছুমান নিজস্ব শাৰীৰিক গুণ দেখা যায়। জীৱবিসংকলে এই ধৰণেৰে বিকাশপ্ৰাপ্ত অন্তৰ্জাতিক আঞ্চলিক ভেটিত কেইবাটাও উপজাতিত ভাগ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চল আৰু শ্ৰীলঙ্কাত নিম্না-জাতকৈ থকা গাহৰিক 'চাচ্' শব্দক 'জিষ্টেচাচ্' নামৰ এটা উপ-প্ৰজাতিত স্থান দিয়া হৈছে। আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপ-পুঞ্জৰ বনৰীয়া গাহৰি দুবিধক ক্ৰমে 'চাচ্-জিষ্টেচাচ্' আন্দামনেচিচ্ আৰু 'চাচ্-জিষ্টেচাচ্ নিকোবাৰিকচ্' নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে।

ধৰচীয়া গাহৰিয়ে বহুতো পৰিসাৰণৰ ঋণ্য ইজম কৰিব পাৰে। এই বিষয়ত বনৰীয়া গাহৰিও অৱশ্যে পিছ পৰা ধিখ নহয়। খান, বাহ, আল, কচু আদিৰ বাহিৰেও নানা বিধৰ উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যও ই সমানে খাব পাৰে। তদুপৰি কেঁচু, কুমটি, কীট-পতঙ্গ আদি আমিষ খাদ্যতো মুখ দিবলৈ ইহঁতে অকণো সঙ্কোচ বোধ নকৰে। মুখৰ আগভাগ নেতুসেতুকৈ চকনীয়া ছোৱা দেখা যায়। লৰাৰ চৰাৰ পৰা ওঠ দুচটাৰ সহায়ত জন্তোটোৱে অতি সহজে খোৱা বস্তুবোৰ মুখৰ ভিতৰলৈ নিব পাৰে। দাঁতৰে খাদ্যখিনি ততাতৈয়াকৈ চোবাই পেটলৈ পঠিয়াই দিয়ে।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰে পাঁজৰে ওখ-চাপৰ ঘাঁহ-বনেৰে ঢাক খাই থকা মুকলি ঠাইত কেইটামান এনে গাহৰি দেখা যায়। বিলৰ পাৰৰ কুমলীয়া ঘাঁহেৰে ভৰা ঠাইতো হৰিণ জাতীয় প্ৰাণীৰ লগত একেলগে এইবিধ প্ৰাণীৰ দুই-চাৰিটাক একান্ত মনেৰে চৰি ফুৰা প্ৰায়ে দেখা যায়। বাঘ আদি মহাপৰাক্ৰমী হিংসাকুৰীয়া প্ৰাণীৰ পৰা আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ বনৰীয়া গাহৰিয়ে অন্যান্য তৃণভোজী প্ৰাণীৰ ওচৰে-পাঁজৰে চৰি থাকে।

বনৰীয়া গাহৰিয়ে আঁকপাতি একেলগে থাকে। সাধাৰণতে মাক পোৱালিৰ একোটা সৰু পৰিয়ালক বয়সীয়া আন কেইটামান গাহৰিয়ে অনুসৰণ কৰি ওচৰে-পাঁজৰে একান্ত মনেৰে চৰি ফুৰা দেখা যায়। সিহঁত মখাই তলমূৰ কৰি খুচুখুচাই খুচুখুচাই খোৱা বস্তুৰ অনুসন্ধানত আগ বাঢ়ি গৈ থাকে। শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণী ওচৰ চাপি অহাৰ উমান পালে গোটেই মখাই ছিটিকি পলাই জোপোহা, ঘাঁহ-বন, নল-খাগৰি, ধৰতা আদিৰে ভৰ-পূৰ হৈ থকা গছ-গছনিৰ আঁৰত লুকাই আত্মৰক্ষা কৰে।

ওখ ঘাঁহ আৰু জোপোহা গছৰ তলতে নান। ধৰণৰ জেং-জাবৰ গোটাই লৈ ইহঁতে পোৱালি জগাবৰ বাবে খোৰোং একোটা বনাই লয়। একোবাবত এজনী গাহৰিয়ে চাৰি-পাঁচটা পৰ্যন্ত পোৱালি জগায়। পোনেই জগা পোৱালিৰ দেহত নোম নগজে।



দন্তহীন আৰু জিভাৰে চেপ্তাকৈ খোৱা প্ৰাণীসমূহ

পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা কিছুমান স্তন্যপায়ী জন্তুৰ মূখত কোনো দাঁত গণনা দেখা নাযায়। এনেবিলাক বিচিত্ৰ প্ৰাণীক একেলগে লগাই জীৱ-বিজ্ঞানীসকলে দন্তহীন প্ৰাণী নামৰ এটা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। তাৰে দুই এবিধ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত গুৰি দাঁতৰ আভাস সামান্যভাৱে পৰিলক্ষিত হ'লেও সবহভাগ প্ৰাণীৰ কোনো প্ৰকাৰৰ দাঁত নাথাকে। ইহঁতৰ কোনো এবিধৰ ক্ষেত্ৰতো আগদাঁত গণনা দেখা নাযায়। সুখ, এন্ট-ইটাৰ আৰু আৰ্মাডিলো নামৰে জনাজাত তিনি শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীক এই বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। সুখ নামৰ প্ৰাণীবিধক দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ব্ৰাজিলত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্মাডিলো নামৰ প্ৰাণীবিলাককো দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ব্ৰাজিল, আৰ্জেণ্টিনা, বুয়েন আয়াৰ্স আদি ঠাইত বাস কৰা দেখা যায়। এইবিলাক প্ৰাণী আনাৰ দেশৰ কেমটাই পহুৰা বনবোৰ লগত সাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ আমেৰিকাত এন্ট-ইটাৰ গোষ্ঠীৰ কেবা-বিধো প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। তাৰ ভিতৰত জায়েন্ট এন্ট-ইটাৰ নামৰ প্ৰাণীকেই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব পাৰি। এইবিলাক প্ৰাণীৰ দেহত কেমটাই পহুৰা দৰে বাকলি থকা দেখা নাযায়। কেমটাই পহুৰা ফলিদ'তা নামৰ এটা ৰেলেগ গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কেমটাই পহুৰা বনবোৰ বিষয়ে ইয়াৰ পাছৰ প্ৰবন্ধত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে।



কেমটাই পহ বা বনবো

শ্ৰেণী---সুত্ৰপায়ী

বৰ্গ---ফলিত;

প্ৰজাতি---মানিছ ক্ৰেচিক'দেতা


কেমটাই পহ নামৰ আকাৰত লক্ষ এবিধ আপুৰ গীয়া জন্তুক কেতিয়াবা অকস্মাতে আমাৰ ছাৰি-বনবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ উৎপত্তি ইমান সামান্য যে অন্যান্য বনবীয়া প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে ইয়াক য'তে ত'তে দেখা পোৱা নাযায়। ইয়াক একেবাৰে সৰল, নিৰ্ভু আৰু নিৰাশ্ৰিত প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। পোক-পৰুৱা আৰু চেলেংকি-চেলেংকি খাই নিবৰে লাহে লাহে ঘূৰি কুৰিয়েই কেমটাই পহৰে বৰ ভাল পায়। ইয়াৰ শাৰীৰিক বিশেষত্ব হ'ল এয়ে যে জন্তুটোৰ গোটেই গাতে বোমাছৰ বাকলিৰ নিচিনা আৱৰণ থাকে। এই বাকলিবোৰ নেজৰ আঁঠুতকৈ পৰা আৱৰণ কৰি সমস্ত দেহত পৰিপাটিক লজাৱা থাকে। পৃথিৱীৰ অন্য কোনো সুত্ৰপায়ী জন্তুৰে এনে ধৰণৰ বিচিত্ৰ বাকলি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আক্ষিক দক্ষিণ আমেৰিকাৰ 'আবু'দিলো' নামৰ প্ৰাণীৰ দেহতো বোমাছৰ বাকলি সদৃশ আৱৰণ দেখা নাযায়। সেই জন্তুবিলাকৰ দেহৰ বাকলিৰ আৱৰণ তৰপা-তৰপী হোৱা দেখা যায়।

বোমাছৰ বাকলিৰ নিচিনা চকলীয়া আৱৰণ থকা বাবে কেমটাই পহক আমাৰ দেশৰ মানুহে বনবো বুলিও কয়। ইয়াৰ হাতোৰাৰ আগভাগত দীঘল চানেকীয়া নখ থাকে। এই নখ থকা আঙুলিবোৰৰ সহায়ত এইবিধ জন্তুৱে মাটিত গাঁত খান্দিব পাৰে। এইদৰে ৰান্দি নোৱা গাঁতৰ ভিতৰতে এইবিধ প্ৰাণীয়ে সাধাৰণতে বাস কৰে। গাঁতৰ ভিতৰৰ মাটিখিনি উজাৰি উজাৰি দিয়াৰ ফলত যেতিয়া গাঁতৰ ভিতৰখন শুৰি মাটিৰে ভৰি পৰে তেতিয়া সেইবোৰ শুৰি মাটি আৰু অন্যান্য জাৰৰ জন্তুটোৱে বাহিৰৰ কালে দলিয়াই পোলোৱা কামত লাগি যায়। মাটিত খোজ কাঢ়ি যাওঁতে এইবিধ প্ৰাণীৰ আঁঠুতকৈ আঙুলি কেইটা লুটি খাই থাকে। পাছ তেওঁৰ আঙুলি এনে হোৱা দেখা নাযায়। ইহঁতে শাবুকীয়া গতিত খোজ কাঢ়ে। এইদৰে মাটিত খোজ কাঢ়ি যাওঁতে তাৰ গাঁটো ওপৰ মূৰাকৈ কুঁজা কৰি লয়। শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণী ওচৰলৈ অহা গৰ পালে ই মূৰটো পেটৰ তলত গুজি নেজ ডালেৰে বেৰিয়াই লৈ এটা বলৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে।

খোজ কাঢ়ি গৈ থাকোতে কিহা কোনোবা ঠাইত একেবিষেবে বৈ থাকোতে অনপ দুটোৰ বস্ত্ৰ চাবলৈ ই কেতিয়াবা পাছঠেং দৃখনৰ ওপৰত থিয় দি ইকালে সিকালে লক্ষ্য কৰে।

কেমটাই পহক স্থলবাসী বা মৃতিকাবাসী জন্তুৰ আখ্যা দিব পাৰি। মাটিত বগাই ফুৰা প্ৰাণী হ'লেও ইহঁতে গছৰ ওপৰতো অনায়াসে উঠিব পাৰে। গছৰ ডালত বগাই ফুৰোঁতে ইহঁতে সোণৰ হাতোৰা কেইখনেৰে গছৰ ডালত খামোচ মাৰি ধৰি আঁহবাঢ়ি যায়। মাটিত বগাই ফুৰোতে ইহঁতে পোক-পৰুৱা আদি প্ৰাণী চেলেকি চেলেকি খায়।

কেমটাই পহৰ দাঁত নাথাকে। সাপৰ জিভাৰ নিচিনা দীঘল চানেকীয়া জিভাখনৰ আগ ভাগ বাহিৰলৈ উলিয়াই দি এইবিধ প্ৰাণীয়ে পৰুৱা, উঁইপোক আদি চেলেকি



বনবৌ

চেলেকি খায়। জিভাত আঠাৰ নিচিনা পদাৰ্থ থকাৰ বাবে ই অতি সহজে পোক-পৰুৱা আদি সৰু সৰু প্ৰাণী মুখৰ ভিতৰলৈ নিব পাৰে। সেই কাৰণে কেমটাই পহৰে কোনো প্ৰকাৰৰ পোটা বস্ত্ৰ খাব নোৱাৰে। নখেৰে উঁই হালুখুবিলাক ভাঙি তাৰ ভিতৰত থকা উঁই পোক আৰু কণীবোৰ ইহঁতে চেলেকি চেলেকি খায়। উঁই হালুখুৰ ভিতৰৰ ফালে থকা স্ক্ৰুঙাবোৰত মূৰটো স্ক্ৰুৱাই দি কেমটাই পহৰে উঁই পৰুৱা আৰু কণীবোৰ জিভাৰ আগেয়ে উলিয়াই উলিয়াই খায়। ইহঁতে এক প্ৰকাৰৰ হিচঁ হিচঁ শব্দ উচ্চাৰণ কৰে।

ভাবভর্য্যত কেবটাই পহ জাতীয় গ্রাণীর দূটা প্রজাতি ঠাই অনুযায়ী বাল করে বুলি জনা যায়। তাহে এটা প্রজাতিক 'হানিচ্ ক্রেটিক'দেতা' আক-আলটোক 'হানিচ পেন্টাডেট্টিকা' নামেবে জনা যায়। সাধারণত প্রথম বিশ্বক চীনা কেবটাই পহ আক দ্বিতীয় বিশ্বক ভাবতীয় কেবটাই পহ খোলা হয়। আচলতে অলরত প্রথম বিশ্ব কেবটাই পহহে দেখা যায়।

কেবটাই পহর পারিবারিক জীবনর বিষয়ে লঠিক ভাবে জনা নাযায়। বছরর যেই কোনো সময়তে বাইকী জনীয়ে পোরালি অগায়। শাকজনীয়ে হেনো নেজ ডালর ওপ-ৰতে কেভিয়াৰ। পোরালিটো উঠাই লৈ কুবে।



বাদুলি বিলাক

শ্ৰেণী----স্তন্যপায়ী

বৰ্গ----চিৰপ্ৰটো

উপবৰ্গ---- (১) মাইজোচিৰপ্ৰটো

(২) মেগাচিৰপ্ৰটো

স্তন্যপায়ী জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত বাদুলি গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ এখন স্তৰীয়া স্থান আছে। এই বিচিত্ৰ প্ৰাণী বিধৰ বাহিৰে অন্য কোনো জন্তুৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীয়ে আদৰ্শত উৰি ফুৰিব নোৱাৰে। বামশৰ বা বাংকেপ নামৰ উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱাই অৱশ্যে উৰি ফুৰা দেখা যায়। এই প্ৰাণীবিলাকে কিন্তু চৰাইৰ দৰে বহুত দূৰলৈ উৰি যাব নোৱাৰে। পাখিৰ দৰে থকা ছাল দুখনৰ সহায়ত সিহঁতে ওখ গছৰ ডালৰ পৰা হেলনীয়াটো তলৰ গছৰ ডাললৈ নামি আহিব পাৰে। এইদৰে ভাহি অসহ্য ছালখন পাবাচুৰ দৰে জন্তুটোক সহায় কৰে। তলৰ ফালে অলপ হেলনীয়াটো ভাহি ভাহি অহাৰ পিছত জন্তুটোৱে গছ এজোপাৰ ডালত লাহেকৈ বহি পৰে। বাদুলি জাতীয় প্ৰাণীয়ে আকাশত চৰাইৰ দৰে উৰিব পাৰিলেও ইহঁতৰ চৰাইৰ দৰে ডেউকা আৰু পাখি নাই। এইবিলাক প্ৰাণীক এখা পাতলীয়া ধৰণৰ ছালে আকাশত উৰি যোৱাত সহায় কৰে। এই পাতলীয়া ছাল দুখনে জন্তুটোৰ আগঠেং আৰু পাছ ঠেং দুখনক লগে লগেই ৰাখে। জন্তুটোৱে ইচ্ছা অনুযায়ী পাখি সদৃশ ছাল দুখন পাবাচুৰ দৰে মেৰিব আৰু জপাব পাৰে। চৰাইৰ পাখিৰদৰে কোবাই কোবাই জন্তুটোৱে আকাশত উৰি উৰি গৈ পাকে।

বাদুলিৰ আনঠেং দুখনক মানুহৰ হাত দুখনৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। আগ-ঠেং দুখো হাতৰ বাউলি আৰু হাতখনৰ আগ ভাগত থকা দুই খণ্ডহাড়ৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। আগভাগত দুডাল হাড়ৰ উৎপন্ন হয়। দুই খণ্ডহাড়ৰ ভিতৰত আগৰ খণ্ডৰ ওপৰত থকা অংশতকৈ ডালখিনি দীঘল হয়। হাতৰ ঠাৰিৰ আগ ভাগত যিটো গাঁঠিৰ উৎপত্তি হয় সেই গাঁঠিৰ পৰা চাৰিটা চাৰিটাকৈ দীঘল চানেকীয়া আঙুলিৰ উৎপত্তি হয়। পাতলীয়া ছালখন হাতৰ ঠাৰি আৰু আঙুলি কেইটাৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকে। জন্তুটোৱে ইচ্ছানুযায়ী আঙুলি কেইটা আৰু হাতৰ ঠাৰি কেইখণ্ড জপোৱা মেলা কৰিব পাৰে। পাতলীয়া ছালখন পাছ ঠেং দুখন ঠাৰিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকে। পাছ ঠেং


দুখনৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ ছালখন নেজডালৰ সৈতে লগুনাথি থাকে। বুঢ়া আঙুলিটোৰ লগত পাণ্ডুলীয়া ছালখনৰ কোনো সংযোগ থকা দেখা নাযায়। ছাতিৰ ঠানীৰ দৰে অঙ্গটোৱে বেতিয়া হাত দুখনৰ সৈতে হাতৰ আগত থকা আঙুলি কেইটা মেল খোৱাই দিয়ে তেতিয়া গোটেই ছালখন বেল খাই পেৰাচুতৰ দৰে কাম কৰে। বেল খোৱা ছালখনে অঙ্গটোক আকাশেশি উৰি যোৱাত সহায় কৰে। আঙুলি কেইটা অপোৱা আৰু মেলাৰ ফলত সালসলনি ঘটাই অঙ্গটোৱে ইচ্ছানুযায়ী যেই কোনো ফালে গতিৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰি অনায়াসে উৰিব পাৰে। আকাশেশি উৰি যাওঁতে নেজডাল ইফাল সিফাল কৰিও অঙ্গটোৱে গতিৰ দিশ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে।

ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা বৰ্ণনাৰ পৰা জনা যায় যে আকাশ পথত উৰি ফুৰিবৰ বাবে বাদুলি শ্ৰেণীৰ পানীবিলাকে হাত দুখনকে চৰাইৰ পাখিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। সেইবাবে বাদুলি গোষ্ঠীৰ আটাইবোৰ প্ৰাণীক লগ লগাই চিৰপুটেৰা নামৰ এটা বৰ্গৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰীক ভাষাত চিৰচ্ শব্দই হাত আৰু “টেবোণ” শব্দটো পাখিক বুজায়। এই চিৰচ্ আৰু “টেবোণ” শব্দৰ সংযোগ ঘটি চিৰপুটেৰা” শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে।

জাত অনুযায়ী কিছুমান বাদুলিয়ে গছৰ ফলমূল খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। আন কিছুমানে কীট-পতঙ্গ-বিলাক খৰি বৰি খায়। ভেম্‌পায়াৰ নামৰ কিছুমান বাদুলি পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভেম্‌পায়াৰবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য হ’ল, ইহঁতে চোফা দাঁতৰ সহায়ত অস্তৰ পাত ফুটা এটা কৰি লয়। ডিভাখনেৰে সিহঁতে এই ফুটাৰ পৰা অঙ্গটোৰ জীয়াভেজ ওহি খায়। উল্লেখযোগ্য যে এই জাতৰ সকলো প্ৰাণীয়ে অস্তৰ তেজ ওহি নাখায়। সৰহ ভাগই নিৰামিষ ভোজী প্ৰাণীৰ দৰেই গছৰ ফল-মূল খায়। ভেম্‌পায়াৰবিলাকৰ সচৰাচৰ বসতি স্থান পশ্চিম গোলাৰ্দ্ধতে সীমাবদ্ধ বুলি জনা যায়। যিবিধ ভেম্‌পায়াৰে প্ৰকৃতিতে অস্তৰ তেজ ওহি খাই জীৱন ধাৰণ কৰে সেইবিধ ভেম্‌পায়াৰক তেজ ওহি খোৱা ভেম্‌পায়াৰ বোলা হয়। এই শ্ৰেণীৰ ‘ভেম্‌পায়াৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ ব্যঞ্জিত পোৱা যায়। দিনৰ দিনটো ইহঁতে ওহা গছৰ আদিত সোমাই থাকে। শক্তি চিকাৰলৈ ওলায় আৰু সাধাৰণতে ওহি থকা অস্তৰ পাত পৰি তেজ ওহি খায়।

ফলমূল খাই জীৱন ধাৰণ কৰা বাদুলিবিলাকক হেগাচিৰপুটেৰা নামৰ এটা উপ-বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এইবিলাক বাদুলি সাধাৰণতে আকাৰত আন কিছুমান বাদুলিতকৈ ডাঙৰ হয়। আনহাতে যিবিলাক বাদুলিয়ে কীট-পতঙ্গ আদি খাই জীয়াই থাকে সেইবিলাক বাদুলিক মাইক্ৰোচিৰপুটেৰা নামৰ আন এটা উপবৰ্গত স্থান দিয়া হয়। গছৰ ফলমূল খাই জীৱন ধাৰণ কৰা বাদুলিক থবুৱা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি ক’ব পাৰি। যিজোপা গছত এই জাতৰ বাদুলি পালে সেই জোপা গছৰ ফলবোৰ খাই খাই এইবিলাক বাদুলিয়ে শেষ কৰি পেলায়। মানুহৰ বাৰীৰ লেচু, বগৰী আদি নানাবিধৰ ফল ধৰা গছত বাদুলিবোৰ পৰি পুৰুষ হৈ পৰিৱৰ্তে নী পাৰ্হঁতেই বাতিটোৰ ভিতৰতে ফলবোৰ খাই শেষ কৰি দিয়ে। গছৰ উত্তম ফলবোৰ বাদুলিৰ পৰা বন্ধা কৰিবলৈ গিৰিহঁতে নান।


উপায় অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বাদুলিবিলাকে বিনামূলি ফল খায় তাতকৈ বহুতখিনি ছিঙি ভাঙি মাটিতৈ পেলাই দিয়ে। পকি থকা ফলৰ বসখিনি শুহি খাই সিটাপিনি মাটিতৈ পেলাই দিয়ে। গুহত লাগি থকা ফলবোৰ দাঁতেৰে কাষৰি ছিঙি-য়েই নগে নগে তললৈ পেলাই দিয়ে। কীট-পতঙ্গ খাই জীৱন ধাৰণ কৰা বাদুলিবিলাকে আকাশত উৰি ফুৰা কীট-পতঙ্গবোৰ ওপৰতে ধৰি ধৰি খায়। গুৰুস্বৰাৰ নিচিনা ডাঠ পাখি থকা পোক ধৰিব লগীয়া হ'লে ডাঠ পাখি কেইখন ছিঙি ভাঙি মাটিতৈ পেলাই দিয়ে আৰু কোমলখিনি নগে নগে খাই পেলায়।



চুঙা-বাদুলি

আমাৰ অসমত সাধাৰণতে দুটা জাতৰ বাদুলি আছে। তাৰে এবিধক চুঙা বাদুলি আৰু আনবিধক বৰ-বাদুলি বুলি কোৱা হয়। আকাশত চুঙা-বাদুলিবিলাক সৰু হয় আৰু এইবিলাক সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰৰ কান্ধাৰ ভিতৰত সোমাই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰৰ চিলিঙৰ ওপৰত বা পকীঘৰৰ বা চিলিং আদিৰ ফাকৰ মাজত সোমাই এইবিধ বাদুলিয়ে মানুহৰ আশ্ৰয়ত বাস কৰা দেখা যায়। সকলো সময়তে মানুহ নথকা ডাক-বঙলা আদি ঘৰৰ চিলিঙৰ ওপৰত এইবিধ বাদুলিক আকে আকে থাপ খাবা দেখা যায়। ইহঁতৰ লাদব দুৰ্গন্ধত বঙলাৰ ভিতৰত মানুহ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ পৰে। দিনৰ দিনতো ইহঁতে ঘৰৰ চাল আৰু চিলিঙৰ মাজত থকা কাঠ-বাঁহৰ ফাকৰ ভিতৰত

নুৰা ঝাকি লোমাই থাকে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এক প্ৰকাৰৰ চিঁ চিঁ শব্দ উচ্চাৰণ কৰি খেঁচা খেঁদি কৰে। পানী-পাছৰ ফালে ওলাই থকা বৰুৱাৰ চুঙাৰ ভিতৰতো বাদুলিবোৰ নোমাই থাকে। গধূলি হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে এটা এটাকৈ থকা ঠাইৰ পৰা ওলাই আহি চাৰিওফালে উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিছু সময় উৰাউৰি কৰি আকোঁ চুঙাৰ ভিতৰত কিম্বা চিলিঙৰ ওপৰত ঠাইবোৰত প্ৰৱেশ কৰেহি। কীট-পতঙ্গ আদি



বৰ বাদুলি

নানাবিধৰ ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ প্ৰাণীয়ে গধূলিৰ সময়খিনিতে উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। উই-চিৰিঙা, চগা, ফৰিং, জিয়াঁ, পখিলা, গুবৰুৱা প্ৰভৃতি পতঙ্গবোৰে গধূলি পৰত আকাশৰ ওপৰলৈ উৰিবলৈ ধৰে। চুঙা বাদুলিবিলাকে সেই পতঙ্গবোৰ বায়ুমণ্ডলত উৰি ফুৰা অৱস্থাতে খেদি খেদি ধৰে। গুবৰুৱা গোষ্ঠীৰ পতঙ্গৰ ডাঠ পাখিখন গুচাই লৰৰ বাবে সিহঁতে তললৈ নামি আহে।

আমাৰ এই ফালৰ ঠাইবিলাকত সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা দ্বিতীয় বিধ বাদুলিক আমাৰ মানুহে বৰবাদুলি বুলি কয়। এইবিধ বাদুলি আকাৰত ডাঙৰ হয় আৰু ইংৰাজীত ইয়াক ফাইং ফল্ল বোলা হয়। ইহঁতক গছৰ ওপৰত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

পাছ তেওঁৰ আঙুলি আৰু নখৰ সহায়ত গছৰ ডালত ধাৰোচ মাৰি ধৰি এইবিধ বাদুলিয়ে মূৰটো তললৈ দি ওলমি থাকে। যিজোপা গছত ওলোয়া-বাদুলি দি থাকিবৰ বাবে বাদুলিয়ে অনুকূল পৰিবেশ বাচি লয় সেই একে জোপা গছটোকে ইহঁত প্ৰতিদিনে আহে। জনপূৰ্ণ নগৰৰ মাজত থকা কোনো কোনো গছতো এইবিধ বাদুলি আৰু পাতি ডালে ডালে ওলমি থকা দেখা যায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অজ্জিন্‌ডৰ কাষত থকা এজোপা প্ৰকাণ্ড আঁহত গছৰ ডালত সোপা সোপে বৰ বাদুলি ওলমি থকা দেখা যায়। খুবুৰীৰ চানকিট হাউচৰ নিচেই কাষতে প্ৰতিষ্ঠিত গুৰুৱাৰ চৌহদৰ ভিতৰত থকা এজোপা গছতো এইবিধ বাদুলি ওলমি থকা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। শিল চৰৰ উপায়ুক্তৰ বঙলাৰ কাষত থকা কেইজোপা মান গছৰ ডালৰোপাতো বহু সংখ্যক বৰবাদুলিয়ে ডালে পাতে ওলমি থকাৰ বাবে স্তুৰিধাজনক পৰিবেশ বিচাৰি লব পাৰিছিল। এই গৃহবিলাকত ওলমি থাকিবলৈ লোৱা বাদুলিবিলাকে সেইবোৰ ঠাইত কিমান দিনৰ পৰা আছে বা ভৰিহাতে সিহঁতে তাত কিমান দিন থাকিব তাক জনা নাযায়।

গোটেই দিনটো নানা ধৰণৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰি এইবিধ বাদুলিয়ে গছৰ ডালত ওলমি থাকে। মাজে সময়ে থকা ঠাইৰ বাবে সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া পোচাল হোৱাতো দেখা যায়। গধূলি আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁত নাহকৈ গছৰ ডাল এৰি এটা এটাকৈ উৰি যাবলৈ ধৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰ্বেলি পৰতে এই যাত্ৰা আৰম্ভ হয়। গোটেই নিশা গুটি ধৰা গছ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে। পকা ফল ধৰা গছ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলে তাতে গোটেই আৰু বাদুলি পৰে। বগনী, লিচু আদি গছৰ পকা পকা ফলবোৰ ছিঙি ছিঙি খাই গৃহস্থৰ ক্ষতি সাধন কৰে। বসখিনি শুহি শুহি ৰায় আৰু বাৰু-নিৰে সৈতে সিটাখিনি উকলিয়াই উকলিয়াই মাটিলৈ পেলাই দিয়ে। বাদুলিৰ আক্ৰমণৰ পৰা লিচুবানীৰ লিচু আৰু অ্যান্য গছৰ পকা-কেচা ফলবোৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে গিৰি-ইতে বহুতো কৌশল অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়।

ওপৰত উল্লেখ কৰা বাদুলিৰ বাহিৰেও কেইবা ভাঙনো বাদুলি ভাঙতৰ্হৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ন ভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা দেখা যায়।

পতঙ্গভোজী প্ৰাণী

পৃথিবীৰ উপবিভাগত বাস কৰা কিছুমান বন্যপ্ৰাণীয়ে কেৱল কীট-পতঙ্গ আদি ভক্ষণ কৰিয়েই জীৱন ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনে প্ৰাণীবিলাকক খাউকতে পতঙ্গভোজী প্ৰাণী বোলা হয়। এই শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত মানুহৰ স্বৰূপ ভিতৰতে আলোঙে আলোঙে থকা চিকা, ডেকুদী নামৰ প্ৰাণী বিলাকে পৰে। পতঙ্গভোজী প্ৰাণী বিলাকৰ বিশেষত্ব হ'ল এই শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা বিভিন্ন গোট আৰু প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীবিলাকে ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰে। জীৱ জগতৰ জনবৰ্দ্ধমান উন্নতি আৰু শাৰীৰিক বিকাশত ইহঁতে বিশেষ আঙঠাৰ পৰা নাই। সেই বাবে আত্মৰক্ষাৰ সজুলি হিচাপে ইহঁতৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাৱলীত বিভিন্ন কপৰ দ্ৰিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিছুমানৰ দেহত বিধাজ পদাৰ্থ ধাৰণ কৰা মাংসগ্ৰহী অথবা এক প্ৰকাৰৰ মোনা বা জোনোঙাৰ উদ্ভৱ হয়। আন কিছুমানৰ নোমৰ সলনি গাত কাঁইটৰ নিচিনা জোঙা জোঙা ত্বক থাকে। কোনো কোনো প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীয়ে গছৰ ডাল-পাত বগোৱাত পাকৈত। শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি আহিলে ইহঁতে গছ গছনিৰ উপৰি ভাগলৈ চকুৰ পতাৰে বগাই গৈ আত্মৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। কিছুমানে বাটিত গাঁত ৰাখে আৰু গাঁতৰ ভিতৰতে আহল বহল ঠাই তৈয়াৰ কৰি লৈ শত্ৰুৰ আক্ৰমণক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰিবলৈ লোৱা প্ৰাণীবিলাকৰ দেহতো ভিন্ ভিন্ শাৰীৰিক গুণে আত্মপ্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

পতঙ্গ ভোজী প্ৰাণীবিলাকৰ আন এটা লেখত লব লগীয়া লক্ষণ হ'ল এয়ে যে ইহঁতৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা আটাইবিলাক প্ৰাণীয়েই আকাৰত সৰু। চিকা সদৃশ একে ক্ষুদ্ৰ আৰু হেজ হগৰ (কেটেলা গাহৰি) নিচিনা প্ৰাণীয়ে এই গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী-বিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ইহঁতৰ বুখ বগলৰ আগ ভাগ দীঘলীয়া। সেই বাবে এই কেইবিধ প্ৰাণীয়ে অতি সহজে পোক-পৰুৱা আদি ধৰি খাব পাৰে। কিছুমান প্ৰাণীৰ বুখৰ আগ ভাগে এনে গঢ় লয় যে ইহঁতৰ ওঁঠ কেইটাক ঠোঁটৰ লগতহে তুলনা কৰিব পাৰি।

জীৱবিদসকলৰ মাপ কাঠিত পতঙ্গভোজী প্ৰাণীবিলাকক দুটা উপবৰ্গ বা শাখাত বিভক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথম উপবৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰাণীবিলাকক লিপোচাইকা আৰু

দ্বিতীয় উপবৰ্গত স্থান দিয়া প্ৰাণীবিলাকক বেনোচাইকা উপবৰ্গৰ প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰা হয়। বগলু বিকাশৰ ক্ৰমোন্নতিৰ পৰ্যায় আৰু অঙ্গ-দাত্যৰ গঠন ভেদীয়াৰ উপবৰ্গত বাইকৈ ভিত্তি কৰি এই দুটা উপবৰ্গৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। গোল্ডেন বগল, অ'চাৰ শ্ৰো টেন্‌বেক্‌ প্ৰভৃতি প্ৰাণীক প্ৰথম উপবৰ্গত স্থান দিয়া হৈছে। গোল্ডেন বগলবিলাকক কেবাটাও প্ৰজাতি উপ প্ৰজাতিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে।

ভাৰতবৰ্ষত চিকা, উতনুৰা আৰু কেটেলা গাহৰি নামৰ প্ৰাণীয়ে পতঙ্গভোজী জন্তুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এই কেইবিধ প্ৰাণীৰ গাইঙটীয়া বিবৰণ তলত বিপ্লবিত্ব কৰা হৈছে।

চিকা

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---পতঙ্গভোজী

গোত্র---চৰিচিদি


প্ৰজাতি---চানকাচি চিৰবিনমাচ

আমাৰ অগম্যত থকা যিবিধ সৰু আকাৰৰ প্ৰাণীক আমি চিকা বুলি কওঁ সেই বিধ প্ৰাণীক নেদেখা মানুহ প্ৰায় নাই বুলি ক'ব পাৰি। বন্যপ্ৰাণীৰ শ্ৰেণীত পৰা প্ৰাণী হ'লেও চিকা মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতহে সাধাৰণতে থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আগহাতে মানুহৰ বশৰতী নোহোৱাকৈয়ে বন্যীয়াভাৱে এইবিধ প্ৰাণীয়ে মানুহৰ ঘৰতে বাস কৰে। দিনা দুপৰিত বৰ বোঁছকৈ ইয়াক দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। দিনৰ ভাগত ই মাটিৰ তলৰ স্তুৰিধা জনক ঠাইত আৰু জাবৰ আদিৰ তলত নিচিল মাৰি পৰি থাকে। সন্ধিয়াৰ সময়ত ওলাই আহে আৰু চিক্ চিক্ শব্দ কৰি ঘৰৰ মজিয়াত ইফালে সিফালে বগাই ফুৰে। কিবা কাৰণত তেও খালেও ই চিক্ চিক্ শব্দ কৰে। কেতিয়াবা ঘৰৰ চোতালত, ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰৰ বাঁহনিও আৰু কেতিয়াবা আলি পদুৰিও ওপৰতে এইবিধ প্ৰাণীক বগাই ফুৰা দেখা যায়। একো একোটা নিগনিৰ সমান সৰু আৰু সাধাৰণতে বাতিৰ আন্ধাৰত পোক পৰুৱা বিচাৰি ফুৰা প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে বহুত সময় ই চিক্ চিক্ কৰা শব্দহে শুনিবলৈ পোৱা যায়। জন্তুটো চকুত গতকাই ধৰাই নপৰে।

চিকা আৰু নিগনি এই দুবিধ ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ প্ৰাণীৰ আকৃতি আৰু প্ৰকৃতিত লেখত লবলগীয়া পাৰ্থক্য আছে যেন নালগে। সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত থকা এন্দুৰ আৰু নিগনিৰে চিকা জাতীয় প্ৰাণীবোৰৰ লগতে ইফালে সিফালে দৌৰি ফুৰে। মাটিৰ ওপৰেদি বগুৱা বাই দৌৰি ফুৰোতে নিগনিৰে সাধাৰণতে কোনো প্ৰকাৰৰ শব্দ নকৰে। চিকাই কিন্তু চিক চিক শব্দ নকৰাকৈ থকা দেখা নাযায়। মানুহৰ ঘৰত বা অন্যান্য স্তুৰিধাজনক ঠাইবোৰত মাটিত বগাই ফুৰা চিকা জাতীয় প্ৰাণীক ইংৰাজী ভাষাত গ্ৰাউণ্ড ছো" বা "মাটিত বগুৱা চিকা" বোলা হয়। গছত হগাই ফুৰা চিকাৰ বিষয়ে স্থানান্তৰত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

ঘৰত পোহা বেকুৰীয়ে নিগনি ধৰাৰ দৰে খেদি খেদি চিকা ধৰিব নোখোজে। চিকাৰ চিক্ চিক্ শব্দ কাণত পৰিলে সিহঁতে খেলা-খেদি কৰিও তাক কামোৰ মাৰি

নধৰাটকৈয়ে নাহেটক আঁতৰি দিয়ে। কুকুৰে কেতিয়াবা কিকি শব্দ শুনিবলৈ পালে তাক খেদি খেদি শনঠেকত পেলাই কামোৰ মাৰি জীৱ বাহিৰ কৰি দিয়ে। কোনো কোনো নেকুৰীয়েও কেতিয়াবা এইদৰে চিকা মাৰে। কিন্তু গাবপৰা অকটা গোল্ড ওনোৱাত ঘৰচীয়া প্ৰাণীৰ কোনো এবিধেও চিকাৰ মাংস নাখায়।



মাটিত বগুৱা চিকা

চিকাৰ প্ৰতি মানুহৰ কোনো গড়ান নাই। এইবিধ প্ৰাণীয়ে পোক পৰা আদি খাই মানুহৰ উপকাৰ কৰিছে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আৰোপ কৰা অৱশ্য

লৰকা নহয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ দেহৰ দুয়ো কাষে কস্তুৰী হৰিণন নাতিস্থলত থকা কস্তুৰীৰ দৰে এক প্ৰকাৰৰ মাংসগ্ৰন্থিৰ উৎপত্তি হয়। এই মাংসগ্ৰন্থিৰ পূৰ্বা এক প্ৰকাৰ গৌদ্ধ বাহিৰ হয়। সেই কাৰণে চিকাই স্পৰ্শ কৰা খাদ্য সামগ্ৰীৰপৰা অকটা গৌদ্ধ ওলায়। মাংস গ্ৰন্থিৰ পৰা ওলোৱা পদাৰ্থত বিষাক্ত ৰস আছে বুলি ধাৰণা হয়। সেই কাৰণে চিকা দেখিলেই মানুহে তাক মাৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰে।



গছত বগাই থকা চিকা;

চিকাৰ বুৰখন অতিপাত ছোঙা আৰু লেতু-লেতু হৈ থকা যেন লাগে। ওপৰ ঊঠৰ আগ ভাগ দীঘলৱীয়া আৰু তলৰ ঊঠ তাৰ মাজ ভাগতে শেষ হৈ অদৃশ্য হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ কাণ দুখন তেনেই সৰু আৰু আকাৰত ঘূৰণীয়া হয়। কাণৰ ভিতৰত বেকটাবেকটি ডাঁজৰ উৎপত্তি হয়। চকু দুটা সৰু আৰু আকৃতিত গোল হোৱা দেখা যায়। নেজডাল গোটা বগুৱাল আৰু দীঘলীয়া হয়। নেজত সেৰেঙা সেৰেঙাকৈ দীঘল চানেকীয়া নোন হয়। সৰ্বশৰীৰৰ গোমৰ ৰবণ ধোৱাৰ নিচিনা হয়। গোমবোৰ কোমল

আৰু ঘন হয়। জন্তুটোৰ আকাৰৰ তুলনাত তেং কেইখন সৰু হয়। সেই কাৰণে দৌৰ দি পলাওতে নিগনি আৰু এন্দুৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ মাজত ইয়াক সহজে চিনি উলিওৱাত অনুবিধা নহয়।

পাৰিবাৰিক অথক সামাজিক জীৱনত এইবিধ প্ৰাণীয়ে সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰত থকা নিগনি জাতীয় প্ৰাণীৰ দৰেই থকা দেখা যায়। শুকান খেৰ কুটা বাঁহ আদি গোটাই লৈ এইবিধ প্ৰাণীয়ে পোৱালি জগাবলৈ বাৰে বাহ সাজে। বাহলৈ ভিতৰতে মাইকীজনীয়ে একেবাৰতে ২৩ টাৰ পৰা ৬৭টা পৰ্যন্ত পোৱালি জগায়। ঘৰৰ ভিতৰৰ কোনোবা ঠাইত পেলনীয়া বিধৰ ফটা কানি, ফটা আগৰ আদি বিচাৰি পালে নিগনিৰ দৰে চিকায়ো তাতে বাহ সাজে। কাপোৰ, লাগজ আদি লাগতিয়াল বস্তু কুটি নষ্ট কৰাৰ ফলত গৃহস্থই কেতিয়াবা অপুৰণীয় ক্ষতি স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয়।

ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে চিকা জাতীয় প্ৰাণীৰ ব্যতি সন্নিবিষ্ট হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰ্বতীয়া ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভৈয়ামৰ ঠাইলৈ ইয়াৰ বসতি সম্ভাৱিত হৈ আছে। তদুপৰি এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী এচিয়া, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা মহাদেশ কেইখনলৈ বিয়পি আছে। উত্তৰ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গতো চিকা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। পৃথিৱীৰ গ্ৰীষ্ম মণ্ডল আৰু শীতোক মণ্ডলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা ঠাইবিশাকৈ চিকাৰ বসতিস্থানবোৰ গিৰণ কৰিছে। হাজাৰ অৱজ্ঞা অনাদৰক হেলাৰেও অতিক্ৰম কৰি চিকাবোৰে নিজকে মৃত্যুভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। সেইবাবে এইবিধ প্ৰাণীৰ মৰণ নাই।



হেজহগ বা কেটেলা গাহৰি

শ্ৰেণী--- প্রাণীবিদ্যা

বৰ্গ--- উদ্ভিদ

পোহ--- ইণ্ডো-মিডিয়া

প্ৰজাতি--- (১) হেমিচিচিয়া

হেজ হগ বা কেটেলা গাহৰি আমল প্ৰাণীবিদ্যক অসমৰ হাৰি বননিও থকা দেখা নাযায়। কেৱল অসমতই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো এখন ৰাজ্যতো এই শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা নাযায়। পশ্চিম ভাৰতত মক্ৰডুসিৰ আশে-পাশে থকা ঠাইবিলাকত কেটেলা গাহৰি বাস কৰে। পাকিস্তানৰ মীমামুৰীয়া ঠাইত থকা বালিঅঁহীয়া মান্দিৰ মুখৰ। মূৰীয়া ঠাইবিলাকেই এই প্ৰাণীবিলাকৰ বাবে অনুৰণ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। পাকিস্তানৰ অন্তৰ্গত সিন্ধু দেশৰ পি। মূৰীয়া ঠাইবোৰতো এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইহঁতৰ বাস্য উত্তৰ পশ্চিমৰ ফালে



কেটেলা গাহৰি

থকা আফগানিস্তানকৈ সংপ্ৰদানিত হৈ থাকিব পাৰে। আধুনিক ভিত্তিত থকা ঠাইৰ বিভিন্নতা আৰু পৰিবেশৰ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱা কেইবাটাও উপ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী হেজহগৰ ক্ষেত্ৰত নিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিলাক প্ৰাণীৰ মুখৰ আকৃতি গাহৰি জাতীয় প্ৰাণীৰ মুখৰ লগতহে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। সেই বাবেই এই প্ৰাণীবিলাক হেজ হগ অথবা কেটেলা গাহৰি বোলা হৈছে

জন্তোটোৰ শৰীৰৰ গঠন গোটা আৰু শকত। আকাৰত কাণ দুখন অযাচিত ভাৱে ডাঙৰ হোৱা যেন দেখি। চকু যোৰা পখালি পখালিকৈ উপস্থাপিত হৈ থকা অংশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখৰ আগ ভাগটো আগবাঢ়ি থকা অংশ ছোঙনি মূৰটোক ক্ৰমশঃ সৰু হৈ যোৱা দেখা যায়। দেখাত জন্তোটো গাহৰিৰ নিচিনা হলেও ঠেঙৰ আগ ভাগত খুৰা দেখা নাযায়। প্ৰত্যেকটো আঙুলিৰ মূত নথ গাজে আৰু ঠেঙৰ পাত্ৰৰ তলুৱা কুকুৰ জাতীয় জন্তুৰ তলুৱাৰ পাত্ৰ নথ। দেহৰ ওপৰ আৰু পাৰ্শ্বভাগত উৎপত্তি হোৱা নোম-বোৰে কেটেলা পছৰ দৰে কাঁইটৰ কপ ধাৰণ কৰে। কিন্তু এই কাঁইটবোৰ কেটেলা পছৰ কাঁইটৰ দৰে দীঘল আৰু শকত হোৱা দেখা নাযায়। এই কাঁইটবোৰ চুটি চুটি হ'ল আৰু দুটোৰ পৰা - ইটোবোৰ পোমৰ দৰে মিহি যেন দেখি। আকাৰত চুটি চুটি হ'লেও এই কাঁইটীয়া আৱৰণখন পকান বাবে যেই সেই শক্ত জাতীয় প্ৰাণীয়ে ইয়াক হঠাতে আক্ৰমণ কৰিলেই সাহস নকৰে।

কেটেলা গাহৰিৰ নিশাচৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। সাধাৰণতে এই গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰক দিন দুপৰতে গছৰ তলৰ মাটিত গাত খান্দি লৈ তাতে থাকে। গছলৈৰ আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁত বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু গোটেই নিশা ধোৱা বস্তু বিচাৰি ঘূৰি কৰে। পোক-পৰুৱাৰ বাহিৰেও এইবিধ প্ৰাণীয়ে মিগ্ৰা-জিটি আদি সৰু সৰু প্ৰাণীও ধৰি ধৰি খায়।

উতনুৱা

শ্ৰেণী---- স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---- পতঙ্গভোজী

গোত্ৰ---- টাল পিদি

প্ৰজাতি---- টাল্‌পা মাইক্ৰোৰা

সদাহতে এই প্ৰৱন্ধত উতনুৱা নামেৰে জনাজাত এবিধ ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ স্তন্যপায়ী জন্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ মোৱা হৈছে। দেখাত এটা নিগনিৰ নিচিনা হলেও উতনুৱাৰ গাত কিছুমান বিশেষ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইবিধ প্ৰাণীয়ে গাত খান্দি মাটিৰ তলত থাকে। মাটিৰ তলত গাত খান্দি থকা প্ৰাণীৰ ভিতৰত উতনুৱাবোৰক বিশেষ পান্দৰশিতা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সুবন্ধত সোমাই থকাৰ বিষয়ত এইবিধ প্ৰাণীক আন কোনো প্ৰাণীয়ে চেদ পেনাৰ মোৱাদে বুলি জনা যায়। আগ ঠেং দুখনৰ ফাঁতৰেই থকা নগৰে ইহঁতে মাটি খান্দি খান্দি একো একোটা গাত খান্দি লয়। ইহঁতৰ গাতৰ মুখত ওঁৰি-মাটিৰ একো একোটা চিপ থাকে। ওঁৰি মাটিৰ এই চিপটোক মল-হিল (Mole-hill) বুলি কোৱা হয়। মাটিত থকা কেচু আৰু নানাবিধৰ পোক-পৰুৱাৰ পোৱালি ইহঁতৰ উপভুক্ত খাদ্য। ইহঁতৰ গাটোৱে দীঘলীয়াটোক গোল আকাৰ ধাৰণ কৰে আৰু গাত গজা নোমবোৰ কোমল হয়। অসমতো এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

শহাপত্ৰ ফৈদৰ প্ৰাণীবিলাক

শহাপত্ৰ গোষ্ঠীত প্ৰাণীবোৰক একেলগে সামৰি লৈ জীৱবিদসকলে “নাগ’মৰ্কা” নামৰ এটা বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। পূৰ্বতে জীৱবিদ বিজ্ঞানীসকলে শহাপত্ৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক কেৰ্কেটুৱা, নিগনি প্ৰভৃতি প্ৰাণীৰ লগত সামৰি লৈ দাঁতৰে কুটি কুটি আহাৰ খোৱা প্ৰাণীবিলাকৰ লগত একেলগে স্থান দিছিল। এই দুয়োবিধ প্ৰাণীৰ দাঁতবিলাক ভাল দৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ ফলত সিহঁতৰ মাজত কেইটামান বিশেষ ব্যৱধান পৰিলক্ষিত হ’ল। বোভেনটৰ ওপৰ পাৰি দাঁতত মাত্ৰ এযোৰাকৈ কুটি খোৱা দাঁত গজে। এই দাঁত সিহঁতে ফটাৰীৰ গিচিগাটক ব্যৱহাৰ কৰি যেই কোনো বস্তু কুটি কিয়া ছিঙি খোৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰে। নাগ’মৰ্কাৰ ওপৰ পাৰিত দুয়োৰাকৈ কুটি খোৱা দাঁত গজা দেখা যায়। এই দুয়ো বোৰা দাঁতৰে সিহঁতে বস্তুবিলাক চিঙি ছিঙি ৰায়। শহাপত্ৰ বৰ্গৰ প্ৰাণীবিলাকৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হ’ল এযে যে সিহঁতে দুয়োপাৰি দাঁত ঘনি খোৱাই খোৱা বস্তুদেখি গুৰি কৰে।

ইংৰাজী ভাষাত শহাপত্ৰ জাতীয় প্ৰাণীক বুজাবলৈ ‘হেমান’ আৰু ‘বেবিট’ শব্দ দুটা একে অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে যিবিলাক শহাপত্ৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে খেৰ আৰু আদি গোটাই লৈ ওখ ওখ বাহ জাতীয় উদ্ভিদৰ মাজত কিবা জোপোহা গছৰ তলত বাহ সাজি থাকিবলৈ লয় সেইবিলাকক ‘হেমান’ কোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে হেমানবিলাকে এইদৰে সাজি লোৱা বাহবোৰতে পোৱালি জগাই ডাঙৰ দীঘল কৰে। এই জাতীয় শহাপত্ৰৰ নতুনকৈ জগা পোৱালিৰ চকু দুটা মেল খাই থাকে। তদুপৰি নতুনকৈ জগা শহা পোৱালিৰ গাতো পাতলীয়াকৈ নোম খৰা দেখা যায়। বেবিট নামৰ শহাপত্ৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে কিন্তু এনেকৈ মাটিৰ ওপৰত বাহ সাজিব নাজানে। সিহঁতে মাটিৰ তলত গাঁত খান্দি লৈ সেই গাঁতৰ ভিতৰত চেপেটা মাৰি সোমাই থাকে। থাকে। গাঁতৰ ভিতৰতে সিহঁতে পোৱালিও জগায়। পোনেনই জগোৱা এই পোৱালি-বোৰৰ চকু কেইটা মুদ খাই থাকে। তদুপৰি নতুনকৈ জগা পোৱালিৰ গাত নোমৰ কোনো চিন্‌চাব্ নাথাকে। দুয়োবিধ প্ৰাণীৰে পাছৰ ঠেং দুখন আগৰ ঠেঙতকৈ তুলনা মূলক ভাৱে দীঘল হোৱা দেখা যায়। অৱশ্যে হেমানৰ পাছ ঠেং দুখন বেবিটৰ পাছ ঠেং দুখনতকৈ অলপ বেছি দীঘল হয়।

সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা শহাপত্ৰ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকক জীৱবিদ-সকলে দুটা গোত্ৰ বা পৰিয়ালত ভাগ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত হেমান আৰু বেবিটক যিটো পৰিয়ালত স্থান দিয়া হৈছে সেই পৰিয়ালটোক নেপ’ৰিদি বোলা হয়। দ্বিতীয়টো

পৰিয়ালত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা শহা প্ৰাণীবিলাকক পিকা বুলি কোৱা হয়। যিটো গোত্ৰত পিকা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেই পৰিয়ালটোক অ'কটানিদি বোলা হয়। ইহঁতক নিগনি শহা বুলিও কোৱা হয়। নিগনি শহাবিলাকে একেলগে আক বান্ধি বাস কৰে। শিলৰ ফাকৰ মাজত আৰু মাটিৰ তলৰ গাতত থাকি ইহঁতে জিৰণি সময়খিনি কটায়। পূব গোলান্ধৰ মধ্য এচিয়া আৰু পশ্চিম গোলান্ধৰ উত্তৰ আমেৰিকাত এই গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা যায়। ত্ৰিমালয় পৰ্বতমালাতো এজাতি নিগনি শহা বাস কৰে।

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত কেবাবিধৰো শহাপহু জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। জলবায়ু অনুযায়ী অঞ্চলিক ভিত্তিত কেইবাটাও উষ্ণ-প্ৰজাতিৰ উদ্ভৱ হোৱা দেখা যায়। আমাৰ অসমত সাধাৰণতে যিবিলাক শহা পহু জাতীয় প্ৰাণী আমি দেখিবলৈ পাও সেই প্ৰাণীবিলাকক খাউকতে শহা পহু বোলা হয়। কিছুমান ঠাইত আলেঙে আলেঙে বাস কৰা আন এবিধ বিশিষ্ট শহা জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা ইয়াক পৃথক ভাবে চিনাকি কৰি দিব বগীয়া হলে এইবিধ শহাপহুক সাধাৰণ শহাপহু বুলি কব পাৰি। অসমত দল খৰিয়া (হিচপিদ হেয়াৰ বা অগম খেৰিচ) নামেৰে জনাজাত আন এবিধ মুহুৰ্গা প্ৰাণী বাস কৰে।

বৰ্ষাকালৰ মৰুমুখিয়ে পৰকা ঠাইবোৰত যিবিধ শহা পহু বাস কৰে সেই বিধক মৰুমুখি শহাপহু বুলি কয়। কাম্বীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাকিস্থানৰ কোনো কোনো ঠাইলৈকে বিয়পি থকা বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগত কেপ হেয়াৰ নামৰ আন এবিধ শহা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়।



শহাপত্ৰ

শেলী---স্তন্যপায়ী

বৰ্ণা---লাগমৰ্ফা

গোত্ৰ---লেপ'ৰিডি

প্ৰজাতি---নেপাচ্ নাইগ্ৰিক'লিচ

অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত শহাপত্ৰ নাম ক'লা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গভীৰ অৰণ্য ভূমিত সাধাৰণতে বাস কৰা নিশক প্ৰাণী বুলি ইয়াক ক'ব নোৱাৰি। মানুহে খেতি পথাৰ কঢ়ি মুকলি কৰিবলৈ ধৰা ঠাইনিলাকৰ কাষে পাজৰে থকা পাওলীয়া হাবিত এইনিলাক প্ৰাণীয়ে বিচৰণ কৰি ফুৰিবলৈ ভাল পায়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা শহাপত্ৰক খেতি পথাৰৰ মাঙত সোমাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। দিন পাতিৰ ভেদাভেদ নৰপাকৈ সকলো সময়তে ইহঁতে আহাৰৰ সন্ধানত ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে। কুমলীয়া ঘাঁহ বিচাৰি বিচাৰি কেতিয়াবা ইহঁতে বাটৰ কাষলৈ ওলাই আহে। ৰাতি গাতিতনীয়া টাইপ মাজেদি যোৱা পথৰ ওপৰেদি জীপ বা মটৰ গাড়ী চাই যাওঁতে শহাপত্ৰ জাতীয় প্ৰাণীক ৰাস্তাৰ কাষত বৈ থকা প্ৰায়েই লগ পোৱা যায়। গভীৰ নাইটৰ পোহৰ গাত পৰিলে ই দোৰোৱা-দোৰোৱাত এবি আগে আগে দৌৰি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইদৰে কিছু দূৰ দৌৰি দৌৰি যোৱাৰ পাছতহে লাহেকৈ পথাৰ কাষত থকা হাবিৰ মাজত সোমাবলৈ যত্ন কৰে। দিন দুপৰত এইবিধ প্ৰাণীক য'তে ত'তে দেখা নাযায়। ওখ ওখ ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ মাজত থকা ওকান ঘাঁহবনবোৰ ঠেঙৰ নখেৰে ঠিক-ঠাক কঢ়ি লৈ তাৰ ওপৰতে তন্তুতোৱে নিবলৈ জিৰণি লৈ থাকে। ঘাঁহনিৰ মাজত এনে বৰণেৰে সজিবাঙনক ঠাই তৈয়াৰ কৰি লৈ নাইকী শহাপত্ৰে তাতে পোৱালি জগায়।

শহাপত্ৰ আকাৰত সৰু হয়। একোটা মেকুৰী জাতীয় প্ৰাণীতকৈ ইয়াক ডাঙৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি। মেকুৰীৰ দৰেই জন্তুটোৰ গোটেই গাটো কোমল মোসেৰে ভৰা। এই মোসেৰেৰে বৰ মোঁৱা বৰণীয়া হোৱা দেখা যায়। দেহৰ উপৰ ভাগত সিৰিনাক নোম হয় সেউ মোমবিলাকৰ বৰণ ক'লা চানেকীয়াতকৈ মুগা হোৱা দেখা যায়। তল পেটত গজা মোমবিলাকৰ বৰণ বগা হয়। নেজ ডালৰ ওপৰ ফালে গজা মোম-মোৰে। অন্তৰ মুগা বৰণীয়া হয়। শহাপত্ৰৰ নেজডাল তেনেই চুটি হয় আৰু ইয়াৰ কাণ দুখন ওপৰৰ ফালে থিয় হৈ থাকে। অৱশ্যে ইচ্ছানুযায়ী জন্তুটোৱে এই কাণ দুখন লৰাৰ চোৱাৰ দৰে। এইবিধ প্ৰাণীৰ আৱৰুদ্ধাৰ বাবে শিং কিম্বা দাঁত আদি গজা দেখা

নাযায়। পাছ ঠেং দুখন আগ ঠেং দুখনতকৈ দীঘল হয়। এই ঠেং কেইখনৰ হাতোবাত আঙুলি আৰু নখৰ উৎপত্তি হয়। কোনো এঠাইত বহি থাকিবলগীয়া হলে জন্তুটোৱে পাছ ঠেং দুখন কিলাকুটিতে ভাঁজ কৰি লয়। মাটিত হাঁহ খাই চৰি ফুৰোতে এইবিধ প্ৰাণীয়ে চাৰিওখন ঠেং ব্যৱহাৰ কৰে। দৌৰি পলাই যাবলগীয়া হ'লে ই অপিয়াই অপিয়াই আগবাঢ়ি যায়। দেহৰ গঠন প্ৰাণী পোহক। ধনুৰ হোৱাৰ বাবে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওঁতে ইহঁতে কোনো অন্তৰিখাৰ সন্ধান হ'বলগীয়া নহয়।



শহাপহু জাতীয় প্ৰাণী ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে কম বেছি পৰিমাণে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গাঁৱ নোমৰ বৰণৰ বিভিন্নতা আৰু বঙৰ গভীৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত নিগাজীকৈ বাস কৰা শহাপহুবিলাকক কেইবাটাও উপ-প্ৰজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰখা হৈছে। অসমৰ ভৈৰাম অৰুণবিলাকক কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা শহাপহু জাতীয় প্ৰাণীৰ নেজৰ নোমবোৰ অলপ বঙছোৱাকৈ মুগা হয়। সেইবাবে এইবিধ শহাপহুক মুগা নেজীয়া শহা হিচাপে বৈজ্ঞানিক ভাৱে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয়। দক্ষিণাত্যৰ ফালে সাধাৰণতে যিবিধ শহাপহুক দেখা যায় সেইবিধ শহাৰ গলখনৰ ওপৰ ভাগত অলপমান ক'লা বৰণীয়া নোমৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা যায়। সেই কাৰণে এইবিধ শহাপহুক জীৱবিদসকলে ক'লা-ডিঙীয়া শহা বুলি কয়। ৰাজপতনাৰ মকড়ুৰি অঞ্চলত এবিধ বেলেগ উপপ্ৰজাতিৰ শহাপহুৱে থলুৱা ভাৱে নিগাজীকৈ বাস কৰিবলৈ লৈছে। এইবিধ শহা পহুৰ নোমৰ বৰণ অলপ হালধীয়া। এইবিলাক শহা পহুক মকড়ুৰীয়া শহা বা ডেজাট হোৱাৰ বোলা হয়। ইয়াৰ উপৰিও বহু আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থানীয়ভাৱে বিৱাজীকৈ বাস কৰা কেইবাটাও উপপ্ৰজাতিৰ প্ৰাণীয়ে ভাৰতীয় শহাপহুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ●

দলখৰিয়া বা হিচুপিদ হেয়াৰ

শ্ৰেণী—স্তুন্যপাখী

বৰ্গ—জাগৰণ

গোত্ৰ—লেপ'ৰিদি

প্ৰজাতি—হেটোলাগছ হিচুপিচ

অসমত দলখৰিয়া নামৰ এজাতি শহাপহ আছে। এইবিধ প্ৰাণীক ইংৰাজী ভাষাত 'হিচুপিদ হেয়াৰ' বা 'আচাৰ বেৰিট' (ওসম বেৰিট) বোলা হয়। গ্ৰীষ্মকালত য'ত ত'তে দেখা শহাপহৰ দৰে এই শহাপহক দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সেই কাৰণে এইবিধ শহাপহক দুঃপ্ৰাপ্য প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰা হৈছে। যিবিলাক ওখ ওখ বাহ জাতীয় উদ্ভিদ থকা মুকলি মূৰীয়া হাবিত 'নল গাহৰি' বাস কৰে তেনেবোৰ হাবিতেই দলখৰিয়া নামৰ শহাপহকো বাস কৰা দেখা যায়। এইবিধ শহাপহ আৰু সাধাৰণ বিষৰ শহাপহৰ মাজত থকা শাৰীৰিক আৰু চান্দ্ৰিক গুণৰ পাৰ্থক্য তেনেই সন্মান্য। হাবিতলীয়া ঠাইত এইবিধ শহাপহক দেখা পালে বেলেগ জাতৰ শহাপহ বুলি হঠাতে কোৱা টান। জন্তু বিশেষজ্ঞ আৰু বন্য প্ৰাণীৰ বিধৰত বিশেষ অভিকৃতি থকা ব্যক্তিগতকণ মতে এইবিধ প্ৰাণীৰ জন্তুসংখ্যা তেনেই কম। সেই কাৰণে এইবিধ প্ৰাণীক ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ প্ৰথম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে।

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা অসমৰ যিবিলাক ঠাই হিমালয় শৈলমালাৰ নামনি ভাগবিলাকত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু তাৰে যিবোৰ এলেকাত বাহ জাতীয় উদ্ভিদে প্ৰাধান্য লাভ কৰি আছে তেনেবোৰ স্বাভাৱিক পৰিবেশতে এইবিধ প্ৰাণীয়ে নিগাজীকৈ বাস কৰিবৰ বাবে ঠাই নিৰ্বাচন কৰি লৈছে। এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতি স্থান আৰু সচৰাচৰ বিচৰণ ভূমি পশ্চিমৰ ফালে উত্তৰ প্ৰদেশত থকা হিমালয়ৰ নামনি অঞ্চললৈকে বিয়পি আছে। দলখৰিয়াৰ নেজডাল তুলনামূলক ভাবে সাধাৰণ শহাপহক চুটি হোৱা দেখা যায়। তদুপৰি এইবিধ শহাপহৰ গাৰ নোমবিলাক অলপ ঠাণ্ডা হয়। সেই কাৰণেই ইয়াক "হিচুপিদ" হেয়াৰ বোলা হয়। ইয়াৰ পিঠিৰ আৰু দেহৰ দুয়ো কাষৰ নোমবিলাক ক'লা আৰু কপাটক শেতা হোৱাৰ বাবে বৰণত ইয়াক সাধাৰণ শহাপহক ক'লা দেখি। ইয়াৰ কাণ আৰু নেজৰ নোমৰ বৰণ মুগা চানেকীয়া হয়। পেটৰ তলৰ ফালৰ নোমবোৰ বগা চানেকীয়া আৰু বুকুৰ তলৰ নোমবিলাক অলপ ক'লা বৰণীয়া হয়।

দুঃপ্ৰাপ্য প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে দলখৰিয়া বা হিচুপিচ হেয়াৰৰ বিষয়ে জানিব লগা কথাবোৰ সঠিক ভাৱে জনা নাযায়। মানাহ অভয়াৰণ্য আৰু ইয়াৰ কাষে পাৰে থকা কিছুমান ঠাইত অৱশ্যে এইবিধ প্ৰাণীক বিচাৰি পোৱা গৈছে। মানাহ অভয়াৰণ্য তথা

বাদ যোজনাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শ্ৰীসঞ্জয় কুমাৰ দেৱ বয়ে (বৰ্ত্তমানে অসমৰ মুখ্য বন সংৰক্ষক) এই বিষয় প্ৰাণীৰ দৃষ্টত অগাভেটা হোৱাৰ প্ৰমাণ আছে। এবাৰ এটা দল-খৰিয়া শহা পহক তেখেতে শত্ৰুৰ দৰলৰ পনা উদ্ধাৰ কৰি আনি আটোম-টোকাৰিকৈ প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিছিলহি। ইয়াৰ বাবে তেখেতে এটা বিশেষ ধৰণৰ গড়ালো নিৰ্মাণ কৰি লৈছিল। জন্তুটোৱে ৰাতিয়ে ৰাজ্যিক পৰিবেশত বুকলি মনেৰে যুৱান দৰে গড়ালৰ ভিতৰতে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেখেতে গড়ালটোৰ ভিতৰত কিছুমান ওখ বাঁহ কই দিছিল। ইমান ভয়াৱৰান নোৱাৰা সৰেও তেখেতে জন্তুটোক আবেষ্টনীৰ মাজত বেছি দিন বচাই ৰাখিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হৈছে যে এইবিধ কোমল মতীয়া প্ৰাণী তেনেই অলপ ধতুৱা আঁক মানুহৰ চাট ই সহ্য কৰিব নোৱাৰে।



দলখৰিয়া বা হিচ্পিদ হোৱাৰ

দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰনদী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু এই বনাঞ্চলৰ কাষে পাছৰে থকা প্ৰেৰনিবোৰৰ মাজতো এই জাতীয় শহাপহু থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। এই বনাঞ্চলৰ গতে গাগি থকাটো কেইবাখনো চাহ বাগিচা আছে। তাৰে ভিতৰত আখাৰি-খেট নামৰ চাহ বাগিচাখনক অন্যতম বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। এই চাহ বাগিচাখনৰ কাষত ৰসতি দৰা কিছুমান বনুৱাই মাজে সময়ে হিচ্পিদ হোৱাৰ আৰু পিগুনি হগু (নল গাহৰি) নামৰ প্ৰাণীবোৰ জাল পেলাই ধৰিছিল। এইদৰে ধৰি অনা বন্যপ্ৰাণীবোৰক দুই চাৰিটা সিহঁতে জীয়াই জীয়াই বজাবত বিক্ৰি কৰিছিল। নলগাহৰিৰ লগতে এটা দলখৰিয়াকো বাগানৰ নেনেজাৰে বনুৱাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনি আলফুলকৈ পালন কৰিছিলহি। এইটো দল খৰিয়াও বৰ বেছি দিন ৰাচি নাপাকিল।

১৯৭৫ চনত নানাহ অভয়াৰণ্যত চাৰি-পাঁচচামান এই বিধৰ শহাপত্ৰ ধৰা পৰিছিল। এই কেইটা শহাপত্ৰ প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিবৰ বাবে গুৱাহাটীৰ চিনিয়াখানালৈ পঠাই দিয়া হৈছিল। কিন্তু সিহঁতৰ নাটতে মৃত্যু হ'ল। ১৯৭৬ চনত নানাহ অভয়াৰণ্যৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শ্ৰীপৰমানন্দ লাহনে বাঁহবাৰী নামৰ ঠাইত দুটা দলখৰিয়া উদ্ধাৰ কৰিছিল। সিহঁত দুটাৰ এটাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মৃত্যু বৰণ কৰিলে। বাকী লোক পুনৰ হাবিত মেলি দিয়া হ'ল।

হিচাপিছ হেয়াৰ বা দলখৰিয়াৰ বিষয়ে জানিব লগীয়া বহুতো তথ্য এতিয়াও নান ঠাইত সিঁচৰতি হৈ পৰিয়েই আছে বুলি ক'ব পাৰি।



দাঁতেৰে কুটিখোৱা জন্তুবিলাক

পোৱা বস্তুবোৰ দাঁতেৰে কুটি বৃষ্টি ৰাই জীৱন ধাৰণ কৰা প্ৰাণীবিলাকক সংক্ষেপতে “ৰোডেণ্ট” বোলা হয়। এই প্ৰাণীবিলাকৰ বিশেষত্ব হ’ল, ইহঁত আটাইবিলাকে আগদাঁত কেইটাৰ সহায়ত খোৱা বস্তুবোৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰি খায় আৰু হজম কৰে। আগদাঁত দুটাৰে ইহঁতে গছৰ ফলমূলবোৰ কামুৰি টুকুৰা টুকুৰকৈ বাৰদিবোৰ একত্ৰাই নানিলৈ পেৰাই দিয়ে। পাছত ফলমূলৰ ভিতৰত থকা বোনৰ শাহখিনি দাঁতেৰে ছিঙি আনি খায়। এই কুটি খোৱা দাঁতৰ আকাৰ ধাৰ থকা বটালিৰ নিচিনা। সেই বাবে এনে ধৰণৰ দাঁতৰ সহায়ত ইহঁতে যেনে কোনো বস্তু অতি সহজে ভাঙিব পাৰে। কুটি খোৱা প্ৰাণীবিলাকৰ ওপৰ দ্ৰাৱ তলৰ পাৰিৰ আলুত এমোৰ এযোৰকৈ দুয়োৰ দাঁতৰ উৎপত্তি হয়। এই দাঁত দুয়োৰ আলুৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা। সেই বাবে কোনো টান বস্তু কুটি খালে এই দাঁত দুয়োৰাৰ ওখৰ আলুৰ একো ক্ষতি নহয়। এইবিলাক প্ৰাণীৰ মুখত কুকুৰ দাঁতৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা নাযায়।

গিগনি, কেৰ্কেটুৱা, কেটেলা পত্ৰ, মাৰমট্ আদি বহুতো বিধৰ প্ৰাণীক এই “ৰোডেণ্টিয়া” বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।



কেটেলা পহু

শ্ৰেণী—স্তুত্যাপায়ী

বৰ্গ—বোডেন্টিয়া

গোত্ৰ—হিট্টিচিদি

প্ৰজাতি—হিট্টিজ ইল্‌পিকা

কেটেলা পহু নামৰ এবিধ সৰু আকাৰৰ বিচিত্ৰ প্ৰাণী অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কম বেছি পৰিমাণে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিশাচৰ হোৱা বাবে ইয়াক দিনৰ ভাগত য'তে ত'তে দেখা পোৱা নাযায়। ই থাকিবৰ বাবে খান্দি লোৱা গাঁতৰ সন্মুখত জ্বা হৈ থকা গুৰি মাটিখিনিৰ পৰাই এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰি থকাৰ বিষয়ে অনুমান কৰিব পাৰি। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ অগুৰ্গত উচ্চ ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণাত্যৰ কুমাৱিকা অন্তৰীপলৈ প্ৰায় সকলো ঠাইতে এইবিধ প্ৰাণীক দেখিবলৈ পোৱা যায়।

দাঁতেৰে কুটি কুটি খোৱা প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত কেটেলা পহু এক বৈশিষ্ট্য থকা প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ দেহত নোমৰ পৰিবৰ্তে এক প্ৰকাৰ কাঁইট বা ছলৰ উৎপত্তি হয়। সাধাৰণতে পিঠিৰ ওপৰৰ নোমবিলাক ডাঠ আৰু দীঘল হোৱা দেখা যায়। দেহৰ দুয়ো কাষৰ কাঁইটবিলাক ওপৰৰ পৰা পেটৰ তলৰ ভাগলৈ ক্ৰমে চুটি আৰু সৰু হৈ যোৱা দেখা যায়। পেট আৰু বুকুৰ তলত কোনো কাঁইট নাথাকে। কাঁইট বিলাকৰ দীৰ্ঘতা, বৰণ আদিৰ বৈচিত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেটেলা পহুবোৰক কেবাটাও প্ৰজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়।

কেটেলা পহুৰ কাঁইটৰ শলাবোৰক একে একোডাল খোৰোচা মাৰিৰ লগত ৰিজাব পাৰি। প্ৰত্যেকডাল কাঁইটৰ গুৰি ভাগ ছালৰ তলৰ মঙহত পোত খাই থাকে। পোত খাই থকা অংশ শুকুৱা বা মাখন ৰঙৰ হয়। বাকী অংশত বগা আৰু ক'লা বৰণৰ খলপা-খলপী দাগ আঙঠিৰ নিচিনাকৈ থাকে। কাঁইটবোৰ আকৃতিত গোলাকাৰ, মাজ ডোৰৰ শকত আৰু দুয়ো মূৰ ক্ৰমে জোড়া হয়। সাধাৰণতে কাঁইটবোৰ গাত লিপিত খাই পৰি থাকে। কিবা কাৰণত জন্তোটো উভেজিত হলে কাঁইটবোৰ থিয় হৈ পৰে আৰু জন্তোটোৱে ভয়ঙ্কৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। আত্মৰক্ষাৰ সজুলি হিচাপে জন্তোটোৱে এই কাঁইটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিবলগীয়া হলেও জন্তোটোৱে কাঁইটবিলাকৰ সহায় লবলগীয়া হয়। এই কাঁইটবোৰৰ দুই এডাল কেতিয়াবা মাটিত সৰি পৰে। কেতিয়াবা বহুতো কাঁইট মাৰিৰ দ্বাৰাত ওচৰা ওচৰিকৈ পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যি ঠাইত

কেটেলা পহুৱে গাঁত খালি থাকিবলৈ লয় তেনেবোৰ ঠাইতো কেটেলাৰ কাঁইট পৰি থকা দেখা যায়। এই পৰি থকা কাঁইটৰ পৰাই এনেবোৰ ঠাইত কেটেলা পহু থকাৰ বিষয়ে নিশ্চিত হব পাৰি। কোনো কোনো মানুহে মাটিবোৰ খালি গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা কেটেলা পহু উলিয়ায়। এইদৰে পোৱা পহু বধ কৰি এওঁলোকে তাৰ মাংসও খায়। কিছুমান জনজাতীয় তিব্বতী মানুহে কেটেলা পহুৰ কাঁইট অলংকাৰ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰে।

শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিষ্কৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কেটেলা পহুবিলাকে অভিনৱ কৌশল অৱলম্বন কৰা দেখা যায়। জন্তুটোৰ সন্মুখৰ ফালে আক্ৰমণ কৰিবপৰা কাঁইট দেখা নাযায়। তাৰ গাটোৰ পাছৰ ফালে থকা কাঁইটবোৰে আক্ৰমণ কৰে। কোনো শত্ৰুৱে ফেৰ মাৰি ধৰি তাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হ'লে সি নিজকে ৰক্ষা কৰিব লগীয়া হয়। সেউবাবে পাছ হোঁহকি গৈ কাঁইটবোৰ ঠৰঙা কৰি লৈ সি শত্ৰুৰ গাত জোৰেৰে বিন্ধি দিয়ে। তাৰ প্ৰচণ্ড আক্ৰমণত ভিটিব নোৱাৰি শত্ৰু পলাই সৰিব-লগীয়া হয়। গাব মঙহ আৰু বুকুত কাঁইট লাগি ধৰাৰ ফলত দুই এটা প্ৰাণীয়ে ততালিকে মৃত্যু বৰণো কৰিবলগীয়া হয়।


কেটেলা পহুৱে মানুহৰ শস্যৰও ক্ষতি কৰে। নতুনকৈ লগাই দিয়া আলু তাতীয়া গছৰ শিপা সি উঠাই আনি কোমল শাহখিনি খায়। ফলত শিপাৰ পৰা ওলাই অহা পোখা আৰু পুলিটোও মৰহি যায়। এইবিধ প্ৰাণী সাধাৰণতে মাটিৰ তলত থাকে। মাটিৰ তলত নিৰাপদে থাকিবৰ বাবে ই একোটা গাঁত খালি লয় আৰু গাঁতৰ ভিতৰত অখালি পখালিকৈ কেইটামান সুৰঙ্গ কৰি লয়। গাঁত খালিবৰ বাবে জন্তুটোৱে ফচ্ ফচীয়া মাটি বিচাৰি লয়।

গাঁত খালিবৰ বাবে জন্তুটোৱে আগঠেং দুখনৰ আঙুলি আৰু নখেৰে মাটিখিনি উজাৰি উজাৰি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। ইয়াৰ ফলত গাঁতৰ মুখৰ চাৰিওফালে মাটিৰ সৰু সৰু টুকুৰা আৰু গুৰিবোৰ গোট খাই একোটা হাঁফলুৰ সৃষ্টি হয়। গাঁতৰ ভিতৰৰ ফালে যি কেইটা সুৰঙ্গ কৰে তাৰে এঠাইত এডোখৰ আহল বহল কুঠলি তৈয়াৰ কৰি লয়। এই ডোখৰ ঠাইতে জন্তু কেইটাই চেপেটা মাৰি পৰি থাকে। মাইকী কেটেলা পহুৱে সেই ডোখৰ ঠাইতে সময় বুজি পোৱালি জগায়। বাহিৰৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা খোৱা বস্তুবোৰ মাচ-নাপেকে গাঁতৰ ভিতৰত সুমুৱাই পোৱালি কেইটাক খুৱাইগৈ। এনেদৰেই পোৱালি কেইটা লাহে লাহে গাঁতৰ ভিতৰত ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে। খোজ কাঢ়িব পৰা হলে সিহঁত দুৱাৰ মুখেদি বহি গৈ ওলাই আহি পৃথিৱীখনৰ লগত চিনাকি হবলৈ যত্ন কৰে।

গাঁতৰ ভিতৰত পৰা বহিবলৈ ওলোৱা সোমোৱা কৰিবৰ বাবে কেটেলা পহুৱে একেটা প্ৰবেশ পথৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভৰ নকৰে। গাঁতৰ ভিতৰত থকা আহল বহল ঠাই ডোখৰৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি ইহঁতে আন কেবাটাও পথ বনাই ৰাখে যিহে দুৱাৰ খনৰ প্ৰবেশ পথেদি শত্ৰু গাঁতৰ ভিতৰলৈ সোমাই অহা গম পালে ইহঁতে

তাৰে এটা নিৰ্গম পথেদি ওলাই কৰবালৈ গুচি যায়গৈ। এনে নিৰ্গম পথক যক্ষ্মা ভাষাত পাছ দূৱাৰ বুলি কোৱা হয়। আচলতে এই নিৰ্গম পথবোৰে জৰ্ম্মী কালীন দূৱাৰৰ কাম কৰে।

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰা মানুহবিলাকে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক বেলেগ বেলেগ নামেৰে নামকৰণ কৰিছে। অসমীয়া মানুহে ইয়াক কেটেলা পহ বোলে যদিও পহ শব্দটো সাধাৰণতে ছবিৰ জাতীয় প্ৰাণীক বুজাবলৈকে অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই একেটা শব্দকে কেইগাবিধমান প্ৰাণীক পৰিচয় কৰি দিবৰ বাবে বিশেষণৰ ৰূপত আমাৰ ভাষাত উন্নৈহতীয়া ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে যি-বিলাক জন্তুৰ মাংস মানুহে খায় তেনে কিছুমান জন্তুক বুজাবলৈ পহ শব্দটো বিশেষণৰ



কেটেলা পহ

ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে শৰপহ, সুগনী পহ, শহাপহ, কেমাটাই পহ, কেটেলা পহ আদি প্ৰাণীৰ নাম উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। বঙালী ভাষাত কেটেলা পহক "ছেদা" বুলি কোৱা হয়। হিন্দী ভাষাত এইবিধ প্ৰাণীক 'গায়াল' আৰু 'সাহি' বোলা হয়। দক্ষিণ ভাৰতৰ মানুহে ভাষা অনুযায়ী এইবিধ প্ৰাণীক বেলেগ বেলেগ শব্দৰে নামকৰণ কৰে। কেটেলা পহক কানাডা ভাষাত "ভেদ" বা মূলবান্ধি, তেলেগু ভাষাত "ভেদ" কিংবা "ভেদ" আৰু মালয়ালম ভাষাত "নোৱাম পুনি" বোলা হয়। পোৰ্টেই দেশৰ মানুহে বিভিন্ন নামেৰে নামকৰণ কৰাটো চাই ৰাখা হয় যে এইবিধ প্ৰাণী ভাৰতৰ

সকলো ঠাইতে কম-বেছি পৰিমাণে বাস কৰে ।

কেটেলা পহ জাতীয় প্ৰাণীৰ কেইবাটাও উপপ্ৰজাতি ভাৰত উপমহাদেশৰ ভিতৰতে বাস কৰাৰ কথা জনা যায় । অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য কেইখনত নিগাৰ্জীক বাস কৰে । কেটেলা পহৰ নেজডাল অলপ বেছি জোপোহা ধৰণৰ । সেই বাবে এই বিধ কেটেলা পহক “ব্ৰাচ টেইলড পৰকোপাইন” বা জোপোহা নেজীয়া কেটেলা পহ কোৱা হয় । দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে থকা এবিধ কেটেলা পহৰ কাঁইটত বঙা বৰণৰ বাঁজ থকাৰ বাবে সেইবিধ প্ৰাণীক বঙা কেটেলা বোলা হয় । পৃথিৱীৰ অন্যান্য বহুতো দেশত কেটেলা পহ থকা দেখা যায় । উত্তৰ আফ্ৰিকাত এবিধ ক্ৰেচ টেইলড পৰকোপাইন বা কিৰিটি পিঙ্কা কেটেলা পহ বাস কৰে । আমেৰিকাৰ ব্ৰাজিলৰ ফালৰ কোনো কোনো ঠাইত গছৰ ডালত বঙুৱা বাই ফুৰিব পৰা এবিধ কেটেলা পহ বাস কৰে । এইবিধ কেটেলা পহৰ গাৰ কাঁইটবিলাকত শঁকা সাপৰ দিবে খলপা-খলপী দাগ থকা দেখা নাযায় ।

কেটেলা পহৰে মুখেৰে সামান্য হচ্ হচ্ শব্দ কৰাৰ বাহিৰে অন্য শব্দ কৰা ন। মাত মতা দেখা নাযায় । কিন্তু ইয়াৰ কাঁইটবোৰৰ পৰা এক প্ৰকাৰৰ কণুক জুনুক শব্দ হয় । কেটেলা পহৰে এবাৰত এটাৰ পৰা চাৰিটা পৰ্যন্ত পোৱালি জন্মায় । পোনেই জগা পোৱালিৰ চকু মেল খাই থাকে । মাকৰ সহায় নোলোৱাকৈয়ে নতুনকৈ জন্মা পোৱালি, য ইফালে সিফালে ফুৰিব পৰা হৈ পৰে ।

মাৰমট্

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—ৰোডেণ্টিয়া

গোত্ৰ—ছুৰিডি

প্ৰজাতি—(১) মাৰমটা কডেটা

(২) মাৰমটা হিমালয়না

মাৰমট্ নামৰ প্ৰাণী বিশ্বক পৰ্বতীয়া এন্দুৰ বোলা হয়। হিমালয় শৈলমালাৰ ওখ ওখ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰিত মাৰমট্ আতীয়া প্ৰাণী বাস কৰে। দেখাত নিগৰ্ণি বা এন্দুৰৰ নিচিনা হলেও আকাৰত এইবিশ্ব প্ৰাণী যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। হিমালয় পৰ্বতত সাধাৰণতে বাস কৰা মাৰমটৰ বসতিস্থান পশ্চিমৰ ফালে লাডাক আৰু কাশ্মীৰৰ অন্তৰ্গত ওখ ওখ পৰ্বত সমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূবৰ ফালে নেপাল আৰু ছিক্কিমলৈকে বিয়পি থকাৰ কথা জনা যায়। এইবিশ্ব মাৰমটক হিমালয়ান মাৰমট্ বা হিমালয়ৰ মাৰমট্ বোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব মাৰমটক দীঘল নেজীয়া মাৰমট্ নামেৰে জনা যায়। ইহঁতৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান লাডাক আৰু কাশ্মীৰতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি এইবিশ্ব মাৰমটাৰ বিচৰণ ভূমি এচিয়া মহাদেশৰ মধ্যাঞ্চলত থকা পৰ্বতীয়া ঠাই কিছুমানলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে।

মাৰমট্ বিনাকৈ একে ডোখৰ ঠাইতে লগ লাগি বাস কৰে। পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত ইহঁতে গাঁত ৰালি সূৰঙ্গ কৰি লয়। আৰু একেটা সূৰঙ্গৰ ভিতৰতে বহুতো মাৰমট্ আৰু পাতি সোমাই থাকে। আৰুকাৰি বহুতো প্ৰাণী এনেদৰে থাকি নোখোৱা নোবোৱাকৈ গাঁতৰ ভিতৰতে বহুত দিন কটায়। বসন্ত কাল আহি যেতিয়া গোটেইবোৰ ঠাই ঘাঁহ, কুঁহিপাত ফলমূল আদিৰে ভৰি পৰে তেতিয়া সেইবোৰ খাবলৈ ইহঁত জাকে গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে। শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণী অহাৰ উমান পালে ইহঁতে ইফালে সিফালে ছিটিকি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। বিপদৰ ইঙ্গিত পালে জন্তুবোৰে এক প্ৰকাৰৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰি আটাইবোৰ লগৰীয়াৰ পলাই সাৰিবৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিয়ে। তেতিয়া গোটেই আৰু প্ৰাণীয়ে আকৌ গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই নিজক ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে।

মাৰমট্ শ্ৰেণীৰ আন কেইবিশ্বমান প্ৰাণী ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি পৃথিৱীৰ অন্যান্য ঠাইত বাস কৰা দেখা যায়। এইবিনাকৰ ভিতৰত ইউৰোপ

মহাদেশত বাস কৰা আল্পাইন হাবৰট্ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাত থকা উলচক্ নামৰ দুবিধ প্ৰাণীৰ দৰে বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। তদুপৰি পশ্চিম গোলার্ধৰ উত্তৰ আমেৰিকাত 'গ্ৰেইবী' নামেৰে যিবিলাক বিস্তৰ্ণ ভূগভূমি আছে সেই পথাৰ-বিলাকত হাবৰটৰ নিচিনা আন এবিধ প্ৰাণী আকৈ আকৈ বাস কৰে। এইবিধ প্ৰাণীক



হাবট্

“গ্ৰেইবী দগ” বা “গ্ৰেইবী হাবৰট” বোলা হয়। ইহঁতে বাস কৰা ‘গ্ৰেইবী’ অঞ্চলৰ একোটা বিস্তৰ্ণ এলেকা ইহঁতে অধিকাৰ কৰি লয়। বিবোৰ ঠাইত ‘গ্ৰেইবী’ দগবোৰে খন্দা গাঁত থাকে সেই ঠাইক গ্ৰেইবী নগৰ বোলা হয়। গ্ৰেইবী দগক আমেৰিকা মহাদেশৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য বন্য-প্ৰাণী ৰূপে গণ্য কৰা হয়।

হাবৰট গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকে একেবাৰতে তিনি চাৰিটা পৰ্বত পোহালি জগায়।



কেৰ্কেটুৱা

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---ৰোডেণ্টা

গোত্ৰ---চিউৰিডি

প্ৰজাতি---(১) কেৰোচিওৰাচ পাইগামিট্ৰাচ্

(২) ড্ৰেমোমিচ্ প্ৰক্ৰিয়া

দাঁতেৰে কুটি খোৱা প্ৰাণীৰ ভিতৰত কেৰ্কেটুৱা অন্যতম। ভাৰতবৰ্ষত কেৰ্কেটুৱা গোষ্ঠীৰ কেইবা বিধে প্ৰাণী বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা দেখা যায়। ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ গুণাগুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ এইদৰে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰা কেৰ্কেটুৱাৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণ দেখা যায়। আমাৰ অসমত সাধাৰণতে য'তে-ত'তে দেখা বিধ প্ৰাণীক খাউকতে কেৰ্কেটুৱা শব্দদৰে সন্মান হয়। বিশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলত থকা কেৰ্কেটুৱা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ কেৰ্কেটুৱাক পৃথক ভাৱে পৰিচয় দিবলৈ হিমালয়ান স্কইৰেল বা হিমালয়ৰ কেৰ্কেটুৱা শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হয়। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত দেখা কেৰ্কেটুৱাৰ বিচৰণ ভূমি পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো পৰ্বতীয়া আৰু ভৈয়মীয়া ৰাজ্যলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত পশ্চিম বঙ্গ, নেপাল, ভূটান, চিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, নগালেণ্ড, মেঘালয়, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা আদিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি।

এইবিধ কেৰ্কেটুৱাৰ গাৰ নোমৰ বৰণ মুগা বা হোঁৱা চানেকীয়া হয়। এই নোমৰ আৱৰণখন বিভিন্ন বঙৰ হোৱা দেখা নাযায়। দীঘল নেজডালত গজা নোমবোৰ অলপ দীঘল হোৱাৰ বাবে নেজ ডালত আকৃতি জোপোহা যেন দেখি। উত্তন আৰু মধ্য ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা কেৰ্কেটুৱা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰক দৰে এইবিধ কেৰ্কেটুৱাক পিঠিত কোনো ধৰণৰ আচ বা পটি দেখা নাযায়।

এইবিধ কেৰ্কেটুৱা সাধাৰণতে গছৰ ওপৰত বগাই ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেইবাটাও কেৰ্কেটুৱা ওচৰা-ওচৰিকৈ ইফালে সিফালে গছৰ ডালত বগাই ফুৰা অৱস্থাত ইহঁতে মাজে সময়ে এক প্ৰকাৰৰ মাত মাতে। এইদৰে একে লেঠাৰিয়ে কৰা শব্দবোৰৰ প্ৰতিবনি বহুত নিলগৰ পৰা মাজে সময়ে শুনিবলৈ পোৱা যায়। “কেৰ্কেট” “কেৰ্কেট” কৰি মাত মাতেতো মতা আৰু মাইকীয়ে একেলগে এই কামত অংশ গ্ৰহণ কৰে। মানুহ কিবা অন্য কোনো শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীৰ উমান পালে ইহঁতে খন্তেকৰ বাবে মাত

এটা বন্ধ কৰি শব্দ আঁফন গাঁতিকাৰ লক্ষ্য কৰি ঠাইতে টৈ যায়। শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিতকে বক্ষা পাবলৈ বাবে এনে এনে ব্যৱস্থা কৰি আৰু আৱশ্যক হলে লাহেকৈ সৰি মাটি মাটি। গঠন ওচৰ যাবগৈ। শত্ৰুৰ অনুসাৰ কৰা যেন নোদেখিলে ইহঁতে পুনৰ মাতি নওনটো আঁফন বৰে। এই তদ কেকেটুৱাই মানুহৰ বাৰীৰ ভিতৰত বান্ধা গছ কলকোৰাতো বান্ধি কামু খুৰুণাবোৰ মাটিলৈ পেলাই দিয়ে। সাত বাৰ নিদান এনে ভাঙি তললৈ পেলাই দিয়াৰ পাচত ভিতৰত থকা কোমল শাহ-খিৰি পাই গছ বন্ধা বাঢ়ি, দলিয়াই গছ সাঁতৰি তলৈ পেলাই দিয়ে। তাৰোপৰি



কেকেটুৱা

কেকেটুৱাই বাৰীৰ তামোল গছৰ ডামোল খাই বহুত সতি কৰে। গছত লাগি থকা কুমলীয়া তামোলত কামোল মাটি ভিতৰত শাহবোৰ খানটো এতে তামোলবোৰ মাটিলৈ সৰি পৰে। কেঁচা তামোল মাটিত সৰি পৰোতে পৰোতে বিছুমান গছৰ ডামোল একে-বাৰে নাইকিয়া হৈ পৰে। গিৰিহঁতে নানা কৌশলেৰে বেৰেটুৱাই অগিষ্ট কৰাৰ পৰা

গছৰ কুমলীয়া তামোলবোৰ বন্ধা কৰিবলৈ যত্ন কৰে। তেওঁলোকে বাটলংটি, বেটেপা, ধনুকাঁড় আদিৰ সহায়ত কেৰ্কেটুৱা দেখে।

কেৰ্কেটুৱাক বৰ চালাক চতুৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি কব পাৰি। যিবোৰ হাবিতলীয়া ঠাইত ইহঁতে মানুহৰ বাবা আক্ৰান্ত নোহোৱাকৈ মুকলি মনেদে ফুৰিব পাৰে সেইবোৰ ঠাইৰ কেৰ্কেটুৱা বিলাকে নিৰলে বাস কৰিব পাৰে। মানুহৰ বাৰী আৰু বাগানত সোমাই কলমুল অনিষ্ট কৰা কেৰ্কেটুৱাবোৰক মানুহে সুবিধা পালেই কৌশলেৰে মাৰিবলৈ যত্ন কৰে। সেই কাৰণে সিহঁতে বগাই ফুৰা গছগছনিৰ তললৈ মানুহ অহাৰ উমান পালে গছৰ ওপৰতে খন্তেকৰ বাবে টলকা মাৰি বৈ যায়। পাছত গছৰ তলৰ পৰা মানুহ আঁতৰি যোৱা গম পালেই গছৰ ওপৰে ওপৰে বগুৱা বাই আৰু ডালে পাতে বগাই নিৰাপদ ঠাইলৈ গুচি যায়।

জং-জাবৰ, শুকান খেঁৰ আদি গোটাই লৈ কেৰ্কেটুৱাবিলাকে গছৰ ধোন্দ বা ফেৰেঙনিত বাহ সাজি থাকিবলৈ লয়। হাবিৰ মাজত সাজি লোৱা বাহত ইহঁতে নিগাজীকৈ থাকিবলৈ লয়। সাধাৰণতে মানুহ বাস নকৰা ঘৰতো ইহঁতে সুবিধা পালে চালৰ তলত বা চিলিঙৰ ওপৰতে বাঁহ সাজে। মাইকী কেৰ্কেটুৱাই এনেবোৰ বাহতে পোৱালি জগায় আৰু বাহিবৰ পৰা খোৱা বস্তুবোৰ ষোঁটাই আনি সিহঁতক খুৱায়হি।



পিঠি আঁচ থকা কেৰ্কেটুৱা

শ্ৰেণী—সুদ্যাপায়ী

বৰ্গ—ৰোডেণ্টিয়া

গোত্ৰ—কুৰিডি

প্ৰজাতি—(১) ফানাসুলচ্ পেনাণ্টি

(২) ফানাসুলচ্ পাৰাখাম

হিমালয় শৈলমালাৰ নামনি অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণাত্যালৈকে বিয়পি থকা এই বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগত দুয়োবিধ কেৰ্কেটুৱা থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই দুয়োজোডিৰ কেৰ্কেটুৱা আকাৰত তেনেই সৰু হয়। সিহঁতৰ পিঠিত দীঘল দীঘল আঁচ থাকে। এই আঁচ কেইডাল ডিঙিৰ ওপৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেজৰ শুবিলৈকে পিঠিৰ ওপৰেদি বিয়পি থাকে। তাৰে ভিতৰত এবিধৰ পিঠিত পাঁচ ডালকৈ আঁচ থাকে। দ্বিতীয় বিধৰ পিঠিত মাত্ৰ তিনি ডালহে আঁচ থকা দেখা যায়। পাঁচডালকৈ আঁচ থকা কেৰ্কেটুৱা বিধ উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বেছিভেদে দেখা যায়। আনহাতে দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত তিনিডালকৈ আঁচ থকা কেৰ্কেটুৱা বিধ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেতিয়াবা দুয়ো বিধ কেৰ্কেটুৱাকে একে ঠাইতেও দেখা যায়।

পাঁচডালকৈ আঁচ থকা কেৰ্কেটুৱাই মানুহৰ সহযোগত থাকিবলৈ ভাল পায়। উত্তৰ ভাৰতত লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, জয়পুৰ আদি মহানগৰবী বিনাকৰ মানুহৰ বাৰীৰ চৌহদ আৰু ঘৰৰ কাষত থকা গছ গছনিবিলাকত এইবিধ কেৰ্কেটুৱা বগুৱা বাই ফুৰি ফুৰা দেখা যায়। মাজে মাজে ইহঁতে মাটিতৈ নামি আহে আৰু বাঁহবন থকা পথাৰ অথবা ততা মাটিৰ ওপৰত বগুৱা বাই ফুৰি ফুৰে। মানুহৰ ঘৰ আৰু বাৰীত সাধাৰণতে থকা এলুৱ, নিগনি প্ৰভৃতি প্ৰাণীৰ দৰে এইবিধ কেৰ্কেটুৱাই মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিবলৈ ভাল পায়। মাটিত, পকীঘৰ আদিৰ বেৰ চালৰ ওপৰত বগাই ফুৰা এই সৰু আকাৰৰ কেৰ্কেটুৱাবোৰৰ আলেক্সেলৈ চাই ভাল লাগে। সাধাৰণতে বগুৱা বাই ফুৰি পকি ফুৰা আৰু মাজে-সময়ে জাপ মাৰি মাৰি ইফাল সিফাল কৰা এই অকণমানি প্ৰাণী-বোৰে সময়ে সময়ে এক প্ৰকাৰৰ চিঁচিঁ শব্দ কৰে।

পিঠিৰ ওপৰত তিনিডালকৈ আঁচ থকা দ্বিতীয় বিধ কেৰ্কেটুৱা জনবসতি অঞ্চলত থকা দেখা নাযায়। গছ গছনিৰে পৰিপূৰ্ণ হাবি বনাৰিবিলাকতহে এইবিধ কেৰ্কেটুৱা সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। গছৰ ডালে পাতে বগাই ফুৰোতে এইবিধ কেৰ্কেটুৱাই এক প্ৰকাৰৰ শব্দ কৰে। এইদৰে মাত মাতী ফুৰি ফুৰা সময়ত ই জোপোছা নেজডাল ডাঙি ডাঙি গছৰাই থাকে। হাবিত বাস কৰা বাবে এইবিধ কেৰ্কেটুৱাই গছত লগা নানাবিধৰ ফল, বাকলি থকা গুৰি, কুমলীয়া কুঁহিপাত, আৰু গছৰ বাকলি আদি খাই জীৱন ধাৰণ কৰে।

পিঠিত আঁচ থকা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আন এবিধ কেৰ্কেটুৱা দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত থকাৰ কথা জনা যায়। এইবিধ কেৰ্কেটুৱাৰ নোমৰ বৰণ ক'লা। বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি দক্ষিণৰ ফালে শ্ৰীশঙ্কটনৈকে সংশ্ৰবিত হৈ আছে। ইয়াৰে আকৌ কেইবাটাও উপজাতিৰ প্ৰাণী মাই অনশাণী স্থানীয় ভাৱে বাস কৰে। তাৰে এবিধ পাঁচ



পিঠিত আঁচ থকা কেৰ্কেটুৱা

সঁচীয়া কেৰ্কেটুৱাৰ শাবীৰিৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল ইহঁতৰ গান নোমৰ বৰণ একেবাৰে ক'লা নহৈ অলপ সেউজীয়াটো মধুৰতা হয়। পিঠিত চাৰি ডালকৈ দীঘল দীঘল ক'লা আঁচ থাকে। তাৰ মাজে মাজে তেজিঙা আৰু ডুপনীয়া আঁচ দীঘলীয়াটো ভিৰিৰিক থাকে। গছৰ ওপৰৰ ডাল পাতৰ মাজত আনেতে আনেতে লুকাই থকা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে ইহঁতক সহজে দেখা নাযায়।

পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত এবিধ সৰু আকাৰৰ আঁচ থকা কেৰ্কেটুৱা বাস কৰে। এইবিধ কেৰ্কেটুৱাইও মানুহ চাট সহ্য কৰিব নোৱাৰে। পৰ্বতীয়া ঠাইত থকা গভীৰ অৰণ্যত সানাবণ্যে এইবিধ কেৰ্কেটুৱাক দেখা যায়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা হিন্দীয়া পৰ্বতৰ নামনি অঞ্চলতো এইবিধ কেৰ্কেটুৱা দেখা যায়। ●

বৰ কেৰ্কেটুৱা

শ্ৰেণী—সুদ্যপায়ী

বৰ্গ—বোডেন্টিয়া

গোত্ৰ—কুৰিডি


প্ৰজাতি—বাটোফা বাটকলৰ

অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা কেৰ্কেটুৱাক আকৃতি সাধাৰণতে মজলীয়া হয়। মানুহৰ বাৰীৰ গছ গছনি আৰু মুকলি বুলীয়া ঠাইত ইহঁতে বাস কৰে। গভীৰ অৰণ্যত ইহঁতক দেখা পোৱা নাযায়। ডাঠ হাৰিৰ ওখ ওখ গছত আন এনিধ ডাঙন আকাৰৰ কেৰ্কেটুৱা বাস কৰে। এইবিধ কেৰ্কেটুৱাক “জায়েন্ট কুইবেল” বোলা হয়। এই শব্দৰ অৰ্থ বুজাই অসমীয়া ভাষালৈ তৰ্জমা কৰিলে এইবিধ কেৰ্কেটুৱাক আমাৰ ভাষাত দৈত্যাকায় কেৰ্কেটুৱা বুলি ক’ব লাগিব। সংক্ষেপতে এইবিধ কেৰ্কেটুৱাক বুজাবলৈ “বৰ কেৰ্কেটুৱা” নামটোকে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গভীৰ অৰণ্যৰ ওখ ডাঙৰ গছবোৰত এই জাতৰ কেৰ্কেটুৱা দেখা যায়। ওখ ওখ গছবোৰৰ ঠিকনি আগত থকা ডালত বাস কৰা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে ইহঁতক সাধাৰণতে য’তে ত’তে দেখা নাযায়। কিন্তু এই জাতৰ কেৰ্কেটুৱা এটা লেখত লবলগীয়া চাৰিত্ৰিক গুণ দ্বাৰা সময়ে ইহঁতে কেৰ্কেটুৱাৰ দৰে মাত মাত আৰু এই মাত গছ জোপাৰ তলত বা অলপ আঁতৰত থকা মানুহে স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পায়। তেতিয়া ভাৱলৈ আহে ডাল পাতত এই জন্তুটোৰ অস্তিত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰি।

গছৰ তলেদি মানুহৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ উমান পালে এইবিধৰ কেৰ্কেটুৱাই গছ জোপাৰ ডাল এটাতে অলৰ-অচৰ হৈ চেপেটা মাৰি পৰি থাকে। মানুহ আঁতৰি যোৱাৰ গম পালেই লাহেকৈ সেই ঠাই এৰি গছজোপাৰ আন এটা ডাল পায়গৈ। কেতিয়াবা কেৰ্কেটুৱাই এনেভাৱে একেখনে থাকে যে যি একে ডোখৰ ঠাইতে বৈ আছেনে নাই তাক ধৰা টান হৈ পৰে। তাৰ দীঘলীয়া স্তবৰ মাত শুনিবলৈ অনুমান কৰিব পাৰি যে কেৰ্কেটুৱাটো একেডোখৰ ঠাইতে টলকা মাৰি বৈ আছে। পিচত তাৰ স্তবধা অনুসাৰে ওচৰতে থকা গছৰ ডালবোৰলৈ জাপ মাৰি মাৰি গুচি যায়গৈ। পলৰীয়া প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে গাৰ বৰণ উজল হলেও হাবৰ মাজত ইহঁতক সহজে দেখা পোৱা নাযায়। কিবা কাৰণত কেতিয়াবা মাটিলৈ নামি আহিবলগীয়া হলেও ইহঁতক তৎক্ষণাত পুনৰ গছৰ ওপৰ পায়গৈ।

সমগ্ৰ দেশতে সৰ্বমুঠ তিনি শ্ৰেণীৰ বৰ কেৰ্কেটুৱা বা জায়েন্ট কুইবেল বাস কৰে বুলি জনা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত যিবিধ বৰকেৰ্কেটুৱাক দক্ষিণাত্যৰ ফালে বাস কৰে দেখা যায় সেইবিধ বৰ কেৰ্কেটুৱাক ভাৰতীয় বৰকেৰ্কেটুৱা বা ইণ্ডিয়ান জায়েন্ট

ছুইবেল বোলা হয়। দ্বিতীয় বিধ বৰ কেৰ্কেটুৱাক বালয়ৰ বন কেৰ্কেটুৱা আৰু তৃতীয় বিধ বৰ-কেৰ্কেটুৱাক গ্ৰিজল্ড আয়েণ্ট ছুইবেল বোলা হয়। ইহঁতৰ বহুতো উপ-প্রজাতি ঠাই অনুযায়ী বাস কৰে। অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি পূব ভাৰতৰ ৰাজ্য গুৱাহাটী বিবিধ বৰ কেৰ্কেটুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবিধৰ গাঁৱ নোমৰ বৰণ বঙচীয়াটক উজল আৰু বিচিত্ৰ হয়। ভুটান, ছিক্কিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত এইবিধ বৰ কেৰ্কেটুৱা দেখা যায়। ভাৰতৰ বাহিৰে এইবিধ বৰ কেৰ্কেটুৱাৰ বসতিস্থান মূৰৰ প্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশলৈ বিস্তাৰিত হৈ আছে বুলি জনা যায়। তাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মদেশ আৰু মালয়ান্দিয়াৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰি পাৰি।



বৰ কেৰ্কেটুৱা

দিন দুপৰত এইবিধ প্ৰাণী ওখ ওখ গছবোৰৰ ওপৰৰ ডাল পাতৰ মাজত নিবলৈ সোমাই থাকে। আবেলি পৰত জিৰণি মোৱা ঠাইৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই আহি গছৰ ডাল পাতৰ ওপৰত বগুৱা বাই কৰে। বনবীয়া গছবিলাকত নমালেনে লাগি থকা নানা ধাঁড়োপযোগী ফল আৰু গুটিবোৰ তাৰ চোকা দাঁতৰে কানুৰি কানুৰি ভাঙি খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ফলৰ ওপৰৰ আঁহবোৰ দাঁতৰে ছিঙি বাকলিৰে সৈতে তললৈ পেলাই দিয়ে। তেতিয়া ফলৰ ভিতৰৰ কালে থকা কোমল শাহৰিনি খাই থয়। নিশা এইবিধ প্ৰাণীয়ে গছৰ ওপৰৰ সুবিধাজনক ঠাইত জিৰণি লয়। নিচেই ৰাতিপুৱা লিহঁতে জিৰণি মোৱা ঠাইৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই আহে। ভৰ দুপৰীয়ালৈকে আগ-বেলা ইহঁতে আহাৰ বিচাৰি কৰে। দুপৰীয়া সৰৱত গছৰ ওপৰৰ কোনোবা এঠাইত আকৌ চেপেটা বাৰি পৰি থাকে। আবেলি পুনৰ ৰাতি বিচাৰি ওলায়। কেতিয়াবা গাইঙচীয়াটক আৰু কেতিয়াবা লগেৰে ইহঁতক গছৰ ওপৰত দেখিবলৈ পাবা যায়।

ওখ ওখ গছৰ ঠাঁই ঠেঙুলিৰ মাজত আৰু ডালৰ কেৰেঙনিত ইহঁতে বাহ সাজে। বাঁহ পাতৰেৰে আদি গোটাই লৈ বাহ সাজে। সেই বাহতে মাইকী কেৰ্কেটুৱাই পোৱালি জগায়।

উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা, বায়শৰ বা বাংকেপ

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—ৰোডেণ্টিয়া

গোত্ৰ—পেতোৰিষ্টাডি

প্ৰজাতি—(১) পেতোৰিষ্টা ৰেণ্ণিফিকচ্

(২) হাইলোপেটচ্ এলবোনিগাৰ

(৩) বিনোমিচ্ পিয়েৰচনি

স্তন্যপায়ী জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত কেৱল বাদুহিয়ে চৰাইৰ দৰে উৰিব পাৰে। কেৰ্কেটুৱা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমানে আংশিক ভাবে উৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে ইন্দোনেচিয়া আৰু মালয়ছিয়াৰ ছাবি বৰ্ণনিত আন দুজাতিৰ উৰিব পৰা বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰে। এই দুবিধ প্ৰাণীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জন্তু কেইবিধক সাধাৰণতে কলোগাছ অথবা ফাইং লেম্বৰ (উৰণীয়া লেম্বৰ) বোলা হয়। এইবিলাক স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ বাহিৰে অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশত ফালাঙ্গাৰ নামেৰে জনাজাত কেইবিধমান প্ৰাণী আছে। ফালাঙ্গাৰ শ্ৰেণীৰ কেইবিধমান প্ৰাণীয়ে উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা আৰু উৰণীয়া লেম্বৰ দৰে আংশিক ভাবে উৰা দেখা যায়। ফালাঙ্গাৰবিলাক মাৰচোপিয়ালা বৰ্গৰ প্ৰাণী আৰু ক্যাছাৰ গোষ্ঠীৰ এই প্ৰাণীবিলাকৰ কোনো এবিধকে ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা দেখা নাযায়। মাছ, সাপ, নাইপিয়া আদি প্ৰাণীৰ ভিতৰতো কিছুমানে আংশিক ভাবে উৰণ শক্তি আয়ত্ব কৰি লব পাৰিছে। আটাইবিলাক প্ৰাণীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো এই প্ৰবন্ধৰ মুখ্য উদ্দেশ্য নহয়। সেই বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নানা পৰিবেশত নিগা-জীৱক বাস কৰা উৰিব পৰা কেৰ্কেটুৱা বিলাকৰ বিষয়ে সদ্যহতে আলোচনা কৰা হ'ব। কেৰ্কেটুৱা শ্ৰেণীৰ যিবিলাক প্ৰাণীয়ে আংশিক ভাবে উৰণ শক্তি আয়ত্ব কৰি ল'বলৈ সৰ্থ হ'ব পাৰিছে সেইবিলাকেও প্ৰকৃত পক্ষে চৰাইৰ দৰে পাখি কোবাই উৰিব নোৱাৰে। উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা বা বায়শৰ নামৰ প্ৰাণীৰ আগঠেং দুখনক সংলগ্ন কৰি দুখন ছালৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা যায়। এই ছাল দুখন চৰাইৰ পাখিৰ দৰে বেলি দি জন্তু-দুটোৱে বায়ুমণ্ডলত কিছু দূৰ উৰি যাব পাৰে। অৱশ্যে এই দুখন ছালৰ সহায়ত সিঙঁতে চৰাইৰ দৰে একেলৈঠাৰিয়ে উৰি যাব নোৱাৰে। ওখ গছৰ ডাল এটাৰ পৰা অলপ তলৰ ফালে থকা ডাল এটালৈ ফেলনীয়া ভাবে ভাহি ভাহি নাবি আহোতে এই ছালখনে

প্ৰাণীটোক সহায় কৰে। ছাল দুচটাই এক প্ৰকাৰ পেৰাচুটৰ নিচিনা কাম কৰে আৰু জন্তুটোৱে আকাশতে ভাহি আহি এভোপা গছৰ ডালত পৰিবলৈ সুবিধা হৈ পৰে। এইদৰে উৰিব পৰাৰ বাবে এইবিধ কেৰ্কেটুৱাক ইংৰাজী ভাষাত 'ফ্লাইং স্কুইবেল' বোলা হয়। এই নামৰ লগত বজ্জিতা খুৱাই আমাৰ ভাষাত এইবিধ প্ৰাণীক 'উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা' বোলা হয়। অসমীয়া মানুহে এই বিধ প্ৰাণীক 'বামশৰ' বুলি কয়। তদুপৰি বাংকেক্ নামৰ আন এটা খাচ্ অসমীয়া শব্দ এইবিধ প্ৰাণীক বুজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই বাবে বামশৰ আৰু বাংকেক এই দুয়োটা শব্দ আনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কেৰ্কেটুৱা গোষ্ঠীৰ বিশেষ প্ৰাণী হ'লি এই বিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা নামটোকো সাময়িক ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।



উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা, বামশৰ বা বাংকেক

গভীৰ অৰণ্যভূমিৰ ওখ গছৰ ওপৰত থকা বাবে উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা বা বামশৰক য'তে ত'তে দেখা নাযায়। গছৰ ওপৰত সবহুখিনি সময় অতিবাহিত কৰাৰ বাবে এইবিধ প্ৰাণীক বৃক্ষবাসী প্ৰাণীৰ আখ্যাও দিব পৰা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পনিবেশত মাত্ৰ তিনিটা প্ৰজাতিৰ বামশৰ বাস কৰিলেও আচলতে সিহঁতৰ কেইবাটাও উপ প্ৰজাতি থকাৰ কথা জনা যায়। চাৰিত্ৰিক গুণত ইহঁতবোৰৰ মাজত লেখত লৰলগীয়া ব্যৱধান আছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু সিহঁত প্ৰত্যেক বিধৰ নোমৰ বৰণ আৰু আকৃতিত প্ৰভেদ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিছুমান জাতৰ উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা বা বামশৰ বিলাক আকাৰত ডাঙৰ হয়। আন কিছুমানক তুলনা মূলক ভাৱে আকাৰত সৰু হোৱা দেখা যায়। অলম আৰু অপমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য কেইখনৰ অন্তৰ্গত একাধিক জাতৰ উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱাক থলুৱা ভাৱে বাস কৰা দেখা যায়। কাশ্মীৰৰ ফালে থকা উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱাক কাশ্মীৰী উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা বুলি কোৱা হয়। ইহঁতৰ নোমৰ বৰণ বগচুৱাকৈ মুগা হয় আৰু এই নোমবোৰ উলসূতাৰ দৰে কোমল হয়। হিমালয় পৰ্বতমাৰ্গৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আন কেবা বিধৰো বামশৰ পোৱা যায়। বিভিন্ন ৰঙৰ নোমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইহঁতক কেইবাটাও প্ৰজাতি আৰু উপ প্ৰজাতিত ভগোৱা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আকাৰৰ হীনডেচি অনুযায়ী বিভিন্ন ৰূপত ইহঁতক দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই অনুপাতে বৈজ্ঞানিক ভাৱে সিহঁতক বেলেগ বেলেগ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। দক্ষিণ ভাৰতৰ অৰণ্যভূমিত থকা উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱাবিলাকৰ প্ৰত্যেক বিধক বেলেগ বেলেগ বৈজ্ঞানিক নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। জীৱবিদ সকলৰ মতে সমগ্ৰ দেশত নিচেই কমো তিনি বিধমান বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ এনে ধৰণৰ প্ৰাণী আছে।

নানাবিধ ফলমূল খাই উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা বা বামশৰবিলাকে জীৱন ধাৰণ কৰে। কীট-পতঙ্গ আদিও ইহঁতৰ খোৱা আহাৰৰ ভিতৰত পৰে। সখল জাতীয় উদ্ভিদৰ বেটুপাত থকা ফল কিছুমান উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱাই কুটি কুটি খোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিশাচৰ প্ৰাণীৰ দৰেই ইহঁতৰ চৰিত্ৰ। গোটেই নিশা আহাৰৰ সন্ধানত ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে আৰু লোক লোকালিতে সাধাৰণতে জিৰণিলোৱা ঠাইবোৰলৈ গুচি যায়গৈ। শুবৰ সময়ত উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱাই মূৰটো পেটৰ ওচৰত গোঁজ মাৰি এটা বলৰ ৰূপ লৈ সেই অৱস্থাতে টোপনি যায়।



গিনিপিগ

শ্ৰেণী----তৃণোপভোজী

বৰ্গ----ৰোডেণ্টিয়া

গোত্ৰ----কেভিডি

‘গিনিপিগ’ নামৰ সৰু আকাৰৰ প্ৰাণীবিধক বন্যভাঙ বুলি আখ্যা দিব নোৱাৰি। কাৰণ এইবিধ প্ৰাণীক বনৰীয়া অৱস্থাত দেখা নাযায়। অথচ আমাৰ মাজৰ বহুতো মানুহৰ ঘৰত গিনিপিগ জাতীয় প্ৰাণী পোহা দেখা যায়। বগা বৰৰা বনৰৰ নোমৰ গছা পছন্দ নিচিনা গিনিপিগবিলাক দেখিবলৈ নতুন ভাল লাগে। পোহৰীয়া প্ৰাণী হ’লেও ইয়াক সাধাৰণতে এটা বাকচ বা গড়ালৰ ভিতৰত সন্মুৱাই বাধি আলফুটেক পালন কৰা হয়। আকৃতিত সৰু আৰু দেখাত মৰম বগা বালে, কুকুৰ মেকুৰী আদি ঘৰচীয়া প্ৰাণীয়ে অত্যাচাৰ কৰাৰ ভয়ত গিনিপিগ জাতীয় প্ৰাণীক মানুহে সাধাৰণতে মুকলি মূৰীয়াতকৈ ফুৰিবলৈ বাহিৰত এৰি দি দিয়ে। পশু চিকিৎসানায় আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়ৰ গৱেষণাগাৰত এইবিধ প্ৰাণীৰ দেহত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৱেষণা চলোৱা হয়। তাৰ বাহিৰে গিনিপিগক অ’কাৰামত লগোৱা দেখা নাযায়।

দেখাত আৰু স্বভাৱত গিনিপিগবোৰ নিৰ্গান আৰু এন্দুৰৰ দৰেই মিল খকা দেখা যায়। গিনিপিগ আৰু এন্দুৰৰ দৰে গিনিপিগেও খোৱা বস্তুবোৰ আগ দাঁতেৰে কুটি কুটি খায়। এইবিধ প্ৰাণীৰো মুখৰ আগ ভাগত এযোপা এযোপাকৈ কুটি খোৱাৰ উপযোগী দাঁত থাকে।

গিনিপিগৰ উৎপত্তি ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া হ’ল সেই বিষয়ে বৰ ভালদৰে জনা নাযায়। অনুমান হয় যে ইংৰাজসকল ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ পৰৱৰ্তী কালছোৱাতে ভাৰতবৰ্ষত এই জাতীয় প্ৰাণীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ’ল। তেওঁলোকৰ কোনো কোনোৱে ইহঁতৰ গাঁচ ভাৰতবৰ্ষলৈ আনি মৰমেৰে ঘৰত প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিছিল। কালক্ৰমত ইহঁতৰ বংশ বৃদ্ধি হৈ বিভিন্ন ঠাইত ঘৰচীয়া ভাৱে পোহ মানিবলৈ ধৰিলে। তদুপৰি আপু-বঙ্গীয়া আৰু দেখাত গুৱনি বাৰে চিৰিয়াখানাতো এইবিধ প্ৰাণীয়ে স্থান পালে। আন-ৰিকাৰ ফালে আগুটি, পাকা, কেভি আৰু কেপিৰাখা নামৰ চাৰিবিধ প্ৰাণী দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ঘৰচীয়াতকৈ প্ৰতিপালন কৰি ৰখা গিনিপিগবিলাকক আমেৰিকাত থকা এই চাৰিবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। আগুটি নামৰ প্ৰাণীবিধ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ব্ৰাজিলত পোৱা যায়। আগুটিৰ দেহৰ পাছ ফালে গজ

নোমবোৰ অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ বাবে জন্তুটোৰ পিছ ফাল অলপ অধৰা ধৰণৰ নোমেৰে আবৃত হৈ থকা যেন দেখি। এইবিধ প্ৰাণীক দিন দুপৰতে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰা দেখা নাযায়। দিনৰ দিনটোত ডাঙৰ গছৰ গুৰিত ফেৰ মেলি থকা শিপাৰ কাঁক বা ভেনে ধৰণৰ অন্যান্য সুবিধাজনক ঠাইত এইবিধ প্ৰাণীয়ে আশ্ৰয় লৈ লুকাই থাকে। ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে চৰিবলৈ ওলাই বাবে এইবিধ প্ৰাণীক নিশাচৰ জন্তু বুলিও ক'ব পাৰি। পাক আৰু কেদি নামৰ প্ৰাণী দুবিধক সমগোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বুলিব পাৰি। পান্টাগনিয়াৰ ফালে বাস কৰা কেৰি বিলাকৰ ঠেং কেইখন অঁচাচিত ভাৱে দীঘল হোৱা দেখা যায়। গিনিপিগৰ সমগোষ্ঠীত অস্তিত্ব হৈ থকা আটাইতকৈ আৰু



গিনিপিগ

ঘনীয়া প্ৰাণীবিধক পান্টাগন'চো বা কেপিৰাৰা বোলা হয়। এইবিধ প্ৰাণীয়ে উদৰ দৰে পানীত থাকিবলৈহে ভাল পায়। ইউৰোপ আমেৰিকা আদি উন্নত দেশৰ চৰিয়াখানা-বিলাকতো এইবিধ প্ৰাণীয়ে ঠাই পাইছে। দৰ্শকে চাব পৰাকৈ চৰিয়াখানা বিলাকত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হয়। সোত বৰি থকা নিজনি পানীত এই বিধ প্ৰাণীক নেলি দিয়া হয়। কিছু সময়ৰ বাবে নামত বগাই ফুৰি জন্তুটোৱে আকৌ পানীলৈ নাসি যায় আৰু নিজনি পানীৰ তল ভাগেদি সাতুৰিবলৈ ধৰে। দৰ্শকসকলে বাঘৰ পৰা পানীৰ তলত সাতুৰি সাতুৰি ফুৰি ফুৰা প্ৰাণীবোৰৰ আলোখ-লেখ চাই আনন্দ পায়।

ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা আটাই কেইবিধ প্ৰাণীৰ কোনো এবিধৰো দীঘল নেজ নহয়। দুবিধ মানৰ নেজৰ কোনো চিন্তাৰেই নাই। আমাৰ দেশত পোহনীয়া গিনি-

পিগ দেখা যায়। বহুতৰ মতে গিনিপিগ শব্দটো গিয়ানা পিগ শব্দৰ অপভ্রংশ ৰূপে উৎপত্তি হৈছে। পোহনীয়া গিনিপিগৰ গাৰ নোমবোৰ নানা বৰণীয়া হয়। সাধাৰণতে বগা গিনিপিগহে দেখা যায়। বগা, ক'লা, কজলা আৰু মুগা বৰণৰ নোম জন্তুবোৰৰ গাত দেখা যায়। দক্ষিণ আমেৰিকাত গিনিপিগৰ দৰে কিছুমান প্ৰাণী এতিয়াও বনৰীয়া অৱস্থাত থকা দেখা যায়। ইহঁতৰ গাৰ নোমবিলাক একে ৰঙৰ হোৱা দেখা যায়। সেউজীয়া আৰু মুগা বৰ্ণ হ'বলৈ যেনে দেখি এই প্ৰাণীবিলাকৰ গাত তেনে বৰ্ণ ফুটি উঠা দেখা যায়। এদ পৰিলে এই নোমবিলাক অতি উজ্জল দেখা যায়। এনে ধৰণৰ কিছুমান প্ৰাণীক গিয়ানাৰ ফালে থকা হাৰি বননিৰ পৰা ধৰি আনি ইউৰোপ মহাদেশৰ কোনো কোনো ঠাইত ঘৰচীয়াকৈ পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল। পাছত নানা ধৰণৰ জন্তুৰ ৰূপত আত্ম প্ৰকাশ কৰিলে আৰম্ভ কৰিলে।

গিনিপিগ বিলাকে ঘাঁহ জাতীয় গছ-পাত খাই জীয়াই থাকে। মাইকী গিনিপিগে একেধাৰতে কেবাটাও পোৱালি দিয়ে।




এন্দুৰ আৰু নিগনি গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীসমূহ

এন্দুৰ আৰু নিগনি শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীবিলাকক “বোডেণ্ট” বা দাঁতেৰে কুটি আহাৰ খোৱা প্ৰাণীৰ বৰ্গত স্থান দিয়া হৈছে। এন্দুৰ আৰু নিগনিৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যিবিলাক নিগনি আকাৰত ডাঙৰ হয় সেইবিলাককে এন্দুৰ বোলা হয়। আকাৰত সৰু এন্দুৰ বা নিগনি শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীবিলাকক নিগনি বোলা হয়। ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে মাটিত আৰু মাটিৰ তলত গাঁত খান্দি থকা ডাঙৰ বিধ এন্দুৰক আমাৰ মানুহে ডাল শলীয়া বুলি কয়। এন্দুৰেই হওক বা নিগনিয়েই হওক এইবিলাক প্ৰাণী সাধাৰণতে আমাৰ চকুত পৰি থাকে। কাৰণ এই প্ৰাণীবিলাকক আমি প্ৰায়েই ঘৰৰ ভিতৰত কিম্বা বাৰী বা চৌহদৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পোওঁ। কেতিয়াবা ইহঁতৰ উপস্থিতিয়ে আমাক ইমান অতিষ্ঠ কৰি তোলে যে সিহঁতৰ অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি নানা কৌশল অৱলম্বন কৰিব লগীয়া হয়। নিগনি আৰু এন্দুৰ ধৰিবৰ বাবে মানুহে ঘৰত মেকুৰী পোহে। ফাল পাতিলে নিগনি ধৰা হয়। ফালত বিষাক্ত পদাৰ্থ মিহলি কৰি নিগনিৰে খাবৰ বাবে আহাৰ ৰখাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হয়। এই কৌশলেৰে বহুত নিগনি আৰু এন্দুৰ জাতীয় প্ৰাণীলিখন কৰা হয়। অৰ্থনৈতিক আৰু স্বাস্থ্যজনিত দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা চালে এন্দুৰ আৰু নিগনি জাতীয় প্ৰাণীবোৰত কোনো প্ৰকাৰৰ মূল্য আৰোপ কৰিব নোৱাৰি। অথচ ইহঁতে জীৱ জগতত এখন স্বতন্ত্ৰ আগম অধিকাৰ কৰি ল’বলৈ সক্ষম হৈছে। তদুপৰি বন্যপ্ৰাণী ভংগতৰ অন্যতম প্ৰতিনিধি ৰূপে এই গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিছে।

থকা ঠাইৰ বিভিন্নতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এন্দুৰ আৰু নিগনি গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। মানুহৰ ঘৰত থকা এন্দুৰ আৰু নিগনি গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকে ঘৰৰ ভিতৰতে আশ্ৰয় লৈ স্বাধীন চিতীয়া ভাৱে থকা দেখা যায়। ঘৰৰ চিলিঙৰ ওপৰত, ধানৰ ভঁৰালত, ধানখেৰ আদি আৱৰ্জনাৰ মাজত আৰু কিতাপ-পত্ৰ বা কাপোৰ-কানিৰ আলমৰিৰ ভিতৰত থাকিবৰ বাবে ইহঁতে বাহ সাজি লয়। কাগজ-পত্ৰ আৰু কাপোৰ-কানিৰ মাজত বাহ সাজি লবৰ বাবে ইহঁতে বাহিবৰ পৰা কোনো উপকৰণ সংগ্ৰহ কৰি আনিব লগীয়া নহয়। আলমৰি আদিৰ ভিতৰত গিৰিহঁতে ৰাখি থোৱা কিতাপ-পত্ৰ আৰু কাপোৰ-কানিবোৰকে ইহঁতৰ

চোকা পাঁতবোৰেৰে কুটি কুটি বাহ সজাব সামগ্ৰী ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰে। এনে ধৰণে সজা বাহৰ ভিতৰত মাইকী নিগনি বা এন্দুৰে পোৱালি জগায়। বাহিৰৰ পৰা খোৱা বস্তু আনি পোৱালিবোৰক খুৱাইহি। ঘৰৰ ভিতৰতে আলোঙে আলোঙে ঘূৰি ফুৰে বাবে গিৰিহঁতৰ খাদ্য দ্ৰব্য বিচাৰি উলিয়াবলৈ ইহঁতৰ বেছি পৰ নানাগে। কিবা কাৰণত আলমাৰি আদি খুলি তাৰ ভিতৰত ৰখা বয়ৰঙাবিনাক ইকাটি সিকাটি কৰিবলগীয়া হলেহে গিৰিহঁতে গম পায় যে তাৰ ভিতৰতে এন্দুৰ বা নিগনিৰে বাহ সাজি পোৱালি জগাইছে। সেই অৱস্থাত মাক বাপেক হাল দৌৰ দি পলায় যায়। পোৱালি মগাই মৃত্যুক আকো-
ৱালি লব লগীয়া হয়।

মানুহৰ ঘৰত থকা নিগনি জাতীয় প্ৰাণীবিলাকক মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। আকাৰত তুলনামূলক ভাৱে ডাঙৰ হোৱা প্ৰাণীবিধক এন্দুৰ আৰু সৰু আকাৰৰ প্ৰাণীবোৰক নিগনি বোলা হয়। চাৰিত্ৰিক গুণত দুয়ো শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য দেখা নাযায়। ইহঁতৰ ঘৰত থকা এন্দুৰ আৰু নিগনি বুলি কোৱা হয়। ডাঙৰ নিধ এন্দুৰক আমাৰ মানুহে শলিয়া বা ডালশলিয়া বুলিও কয়। এবিধ ডাল শলিয়াই মানুহৰ ঘৰতে থাকি লৈ সুবিধা মতে ঠাই বিচাৰি লয়। এনে ধৰণে এন্দুৰ কাৰবাৰ ঘৰত থাকিব লগীয়া হ'লে নাতি বিয়লি ঘৰৰ চিলিঙৰ ওপৰত খেদা খেদি কৰি হল-
স্থল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে। আমি কেতিয়াবা তেনে বিধৰ ডাঙৰ এন্দুৰ দেখিবলৈ পালে এটা “বস্তু এন্দুৰ” ওলাইছে বুলি কওঁ। আন দুবিধ মান শলিয়া বা ডালশলিয়া এন্দুৰক সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত থকা দেখা নাযায়। আন হাতে দেখা যায় যে জীৱন ধাৰণৰ বাবে সিহঁতেও মানৱ জাতিৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ ভাৱে ভাৰসা কৰি চলে।



বৰুৱাণিৰ দাঁতি কাষৰে থকা খাল, নলা আদিৰ ওচৰে ওচৰে সিহঁতে বাস কৰাৰ অনু-
কূল পৰিবেশ বিচাৰি লয়। মাটিৰ তললৈ গাত খান্দি সুৰঙ্গ নিৰ্মাণ কৰে। পকীঘৰ বা
দেৱালৰ ইটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব পৰা গাঁত খান্দি সিহঁতে ঘৰৰ গিৰিহঁতৰ অনিষ্ট
সাধন কৰে।

কিছুমান জাতৰ এন্দুৰ আৰু নিগনিয়ে মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীৰ চুকে-কাণে গাঁত বা
সুৰঙ্গ নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখা যায়। এনেবিলাক প্ৰাণীক পথৰুৱা মাটিত গাঁত খান্দি
সুৰঙ্গৰ ভিতৰত সোমাই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খাউকতে এইবিলাক এন্দুৰক
পথাৰবাগী এন্দুৰ বোলা হয়। আন কিছুমান এন্দুৰক গছ গছনিৰ ওপৰত বাহ সাজি
বাস কৰা দেখা যায়। এইবিলাক এন্দুৰ বা নিগনিক গছত বাস কৰা এন্দুৰ বুলি কোৱা
হয়। বিকল্পৰূপে সিহঁতক বৃক্ষবাগী এন্দুৰৰ আখ্যা দিব পাৰি।

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰা সকলো জাতীয় এন্দুৰ
আৰু নিগনিৰ প্ৰজাতিগত বৰ্ণনা গাইগুটীয়া ভাৱে আগবঢ়োৱা সহজ নহয়। শাৰীৰিক
আৰু চাৰিত্ৰিক গুণত সিহঁত আটাইবোৰৰ নাজাত কিছুমান উমৈহতীয়া গুণৰ বিকাশ
সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা কেইবিধ মান
প্ৰাণীৰ বৰ্ণনা সমূহীয়াভাৱে উপাপন কৰিবলৈ ইয়াৰ পাছত উদ্ধৃত কৰা প্ৰবন্ধ গোটা-
চেৰেক আগবঢ়োৱা হৈছে।



মানুহৰ ঘৰত বাস কৰা নিগান

শ্ৰেণী---স্বত্বাধীন

বৰ্গ---বোৰ্ডিং-চাৰ্জ

পোত---মিউৰিড

প্ৰজাতি---মাছ মাচকিউনাছ

নিগনি জাতৰ কিছুমান প্ৰাণীয়ে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতে চিৰদিন থকা দেখা যায়। আকাৰত এইবিধ নিগনি তেনেই সৰু। ই অতি বেগত ঘৰৰ ভিতৰতে দৌৰা দৌৰি কৰি ফুৰি ফুৰি পাবে। এইবিধ নিগনি দীঘলে দীঘলে প্ৰায় ৫ চেণ্টিমিটাৰ মানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৮ চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হব। সোজা ডালৰ দীৰ্ঘতা প্ৰাণীটোৰ শৰীৰৰ দীৰ্ঘতাৰ লগত



ছেৰেৰেৰে ধকা যেন নালাগে। ইয়াৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ মুগা চানেকীয়াটক ক'লা হয়। ঘৰৰ মজিয়াত বগাই বগাই দৌৰি ফুৰাৰ দৰেই ইহঁতে বেৰ, চতি, মাৰ্চলি, কুৱা আদিৰ ওপৰতো সমানে বগাই ফুৰিব পাৰে। পকী ঘৰৰ বাতান আদিৰ ওপৰত ইহঁতক বগাই ফুৰা দেখা যায়। সাধাৰণতে ঘুৰা ঘুৰি কৰিবৰ বাবে এইবিধ প্ৰাণীয়ে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত একোটা পথকে নিৰ্বাচন কৰি লয় আৰু পুৱা-গধূলি সেইটো পথেদিয়েই অহা যোৱা কৰি কৰি সময় অতিবাহিত কৰে। ধান, চাউল, ভাত, তৰকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছ মাংসলৈকে সকলো বিষৰ খাদ্যই ইহঁতে খায়। মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত অগবৰত থকাৰ বাবে এনেবিলাক বস্তু বিচাৰি উলিওৱাত এই নিগনিবোৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়। কিতাপ বখাৰ আলিঙ্গা, কাপোৰ কাগজ বখাৰ আলমাৰি আৰু ষটখাটৰ তলৰ আছুতীয়া ঠাইত এইবিধ নিগনিয়ে বাহ সাজি তাতে মাইকী জনীয়ে পোৱালি জগায়। নিগনিয়ে কেইবাবাৰো পোৱালি জগায় আৰু প্ৰত্যেক বাৰতে এজনী মাইকী নিগনিয়ে ৭।৮ টা পৰ্যন্ত পোৱালি দিয়ে।



মানুহৰ ঘৰত বাসকৰা এন্দুৰ

শ্ৰেণী----সুদূৰপায়ী

বৰ্গ----বোডেণ্টিয়া

গোষ্ঠ---শিক্কাবিডি

প্ৰজাতি বাচ্চি বাচ্চি

মানুহৰ ঘৰত ভিতৰত যিবিলাক শিক্কাবিডি আৰু এন্দুৰ থাকে সেইবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান আকাৰত সৰু আৰু কিছুমান ডাঙৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই গোষ্ঠীৰ ডাঙৰ আকাৰৰ যিবিলাক প্ৰাণী সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰত ভিতৰত বাস কৰে সেইবিলাকে ঘৰত বাস কৰা এন্দুৰ বোলা হয়। এই এন্দুৰবিলাকেও শিক্কাবিডিৰ দৰেই মজ্জিত বগাই ফুৰে। মানুহৰ খোৱা বস্তুবিলাকত মুখ দিয়ে আৰু সেইবোৰত-লাদ পেনাই এই এন্দুৰবোৰে মানুহক বন উপদ্ৰৱ কৰা দেখা যায়। তদুপৰি কিতাপ কাগজৰ আলমৰি, খানৰ ভাৰি, কাপোৰ কাগিৰ আধাৰ আদিত বাহ মাতি লৈ ইহঁতে তাতে পোৱালি জগায় আৰু মূল্যবান বস্তুবোৰ দাঁতেৰে কুটি গিৰিহঁতৰ বহুতো ক্ষতি সাধন কৰে। আমাৰ মানুহে এনে প্ৰাণীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা বক্ষা পাবলৈ ঘৰত মেকুৰী পোহে। তদুপৰি বজাৰৰ পৰা বিৰাজি উষধ কিনি আনি খোৱা বস্তুৰ লগত এনে উষধ মিহলি কৰি এন্দুৰে খাবলৈ বাতি ক'ৰবাত দি দিয়ে। খোৱা বস্তুৰ লগত এনে উষধ মিহলি হৈ মানুহৰ যাতে কোনো অসুখ নহয় তাৰ বাবে গতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা অতি প্ৰয়োজনীয়। ঘৰত ভিতৰত বা বাহীত কেতিয়াবা অতি ডাঙৰ আকাৰৰ এন্দুৰ দেখা যায়। এনে এন্দুৰ আমাৰ মানুহে ভাৰ শুলিয়া বোলে। আচলতে এনে ডাঙৰ আকাৰৰ এন্দুৰক বান্ধিকট প্ৰজাতিৰ এন্দুৰ বুলি জনা যায়।



বাহ্যাবীয়া এন্দুৰ

শ্ৰেণী---স্তুন্যপাণী

বৰ্গ---ৰোডেন্টিয়া

গোত্ৰ---নাইজোমিডি


প্ৰজাতি---(১) নাইজোমিচ থোনিয়াচ্

(২) কেণোমিচ্ বডিয়াচ্

এই প্ৰৱন্ধত বৰ্ণনা কৰিবলৈ লোৱা প্ৰাণী এটাক দেখিলে নিষে এন্দুৰ আৰু নিগাণি গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী এই কথা বিগ্ৰাস কৰিবলৈ চান লাগে। আকাৰত এইবিধ প্ৰাণী একোটা সৰু আকাৰৰ গিনিপিগ জাতীয় প্ৰাণীৰ সমানেই হব। ইয়াৰ গাৰ নোমবিলাকৰ বৰণ ধোঁৱাৰ নিচিনা হয়। এই নোমবিলাক বৰ কোমল বাবে জন্তোটোক হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিলে উলৰ নিচিনা লাগে। জন্তোটোক নেজডাল নিচেই চুটি হয় আৰু নোমৰ তলত লুকাই থকা নেজডাল চকুৰে মনিব নোৱাৰি। গাঁতৰ ভিতৰত বাস কৰা প্ৰাণী বাবে বাঁহবাৰীয়া এন্দুৰক য'তে ত'তে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলত পৰা পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰ এইবিলাক এন্দুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ বাবে অনুকূল ঠাই। পশ্চিমৰ ফালে নেপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভুটান, চিকিমৰ মাজেদি অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰ্যন্ত এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমিয়ে বিস্তৃতি লাভ কৰি আছে। তদুপৰি মেঘালয়, নগালেণ্ড আদি পূৰ্বাঞ্চলৰ পাছৰী ৰাজ্য কেইখনৰ অন্তৰ্গতো এই প্ৰাণীবিলাকে থলুৱাভাৱে বাস কৰা দেখা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাৰ বাহিৰে এইবিলাক প্ৰাণীৰ বসতিস্থান থাইলেণ্ডৰ মাজেদি গৈ চীন দেশ পৰ্যন্ত সংপ্ৰসাৰিত হৈ আছে। ইয়াৰ দুটা প্ৰজাতি আছে। নেঘালয়ৰ খাচিয়া পাছৰত তাৰে এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী এটাক হাবিৰ পৰা ধৰি আনি ১৯৮১ চনত নেডি হাইদৰী পাৰ্কৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা ক্ষুদ্ৰ চিৰিয়াখানাত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিল।

এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ ডিঙি, গা আৰু কান্ধৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বকা থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ডিঙি ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিঠিয়েদি ককাললৈকে গোটোৰ গোটেই ছোৱা আকাৰত সমান ছোৱাৰ বাবে জন্তোটো দেখাত এটা কোমোৱাৰ নিচিনা লাগে। ইয়াৰ ঠেং কেইখন তেনেই চুটি চুটি হয় আৰু সেই কাৰণে মাটিৰ ওপৰত খোজ কঢ়োতে এই ঠেং কেইখন চকুত নপৰে। আগ ঠেং দৰনৰ মাজত স্ত-

টোৱে মূৰটো সুমুৱাই লৈ জিৰণি লৈ থকা সময়ত জন্তুটোৰ কোন ফালে মূৰটো আৰু কোন ফালে নেজডাল আছে ধৰা টান হৈ পৰে। এন্দুৰ আৰু নিগনি গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে কুটি খোৱা দাঁতৰ সহায়ত খোৱা বস্তুবিলাক কুটি কুটি খায়। বাঁহবাৰীয়া এন্দুৰৰো এই ধৰণৰ দাঁতৰ গড়ে। এই দাঁতৰ সহায়ত এইবিধ এন্দুৰে কুমলীয়া বাঁহ, কঁহিপাত আদি কুটি কুটি পান আৰু মাটিৰ তলত উৎপন্ন হোৱা শিপা, আন আদি ছিঁড়ি খায়।



বাঁহবাৰীয়া এন্দুৰ

দুটা প্ৰজাতিৰ বাঁহবাৰীয়া এন্দুৰ বাস কৰাৰ কথা জনা যায়। তাৰে এবিধ আনবিশতক আকাৰত তুলনামূলক ভাৱে সৰু হোৱা দেখা যায়। হাবিৰ মাজত এই প্ৰাণীবিলাকে ইহঁতৰ ঠেঙৰ আগ ভাগত হোৱা দীঘল দীঘল নগ আৰু আগদাঁতৰ সহায়ত মাটিত গাঁত খান্দি লৈ তাৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে। নদী নলাৰ পাৰত থকা ধিয় গৰা বিলাকত এই প্ৰাণীবোৰে গাঁত খান্দি দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ সুৰঙ্গ কৰি লয়। গাঁতৰ মুখত বহুত পৰিমাণৰ গুৰি মাটি ভৰা হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নদী নলাৰ পাৰত গছৰ শিপাবোৰ ওলাই থাকিলে সেইবোৰ ঠাইত গাঁত খান্দিবলৈ ইহঁতে আবদ্ধ কৰে। বাঁহ বনেৰে ঢাক খুৱাই ৰখা নিমজ্জাল ঠাইবোৰো গাঁত খান্দিবৰ বাবে ইহঁতে নিৰ্বাচন কৰি লয়। মাটিৰ উপৰি ভাগৰ পৰা আবদ্ধ কৰি বিটো গাঁত খন্দা হয় সেই গাঁতটো

পোনে পোনে মাটিৰ তলৰ ফালে নগৈ সমান্তৰাল বা কৌণিক গতিত পথালি মুহাটক আগ বাঢ়ি যায়। গাঁতৰ ভিতৰতে চেপেটা মাৰি সোমাই থাকিবৰ বাবে সুৰঙ্গৰ এডোখৰ ঠাই আহল বহলকৈ খান্দি এটা কোঠালি তৈয়াৰ কৰা হয়। বাহিবৰ লগত সংযোগ ৰাখিবৰ বাবে এই কোঠালিৰ পৰা এটা নিৰ্গম পথ তৈয়াৰ কৰি ৰখা হয়। মুখ-খনেদি প্ৰবেশ কৰি কোনো শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীয়ে তাক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিজ্ঞায়েৰে ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ গম পালে সি নিৰ্গম পথেদি বাহিবলৈ ওলাই আহি বন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰে। বাহিবলৈ জৰুৰী অৱস্থাত ওলাব পৰা এই পথটোক জৰুৰী কালীন নিৰ্গম পথ বুলিব পাৰি। কোঠাটোৰ ভিতৰত ওই পৰিবৰ্তে আশ্ৰয় কৰাৰ আগতে জন্তুটোৱে মাটিৰ সোপা দি প্ৰবেশ পথটো চিনিব নোৱাৰকৈ বন্ধ কৰি লয়।

এইবিধ এলুৰ জাতীয় প্ৰাণীয়ে একো একোবাৰত কেবাটাও পোৱালি জগায়। পোনেই জগোতে পোৱালিবোৰৰ গাত নোমৰ কোনো চিন চাব নাথাকে। সেই সময়ত পোৱালি জাকৰ চকুবোৰো মুদ ৰাই থাকে।



জহামাল বা চিভেট্, কেট্, ফৈদৰ গুলীসমূহ

জহামাল গোত্ৰৰ প্ৰাণীবিলাকে অস্ত্ৰ জগতত এখন সুৰীয়া আসন অধিকাৰ কৰি লব পাৰিছে। অসমীয়া ভাষাত জহামাল শব্দটোৱে চিভেট্ মেন' গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী নিদিষ্ট প্ৰাণীকহে বুজায় হয়। সেইবিধ প্ৰাণীক ইংৰাজী ভাষাত 'মাৰ্জ ইন্দিয়ান চিভেট' বুলি কোৱা হয়। অসমৰ ভৈয়াম আৰু পাৰ্বত্য অঞ্চলত আন এবিধ সৰু আকাৰৰ চিভেট কেট জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। সেইবিধ চিভেটক 'অসমীয়া ভাষাত মেচেকা বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজী ভাষাত মেচেকাক বুজাবলৈ 'স্মল ইন্দিয়ান চিভেট' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা বহুত বিধৰ প্ৰাণীয়ে চিভেট কেট বা জহামাল জাতীয় প্ৰাণীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এই সম্পৰ্কত বৰ বেছি দুইটা নগৈ কেৱল অসম আৰু পূৰ্বাঞ্চলত থকা অন্যান্য পৰ্বতীয়া ৰাজ্য কেইখনৰ কথা কৈ ধৰিব পাৰি। অসমৰ বনাঞ্চল কিছুমানত বাস কৰা বৃক্ষবাসী পান্ চিভেটক বাদ দিলেও দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ মধ্যমীয়া আৰু উচ্চ স্তৰৰ ঠাই-বিলাকত হিমালয়ৰ পৰা চিভেট, টাইগাৰ চিভেট আদি বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে জহামালক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিছে।

চিভেট কেট গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকে প্ৰজাতি ভেদে খোৱা বিষয়ত আৰু থকা ঠাইৰ নিৰ্বাচনত ভিন্ন মুখী চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে। ইহঁতৰ কিছুমানে জনবসতিৰ আশে পাশে থকা মুকলিমূবীয়া হাৰি বননিবোৰত নিগাজীকৈ বাস কৰে। সৰু-সুৰা আকাৰৰ নানা-বিধ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী, নাইপিয়া, জেঠি, কীট-পতঙ্গ আদি ইহঁতে ধৰি ধৰি পায়। কিছুমানে নিৰামিষ খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কেইবিধমান জহামালে হাঁহ-কুকুৰা আদি পোহনীয়া পক্ষী ধৰি পায়। ঘৰচীয়া প্ৰাণীক সহজে বিচাৰি খাবৰ বাবে কোনো কোনো জাতীয় জহামালে মানুহৰ বসতিস্থানৰ আশে পাশে জোপোহা গছৰ হাৰি বননিত বাস কৰিবলৈ আশ্ৰয় লয়। চিভেট কেট জাতীয় কেইবিধ মান প্ৰাণীয়ে কুকুৰ সেকুৱীৰ দৰে ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়। এনে ধৰণৰ জহামালবিলাকক ভূমি বিগাসী বা মৃত্তিকাৰাসী প্ৰাণীৰ শাৰীত স্থান দিব পাৰি। আন কিছুমানে গছৰ ওপৰত বগুৱা বাই ফুৰে। এনেবিলাক জহামাল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক বৃক্ষবাসী জহামাল বুলি কব পাৰি। মালয়াছিয়াৰ ফালে পানীত নাগৰি সাতুৰি কুৰিবলৈ ভাল পোৱা আন এবিধ জহামাল আছে বুলি জনা যায়। এইবিধ প্ৰাণীক উদ জহামাল বোলা হয়। নানা বিধৰ জলচৰ প্ৰাণী ধৰি বাই ইহঁতে জীৱন ধাৰণ কৰে।

চিভেট কেট বিলাকৰ দেহত উৎপত্তি হোৱা কিছুমান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহঁতৰ কটি দেশত এবিধ গোন্ধোৱা পদাৰ্থৰে ভৰা যোনা সদৃশ নাংগাৱছ আছে। শৰ্ক

পক্ষৰ প্ৰাণী ওচৰ চাপি অহাৰ উমান পালে ভক্তটোৱে এইদৰে গোট খাই থকা জুলীয়া পদাৰ্থ নিঃসৰণ কৰি দিয়ে। শত্ৰুক পঞ্চমষ্ট কৰি নিজে সেই সুযোগতে নিৰাপদ ঠাইলৈ আঁতৰি যোৱাৰ এইটো এটা উত্তম উপায় বুলি ক'ব পাৰি। কোনো কোনো দেশৰ মানুহে চিভেট কেট জাতীয় প্ৰাণীয়ে ধাৰণ কৰা এই সুগন্ধি বস আহৰণ কৰি তাৰপৰা এক প্ৰকাৰৰ আতৰ তৈয়াৰ কৰে। আন্তৰ্জাতিক বজাৰত এইবিধ সুগন্ধি তেল বা আতৰৰ মূল্য অত্যন্ত বেছি বুলি জনা যায়।

আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা আৰু এবিধ বিষাক্ত পদাৰ্থ জহামাল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ দেহত সংক্ৰান্ত হৈ থকা দেখা যায়। ইহঁতৰ কাঁচ দেশত এটুকুৰা কোমল নাংগ গ্ৰন্থিৰ নিচিনা জোনোণ্ডাৰ ভিতৰত ধোঁৱাৰ দৰে উঠি যাব পৰা ডবি পদাৰ্থ সংক্ৰান্ত হৈ থাকে। শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীয়ে তাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিলে ভক্তটোৱে নাংগগ্ৰন্থিৰ ভিতৰৰ পৰা বিষাক্ত গেচীয় পদাৰ্থ নিঃসৰণ কৰি দিয়ে। শত্ৰু পক্ষীৰ ভক্তৰ চকুত এই ধোঁৱা লাগিলে তাৰ চকুত জাল মাৰি মৰে। তেনে অৱস্থাত আক্ৰমণকাৰী ভক্তৰে নিজেই পলাই যাব লগীয়া হয়। এনে ধৰণৰ গেচীয় পদাৰ্থ ধাৰণ কৰা জোনোণ্ডাটোক “বন্ধ-কোষ” বুলি কোৱা হয়।

বিকট মূৰ্তি ধাৰণ কৰি শত্ৰুপক্ষীৰ ভক্তৰ ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে জহামাল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী কেইবিধমানো অঁকা-ধিকা ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা যায়। সিহঁতৰ ভিতৰৰে দুই এবিধ প্ৰাণীয়ে পানিপাণ্ডিক অৱস্থাৰ লগত চিনিব নোৱাৰাকৈ মিহলি হৈ থাকি গোপন ভাৱে আত্মৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাও দেখা যায়। আমাৰ এই ফালৰ ঠাইবিনাকত আটাইতকৈ ডাঙৰ আকাৰৰ যিবিধ জহামাল দেখা যায় সেই বিধ জহামালৰ মূখৰ নোমবিলাক অঁকা বিকা হয়। দেহ আৰু নেঙডালৰ নোমবোৰ চিত্ৰ-বিচিত্ৰ হোৱা দেখা যায়। অলপো জাতৰ নাংগোণ্ডী বন্যপ্ৰাণীয়ে জহামাল ভয়ঙ্কৰ ৰূপ দেখি তাক জোকাই ল'বলৈ সাহস নকৰে। সেই বাবে প্ৰাণিকাক বন্যপ্ৰাণীয়ে তাক অনাহকতে আক্ৰমণ নকৰে। জহামাল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ আঁচ এটা শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয়। ইহঁতৰ গনমুখ ভাগত এক প্ৰাচীন দীঘল চানেকীয়া শলাৰ নিচিনা গাঁফৰ উৎপত্তি হয়। এই গাঁফ ইহঁতে ইচ্ছানুযায়ী ল'বাব চৰাব পাৰে। মাটিত পৰি থকা যেই কোনো প্ৰাদোষ্যপ্ৰযোণী বস্তুৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ইহঁতে এই গাঁফ কোছা কামত লগায়।

গমথ পৃথিৱীত চিভেট কেট গোষ্ঠীৰ ভালেমান বিধ প্ৰাণীয়ে ঠাই অনুযায়ী বাস কৰিবলৈ লোৱা দেখা যায়। এচিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশ দুখনতে এই বিচিত্ৰ প্ৰাণী-বিলাকৰ উৎপত্তি দেখা যায়।

জহামাল

শ্ৰেণী---স্তুন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---ভাইভেৰিডি

প্ৰজাতি---ভাইভেৰা আইবেথা

ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা চিভেট্ কেট্ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত জহামাল নামৰ প্ৰাণীয়েই আকানত আটাইতকৈ ডাঙৰ । ইয়াৰ সচৰাচৰ বসতি স্থান নেপাল আৰু ভূটানৰ পাৰ্বত্য ভূ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশেদি পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য কেইখনলৈ বিয়পি আছে । পশ্চিম বঙ্গৰ উত্তৰ অঞ্চলতো এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় । ভাৰতৰ বাহিৰে বাংলাদেশ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজেদি দক্ষিণ পূব এচিয়ান কেইবাখনো দেশলৈ ইয়াৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণভূমি সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে । তাৰ ভিতৰত থাইলেণ্ড, ইন্দোনেচিয়া, থাইলেণ্ড আৰু চীনদেশৰ দক্ষিণৰ ফালে থকা ঠাইবিলাকৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি । কোনো কোনো অসমীয়া মানুহে এইবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ “হাগেৰ গেল্লা” শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে । বঙালী ভাষাত ‘মাচ ভল্লৰ’ ‘বাগদ’ আৰু ‘পুদো গাওলা’ শব্দ কেইটা ঠাই অনুসন্ধানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

জহামালৰ দেহৰ গঠন দীঘলীয়া আৰু গোটা হয় । শৰীৰৰ সন্মুখ ভাগতকৈ পিছৰ ভোৱা বেছি মঙহাল হয় । গোটেই গাতে চেনেকৈ চুবুৰা আঁচৰ দাগবোৰ পিঠিৰ পৰা তলপেটলৈকে বিয়পি থাকে । ঠেং কেইখন সন্মান । অন্যান্য জন্তুৰ ঠেঙৰ তুলনাত চুটি আৰু মঙহাল হয় । পিঠিৰ উপৰি ভাগেদি ৰাজহাড় ডালৰ ওপৰে ওপৰে ক’লা চানেকীয়া এটা দীঘল পাৰিৰ উৎপত্তি হয় আৰু এই পাৰি ডাল মূৰৰ ওপৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেজৰ গুৰি ভাগলৈকে থাকে । জোপোহা ধৰণৰ নেজডাল গুৰিৰ পৰা আগলৈ ক্ৰমে সৰু হৈ যোৱাৰ নিচিনা দেখি । এই নেজডালত পথালি পথালিকৈ বগা আৰু কলা দাগ দেখা যায় । জন্তুটোৰ ডিঙি ভাগতো অখালি পথালিকৈ কিছুমান বগা বৰণৰ দাগ থাকে ।

জহামালক প্ৰকৃততে নিশাচৰ প্ৰাণীৰ আখ্যা দিব পাৰি । অৱশ্যে বাৰিষা বতৰত ইহঁতে দিন-দুপৰতো আহাৰ বিচাৰি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে । সাধাৰণতে দিনৰ পোহৰত ইহঁতে বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভাল নাপায় । জোপোহা গছৰ তল বা নল, খাগৰি

আদি ওখ ওখ বাঁহ আতীয় উত্তিৰ তলত ধোৰোং একোটা বনাই লৈ তাৰ ভিতৰতে চেপেটা মাৰি পৰি থাকে । জোপোহা উত্তিৰে ইহঁতৰ বাবে উৎকৃষ্ট পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে । গধূলি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ইহঁতে দিনত আশ্রয় লৈ থকা ঠাইবোৰৰ পৰা নাহেৰু ওলাই আহে



অহামান

আৰু আহাৰ বিচাৰি ইকালে লিকালে ধুৰি কুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । নিচেই পুৱাতে পিছদিনা ইহঁতে পুনৰ দ্ৰাৱিত সোমাই আশ্রয়ৰ উপযোগী ঠাই বিচাৰি লয় । ভেকুলী, বেং, গাইপিয়া, কেচু, কুমটি আদি ইহঁতে ধৰি ধৰি খায় । কেতিয়াবা কেতিয়াবা

ধৰচীয়া হাঁহ কুকুৰাও ইহঁতে ধৰি মানি পেলায়। কেতিয়াবা অকলশৰীয়া ভায়ে বৃষি বৃষি ফুলা অৱস্থাত লগ পালেও প্ৰকৃত পক্ষে দুটা বা তিনিটা জন্তু ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দেখা যায়।

চাৰিত্ৰীয়া পথেদি বাঢ়ি জীপ গাড়ী অদিত যোৱা মানুহে জহামাল জাতীয় দুই এটা প্ৰাণীক কেতিয়াবা অকস্মাতে দেখা পায়। আমিষ ভেঙী প্ৰাণী হলেও হানি বননিত নিবলে বাস কৰি থকা জহামালবিলাকে মানৱ জাতিৰ অপকাৰ কৰা দেখা নাযায়। সেই কাৰণে এইবিধ বনবাসী বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে আভিকোপাত হাঙাৰ বিপদ-বিঘিনি অত-এম কৰি ৰাতি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে।

গাউ-ভুইব সমীপৱৰ্তী মুকলি মূৰীয়া হাবি বনবিলাকত বাস কৰা জহামালবিলাক অৱশ্যে প্ৰায়েই মানুহৰ বাস আক্ৰান্ত হবলগীয়া হয়। ধৰচীয়া কুকুৰবিলাকেও সিহঁতৰ দুই এটাক লগ পালে সুদাই বেৰে। কাটি দেশত উৎপন্ন হোৱা মাংসগ্ৰহিণ পদা বিয়াস্ত গোট বিকিনণ কৰি ই আক্ৰমণকাৰী জন্তুক পঞ্চাষ্ট বৰি বটলৈ চেলো কৰে আৰু বহুতো ক্ষেত্ৰত এই কামত জন্তুটোৱে কৃতকাৰিতাও লাভ কৰে। মেজৰ গুৰি ভাগত উৎপন্ন হোৱা আন এবিধ জোলাজাত সজিত হৈ থকা পদাৰ্থৰ পদা জহা চাউলৰ গিচিনা যি গোন্ধ ওলায় খেদি গিয়া কুকুৰে সেই গোন্ধ অনুসৰণ কৰি ইফালে সিফালে কৰোতেই জহামালে পলাই পত্ৰ দি়ে।

জহামালৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বিষয়ে বিতং ভাৱে জনা নাযায়। বহাগ-জেঠ মাহতে মাইকী জহামালে একেবাৰে তিৰি চাৰিটা পুৰুষ পোৱালি অগায় বুলি জনা যায়।



মেচেকা বা সৰু জহামাল

শ্ৰেণী---সুখ্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---ভাইভেৰিডি

প্ৰজাতি - ভাইভেৰিকিউলা

ইন্দিকা

ইয়াৰ আগৰ প্ৰৱৰ্ত্ত বৰ্ণনা কৰি অহা জহামাল নামৰ প্ৰাণীৰ বাহিৰে আৰু আঁৰৰ পৰা আঁকাৰলৈ চিভেট কেট্ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ হাবি বন্যনিবোৰত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিধ জহামালক আমাৰ মানুহে মেচেকা বুলি কয়। ইংৰাজী ভাষাত ইয়াকেনে মন্থা ইন্দিয়ান চিভেট বোলা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবিধ জহামালৰ কেইবাটাও উপজাতি আছে বুলি ভবা যায়। মেচেকা আকাৰত জহামালতকৈ ভালমান সৰু হয় আৰু ইয়াৰ গাৰ নোমবোৰৰ বৰণ মোটামুটিভাৱে নগুচুৱালৈ ধোৱা বগাৰীয়া হোৱা দেখা যায়। গাত থকা ক'লা বগৰ ফুটুকা-ফুটুকি দাগবোৰ শৰীৰৰ দুয়ো দাখে সজাই থোৱা যেন লাগে। পেটৰ তল ভাগত এই দাগবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ পৰে। বুকুতো ফুটুকা-ফুটুকি দাগ। জহামালৰ মেজৰ নিচিনাকৈ এইবিধ প্ৰাণীৰ মেজো অলপ জোপোহা হয় আৰু এই মেজত ক'লা আৰু বগা বৰণৰ আঙঠিৰ দৰে দাগ দেখা যায়। ডিঙি ভাগতো ওপৰৰ পৰা তললৈ দীঘলীয়াকৈ আঁকি দখা বগা আৰু ক'লা বৰণৰ আঙঠিৰ নিচিনা পট্ট থাকে। ইয়াৰ পিঠিত দীঘল নোম দেখা নাযায়।

পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় আটাই কেইখন ৰাজ্যতে মেচেকা নামৰ চিভেট কেট্ জাতৰ প্ৰাণী দেখিবলৈ পোৱা যায়। হিমালয় পৰ্বতৰ নামনি ভাগৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে এইবিধ প্ৰাণীক দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাকিস্থানৰ কোনো কোনো ঠাইত ইয়াক কমবেছি পৰিমাণে দেখা যায়। ইয়াৰ কেবাটাও উপজাতি আছে আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে থকা ঠাইবোৰত এনে বৰণৰ দুই এবিধ উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। দক্ষিণৰ ফালে ইয়াৰ বসতিস্থান শ্ৰীলঙ্কা পৰ্যন্ত বিস্তৃত হৈ থকা দেখা যায়। পূৰ্বৰ কালো ভাৰত-বৰ্ষৰ ভৌগোলিক সীমাবন্ধা অতিক্ৰম কৰি মেচেকা নামৰ প্ৰাণীবিলাকে ব্ৰহ্মদেশৰ মাজেৰে নাংগোচাণ আৰু ইন্দ্ৰোনেচিয়ালৈ বসতি সম্প্ৰসাৰণ কৰি নিগাৰ্জাকৈ বাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

জহাৰাল আৰু মেচেকাৰ চাৰিত্ৰিক গুণত বিশেষ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। জহাৰালৰ দৰে এইবিধ প্ৰাণীও নিশাচৰ। পাতলীয়া হাবি আৰু ওখ ওখ হাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ মাজত সোমাই সোমাই থাকিবলৈ ইহঁতে ভাল পায়। গছৰ ধোল আৰু শিলেৰে আগুৰি থকা ঠাইবোৰত কেতিয়াবা এইবিধ প্ৰাণীয়ে দিনৰ দিনটো আশ্ৰয়লৈ থাকে। প্ৰদূলি সময়ত চিকাৰ কৰিবৰ বাবে নাহেটক বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু নিগনি, জেঠি আদি প্ৰাণীবোৰ ধৰি ধৰি খায়। কীট-পতঙ্গ পোক আদিও ইয়াৰ সচৰাচৰ আহাৰৰ ভিতৰত পৰে।

হাঁহ-কুকুৰা আদি ঘৰচীয়া প্ৰাণী ধৰি ধোৱাত এইবিধ প্ৰাণী পটেকত। মাজ নিশা ঘৰৰ সকলো শুই নিঃপালি দিয়াৰ পিছত দুই এটা মেচেকা জাতীয় প্ৰাণীয়ে গড়ালৰ ভিতৰত সোমাই হাঁহ-কুকুৰাবোৰৰ ভিত্তিত কামোৰ মাৰি ধৰি এটা এটাক সিহঁতৰ নেলু-বোৰ ছিঙি পেলায়। পাৰ্থক্যে সিহঁতৰ জীয়া তেজৰিনি শুহি শুহি খায়। যিমান দূৰ পাৰে সিহঁতৰ মাসে ধোৱা কামতো লাগি যায়। পৰাধিনি খাই শেষ কৰে আৰু নোৱাৰা ধিনি গড়ালতে পেলাই ধয়। যাৰ সময়ত এটা হাঁহ বা কুকুৰাৰ ভিত্তিত কামোৰ মাৰি ধৰি গড়ালৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ টানি আঁজুৰি উলিয়াই আনে। এইদৰে কামোৰ মাৰি ধৰি অনা হাঁহ বা কুকুৰাটোক পোৱালিক ধুৱাবলৈ বুলি লৈ যায়। গিৰিহঁত গিৰি-হঁতনীয়ে পাছ দিনা ৰাতিপুৱা গড়ালটোৰ দুৱাৰ খুলিহে গম পায় যে ৰাতিৰ ভিতৰতে মেচেকাই সকলো শেষ কৰি গৈছে। ঘৰত ঢোকা কুকুৰ থাকিলে মেচেকাই তুৰমুৰি কৰিব নোৱাৰে। কুকুৰে খেদি খেদি মেচেকাক ক'বাত ধৈ আহেগৈ। এটা কুকুৰে কোনো এটা মেচেকা খেদি খেদি লৈ যোৱা সময়খিনিতে আন এটা মেচেকাই গড়ালত সোমাই হাঁহ বা কুকুৰাৰ নেলুত কামোৰ মাৰি ধৰি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে।

মেচেকাই বছৰৰ যেই কোনো মাহতে পোৱালি জগায়। ওখ ওখ হাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ মাজত খেৰ যাঁহেৰে ধোৱাং একোটা সাজি পোৱালি জগায়। মাকজনীয়ে ধোৱা বস্ত্ৰ গোটাই আনি পোৱালি কেইটাক ধুৱাইহি। এই দৰে সংগ্ৰহ কৰা ধান্যৰ ভিতৰত কেতিয়াবা ঘৰচীয়া হাঁহ কুকুৰাও পৰে। এজনী মেচেকাই এবাৰত দুটাৰ পৰা চাৰি পাঁচটালৈকে পোৱালি জগোৱা দেখা যায়।

তাড়িখোৰা জহামাল

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ----ভাইডেৰিডি

প্ৰজাতি-----পাৰাডক্‌চাৰচ্

হাৰমাক্ৰডাইটাচ্

এইবিধ জহামাল সাধাৰণতে গছৰ ওপৰতহে থাকে। গছ গছনিৰে ভৰা হাবি জঙ্গলবিলাকত এই জাতীয় জহামালক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওখ ওখ গছৰ ডালৰ ফেৰেঙনি আৰু ধোন্দৰ ভিতৰত সোমাই থাকি ইহঁতে অৱসৰৰ সময়খিনি কটায়। কেতিয়াবা দিন দুপৰত আৰু কেতিয়াবা সন্ধিত ইহঁতে আশ্ৰয় লৈ থকা ঠাইৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই আহি সৰু-সুৰা আকাৰৰ নানাবিধ প্ৰাণী ধৰি খায়। কেতিয়াবা ইহঁতে মাটিলৈকে নামি আহে আৰু নিগনি, ভেকুৰী, প্ৰভৃতি নানাবিধ প্ৰাণী চিকাৰ কৰি খায়। ডাঠ হাবিত থকা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হলেও ইহঁতৰ কিছুমানে গাঁও আৰু নগৰৰ আশে-পাশে নিগা-জীটক থাকিবলৈ উপযুক্ত ঠাই বাচি লয়। কিছুমানে মানুহ নথকা পুনৰি ঘৰ আৰু হাবিৰ মাজত থকা ডাক বঙলাৰ চিলিঙৰ ওপৰত আলোঙে আলোঙে থকাও কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকিবলৈ লোৱা প্ৰাণীবিলাকে ঘৰচীয়া হাঁহ কুকুৰালৈও হাত মেলে। খেজুৰ গছৰ ওপৰত ওলোমাই বন্ধা মাটিৰ টেকেলিৰ ভিতৰৰ পৰা তাড়িখিনি উলিয়াই উলিয়াই খায়। সেই বাবে ইয়াক তাড়ি খোৱা জহামাল বা টাডি কোৱা বোলা হয়। বাৰীৰ কাষে পাৰ্শ্বত থকা খাল ডোঙ আদিত ইহঁতে কেতিয়াবা চেপোটা মাৰি পাবি থাকে আৰু ওচৰত মানুহ নথকাৰ উমান পালেই লাহেকৈ ওলাই আহি মানুহে পেলাই দিয়া বস্ত্ৰবোৰ বুটলি খায়। খোৱা বস্তু খৰিবৰ বাবেই কিছুমান প্ৰাণীয়ে নিগাজীটক এনে ঠাইবোৰতে থাকে। মানুহৰ চকুত পৰিলে ইহঁতক মাৰি পেলায়। গছৰ ওপৰত থকা এণেজাতীয় প্ৰাণীয়ে মানুহলৈ ভয় বুলি গছৰ ওপৰত বঙৰা বাই নাই যুনি ফুন্দোতে ইহঁতৰ দুই এটাক নাইহে সময় দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাড়ি খোৱা জহামাল গছৰ ফল মূল খোৱাতো পাটকৈ।

তাড়ি খোৱা জহামালৰ গাট নোমৰিলাক অলপ দীঘল চানেকীয়াটক জোঙ্গোছা হয়। নোমৰ বৰণ ক'লা হয় যদিও তাত নুগা বৰণৰ ছিলিকণি থকা যেন লাগে।

জাৰন দিনত নোমবোৰ বেছি জোপোহা হয় আৰু নোমৰ ভিতৰৰ ফালে উলৰ দৰে কোমল নোম গজে। ঠেং কেইখনৰ আগৰ ফালৰ নোমবোৰ ক'লা হয়। সন্মুখৰ নোমবোৰৰ বৰণ ক'লা যদিও চকুৰ ওপৰ আৰু গালৰ দুয়োকাষে থকা নোমবোৰ বগা হয়।

এইবিধ চিহ্নটো কেটৰ বসতি স্থান ক্ষুদ্ৰ বিয়পা বুলি জনা যায়। হিমালয় পৰ্বত-মালাৰ পশ্চিমৰ ফালে থকা কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে এইবিধ



তাড়িপোৱা জহামাল

জহামালৰ বসতিস্থান বিশপি আছে বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। তদুপৰি পূৰ্বাৱৰ্ত পৰা অসম আৰু অগ্ন্যান্য চুবুৰীয়া ৰাজ্য কেইখনৰ বাহিৰে দক্ষিণাত্যৰ ফালেও এই বিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা যায়। সেই ফালে থকা হাবি বননিৰিলাত এইবিধ প্ৰাণীক আন এটা প্ৰজাতিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে।

তাড়ি পোৱা জহামালে গছৰ বোন্দত কিম্বা পাখৰ আদিৰ ফাঁকত থকা পৰখৰ বস্তু গোটাই লৈ বাহ সাজে আৰু মাইকী জনীয়ে তেনেবোৰ ঠাইতে পোৱালি জগায়। এজনী মাইকী তাড়িপোৱা জহামালে এবাৰত এফাঁপক পোৱালি জগোৱা দেখা যায়।

পাহাৰী জাহাজ

লেখক---জন্যায়ী

বৰ্গ---নাংসাহাবী

গোত্র---ভাইভেৰিডি

প্ৰজাতি---পান্‌গোমা ফ্ৰাণ্ডাই

অসমৰ ভৈয়াম অঞ্চলৰ বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা দুদিন জাহাজৰ পৰা ইহঁত-
মাত্ৰ আনোচনা কৰি অহা হৈছে। তাৰে এবিধক অসমীয়াত 'জাহাজ' আৰু জৰ্মানত
'মেচকা' বোলা হয়। আকাকত নাৰ্জ হিম্মান চিভেট্ বা জাহাজ নামেৰে জনাজাত
প্ৰাণবিধেই চিভেট কেট্ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ। তেওঁ
উপ মহাদেশৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাকত বি কেইবিধ চিভেট্ কেট্ বাস কৰে সেই কেইবিধৰ
ভিতৰত পাম চিভেট্ বা তাড়িখোৱা জাহাজৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আনোচনা কৰি অহা
হৈছে। এই অধ্যায়ত হিমালয়ৰ পাম চিভেট্ বা পাহাৰী জাহাজ নামৰ আন এবিধ
বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে আনোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এইবিধ জাহাজৰ বসতিস্থান
হিমালয় শৈলমালাৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাক। এইবিধ প্ৰাণীক হিমালয়ৰ নামনি
ভাগৰ অনধ্যাতো দেখা যায়। এইবিধ চিভেট কেটক ভাৰতৰ পশ্চিম ভাগত থকা কাশ্মীৰ
উপত্যকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গিৰিবাৰু হিমালয়ৰ মাঝেদি অৰুণাচললৈকে বিয়পি থকা
পাৰ্বত্য ভূমিত বাস কৰা লক্ষ্যবলৈ পোৱা যায়। ভাৰতৰ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধা অতিক্ৰম
কৰি পাহাৰী জাহাজৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমিয়ে ব্ৰহ্মদেশেদি মালয়েচিয়া, ইন্দো-
নেচিয়া পৰ্যন্ত বিয়পি আছে। ভাৰত মহাসাগৰৰ অশান্ত জনবান্ধিৰ মাজত অৱস্থিত
আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জতো এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে।

অন্যান্য চিভেট কেট্ জাতীয় প্ৰাণীৰ দৰেই পাহাৰী জাহাজৰ গাটো দীঘল আৰু
সেই অনুপাতে ইয়াৰ ঠেং কেইখনো চুটি। ঠেঙৰ পাতত থকা নখৰ সহায়ত এইবিধ
প্ৰাণীয়ে গছত বগোৱা চিভেট কেটৰ দৰে গছৰ ডালে পাতে সহজে বগাই ফুৰিব পাৰে।
ইহঁতৰ নোমবিলাকৰ বৰণ মুগা চানেকীয়া হয় আৰু পেটৰ তলৰ নোমবোৰ বগা হয়।
ভিড়িত বগা বৰণৰ এচটা পট্ট বেল খাই থাকে। নেজ ডাল দীঘল আৰু এই নেজৰ
আগৰ নোমবোৰ ক'লা চানেকীয়া। চকুৰ ওপৰৰ ফালে আৰু তলত বগা বৰণীয়া
নোমৰ উৎপত্তি হয়।

এইবৰ চিভেট কেটেও দিনত গছৰ বোকা কিছা য়েৰেছনি আদত আঁহৰ দৈ থাকে আৰু গধূলি পলত নাহেই। ওলাই আহি চিকান অনুসন্ধান কৰে। নানা খৰণৰ গন্ধ-সুৰা প্ৰাণী আৰু চনাই আদি ধৰি বৰি খাই ই ভীৰু ধাৰণ কৰে। ‘ছ’ ফলমূল আদি খাবলৈও এই এণীৰ চিভেট কেটে ভাল পায়। এই বিনাচিভেট কটক নাকি



পাচাবী ডহাৰী।

দেশতে। হানবীয়া বস বৰ। মাংসপৰি। গৰু। ইয়া পৰা এক বৰ। পোন্ধ ওলায়। বছৰৰ মই কোনো সময়তে ইহাতে। হাৰা। ডগায় আৰু গৰুবাৰতে তিনি চাৰিটা যিস্ত পাৰালি দিয়ে।

ভালুক-মেকুৰী বা বিণ্টুৰং

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---ভাইভোৰ্ভাড

প্ৰজাতি---আৰ্শ্ৱিট্টিছ বিণ্টুৰং

আৰ্শ্ৱিট্টিং বা ভালুক-মেকুৰী নামৰ এবিধ চিভেট্ কেট পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাকত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দীঘল দীঘল নোমেৰে এই জন্তুটো দেখাত ভালুকৰ দৰে। দেখাত ভালুকৰ মিচিংগ হৰোও ইমান গাত চিভেট কেটৰ ওপৰেহে দেখা যায়। সেই বাবে ইয়াক ভালুক-মেকুৰী বোলা হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বসতি স্থান আৰু বিচৰণ ভূমি পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰ। যেনেপাল, ভূটান আৰু ছিক্কিমৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমান বসতি স্থান অৰুণাচলৰ মাজেদি পূব ভাৰতত থকা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰ্বতীয়া ঠাইৰ বনভূমিবিলাকলৈ সংসাৰিত হৈছে। পাহাৰৰ নামনিৰ হাবি বননি-বিলাকৰ মাজতো এইবিধ প্ৰাণীৰ দেখা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ নেইবাৰন দেশটো এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতি স্থান। তাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মদেশ, মালয়েচিয়া আৰু ইন্দোনেচিয়া প্ৰভৃতি দেশৰ নাম উল্লেখ কৰিব পৰা যায়।

এইবিধ জন্তু সাধাৰণতে গছৰ ওপৰত থাকে। ব'লা বৰণৰ দীঘল দীঘল নোমেৰে আৰু জন্তুটোৰ দুয়োখন কাণৰ ওপৰত একোছাটক দীঘল নোম হয়। দীঘল নেজডালৰ নোমবিলাক দীঘল হোৱাৰ বাবে নেজডাল জোপোছা যেন লাগে। নেজডালৰ আন এটা বিশিষ্ট গুণ হ'ল আৱশ্যক অনুযায়ী জন্তুটোৱে গছৰ ডালত নেজেৰে মেথিয়াই লৈ গছৰ ওপৰত বগাই ফুৰিব পাৰে। ভালুক-মেকুৰীৰ নোমবিলাক অতিপাত দীঘল হোৱাৰ বাবে চুটি ঠেং কেইখনো নোমসোপাৰ তলতে নাক খাই থাকে। সেই কাৰণে গছৰ ডালত বগাই ফুৰোতে জন্তুটোৰ ঠেং কেইখন ভালদৰে চমুত নপৰে। সেই বাবে ইয়াক পেট চোঁচৰাই চোঁচৰাই শোৱা প্ৰাণী যেনহে লাগে। ইহঁতৰ দীঘল নোমবোৰ ঠবঙা আৰু এই নোমৰ মাজত গজা বগা বৰণীয়া নোমবোৰ জিলিকি থাকিলেও জন্তুটোক ক'লাহে দেখা যায়।

দিনৰ ভাগত জন্তুটোৱে শুই থকাৰ সময়ত দীঘল নেজডাল বগুভিৰীয়াটক মূৰৰ ওপৰৰ পৰা ঘূৰাই আনি তাৰ মাজতে মূৰটো গোঁজ মাৰি লৈ চেপেটা হৈ থাকে। এই

অবস্থাতে জটিলেৰে গভীৰ নিদ্ৰিত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় । ডাঠ হাৰিৰ গছ-গছনিৰ ওপৰত থকা আৰু বিশেষকৈ নিশাচং প্রকৃতিৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে ইয়াক সহজে দেখা নাযায় । পাৰ্চ লাইটৰ সহায়ত নিশাচং বেতিয়াৰ অৱস্থাত ইয়াৰ পৰা ইয়াক গছ গছনিৰ ওপৰত গাই ফুৰা অবস্থাত ইয়াক দুই এটা প্ৰাণীক কেতিয়াবা এবাৰে টেক দেখা যায় ।



ভালুক-মেকুবী বা বিন্টুং

চিৰিয়াখানাবিনাকত প্ৰতিপালন কৰি নাথিৰৰ বাবে এইবিধ প্ৰাণীক কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাৰিৰ মাজৰ পৰা ধৰি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । স্বাধীনচিতিয়া ভাৱে গভীৰ অৱণতুমিৰ মাজত বাস কৰা বিধৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে ই বাঘোৱাত থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে আৰু সকলো সময়তে পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে । ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন অনুযায়ী এই বিধ দুৰ্লভ প্ৰাণীক নিষিদ্ধ প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

মেকুৰী আৰু বাঘ জাতীয় প্ৰাণীবিলাক

মেকুৰী আৰু বাঘ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকক এটা বেলেগ শৃংখল বা গোত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই জন্তুবিলাকে অন্যান্য জন্তুৰ মাংস পাই জীৱন ধাৰণ কৰে। সেই কাৰণে ইহঁতৰ মাংসাহাৰী জন্তু বুলি কোৱা হয়। এইবিলাক জন্তুৰ বাহিৰেও বিভিন্ন প্ৰাণীয়ে জীৱন ধাৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাংসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তেনে প্ৰেণীৰ প্ৰাণীকে মাংসাহাৰী জন্তু বোলা হয়। বাঘ, কুকুৰ, ভালুক, ফিভেৰ্চ ফেট্ আদি প্ৰাণীৰ নাম এই সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰিব পাৰা যায়। উল্লেখযোগ্য যে চিকাৰ গৰি খাবৰ বাবে মাংসাহাৰী জন্তুৰ চোকা দাঁত, নখ আদি গুণ দেখা যায়। আটাইবিলাক মাংসাহাৰী জন্তুৰ ভিতৰত মেকুৰী আৰু বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ কিছুমান অভাৱনীয় গুণ দেখা যায়। সৰু সৰু আকাৰৰ মেকুৰীয়েই হওক বা কিবাটো আকাৰৰ বাঘ অথবা সিংহই হওক এইবিলাক জন্তুৰ দেহত থকা কিছুমান বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো মাংসাহাৰী জন্তুৰ গাত দেখা দেখা নাযায়। মাংসাহাৰী তথা চিকাৰ বিলাগী প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত এই প্ৰাণীবোৰে সৰ্বোচ্চ স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে।

এইবিলাক জন্তুৰ এবৰ আৰু দৃষ্টিশক্তি প্ৰবল। ইহঁতৰ কাষেদি যোৱা যেই কোনো জন্তুৰ শব্দ ইহঁতৰ কাণত পৰিলে ততাতীয়া সজাগ হৈ জন্তুটো ধৰিবৰ বাবে সাজু হয়। দৃষ্টিশক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই প্ৰাণীবিলাকে নিঃশব্দ পৰা লক্ষ্য কৰিয়েই চিকাৰৰ ওপৰত সহজে দৃষ্টি নিৰ্দ্ধেশ্য কৰিব পাৰে। চিকাৰৰ জন্তু এবাৰ চকুত পৰিলেই ইহঁতে নানা কৌশলেৰে কাষ চাপি আচৰিতে জন্তুটোৰ ওপৰত জপিয়াই পৰি আক্ৰমণ কৰে। এই প্ৰাণীবিলাকৰ মুখৰ আগভাগত কেইডালমান ঠৰঙা গৌফ গজে। এই গৌফ কেইডালৰ সহায়ত জন্তুটোৱে বেই কোনো বস্তু স্পৰ্শ কৰি তাৰ গুণাগুণ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে। তদুপৰি ইহঁতৰ আগ ঠেং দুখন আঙুলিৰ মাজত হোৱা অনন্য দীঘল নোমখিনিয়ো স্পৰ্শৰ দ্বাৰা বস্তুৰ গুণাগুণ নিৰ্ণয় কৰাত এই প্ৰাণীবোৰক সহায় কৰে।

মেকুৰী তথা বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে ঠেঙৰ আগ ভাগেৰে মাটিত খোজ কাঢ়ে।

গোবোহা কেইটা মাটিত নগৰাটক আঙ্গাৰতে ডাং খাই থাকে বাবে মানুহৰ মনে ভৱিষ্যত পতাৰ তলুৱা কোমল মাটিত নপৰে। তলুৱাৰ আঙুলিৰে পোজ কঢ়াৰ বাবে এই প্ৰাণীবিলাকক ডিঅক্সিগ্ৰেট প্ৰেণীৰ প্ৰাণী বোলা হয়। মেকুৰী গোষ্ঠীৰ জন্তুৰ নখৰ বৈশিষ্ট্য এয়ে যে জন্তুটোৰ নখৰোৰ সাধাৰণতে আঙুলিৰ আগ ভাগৰেও ওলাই নাথাকে, আঙুলিৰ মাজৰ এটা ধাপৰ ভিতৰতহে সোমাই থাকে। নখটো এইদৰে ৰাপৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ কাৰণে মাটিত খোজ কাঢ়োতে বঁহনি খাই ক্ষয় নাযায়। সেই

দৰে এইবিধ জন্তৰ কামিদ্বেশত কোনো না সন্ধানি থকা দেখা যায়। সেই কাৰণে এইবিধ প্ৰাণীৰ গাঁৱপৰা কোনো সন্ধানৰ গাঁৱ নোলায়।



ফুটুকী-জহামাল বা স্পটেড লিনচাং

ফুটুকী জহামালে গছৰ ওপৰত বগাই ফুৰা সৰু-সুৰা প্ৰাণী ধৰি খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। গছৰ ডালত পৰা চৰায়ে দুই চাৰিটা কেতিয়াবা এইবিধ প্ৰাণীয়ে ধৰি পায়। গছৰ ওপৰত বাহ সাজি প্ৰাণী পৰা চৰাইয়েও এইবিধ জহামালৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰে। গছৰ ওপৰত বাহ সজা চৰাইবোৰে সেই কাৰণে চাই চিতিহে বাহ সাজিবৰ বাবে ঠাই বাচি লয়। সুনাত্ৰা, ভাতা দাঁপপুণ্ডত বাস কৰা স্পটেড লিনচাং বা ফুটুকী জহামালৰ

গাত দীঘলীয়া আঁচৰ উৎপাদিত হোৱা দেখা যায়। এইবিধ মহানাদে সাধাৰণতে গছৰ ওপৰত বাস কৰে আৰু নানা বিধৰ সৰু সৰু আকাৰৰ প্ৰাণীবোৰ খৰি খৰি খাই জীৱন বান্ধি কৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁত মাটিতলৈকে নাগি আহি মাটিত বগাই ফুৰা প্ৰাণীবোৰ খৰি খৰি খায়। ইয়াৰ বাহিৰে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ অঞ্চলত এই শ্ৰেণীৰ আন এবিধ পানী বাস কৰে। ইহঁতৰ গাৰ দাৰ্গানাক দেখাত নিচেই সৰু।

বুটুবী মহানাদে বটত দুৰাবটৈ গোৱালি জগায়। গছৰ বোন্দ বা তেনে ধৰণৰ সুবিধা অনেক ঠাইত নৈদ পাছ সোমাই থাকে। মাইকী জনায়ে তেনেবোৰ ঠাইতে গোৱালি জগায়। ভাৰততে এই সাধাৰণতে দুটাকৈ গোৱালি জগায়।



কুটুকী জহামাল

শ্ৰেণী---জন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---ভাইভেৰিডি

প্ৰজাতি---পিতৃদত্ত

পাণ্ডিকন

ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি অহা চিভেট্ কট্ বা জহামাল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিজ্ঞানৰ বাহিৰেও আন এবিধ আটক-মুখীয়া প্ৰাণী গভীৰ অধ্যয়ত আলোচ্য আনোৱে বস্তু দেখা যায়। এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান পূব ভাৰতৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল বিনাকৈই বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। ইয়াক স্পটেড্ লিনচাং বা টাইগাৰ চিভেট বোলা হয়। অসমীয়া ভাষাত এইবিধ প্ৰাণীক ‘কুটুকী জহামাল’ বোলা হয়। অসমৰ ভৈয়াম অঞ্চলত থকা মেচেকাৰ লগত এইবিধ প্ৰাণীৰ সাদৃশ্য দেখা যায়। গতিকে পৰ্বতীয়া মেচেকা বুলিও ক’ব পৰা যায়। অসমত এই বিধ চিভেট্ বিনল বাবে আৰু মেচেকাৰ লগত ইয়াৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাগুণৰ মিল থকা বাবে অসমীয়া ভাষাত ইয়াৰ বেলেগ নাম থকাৰ কথা ভাৱা নাযায়। ইয়াৰ বসতিস্থান নেপাল আৰু ভূটান পৰ্যন্ত সমগ্ৰায়িত হৈ থকাৰ কথা ভাৱা যায়। দক্ষিণ পূব এচিয়ান বৃহৎদেশ আৰু অন্যান্য দেশতো এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। ভূটীয়া বিনাকৈ ইয়াক ‘জিৰ-চোম’ বোলে আৰু লেপচা সমগ্ৰায়ন মানুহে এইবিধ প্ৰাণীক বৃজাবলৈ চুইলিও বা চিলিও শব্দ দুটা টাই অনুবাদী ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কুটুকী জহামালৰ সচাচৰ বসতিস্থান হিমালয় শৈলমালাৰ নামনিৰ পৰ্বতীয়া অঞ্চলত। অসমৰ অন্তৰ্গত সীমা মূখীয়া হাৰি বংশি বিনাকৈ এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান।

কুটুকী জহামালৰ সমুখ ভাগৰে ওতো দীঘল চানেকীয়া দেহাটো অতিপাত দাঁত হোৱা দেখা যায়। দুটা বগীয়া গাত কুটুকী কুটুকী দাগৰ উৎপত্তি হয়। গিঠিৰ ওপৰৰ দাগবোৰ ভৰকা-কুলীয়া হয় আৰু দেহৰ তলৰ ফালে থকা দাগবোৰ ক্ৰমে সৰু হয়। দেহৰ আগ ভাগৰপৰা তপিনালৈকে থকা এই দাগবোৰ শাবী শাবীকৈ সজাই থোৱা যেনহে লাগে। ঠেং কেইখনৰ কুটুকী দাগবোৰ দেহৰ পৰা ঠেঙৰ আগভাগলৈ সজোৱা থাকে। কুটুকী জহামালৰ নেখডাল পাচোতকৈ কম দীঘল নহয়। তদুপৰি নেখডালত আঙঠিৰ নিচিনাকৈ ক’লা বৰণৰ খাপ কটা দাগ দেখা যায়। অঙটোৰ আকাৰৰ তুলনাত ঠেং কেইখন চুটি হোৱা দেখা যায়। জহামাল গোষ্ঠীৰ অন্য প্ৰাণীৰ

কাৰণে নথ কেইটা সকলো সময়তে খুবৰ দৰে চোকা হৈ থাকে। কোনো চিকাৰৰ জন্তক খপিয়াই ধৰিবলগীয়া হলে জন্তটোৱে নথ কেইটা নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী খাপৰ মাজৰ পৰা বাহিৰ কৰি লয়। চিকাৰৰ জন্তৰ গাত তলুৱা খনেৰে খাপ মাৰি ধৰাৰ লগে লগে চোকা নথবোৰ জন্তটোৰ গাত সোমাই পৰে আৰু সি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে। মেকুবী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ নাসিৰ অন্য কোনো মাংসাহাৰী জন্তৰ নথত এনে বৈশিষ্ট্য দেখা নাযায়।

মেকুবী তথা বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ দাঁতৰ গঠন অলপ বিশেষ ধৰণৰ। এই শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীয়ে দাঁতৰ সহায়ত চিকাৰৰ জন্ত সহজে কামোৰ মাৰি ধৰি কুচা কৰিব পাৰে। গাৰ পৰা মাংস ছিঙি আনি গুৰি দাঁতেৰে চোবাই টুকুৰা টুকুৰ কৰাত এই প্ৰাণীবোৰৰ অকণো অসুবিধা নহয়। যি কেইটা আগ দাঁতেৰে চিকাৰৰ জন্তৰ মাংস কামোৰ মাৰি ছিঙি আনে সেই কেইটা দাঁতক কুকুৰদাঁত বোলা হয়।

এই প্ৰাণীৰ ওঠৰ তলতে দুটা সৰু সৰু দাঁতৰ উৎপত্তি হয়। হাড়ৰ পৰা মাংস একেটাই অগত সুবিধা হয় বাবে এই দুটা দাঁতক ছিঙি খোৱা দাঁত বোলা হয়। ইহঁতৰ জ্বনি দাঁতৰ ওপৰ ভাগ এনে ধৰণে খাঁজ কটাকৈ থাকে যে সেই দাঁতৰ সহায়ত ইহঁতে সহজে হাড় মাংসবোৰ ভাঙি টুকুৰা কৰিব পাৰে। এই দাঁতবোৰ হাড়ৰ মাজত পোত ৰাই থাকে বাবে জন্ত এটাক কামোৰ মাৰি থেকেকা থেকেকি কৰিবলৈও সিহঁতৰ খাঁজ নলৰে। কুকুৰদাঁত আৰু গুৰি দাঁতৰ মাজৰ অন্তৰ কোনো দাঁতৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা নাযায়। কুকুৰদাঁতৰ সহায়ত ছিঙি অনা মাংসখিনি চোবাই গুৰি কৰাৰ আগতে মুখৰ ভিতৰত লৰণ বাবে সুবিধা হৈ পৰে। গুৰি দাঁত বোৰক ক্ৰমে “ম’লাৰ” আৰু “প্ৰিম’লাৰ” বোলা হয়। মাংস আৰু হাড়বোৰ ভাঙি ছিঙি গুৰি কৰিবলৈ এইবিলাক দাঁত অপৰিহাৰ্য্য। ওপৰ আৰু তল পাৰি দাঁত লাগি থকা হাড় দুডাল লাওখোলাত উৎপত্তি হয় আৰু সেই দুডাল হাড়তে এই দাঁতবোৰ নিখুট ভাবে লগা থাকে। এই শক্তি সম্পন্ন হাড় দুডালে মাংস, হাড় আদি অতি সহজে ছিঙি ভাঙি গুৰি কৰে। এই মাংসাহাৰী বিধ প্ৰাণীৰ দাঁতৰ বৈশিষ্ট্য মন কৰিব লগীয়া।

মেকুবী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ জিভাৰ উপবিভাগ খহটা। খোৱা বস্তুৰ সোৱাদ সোৱাতকৈও তৎক্ষণাত পেটল ভিতৰলৈ আহাৰ ঠেলি পঠোৱাতহে এই জিভাখনে বেছি সহায় কৰে। তদুপৰি মৰা জন্তৰ হাড় বা ছালত লাগি থকা মাংসবোৰ এই খহটা জিভাখনে একেটাই অগত সহায় কৰে। হাবিবনৰ মাজত নিজকে গাপ খুৱাই ৰাখি চিকাৰী বা অন্য জন্তৰ আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ সুবিধাৰ বাবে এই বিধ জন্তৰ ছালৰ বং বিশেষ ধৰণৰ হয়। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ ছালত দীঘল দীঘল পট্ট থকা বাবে পাদিপাশ্বিক অৱস্থায় লগত চিনিৰ নোৱাৰাকৈ গিলি থাকে। গোধা-কুটুকী বাঘ, নাহন-ফুটুকী বাঘ আৰু তেনে ধৰণৰ অন্যান্য মেকুবী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ গাৰ মোৰৰ বৰণ আৰু গঠনৰ আকৃতিয়ে হাবিত নিজক চিনিৰ নোৱাৰাকৈ লুকাই থকাত ইহঁতক সহায় কৰে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা কথাৰ পৰা সহজে অনুমান হয় যে বাংলাছাৰী জন্তু হিচাপে মেকুৰী গোষ্ঠীৰ জন্তুৰ দেহত কিছুমান শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাগুণে চৰম পৰিণতি লাভ কৰিছে।

ভাৰত উপ-মহাদেশৰ অন্তৰ্গত থকা এই গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ গাইঙীয়া বিবৰণ তলত উদ্ধৃত কৰা প্ৰবন্ধ গ্ৰন্থৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে



ভাৰতৰ সিংহ

শ্ৰেণী—জ্ঞানপায়ী

বৰ্গ—বাংলাহাবী

গোত্ৰ—কেনিডি

প্ৰজ্ঞাতি—পায়েৰা লিঙপাৰ্চি'কা

সিংহক পশুৰ ৰজা বোলা হয়। এই বাংলাহাবী মহা—পৰাক্ৰমী অত্যন্ত বিশেষকৈ শক্তিশালী প্ৰতীক বুলি ক'ব পাৰি। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বাহিৰে অন্য কোনো বেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে সিংহৰ লগত সন্মানে সন্মানে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে। শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক দিশত এইবিধ প্ৰাণীৰ দেহত কিছুমান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সিংহৰ গলদেশত উৎপত্তি হোৱা দীঘল দীঘল নোৰ বা চুলি অন্য কোনো বেকুৰী জাতীয় প্ৰাণীৰ দেহত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ভিত্তিত উৎপত্তি হোৱা এই চুলিবোৰক কেপৰ বোলা হয়। সিংহৰ নেজৰ আগভাগতো একোছা দীঘল চানেকীয়া চুলিৰ খোপা থাকে। সিংহৰ ককালটো বাঘ আৰু বেকুৰী গোষ্ঠীৰ অঙ্গবোৰৰ ককালৰ তুলনাত চিৰা হয়। সেই বাবে এইবিধ বাংলাহাবী অঙ্গৰ মহা পৰাক্ৰমী ৰূপ দেখা যায়। খাওঁ খাওঁ বুজিব চকু বোৰাৰে সৈতে অঙটোক দেখিলে উন্নত গাঁৱ নোৱ ডালি ডালি হ'ব খোজে। আঁঠুৰ আগৰ ফালে থকা নোমখিনিও অসুপ দীঘল হোৱা দেখা যায়। দেহৰ অন্যান্য ঠাইৰ নোমল নৰণ বঙচীয়াটক বুগা হয়। নোমৰ ওপৰত কোনো বিশিষ্ট বৰণ সমাবেশ ঘটা দেখা নাযায়। উল্লেখযোগ্য যে সিংহিনীৰ দেহত কোনো কেপৰ উৎপত্তি নহয়।

বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কেৱল গুজৰাটতহে স্বাভাৱিক পৰিবেশত স্বাধীন চিতীয়া ভাৱে ভাৰতীয় সিংহ ৰাখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইখন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত কাৰিয়ার উপৰীপৰ গাঁৱ নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়া প্ৰায় ৪০০ মান বনবীয়া সিংহ আছে বুলি জনা যায়। অতীততে ভাৰতীয় সিংহৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ জুৰি উত্তৰ ভাৰতৰ বহুতো ঠাইলৈ বিয়পি আছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক সীমাবোৰা অতিক্ৰম কৰি এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান পশ্চিমৰ কানে ইয়াক আৰু ইয়াৰ পৰিস্ৰৱ সমগ্ৰাবৃত হৈ আছিল। এতিয়া এই দুখন দেশৰ অৰণ্যত সিংহ দেখা নাযায়। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ আৰু ভাৰতীয় সিংহৰ চেহেৰা পান্টিত সামান্য প্ৰভেদ পৰিলক্ষিত হয়। 'ভাৰতীয়

সিংহৰ বাহিৰে অন্য কোনো জাতীয় সিংহ এচিয়া মহাদেশত নোহোৱাৰ বাবে এইবিধ সিংহক এচিয়া মহাদেশীয় সিংহৰ আখ্যা দিব পাৰি। আফ্ৰিকাৰ সিংহৰ তুলনাত এচিয়াৰ সিংহৰ গলধন আৰু ডিঙিত উৎপন্ন হোৱা কেশৰত কম পৰিমাণৰ চুলি হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ নেজৰ আগভাগৰ নোমৰ দীৰ্ঘতা আফ্ৰিকাৰ সিংহৰ নেজৰ নোমতকৈ বেছি হয়। তদুপৰি নেজৰ আগত থকা চুলিৰ পৰিমাণো তুলনামূলক ভাৱে বেছি হোৱা দেখা যায়। ওপৰে ওপৰে লক্ষ্য কৰিলে দুয়োবিধ সিংহৰ মাজত যে কিবা ব্যৱধান আছে এই কথা ঠাৱৰ কৰা টান হৈ পৰে।



ভাৰতীয় সিংহ

সিংহক গভীৰ অধ্যভূক্তি বাস কৰা প্ৰকৃতিৰ শালী বুলি ক'ব নোৱাৰি। গাঁৱ
বাহীৰ উদ্যানত থকা পাউলীয়া হাবি আৰু জঙ্গল কদম জাতীয় গৰু-গুৰা গছ আৰু
জলজীৱী আকানৰ ছিৰিলিপিতীয়া গছ থকা পৰিৱেশতে ভাৰতীয় সিংহ বাস কৰা দেখা

যায়। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ নিচিনাকৈ সিংহক অকলশৰীয়াটক বিচৰণ কৰি কুৰা দেখা নাযায়। সিহঁতে সাধাৰণতে জাক বান্ধি বাস কৰে। সেই বাবেই সিহঁতক সমাজ-প্ৰিয় প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। মাক-পোৱালিৰ সন্মিলনত একোটা মৰু সুৰা জাকৰ সৃষ্টি হয়। সিংহিনীহঁতৰ দগ লাগি মতা সিংহবিলাকে কেতিয়াবা একোটা একোটা ডাঙৰ জাকৰ সৃষ্টি কৰে। একেদৰে জাক পাতি দক। সিংহবিলাকৰ মাজত কাজিয়া-পেচালৰ সূত্ৰপাত পৰিলক্ষিত নহয়। আনকি সিহঁতৰ মাজনে কোনো এটা সিংহই চিকাৰ কৰি কোনো ভ্ৰত মানি আনিলে গোটেইমুখাই চাৰিওফালৰ পৰা বেদিকুৰি ভক্তটোৰ মাংসবোৰ টানি-আজুনি খোৱাত লাগি যায়। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ এনে সামাজিক গুণ দেখা নাযায়। বাঘে চিকাৰৰ জন্তু মানি হাবিৰ মাজলৈ টানি নি অকলশৰীয়াটক খাবলৈহে ভান পায়। গীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত নীলগাই, ফটুকীহৰিণ, চাৰি শিঙীয়া এণ্টেলোপ্, চিচ্কাৰা প্ৰভৃতি নানাবিধ তৃণভোজী প্ৰাণী বাস কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাস কৰা সিংহবিলাকে সুবিধা বৃদ্ধি তৃণভোজী প্ৰাণীৰ দুই-এটাক ধৰি ধৰি খায়।

এই তৃণভোজী প্ৰাণীবিলাকৰ বাহিৰে গীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আন কেৰাবিধো মাংসা-হাৰী জন্তু বাস কৰে। ইহঁতৰ ভিতৰত নাহৰ-ফটুকী বাঘৰ নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ কৰিব পাৰি। গীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নাহৰ-ফটুকী বাঘৰ সংখ্যা এতিয়া আশাতীতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সিংহৰ দৰে এই নাহৰ-ফটুকী বাঘেও খাদ্যৰ বাবে উদ্যানত বাস কৰা তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব লগীয়া হয়। এই বিষয়ত এই দুয়ো প্ৰকাৰ প্ৰাণীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে। অৱশ্যে মহা পৰাক্ৰমী সিংহৰ দগত হেতা-ওপৰা কৰিবলৈ সিহঁতে সাহস নকৰে। সেই বাবে উদ্যানৰ আশে পাশে থকা গাওঁদেৱালত ধৰণ কৰি এই নাহৰ-ফটুকী বাঘবিলাকে ঘনচীয়া জন্তু চিকাৰ কৰি খাবলৈ আনহু কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিচালকসকলে কিছুমান নাহৰ-ফটুকী বাঘক কৰায়ত কৰি স্থানান্তৰ কৰহু হাতত লবলগীয়া হৈছে।

সিংহৰ গোলমণিত মানুহৰ কাণ ফাটো বুলি এঘাৰ কথা অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে সিংহবিলাকে প্ৰকাণ্ড শব্দ কৰি আকাশ-পাতাল কপোৱাৰ অৱস্থা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সিংহনাদৰ ভয়াবহ শব্দই ওচৰৰ ঠাইত বাস কৰা মানুহৰ মাজত আতঙ্কৰ সৃষ্টি কৰে। সিংহই সাধাৰণতে ডোক-মোকালি পৰ্যন্ত গোজৰিবলৈ আনহু কৰে। দোভাগ নিশা আৰু ভৰ-দুপৰতো কেতিয়াবা সিংহৰ আৰ্তনাদ শুনা যায়। গীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষে পাৰ্শ্বৰে থকা মানুহে কেতিয়াবা এই অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাত লাহন-পালন কৰি ৰখা সিংহ কেইটাল ভয়াবহ গে জৰণি প্ৰায়েই শুনিবলৈ পোৱা যায়।

ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে গীৰ অভয়াৰণ্য তথা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰে ভাবতবৰ্ষৰ অন্য কোনো ঠাইত সিংহ জাতীয় প্ৰাণীক স্বভাৱিক পৰিবেশত স্বাধীনচিন্তীয়া ভাৱে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অৱশ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বৰিভুলি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু উদ্যায়ন নন্দন কানন উদ্যানত সিংহক মুকলি শূন্য ভাৱে আহল বহন পৰিবেশত

যেদি দি চাকৰি দাব আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান পঢ়ি তোলা হৈছে। এই চাকৰিৰ ভিতৰলৈ উদ্যান পৰিচালকসকলে ব্যৱস্থা কৰি যথা নিৰাপদজনক যন্ত্ৰচালিত বাহনত আবোহণ কৰি লক্ষ্যসকলে সিংহবোৰৰ নিচেই কাষলৈকে যাব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য স্বাভাৱিক পৰিবেশত যাতে সিংহ প্ৰতিপালন কৰি বিকল্প আবাস ভূমিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। অৱশ্যে এই আঁচনি এতিয়ালৈকে কৃতকাৰ্য্যতাৰে সম্পাদন কৰিব পৰাৰ লক্ষণ দৃষ্টিভূত হোৱা নাই।

সিংহ জাতীয় প্ৰাণীয়ে বছৰৰ বেছি কোনো সময়তে পোৱালি জগায় বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। প্ৰায় বাৰ্ষিক উদ্যানত বাস কৰা সিংহ-সিংহিনীবোৰৰ মাজত শীতকালত মিলা বীৰি ভাৱ দেখা যায়। বাৰ-কাণ্ডপ মাহত সিংহিনীহঁতে পোৱালি জগায় আৰু এবাৰত এটাতকৈ বেছি পোৱালি জগায়। গৰ্ভ ধাৰণৰ সময় ১২৬ দিন বুলি জনা যায় যন্ত্ৰ মাইকী উভয়ে মিলি পোৱালিবোৰক প্ৰতিপালন কৰি ড'হৰ দীঘল কৰে।



ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ

শ্ৰেণী----স্বল্পপায়ী

বৰ্গ----মাংসাহাৰী

গোত্ৰ----ফেলিডি

প্ৰজাতি----পাছেদ। টাইগ্ৰিছ

সেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ ভিতৰত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘেই আকাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ হয়। মহা পৰাক্ৰমী সিংহৰ বাহিৰে বাঘৰ দগত ফেৰ নাহিব পৰা দ্বিতীয় বিধ সেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী ধকাৰ কথা জনা নাযায়। এই দুবিধ প্ৰাণীয়ে কেতিয়াবা যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হলে অৱশেষত কোনে কাক লগবাই ফেলিব পাৰিব তাক আগতীয়াতকৈ কোৱা টান। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ নোমৰ বৰণ হালধীয়া হোৱা দেখা যায়। গোটেই গাতে শুক্লবৰ্ণৰ দীঘল-পহীয়া দাগ বা আঁচ থাকে। ঢেকীয়া গছৰ পাতৰ দৰে এই আঁচবোৰ জন্তুটোৰ দেহত দিনপি ধকাৰ বাবে এইবিধ প্ৰাণীক আমাৰ ভাষাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ বুলি কোৱা হয়। জন্তুটোৰ মুখমণ্ডলত অঁকা-বিকা দাগৰ উৎপত্তি হয়। ঠেং কেইখনত হোৱা বগা বৰণৰ আঁচবোৰ প্ৰধানিকৈ গছাই ৰখা যেন লাগে। মতা বাঘৰ তুলনাত বাঘিনীৰ গাটো পাতলীয়া হোৱা দেখা যায়। অঁকা-বিকা লাগেৰে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ দেখাত সুৱনী হয়। চিকাৰ-বিলুপী আৰু মাংসাহাৰী প্ৰাণী হলেও বাঘ যিকোনো সময়তে জন্তু নিধন কৰা দেখা নাযায়। পেটৰ ক্ষুধা নিৰ্বাৰণৰ বাবে সি চিকাবোপযোগী এটা জন্তু বিচাৰি লয়। সেইটো জন্তুক বধ কৰি পাৰে অত্যাৱশ্যক কৰিলে সি অন্য জন্তুৰ মাজত অৱাৰতে গম্ভীৰ সৃষ্টি নকৰে। সেই কাৰণে বাঘক উদাৰ প্ৰাকৃতিৰ উচ্চমনা প্ৰাণী বোলা হয়।

সাধাৰণতে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে গভীৰ অৱণ্যত বাস কৰিবলৈ ভাল পায়। উলু বৰতা, ইকৰা, পাগৰি গুড়তি ওখ ওখ ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদেৰে ভৰপূৰ হৈ থকা আৰু, সেৰেঙা সেৰেঙা গছ গছনি থকা হাবি বননিয়ে এইবিধ প্ৰাণীৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ভিন্ ভিন্ জৰায়ুয়ে প্ৰাণীৰ মাজত কথা নানা প্ৰকাৰৰ বাতাব্যৱহাৰ ইহঁতে কৃতকাৰ্য্যতাৰে ভীৰন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। আচৰ্য্যতে বিষাক্ত ইপ-যোগী জন্তু যেনেই পৰিমাণে থকা বা নথকাৰ অৱস্থাই ইহঁতৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশ সৃষ্টি কৰা বা নকৰাত পোনপটীয়া অধিগণা যোগায়। বনৰীয়া জন্তুৰ অভাৱ হলে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে মাছে সময়ে পাৱৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৰু, ছাগলী আদি খবচীয়া

জন্তুকো আক্ৰমণ কৰে। বাঘে সাধাৰণতে মানুহলৈ ভয় কৰে আৰু ধকা ঠাইৰ ওচৰলৈ মানুহ অহা যোৱা কৰাৰ গম পালে ই নাহেঁকৈ হাবিৰ মাজলৈ সোমাই যায়। কেনে-বাকৈ মানুহৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'লে কিম্বা ভোকত আতুৰ হোৱাৰ সময়ত চিকাৰৰ উপযোগী প্ৰাণী বিচাৰি নাপালে কেতিয়াবা ই মানুহকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ কুঠাবোধ নকৰে। এবাৰ মানুহৰ তেজৰ সোৱাদ পালে ই নাপাহৰে। তেনে বাঘে মানুহৰ পাছ লয় আৰু আচৰিত্তে আক্ৰমণ কৰে। কালক্ৰমত সি মানুহ খোৱা বাঘত পৰিণত হয়। নৰ খাদকৰ উপদ্ৰৱত কেতিয়াবা বহুতো মানুহে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগীয়া হয়। তেনে বাঘক গুলিবিন্ধ কৰি বধ কৰিব লগীয়া হয়। উত্তৰ পানৰ মাজৰাট নামেৰে ঠাইত বাস কৰা জিয়াউৰ বহমান নামৰ এজন অভিজ্ঞ লোকে কেবাটাও নন্দখাদক ফাল্গু পাতি জীয়াই জীয়াই ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইদৰে মানুহ খোৱা বাঘ কদাচিৎ কিনি তেওঁ বহুতো মানুহক বাঘৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পৰা বক্ষা দিবলৈ সক্ষম হৈছে।



চেকীয়াপতীয়া বাঘ

চেকীয়াপতীয়া বাঘৰ উৎপত্তি স্থান ছাইবেৰিয়াৰ বিস্তীৰ্ণ বনভূমিবিন্যাসকে নিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বুলি জনা যায়। ছাইবেৰিয়াৰ ফালে বস কৰা চেকীয়াপতীয়া বাঘবিন্যাসক উচুৰি বাঘ বুলি কোৱা হয়। এই চেকীয়াপতীয়া বাঘৰ গোমবিন্যাসক অগপ দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবে ইহঁতক আকাবত ডাঙৰ যেন লাগে। আৰু দেখৰ তাপমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰো সহায় কৰে। কালক্ৰমত কিছুমান উচুৰি বাঘে দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূবৰ ফালে প্ৰসুৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। জলবায়ু আৰু মাটি পানীৰ প্ৰভাৱৰ অনুপাতে বাঘ বিন্যাসক আকাবত ভিন্ন ৰূপ দেখা যায়। ইয়াৰ কিছুমান বাঘে ঠাই সলনি কৰি আহি

ভাবতব অৰণ্যভূমিত সোমাইছি বুলি জনা যায়। বাছস্থানৰ স্বৰূপভূমিয়ে গৰকা বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগৰ বাহিৰে সমগ্ৰ দেশতে চেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আধিপত্য দেখা যায়। হিন্দালয় শৈলমালাৰ নানানি ভাগত থকা বাঘবিলাক আক্ৰান্ত অন্যান্য ঠাইৰ বাহতকৈ অলপ ডাঙৰ যেন লাগে। অগম আৰু অসমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য কেইখনত চেকীয়াপতীয়া বাঘ দেখা যায়। ছাইবেৰিয়াৰ ফালৰ কিছুমান উচুৰি বাঘৰ বংশধৰে সুন্দৰ প্ৰাচ্যৰ ফালেও বসতি বিস্তাৰ কৰা দেখা যায়। এইদৰে স্থান সলনি কৰা বাঘে দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন দেশত বাস কৰিছে আৰু কৰিলে। এইবিলাক দেশৰ ভিতৰত চীন দেশ, স্ত্ৰাজা, জাপান, ব্ৰহ্মদেশ প্ৰভৃতি দেশৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। আন কিছুমান চেকীয়াপতীয়া বাঘে দক্ষিণ পশ্চিম ফালে চোং সলাই ৰ কাঙ্গিয়ান হ্ৰদৰ চাৰিও কাষে থকা কিছুমান অৰণ্যত থাকিবলৈ ল'লেগৈ। বিভিন্ন অঞ্চলত এইদৰে থাকিবলৈ লোৱা বাঘবিলাক স্থানীয় জনবায়ুৰ দ্বাৰা ভয়ৰ বিষয়ে হ'ল। পৰিবেশ অনুযায়ী বাঘবিলাকৰ দেহত কিছুমান নিৰ্ভৰশীল বৈশিষ্ট্য ফুটি উঠিল। জন্তু সৰুহঁতৰ দেহত পৰিষ্কাৰ হৈ উঠা আক্ৰান্ত আকৃষ্টিৰ সামান্য ব্যৱধান আৰু গাঁৱ নোমৰ বৰণৰ গভীৰতাৰ ইণ্ডিগোচি অনুগতি চেকীয়াপতীয়া বাঘক ৭টা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে।

অসমৰ অসমত চেকীয়াপতীয়া বাঘ আছিল বুলি জনা যায়। বাঘ নিধন কৰিব পৰা সাহসী লোক সকল সকলোৰে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈছিল। ইয়াৰ সকল অসমলৈ অহাৰ আগতে পুৰাকৃত ৰাজ্যবিলাক অৰণ্যভূমিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল। বহুতো মানুহে বাঘৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগীয়া হৈছিল। অসমৰ মাজেদি খেল আইন প্ৰতিষ্ঠাকৰাৰ পাছত ঠায়ে ঠায়ে হাবি জলবোৰৰ কাটি-ছিঙি চাহ বাগিচা-লোৰ স্থাপন কৰা হ'ল। ফল স্বৰূপে বাঘজাতীয় প্ৰাণীবোৰে নিৰলে বাস কৰা বনভূমি অঞ্চলৰ সংকোচন ঘটিল। বাঘবোৰে চোং সলাই সলাই বিভিন্ন ঠাইত গোপনে বাস কৰাৰ পথ বিচাৰিলে। চিকাৰী সকলৰ হাতত বহুতো বাঘে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগীয়া হ'ল। ভাৱতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইত বাস কৰা চেকীয়াপতীয়া বাঘক বধ কৰিব বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল। অভিজ্ঞ চিকাৰ বিলাসী লোকসকলে গাইঙলীয়াভাৱে আৰু সমূহীয়াকৈ নিধন কাৰ্যত আত্মনিয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। হিংসাকৰীয়া মাংসাছাৰী জন্তু হোৱাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণে নিধন যন্ত্ৰত সাধ্যানুসাৰে যোগদান দিলে। অভিজ্ঞ চিকাৰী সকলে বাইজৰ পৰা উৎসাহ উদগনি পোৱাৰ উপৰিও কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পুৰস্কৃত হ'ল। দেশ বিদেশৰ পৰা অহা অভিজ্ঞ চিকাৰীৰ দলবিলাকক ছাবি বৰ্গনিৰ কাষত শিবিৰ পাতি লৈ নানাবিধৰ বিচিত্ৰ বন্যপ্ৰাণী বধ কৰিবলৈ চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। এই চিকাৰী দলবোৰৰ হাতত প্ৰতি বছৰে একাধিক বাঘে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগীয়া হৈছিল।

ধাৰাবাহিক ভাৱে নিধন কাৰ্য চলি থকা বাবে অন্যান্য গোষ্ঠীৰ বন্যপ্ৰাণীৰ দৰে দেশত বাঘৰ সংখ্যাও ক্ৰমে কমি আহিল। কোনো কোনো বন্যপ্ৰাণী অৰণ্যত এলেকা সম্পূৰ্ণভাৱে বন্যপ্ৰাণী শূণ্য হৈ পৰিল। বনাঞ্চল জনাঞ্চলত পৰিণত হ'ল। চৰকাৰে বাঘ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'লে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত ব্যাঘ্ৰ যোজনা কিছুমান দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠা কৰি এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ আৰু বংশ বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱতীৰ্য ব্যৱস্থা চৰকাৰে হাতত ললে। চেকীয়াপতীয়া বাঘ দুৰ্ভাগ্যবশত শ্ৰেণীৰ অন্যতম বন্যপ্ৰাণী বুলি পৰিগণিত হ'ল। বাঘৰ নিধন যন্ত্ৰ আইন বিৰোধী বুলি ঘোষিত হ'ল। ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ দেশত বাঘৰ সংখ্যা লাহে লাহে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে।

বৰ্তমান অৱস্থাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ ভবিষ্যত উজ্জ্বল হৈছে বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে কালক্ৰমত এই অৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন হোৱাতো স্বাভাৱিক। ঠায়ে ঠায়ে এইবিধ হিংসাকুৰীয়া বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা আশতীতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰিস্থিতিয়ে বিকট ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আগতে যে জন্তু সংখ্যাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব সেইটো ধুৰূপ। পাৰি-পাশ্বিক অৱস্থাৰ লগত খাপ খোৱাকৈ ঠাই অনুযায়ী ধাৰণ শক্তি নিৰূপণ কৰিব লাগিব। ধাৰণ ক্ষমতাক আওকাণ কৰি বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ দিলে এদিন গোঁজেই গজালি হৈ জংগনৰ মাজত সন্দ্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব।

ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে যোখা পাতি বাস কৰেনে কিম্বা পালেৰে জীৱন যাপন কৰে এই কথা স্পষ্ট ভাৱে জনা নাযায়। সময় অনুযায়ী বাঘ আৰু বাঘিনীৰ মাজত সদভাৱৰ সৃষ্টি হ'লেও সেই মিলন চিৰস্থায়ী হোৱা দেখা নাযায়। বাঘিনীয়ে এবাৰত তিনি-চাৰিটা পৰ্যন্ত পোৱালি জগায়। তাই অকলে পোৱালি কেইটাক প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লগীয়া হয়। আনকি বাঘটোৰ মুখৰ পৰাও তাই পোৱালি কেইটাক ৰক্ষা কৰিব লগীয়া হয়। সি যাতে পোৱালি কেইটাৰ কোনো হানিবিঘিনি ঘটাব নোৱাৰে তাৰ বাবে বেচেত্ৰীয়ে পোৱালি কেইটাক পলুৱাই পলুৱাই লৈ ফুৰিব লগীয়া হয়। বাঘৰ জীৱন কাল প্ৰায় ৩০ বছৰৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব বুলি জনা যায়।

বগা বাঘ

শ্ৰেণী—স্কল্যাপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী

গোত্ৰ—ফোৰ্ণলডি

প্ৰজাতি—পাহেৰা টাইগ্ৰিছ

ভাৰতবৰ্ষত বগাবাঘ নামৰ আন এবিধ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু বৰ্তমানে এইবিধ বিৰাচিত প্ৰাণী লুপ্তপ্ৰায় হৈছেগৈ। এইবিধ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিশেষত্ব হ'ল সাধাৰণ বৰণৰ বাঘৰ দৰে ইয়াৰ গাৰ নোমবিলাকৰ বৰণ হালধীয়া নহৈ বগা হোৱা দেখা যায়। অন্যান্য বাঘৰ দৰে ইয়াৰ গাতো ঢেকীয়া গছৰ পাতৰ দৰে দীঘল দীঘল আঁচ বা পট্ট থাকে আৰু এই পট্টবোৰে জন্তটোক আটক ুনীয়া কৰি সজাই নাখে। ইয়াৰ ঠেঙত পখালিকৈহে আঁচ থকা দেখা যায়। ইয়াৰ নখ আৰু দাঁতৰ গঠন প্ৰণালীত কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা নাযায়। সাধাৰণ বৰণৰ বাঘ আৰু এইবিধ বাঘৰ মাজত এই বিষয়ত কোনো প্ৰকাৰৰ পাৰ্থক্য নাথাকে। তাবোপৰি মুখ মণ্ডলত অঁকাৰিকা দাগৰ সাঁচ থকা দেখা যায়। ওপৰ উঠত মোটা ধৰণৰ গৌঁক হয়। জন্তটো সাধাৰণ বৰণৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ তুলনাত অলপ লাহি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিধ বাঘৰ বৰণ আৰু গঠন প্ৰাণালীয়ে জন্তটোৰ সৌন্দৰ্য দুগুণ বৃদ্ধি কৰে। সাধাৰণতে এইবিধ বগা বাঘ দুৰ্লভ হোৱাৰ বাবে ইহঁতক বিস্ময়ৰ অন্যান্যত্ৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰিব লাগিব।

∴ বগা বাঘৰ উৎপত্তিস্থান মধ্যপ্ৰদেশ বুলি ক'ব পাৰি। বৃটিছৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বহুতো সৰু-ডাঙৰ মিত্ৰৰাজ্য আছিল। ইংৰাজ অনুশাসনৰ ছত্ৰ-চাঁয়াত এই মিত্ৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ৰজা মহাৰজাসকলে নিজ নিজ ৰাজ্যৰ শাসন স্বত্ব পৰি-পাৰিচালনা কৰিছিল। চিকাৰ বিলাসী ৰজা-মহাৰজাসকলে নিজ নিজ ৰাজ্যত একে। একোভোখণ্ড অংগ্যভূমি চিকাৰ অভিযানৰ বাবে আছুতীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল। বছৰৰ এটা নিদিষ্ট সময়ত এওঁলোকে দলে বলে চিকাৰৰ বাবে এই দৰে সংৰক্ষণ কৰি কৰি ৰখা মুগয়াবন বিলাকত প্ৰবেশ কৰিছিল। হৰিণ, কুকুসাৰ আদি জন্ত ৰখ কৰি কৰি তেওঁলোকে মনোৰঞ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। মধ্য প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত বেতা নামৰ যিখন সৰু মিত্ৰৰাজ্য আছিল সেই মিত্ৰ ৰাজ্যৰ মহাৰজাৰ তেনে এখন মুগয়াবন আছিল। তাৰ মহাৰজাই নাহে সময়ে সেই মুগয়াবনখনলৈ দলে বলে চিকাৰ অভিযানত গৈছিল।

চিকাৰত বধ কৰা প্ৰাণীবিলাকৰ বাহিৰে মহানভাই দুই চাৰিটা আকৰ্ষণীয় প্ৰাণী জীয়াই ধৰি আনি ৰাজপ্ৰাসাদৰ চৌহদত আটোমটোকাৰিকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। এবাৰ তেওঁ গুণাৰনত কেইটামান বগা বৰণীয়া বাঘৰ পোৱালি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই বগা বাঘ কেইটা তেওঁ ৰাজ-প্ৰাসাদৰ এটা অংশ আৰু চৌহদৰ ভিতৰত ৰাখি ঘৰচীয়াকৈ প্ৰতিপালন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিলে। কালক্ৰমত এইদৰে ৰাজপ্ৰাসাদত বগা বগা বাঘ কেইটাই বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ সকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ল। দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিষ্ঠিত চিৰিয়াখানাবিলাকত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে স্থান পালে। ভাৰতবৰ্ষৰ বন্যপ্ৰাণী জগতটো এটা নতুন সংযোজনাৰ সূত্ৰপাত হ'ল।



বগাবাঘ

বিজ্ঞান সম্মতভাৱে বগা বাঘক বেলেগে প্ৰজাতিৰ জন্তু বুলি কোৱা নহয়। সাধাৰণ বৰণৰ টেকীয়াপতীয়া বাঘৰ পৰাই এইবিধ আপুৰুগীয়া প্ৰাণীৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি জনা যায়। মিয়মট কি নহওক এইবিধ প্ৰাণীৰ অভ্যুদয়ে জন্তু জগতত এক বিস্ময়ৰ সৃষ্টি

কৰিছে। কিয়নো সকলো ঠাইতে বাঘ কৰা ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘৰ পোৱালিৰ মাজত বগা বৰণীয়া বাঘৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। উল্লেখযোগ্য কথা যে প্ৰত্যেক বিধ বন্যপ্ৰাণীয়ে নোমৰ বা পাখিৰ নিদিষ্ট বৰণ আৰু গঠন প্ৰণালীৰ দ্বাৰাহে আত্মপ্ৰকাশ কৰে। জীৱ জগতৰো বৰণ আৰু গঠন প্ৰণালী আদিত জলবায়ু, সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা উচ্চতা ভৌগোলিক অৱস্থান আদিৰ প্ৰভাৱো আংশিকভাবে পৰিলক্ষিত হয়। এই প্ৰভাৱৰ বলত বিভিন্ন পৰিবেশত নিগাজীকৈ বাঘ কৰা একে প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ গাৰ বৰণৰ হীনভেদটি দেখা যায়। এনেবিলাক ভিন্নৰূপী একে প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীক উপ-প্ৰজাতিৰ আখ্যা দিয়া হয়। ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘৰ ক্ষেত্ৰতো এনে ধৰণৰ ভিন্নৰূপ দেখা লয়। গ্ৰীষ্ম প্ৰধান বা অৰ্প বৃষ্টি হোৱা এলেকাবিলাকত থকা কিছুমান বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত কেতিয়াবা দুই এটা বগা জন্তু বা চৰাই উদ্ভৱ হয়। এনেবিলাক জন্তুক “এল বিনো” বোনা হয়। কাউৰী, বান্দৰ, ভালুক আদিৰ মাজত “এলবিনো”ৰ উৎপত্তি হোৱা কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বক্তৰ লগত মিহলি হৈ থকা এলবিনিৰ নামৰ পদাৰ্থৰ প্ৰাধান্যই এই ধৰণৰ বিকল্প বৰণ সৃষ্টি কৰাত অবিহণা যোগায় বুলি কোৱা হয়।

ওপৰত বৰ্ণনা কৰি অহা প্ৰতিপাদাই বগা বাঘৰ শুভ বৰ্ণক আংশিক ভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিলেও জীৱ জগতত এইবিধ প্ৰাণীয়ে এক অভূতপূৰ্ব কিম্বদন্তী সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো বগা বাঘৰ উৎপত্তি বিচৰণভূমিৰ সকলো ঠাইতে বিয়পি থকা দেখা নাযায়। অন্যন্য তথ্যকথিত শুভবৰণীয়া প্ৰাণীৰ দৰে এই ঘটনাক আকস্মিক ব্যতিক্ৰম বুলি বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰি। শুনা যায় যে বগা বৰণীয়া বাঘ বা বাঘিনীৰ মাজত যি পোৱালিৰ উদ্ভৱ হয় সেই পোৱালিৰ আটাই কেইটাই বগা বা হালধীয়া ৰং ধাৰণ কৰি জন্ম লোৱা দেখা নাযায়। এইবিলাক বিষয়ত গবেষণা তথা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় কৰাৰ উপযোগী বহুতো তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে বুলি জনা লয়। সি যিয়েই কি নহওক ডাঙৰ ভাগত শুভবৰ্ণৰ বাঘ কেইটাই এক বিস্ময়ৰাজিত পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতভূমিত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ অভূতদৰ্শ্যে বন্যপ্ৰাণী জগতত দেশৰ মৰ্যাদা উন্নত পৰ্যায়ত সংস্থাপিত কৰিবলৈ যে সক্ষম হৈছে সেই কথা বিনা দ্বিধাৰে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব।

নাহৰ ফুটুকী বাঘ

শ্ৰেণী----সুন্ধ্যাপায়ী

বৰ্গ----মাংসাহাৰী

গোত্ৰ----ফেলিডি


প্ৰজাতি---পাহেৰা পাৰ্ছ

নাহৰফুটুকী বাঘ ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘৰ তুলনাত সৰু। ইহঁতৰ দেহত ঢেঁকীয়া পতীয়া বাঘৰ দৰে দীঘল পহীয়া আঁচ দেখা নাযায়। কিন্তু গাৰ নোমবোৰ বগুচুৱাকৈ হালধীয়া হয়। তলপেট আৰু কৰঙনৰ ভিতৰৰ অংশৰ নোমবোৰ বগা। গোটেই গাতে ক'লা ফুলামপহীয়া দাগৰ উৎপত্তি হয়। ৰাজহাড় ডালৰ ওপৰত আৰু এই ৰাজহাড় ডালৰ দুয়ো কাষে থকা ফুলামপহীয়া দাগৰ কিছুমান দীঘল চানেকীয়া আৰু আন কিছুমান চক্ৰাকাৰ বা বহুকোণীয়া হয়। কিছুমান দাগৰ মাজত জন্তোটোৰ গাৰ ৰঙৰ লগত মিলাকৈ হালধীয়া চকৰ দেখা যায়। মুখৰ আগত, ডিঙিত আৰু মূৰৰ ওপৰ ভাগত তলনুকপ ফুটুকী-ফুটুকী দাগ দেখা যায়। মুখৰ আগ ভাগ আৰু ডিঙিৰ দুয়ো কাষৰ চকৰবিলাক আকাৰত তুলনামূলক ভাৱে সৰু হয় আৰু এই চকৰ বিলাকৰ মাজত হালধীয়া ফুলৰ নিচিনাকৈ ৰূপ বহা নাগাকে। আকৃতি আৰু গঠন প্ৰণালীত দাঁত আৰু নখবোৰ সেকুৱী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ দৰেই হয়। দেহৰ বৰণৰ তাৰতম্য আৰু ফুলাম পাহিবোৰৰ আকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নাহৰ-ফুটুকী বাঘক কেবাটাও উপ-প্ৰজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলগীয়া হৈছে।

ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় সকলোবিলাক ঠাইতে কমবেছি পৰিমাণে নাহৰ-ফুটুকী বাঘ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাৰতৰ ভৌগোলিক চাবিসীমাৰ বাহিৰে ইয়াৰ বসতিস্থান পশ্চিমৰ ফালে পাকিস্তানলৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছে। পূবৰ ফালে বাংলাদেশ আৰু ব্ৰহ্মদেশতো এই বিধ প্ৰাণী দেখা যায়। তদুপৰি ভূটান আৰু নেপালৰ পৰ্বতীয়া পৰিবেশত আৰু দক্ষিণৰ ফালে শ্ৰীলঙ্কাত এইবিধ প্ৰাণীৰ অৱস্থান দেখা যায়। নাহৰফুটুকী বাঘক সাধাৰণতে গভীৰ অৰণ্যত দেখা নাযায়। পাতলীয়া হাবি বনৰি বিলাকত ইহঁতে পাবিবলৈ ভাল পায় আৰু এনে বৰণৰ পৰিবেশত পকা নানা বৰণৰ খাদ্য চিকাৰ ফলি খায়েই এইবিধ প্ৰাণীয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। চিকাৰৰ বাবে ঘাইকৈ নিৰ্দিষ্ট জাতীয় জন্তু বিচাৰি পোৱা বা গোপোৱাৰ ওপৰতে নাহৰ-ফুটুকী বাঘে নিৰ্ভৰ কৰি বাগীয়া হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যি কেইটা নাহৰ-

ফুটুকী বাঘে নিগাজীকৈ থকাৰ বাবে অনুকূল ঠাই বাচি লৈছে সিহঁতে চিকাৰৰ বাবে সেই ঠাইত থকা সুগন্ধী পহু, শহু, গাহৰি আদি বন্যপ্ৰাণীবোৰৰ ওপৰতে ভাৰসা কৰিব লগীয়া হয়। ঘনচীয়া জন্তুৰ ভিতৰত গৰু, ছাগলী, ভেড়া আদি প্ৰাণীকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। নিগোন, কেৰ্কেটুৱা আৰু বেকৌৰা গোষ্ঠীৰ নিম্ৰখাপৰ প্ৰাণীকো এইবিধ মাংসাহাৰী প্ৰাণীয়ে আহাৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।

ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণ আৰু পাশ্চিমৰ ৰাজ্য কেইখনে বিভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা নাহব-ফুটুকী বাঘ বিলাকে সেইবোৰ ঠাইত গঢ়াঢ়ন লাগ কৰা তৃণ-পল্লবভোজী বন্য প্ৰাণী আৰু ঘনচীয়া জীৱ-জন্তুৰ ওপৰতে ঘাইকৈ নিৰ্ভৰ কৰিব লগীয়া হয়। সেইবিলাক ঠাইৰ তৃণভোজী বন্যপ্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত চাৰিশিঙীয়া এণ্টেলোপ, কুম্ভাৰ, চিন্-কাৰা আদিয়েই প্ৰধান। গাওঁ-ভূইবিলাকৰ কাষৰ পাৰ্শ্বৰ হাবিবোৰত থকা নাহব-ফুটুকী বাঘে ভেড়া, ছাগলী আদি ঘনচীয়া জন্তুৰ ওপৰতো চকু দিযে। আনকি ঘোঁৰা, গোধ, পছৰ পভতি জন্তুকো সিহঁতে আক্ৰমণ কৰে। মানুহৰ নগতি অঞ্চলত পাকি জীৱন গঢ়িব কৰা প্ৰকৃতিৰ মাংসাহাৰী প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে বহুতো গদগদীয়া লৰাই ইহঁতৰ দ্বাৰা



আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ বিসৰ্জনা দিব লগীয়া হয়। হাবিত থকা লুবিবলৈ যোৱা মানুহেও কেতিয়াবা মৃত্যু বৰণ কৰিব লগীয়া হয়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হিমালয়ৰ নামনি ভাগত বাস কৰা হাবিতলীয়া বহুতো মানুহে নাহব-ফুটুকী বাঘৰ হাতত মৃত্যুক আকোৱালি লব লগীয়া হৈছিল। তাহানি দিনৰ বিখ্যাত চিকাৰী তথা বন্যপ্ৰাণীবিদ্ কৰ্মক্ষেত্ৰে বহুতো মানুহৰো নাহব-ফুটুকী বাঘ নিধন কৰি সেই হাবিতলীয়া ঠাইবোৰত বাস কৰা জনজাতীয় নাইগ্ৰব জীৱনটো শান্তিৰ নিজৰা বোৱাই আনিছিল। জীম্ কৰ্বেটৰ অমৰ লেখনীত

নাহৰ-কুটুকী বাঘৰ অত্যাচাৰৰ কাহিনীবোৰ পঢ়িলে এতিয়াও গাঁৱ নোমবোৰ শিয়ৰি উঠে।

জীম কৰবেটে বৰ্ণনা কৰা অসংখ্য লোমহৰ্ষক কাহিনী আছে। তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ এটা কাহিনী তলত উদ্ধৃত কৰি দিয়া হ'ল। ঘটনাটো ঘটিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুমাও অঞ্চলত থকা এডোখৰ পৰ্বতীয়া অৰণ্যভূমিত। হাবিৰ মাজে মাজে মানুহবিলাকে গ. ৩ পাতি বাস কৰিবলৈ লৈছিল। এবাৰ এখন গাঁৱৰ এজনী মাইকী মানুহে বাঁহ কাটিবৰ বাবে হাবিলৈ গৈছিল। বাঁহ কাটি থকা অৱস্থাতে তাইক এটা নাহৰ-কুটুকী বাঘে ধাপ মাৰি ধৰি মাৰি পেলালে। বাঘটোৱে মানুহজনীৰ মাংসখিনি কামুৰি কামুৰি খাই শেষ কৰি পেলালে। ভিত্তিত কামোৰ মাৰি ধৰি হাবিৰ যি যি ফালেদি বাঘটোৱে মানুহজনীক টানি লৈ গৈছিল সেই ছোৱা ঠাইত তাই পিছা কাপোৰ কানিখিনি ছিৰা-ছিৰ হৈ বাটে-বাটে পৰি গ'ল। কাপোৰ কানিৰ চিন পায়ো গাঁৱৰ মানুহে মানুহজনীক বিচাৰি হাবিৰ মাজত সোমাবলৈ সাহস নকৰিলে। সেই সময়তে জীম কৰবেটে ওচৰৰে আন এখন গাঁৱত বাঘ চিকাৰৰ বাবে শিবিৰ পাতি আছিলহি। গাঁৱৰ বাইজে এই মানুহজনৰ কাষ চাপিবলৈ স্থিৰ কৰিলে। যথা সময়ত সদলবলে তেওঁৰ কাষ চাপি গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সকলোবিলাক কথা ফুঁহিয়াই কলেগৈ। যি ঠাইত নাহৰ-কুটুকী বাঘটোৱে বাঁহ কাটি থকা মানুহজনীক আক্ৰমণ কৰিছিল কৰবেট চাহাবে সেই ডোখৰ ঠাইলৈ যাবলৈ স্থিৰ কৰিলে। সেই ডোখৰ ঠাইলৈ গৈ পোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই মানুহজনীক বাঘে টানি লৈ যোৱা পথ অনুসৰণ কৰি হাবিৰ মাজত সোমাল। গাঁৱৰ মানুহ দুজন মানে তেওঁক পথ দেখুৱাই লৈ গ'ল। মৰা তেজৰ টোপাবোৰ ঠায়ে ঠায়ে পৰি গোট মাৰি থকাৰ বাবে পথ অনুসৰণ কৰাত কৰবেটৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ল। কিছুদূৰ এইদৰে জোপোহা হাবি আৰু ওপৰে ওপৰে হাঁহ ভাতীয় উদ্ভিদৰ মাজে মাজে আগ বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ফটাছিটা কাপোৰৰ চিনচাব আবিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। অলপ সময়ৰ পাছতে তেওঁলোকে মৰা মানুহ জনীৰ লাওখোলাটো চুলি কোছাৰে লৈতে দেখা পালে। ততাতৈয়াকৈ চাহাবে ওচৰতে থকা এজোপা গছৰ ডালত এখন চাং সজাৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলালে। চাহাব চাঙৰ ওপৰত উঠিল আৰু ওচৰতে থকা অন্যান্য গছৰ ওপৰত লগত যোৱা গাঁৱৰ মানুহ কেইজনক বহুৱাই বপাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। শৰ সন্ধানত বাতি বাঘ আহি যথা স্থানত উপস্থিত হ'লহি। মানুহজনীৰ মাংসখিনি টানিবলৈ লওঁতে নোলওঁতেই চাহাবে দুজাই গুলি মাৰি দিলে। নাহৰ-কুটুকী বাঘটো ঠাইতে ঠেৰেঙা লাগি পৰি গ'ল। ঋন্তেক পাছতেই ধবফৰাই ধবফৰাই তাৰ প্ৰাণৰায় উৰি গ'ল। তেতিয়াৰ পৰাই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে চাহাবক ঈশ্বৰ যেন দেখা হ'ল। জীম কৰবেটৰ লেখনীত এনে ধৰণৰ বহুতো লোমহৰ্ষক কাহিনীয়ে স্থান পাইছে।

নাহৰ-কুটুকী বাঘিনীয়ে বহুৰৰ বেই কোনো সময়তে পোৱালি জগায়। তাই এবাৰত তিনি চাৰিটা পৰ্যন্ত পোৱালি দিয়ে বুলি জনা যায়।

ক'লা বাঘ

শ্ৰেণী---সুখ্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী


গোত্ৰ---ফেলিডি

প্ৰজাতি---পাছো পাৰ্ভছ্

অসমৰ বনাভূমি বিনাকৰ কোনো কোনো ঠাইত এবিধ ক'লা বৰণৰ বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই বিশেষ প্ৰাণীবিধ আকাৰত ইয়াৰ আগৰ প্ৰৱৰ্ত্ত বৰ্ণনা কৰি অহা নাহৰ-ফুটুকী বাঘৰ সমানেই হ'ব। এইবিধ প্ৰাণীৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ নোমবিলাকৰ বৰণ কাউৰীৰ দৰে ক'লা হয়। আমাৰ মানুহে ইয়াকে ক'লা বাঘ বা ষোং বোলে। বিজ্ঞান সন্মতভাৱে এইবিধ প্ৰাণীক নাহৰ-ফুটুকী বাঘৰে অন্য কপ বুলি কোৱা হয়। আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে নাহৰফুটুকী বাঘক পাব নোমৰ বৰণৰ ভাৰতীয় আৰু অন্যান্য শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ কাৰণত কেইবাটাও উপ-প্ৰজাতিত ভাগ কৰা হৈছে। সেই অনুপাতে ষোং বা ক'লা বাঘক এটা উপ-প্ৰজাতিৰ নাহৰফুটুকী বাঘ বুলিয়েই ধৰিব পাৰি। যিয়েই কি নহওক সাধাৰণ নাহৰফুটুকী বাঘৰ তুলনাত এইবিধ প্ৰাণীক অধিক খঙাল প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ গাত সাধাৰণ নাহৰ-ফুটুকী বাঘৰ দৰে ফুলায় পাহি নাথাকে। গোটেইটো প্ৰাণী কিচ্ কিচ্ কৰে ক'লা হোৱাৰ বাবে ই ওচৰতে থাকিলেও সহজে চকুত ধৰা নপৰে। অলপ নিলগৰ পৰা চকুহাল টল্ টল্ কৈ অলি থকা দেখিবলৈ পালেহে গন পোৱা যায় যে সেই ফালেদি কিবা এটা প্ৰাণী পাৰ হৈ গৈছে। এইবিধ প্ৰাণীৰ দাঁত-নখ আদিও অন্যান্য মেকুৰী বা বাঘ জাতীয় প্ৰাণীৰ দৰেই হয়।

চিৰিয়াখানাবিলাকত সংৰক্ষণ আৰু প্ৰতিপালন কৰি থকা সাধাৰণ নাহৰফুটুকী বাঘ আৰু ষোং বা ক'লা বাঘৰ আচৰণৰ পৰা প্ৰমাণ পোৱা যায় যে ক'লা বাঘ আৰু নাহৰফুটুকী বাঘৰ মিলনত উদ্ভৱ হোৱা গতি সম্ভৱতঃ মাথত দুয়ো বৰ্ণৰ প্ৰাণীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয়। গতিকে বংশ প্ৰসৰণাগত ভাৱে ক'লা জাতীয় বাঘৰ উৎপত্তিক স্বতঃসিদ্ধ বুলি ধৰিব গোৱাৰি। বগা বাঘৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে ইতিপূৰ্বে এটা কথা উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে বন্যপ্ৰাণীৰ তেজত এলবিনি' নামৰ এবিধ পদাৰ্থৰ উৎপত্তি হয়। এই পদাৰ্থই প্ৰাণীৰ লাভ কৰা পোৱালি সম্পূৰ্ণভাৱে বগা হয়। খ্ৰীষ্ট-প্ৰধান দেশৰ অলপ বৃষ্টিয়ে গৰক ঠাইত বাস কৰা অলপ বিশেষৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এনে ধৰণৰ বিস্ময়

দেখা যায়। জীৱ-জন্তুৰ তেজত মিহলি হৈ থকা আন এবিধ মুখ্য পদাৰ্থৰ নাম হ'ল "মেলানিন"। মেলানিন-প্ৰধান বস্তুই ক'লা বৰণৰ জন্তুৰ উৎপত্তি কৰাত অৰিহণা যোগায়। ষোং বা ক'লা বাঘ নামৰ যিবিধ প্ৰাণী অকস্মাতে জন্ম হয় সেই বিধ প্ৰাণীৰ দেহত "মেলানিন" নামৰ পদাৰ্থই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। গ্ৰীষ্ম মণ্ডলৰ বৃষ্টিপ্ৰধান জলবায়ুতে



ষোং বা ক'লা-বাঘ

অধিক পৰিমাণৰ "মেলানিন" উৎপাদন কৰাত জন্তু বিশেষকৈ সহায় কৰে বুলি কোৱা হয়। বিয়েই কি নহওক এই সম্পৰ্কত দোহাৰিব পাৰি যে ষোং বা ক'লা বাঘক এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ জন্তু বুলি ধৰিব নোৱাৰি। মুঠতে ক'লা বাঘ বা ষোং, নাহদ-মুটুৰী বাগদে অন্যতম ৰূপ।



প্রজাতি---নিঅ'ফেলিছ নেবোল'ছা

নেপাল আৰু ভূটানৰ অন্তৰ্গত পৰ্বতীয়া অঞ্চলত অসংখ্য আৰু ক'ৰ অকণাচল
 প্ৰদেশলৈকে গোখা-ফুটুকী বাঘৰ বসতি আছে। ইয়াৰে কিছুমাত্ৰ নাভ কৰি
 আছে। নাগালেণ্ড, মেঘালয় প্ৰভৃতি পাহাৰীয়া অঞ্চলত ইয়াৰ অসংখ্য প্ৰাণীয়ে
 থিতাপি লৈছে। পাহাৰৰ সন্নিৱিষ্ট অঞ্চলত অসংখ্য পাহাৰীয়া অঞ্চলত ইয়াৰ অসংখ্য
 প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰে কিছুমাত্ৰ নাভ কৰি আছে। অতিকম
 কৰি গোখা-ফুটুকী বাঘৰ বসতি স্থান আৱৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰে কিছুমাত্ৰ নাভ কৰি
 আছে। এই দেশবিলাকৰ ভিতৰত বাংলাদেশ, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়দ্বীপ, ইণ্ডোনেছিয়া আদি দেশৰ নাথ
 বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি।



ମାୟା-ମୂର୍ତ୍ତିର ମାଡ଼

হাবিৰ মাজৰ গছ-গছনিত উঠি এইবিধ প্ৰাণীয়ে দিনটো কটায়। কেতিয়াবা, গো-গছৰ খোন্দ আদিতো আলেঙে আলেঙে কেতিয়াবা সোমাই থাকে। সেই বাবে ইহঁতক নুৰ-বালী প্ৰাণী বুলিও ক'ব পাৰি। গছৰ ওপৰত বগাই ফুৰা মানাবিধ সকলোৱা প্ৰাণী ইহঁতে ধৰি ধৰি খায়। বাতিহে এইবিধ প্ৰাণীয়ে চিকাৰৰ সন্ধানত ওলায়। কেতিয়াবা ইহঁতে মাটিতৈ নামি আহি মাটিত বগাই ফুৰা মানাবিধ প্ৰাণী ধৰি ধৰি খায়। হিমালয়ৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ বনভূমিৰ কাষত থকা কিছুমান গাঁৱত প্ৰবেশ কৰি এইবিধ প্ৰাণীয়ে বনচীয়া জীৱ-জন্তুৰো হানি বিধিনি ফটায়।

এইবিধ মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে গছৰ খোন্দৰ ভিতৰত পোৱালি জন্মায়। এবাৰত সাধাৰণতে দুটাকৈ পোৱালি দিয়া দেখা যায়।



চিতা-বাঘ

শ্ৰেণী----স্তুন্যপায়ী

বৰ্গ----মাংসাহাৰী

গোত্ৰ----ফেলিডি

প্ৰজাতি----এচিনোনিষ্টা জুবোচচ্

চিতাবাঘ নামৰ এবিধ মেকুৰী তথা বাঘ গোষ্ঠীৰ বিচিত্ৰ প্ৰাণী এসময়ত ভাৰত-বৰ্ষৰ কোনো কোনো ঠাইত দেখা গৈছিল। বৰ্তমান এইবিধ প্ৰাণী ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ পৰা সমুদৰে লোপ পালে। পূৰ্বতে এইবিধ প্ৰাণী মধ্য ভাৰত আৰু দক্ষিণাত্যৰ বিভিন্ন পৰিবেশত থকাৰ কথা জনা যায়। কালক্ৰমত ইয়াৰ সংখ্যা ভাৰতবৰ্ষত লাহে লাহে কমি আহিল আৰু বৰ্তমান যুগত ইয়াৰ চিন্-মোকাম্ একেবাৰেই নাইকিয়া হ'লগৈ। অতীততে ভাৰতত এইবিধ প্ৰাণীক চিকাৰৰ সানখি হিচাপে কিছুমান মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই কাম সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে চকুত এখন ফটাকানি বান্ধি জন্তটোক হাবিলৈ লৈ যোৱা হয়। হাবিৰ অলপ নিৰ্ভৰতা চিকাৰৰ উপযোগী কিবা জন্তু চকুত পৰিলে জন্তটোৰ চকুত বন্ধা কাপোৰখন খুলি মেলি দিয়া হয়। প্ৰবল বেগত খেদি খেদি সি বনৰীয়া জন্তটোক অতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰ ভ্ৰতগতিত জন্তটোৱে তন্ত্ৰিৰ নোৱাৰা হৈ পৰে। চিতাবাঘটোৱে তেতিয়া জন্তটোৰ ভিত্তিত কামোৰ মাৰি ধৰি আনি গৰাকীৰ ওচৰত পেলাই দিয়েহি। এটা জন্তু এইদৰে ধৰা হৈ গ'লে দ্বিতীয়টো জন্তু ধৰি আনিবৰ বাবে চিতাবাঘক পুনৰ মেলি দিয়া হয়। এই পদ্ধতিৰে কেইবাটাও জন্তু চিকাৰত ধৰি মানিকে ঘৰ পোৱায়হি। চিতাবাঘৰ বংশ উচ্ছেদ হোৱাত আজি কালি এই ব্যৱসায় লোপ পালে।

বৰ্তমান যুগত চিতাবাঘ জাতীয় প্ৰাণী কেৱল আফ্ৰিকা মহাদেশতহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। কক্কাৰ বাহিৰে অন্যান্য প্ৰায় সকলোবিলাক ঠাইতে এইবিধ প্ৰাণী কম-বেছি পৰিমাণে দেখা যায়। প্ৰাচীন কালত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ আৰু এচিয়া মহাদেশৰ অন্যান্য ঠাই কিছুমান আফ্ৰিকা মহাদেশখনৰ সৈতে লগ লাগি আছিল সেই সময়তে আফ্ৰিকাৰ সিংহৰ দৰে চিতাবাঘ জাতীয় প্ৰাণী কিছুমানে এচিয়া মহাদেশ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমাঞ্চললৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। কালক্ৰমত এচিয়া মহাদেশত থকা এইবিধৰ প্ৰাণী-বোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ল। শেষান্তৰত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী ভাৰতভূমি তথা এচিয়া মহাদেশৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে লোপ পালে।

আকাৰত চিতাৰাঘক নাহৰ-কুটুকী বাঘৰ নিচিনাই লাগে। নাহৰ-কুটুকী বাঘৰ দৰেই ইয়াৰ গোটেই শৰীৰত ফুলাম-পহীয়া দাগ হয়। আনহাতে চিতাৰাঘৰ গাটো তুলনামূলকভাৱে দীঘল আৰু চিয়া হয়। ইয়াৰ মূৰটো গোল আৰু ঠেং কেইখন দীঘল। এইবিধ মেকুবী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ মূৰটোৰ আকৃতি দেখাত গুৱনি। নাকৰ ওপৰভাগৰ পৰা তালুটালৈকে থকা মূৰৰ অংশটোক দেহৰ একাধৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে উৰুৰি খোৱাই বখা কাঁহ-পিডলৰ বাটি এটা যেন লাগে। দীঘল দীঘল ঠেং চাৰিখনৰে সৈতে গোটেই জন্তুটো দেখাত বজ্জা হয়। মূৰটোক মন্দিৰৰ কলটি বা মছজিদৰ গম্বুজৰ নিচিনা দেখি।



চিতাৰাঘ

চিতাৰাঘৰ শাৰীৰিক বোধ্য হ'ল এইবিধ প্ৰাণীৰ হাতোৰাৰ আঙুলিৰ নখৰোৰ কুবল অৰ্থাৎ প্ৰাণীৰ আঙুলিৰ নখৰ নিচিনা হয়। মেকুবী গোষ্ঠীৰ অন্য জন্তুৰ দৰে এইবিধ জন্তুৰে ইচ্ছানুযায়ী নখৰোৰ জপাৰ মেলিব নোৱাৰে। সেই কাৰণে চিকাৰ প্ৰাণীক ধামোচ মাৰি ধৰিবৰ বাবে জন্তুটোৱে হাতোৰাখনৰে সৈতে আঙুলিৰ নখ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। এই ঠেং কেইখন কুকুৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ ঠেঙৰ গৰ্ভ বগত মিনি গোৰাৰ দৰে জন্তুখনেৰে অতিদেগত দৌৰিব পাৰে। জনা যায় যে ক্ৰান্ত বোৰেৰে দৌৱাৰ বিষয়ত আমেৰিকাৰ গ্ৰে-হাউণ্ড নামৰ কুকুৰেও এইবিধ প্ৰাণীক চেৰ পেলাব নোৱাৰে। তেওঁৰ পতা কেইখন অলপ বহল হোৱা বাবে এই পতাৰ সহায়ত জন্তুটোৱে অতি প্ৰবল বেগেৰে দৌৰিবলৈ সক্ষম হয়। দৌৱাৰ সময়ত দীঘল নেজডালৰ কথাও উল্লেখ কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ জন্তুটোৱে দৌৰি থকাৰ সময়ত এই নেজডালে দেখা ভাবসামান্যতা বক্ষা কৰাত সহায় কৰে।

চিকাৰ পদ্ধতিতো এইবিধ প্ৰাণীৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মেকুবী তথা

বাঘ গোটীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ লৰে এইবিধ বাঘ গোটীৰ প্ৰাণীয়ে জোপ লৈ চিকাৰৰ জন্তুৰ ওপৰত অকস্মাতে অশিৰাই নপৰে। বহুত নিলগৰ পৰাই ই নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লয়। জন্তুটোৰ অলপ ওচৰ চাপিবৰ বাবে পেট চোঁচবাই চোঁচবাই আগ বাঢ়ি বোৱাব শিক্ত ই অলপ থিয় হৈ লক্ষ্য পুনৰ স্থিৰ কৰি লয়। তাৰ পাছত দেখা দিবাকৈ জন্তুটোক খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰে। পলাই সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা জন্তুটোক খেদি খেদি ই লেৰাজান কৰি দিয়ে। ধৰা পৰা জন্তুটোৰ ডিঙিত ই চোকা দাঁতেৰে কামোৰ মাৰি ধৰি ডিঙিৰ মেলু ছিঁড়ি পেলায়। পোন প্ৰথমতে ডিঙিৰ পৰা ওলাই অহা তেজাখিনি জন্তুটোৱে হেপাহ পলোৱাই চুহি চুহি খায়। পাছত অৱশৰ সময়ত মাংসৰ জুতি লোৱা কামত লাগি যায়।



হিমবাহ

এণী---স্তুন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---ফেলিডি

প্ৰজাতি---পাছেৰা আন চিয়া

হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওখ ঠাইবিলাকত হিমবাহ নামৰ এৰিষ মেকুৰী তথা বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰে। দেখাত এইবিধ প্ৰাণী নাহব-ফুটুকী বাঘৰ নিচিনা। ইয়াৰ দেহৰ নোমবোৰ নাহব-ফুটুকী বাঘৰ নোমৰ দৰে বগুচুৱাকৈ ছালৰীয়া নহয়। এই নোমৰ বং মাখন বৰণীয়া আৰু পেটৰ তলৰ নোমবোৰ বগা হোৱা দেখা যায়। নোমবোৰৰ ওপৰত নাহব-ফুটুকী বাঘৰ দেহেই ভসকা-কলীয়া দাগ হয়। দাগবিলাকৰ কপা ভিন্ ভিন্ ধৰণৰ। আকৃতিত কিছুমান দীঘলীয়া, কিছুমান ঠাঁহ কলীৰ নিচিনা আৰু আন কিছুমান বহুকোণীয়া হোৱা দেখা যায়। কিছুমান হিমবাহ বৰণত সম্পূৰ্ণভাৱে ক'লা হয়। আন কিছুমানৰ দাগৰ মাজ ভাগত কলৰ কলিৰ নিচিনা দাগ থাকে। মেজডালতো আঙঠিৰ দৰে ক'লা দাগ দেখা যায়। দাঁত আৰু নখৰ গঠন মেকুৰী তথা বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ দৰেই।

বৰক বেখাৰ নিচেই ওচৰৰ ঠাইত সচৰাচৰ বাস কৰা প্ৰকৃতিৰ হিমবাহ জাতীয় প্ৰাণীক সহজে দেখা নাযায়। পৰ্বতৰ ওপৰৰ দুৰ্গম ঠাইবিলাকলৈ সাধাৰণতে ভৈয়ামৰ মানুহ অহা যোৱা নকৰে। আগতে কিছুমান চিকাৰ-বিনাসী লোকে হিমবাহ আৰু অন্যান্য আপুৰ গীয়া জন্তুৰ চিকাৰ অভিযানত গৈ গৈ এই দুৰ্গম ঠাইবিলাক পাইছিল গৈ। ভাৰতৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন অনুযায়ী হিমবাহ নিষিদ্ধ প্ৰাণী বুলি ঘোষিত হোৱাত এই ব্যৱসায়ৰ এতিয়া মূঢ়া বৰিছে। সেইবিলাক পৰ্বতীয়া ঠাইত চিৰস্থায়ীভাৱে বাস কৰা কিছুমান জনজাতীয় লোকে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক আগতে বৰ কৰিছিল। মানুহ বিলাকৰ পোহনীয়া জন্তুবিলাকৰ ওপৰত হিমবাহ জাতীয় প্ৰাণীয়ে মাজে মাজে অত্যাচাৰ কৰে। বৰলীয়া তুণভোজী জন্তুবিলাক হিমবাহে কোপলৈ-লৈ ধৰে আৰু তেনে জন্তুৰ মাল খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। গৰমৰ দিনত হিমালয় পৰ্বত মালাৰ অলপ নিম্ন ভাগত অৱস্থিত ঠাইৰ বৰকষোৰ গলি যায়। বৰক গলি গলি নাইকিয়া হোৱা মাটি বোৰত কোৱল হাঁহবিলাক গজিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বৰচীয়া ছাগলী, জেড়া আদি প্ৰাণী-

বোৰে সেইবোৰ ঘাঁহনি পথাৰত চৰিবলৈ ওলাই যায়। হিমৰাঘবোৰে চল বুজি এই
ঘৰচীয়া জন্তুবোৰৰ দুই এটাক খাপ মাৰি ধৰি থায়।



হিমন্ত

হিমালয় পৰ্বত শালাৰ বাহিৰেও হিমৰাঘৰ বলতি স্থান আৰু বিচৰণ ভূমি
এচিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ বহুতো ঠাইলৈ সংপ্ৰসাৰিত হৈ আছে। হিমালয়
পৰ্বতমালাৰ পশ্চিমত অৱস্থিত কাশ্মীৰ আৰু নাডাকৰ শৈল-বাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি

পূৰ্বাঞ্চলত থকা ভূটান পৰ্যন্ত এই পাৰ্বত্য এলেকাত হিমবাহ জাতীয় প্ৰাণীয়ে ঠায়ে ঠায়ে উপযুক্ত পৰিৱেশ বাচি লোৱা দেখা গৈছে।

উত্তৰ গোলাৰ্দ্ধত ছোভিয়েত ৰাছিয়াৰ অন্তৰ্গত কিছুমান ঠাইত হিমবাহৰ বাবে উপযোগী পৰিৱেশ আছে। কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত ৰাছিয়াত বাস কৰা হিমবাহবিলাকৰ সংখ্যা বৰ্তমানে বহুতো কমি আহিল। দেখাত অতিশয় মোহনীয় হোৱাৰ বাবে এইবিধ বন্যপ্ৰাণীৰ ছালখনৰ চাহিদা অত্যন্ত বেছি। তদুপৰি চিকাৰপ্ৰিয় মানুহ কিছুমানে এইবিধ প্ৰাণীক গুলিবিদ্ধ কৰিবৰ কৰাটো এসময়ত সাধাৰণ কথাহে আছিল। তেওঁলোকে মৃত্যুৰ মুখলৈ তৈলি দিয়া হিমবাহৰ ধুনীয়া ছালখনৰ উপৰিও গোটেই মূৰ ভাগ কাটি নি বিশেষজ্ঞৰ সহায়ত সেই মূৰ ওপৰৰ ছালখন বৰলিয়াই তাত বসায়নিক পদাৰ্থ ৰাঁহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। কাঠৰ ক্ৰেমত এই মূৰ ভাগ জীৱন্ত প্ৰাণীৰ মূৰৰ দৰে ধুনীয়াটক সজাই ড্ৰয়িং ৰুমৰ শোভাবৰ্দ্ধন কৰিছিলগৈ। এনে বিলাক আপুৰুগীয়া তথা আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী অতিবিক্ৰম দামত বিক্ৰি কৰি লাভবান হোৱাৰ পথ মুকলি কৰিছিল। কালক্ৰমত আন্তৰ্জাতিক ভিত্তিত এইবিধ প্ৰাণী দুৰ্লভ প্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত ছোভিয়েত চৰকাৰেও ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হাতত ললে। ফলস্বৰূপে এইবিধ প্ৰাণীৰ জন্তু সংখ্যা (Population) সেইখন দেশত ক্ৰমে বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চীন দেশৰ পৰ্বত্য অঞ্চলতো হিমবাহ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইউৰোপ মহাদেশৰ অন্তৰ্গত উন্নত দেশবিলাকৰ চিৰিয়াখানাবিলাকত প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিবৰ বাবে আগতে ছোভিয়েত ৰাছিয়াৰ পৰা এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ আমদানি হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত অৱশ্যে সেই ব্যৱসায়ৰ ওৰ পৰিছে।

“ৰেড দাটা বুকত” উল্লেখ কৰা হৈছে যে মঙ্গোলীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা হিমবাহৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা ৩০০ মান হ'ব। চীন দেশত কিমান পৰিমাণৰ হিমবাহ বাস কৰি আছে সেই বিষয়ে ভালদৰে জনা নাযায়। চিয়াং-কিয়াং পৰ্বতমালাৰ আশে-পাশে টিয়েন চান, পামীৰ মালভূমি আৰু আচ্‌টিন্‌ টাগ নামৰ যিবিলাক পৰ্বতীয়া ঠাই আছে সেইবিলাক ঠাইত কিছু সংখ্যক হিমবাহ আছে বুলি প্ৰমাণ পোৱা যায়। তদুপৰি তিব্বত মালভূমিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিন্‌দাই আৰু কান্‌চু প্ৰদেশ পৰ্যন্ত যি পাৰ্বত্য ভূ-ভাগ আছে সেই ভূ-ভাগতো হিমবাহ কিছুমান নিগোজাতকৈ বাস কৰি আছে। এইবোৰ ঠাইৰ পৰা পৃথিৱীৰ উন্নত দেশসমূহত প্ৰতিষ্ঠিত চিৰিয়াখানা বিলাকলৈ কিছু সংখ্যক হিমবাহ আগতে বণ্টান কৰা হৈছিল। বৰ্তমান অৱস্থাত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে চীন দেশৰ চৰকাৰে সমৰোচিত ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ বাবে ইয়াৰ বণ্টান বন্ধ হৈছে।

নেপালৰ অন্তৰ্গত হিমালয়ৰ পৰ্বতীয়া পৰিৱেশত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ হিমবাহ জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰিছে বুলি জনা যায়। ১৯৭৭-৭৮ চনত মিঃ ৰুদ্ৰি জেকচন নামৰ এজন উদ্যোগী প্ৰাণীবিদে এইবিধ প্ৰাণীৰ স্থিতিৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে নেপাললৈ আহিছিল। তেখেতে একে লেঠাৰিয়ে এবছৰ এই দেশৰ বিভিন্ন ঠাই পৰিদৰ্শন কৰি হিমবাহৰ গণনা কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিল আৰু নানা আঁঠে-আঁঠুকালৰ মাধ্যমে পৰিস্থিতি

অধ্যয়ন কৰিছিল। তেওঁ সংগ্ৰহ কৰা তথ্যপাতি বিলাকৰ পৰা জনা যায় যে নেপালত প্ৰায় ৩০০শ মান হিমবায় জীয়াই আছে। পাকিস্তানতো কিছু পৰিমাণৰ হিমবায় আছে। এই দেশৰ অন্তৰ্গত চিত্ৰাল, গিলগিট, বাল্টিস্তান আদি পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাকৰ উপৰিও আজাদ কাশ্মীৰত হিমবায়ৰ অৱস্থিতি পৰিলক্ষিত হৈছে। স্কেলার নামৰ এজন বিশেষজ্ঞই উল্লেখ কৰা মতে পাকিস্তানত বাস কৰি থকা হিমবায়ৰ সৰ্বমুঠ সংখ্যা এশতকৈ বেছি নহ'ব। অৱশ্যে “বেড দাতা বুকৰ” তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তানত ২৫০টা মান হিমবায় আছে।

হিমবায়ক নিশাচৰ প্ৰাণী বোলা হয়। দিননুপৰত ইহঁতে পাখৰৰ ফাকত অথবা তেনে ধৰণৰ স্তূ-পৰিবেশত নুৰা পাতি পাতি সোমাই থাকে। গৰুলি আন্ধাৰ হোৱাৰ উমান পালেই ইহঁতে লাহেকৈ থকা ঠাইবোৰৰ পৰা ওলাই আহে আৰু গোটেই নিশা আহাৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিনৰ ভাগতো হিমবায়ক ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ উচ্চ শিখৰত প্ৰতিস্থিত নন্দা-দেবী নামৰ অভয়াৰণ্যত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক দেখিবলৈ আশা কৰিব পাৰি।

ওপৰত উল্লেখ কৰা তথ্যপাতি বিলাকৰ পৰা দেখা যায় যে সমস্ত পৃথিৱীত হিম-বায়ৰ পৰিস্থিতি সিমান বেয়া নহয়। এইবিধ সৰ্বাঙ্গসুলভ প্ৰাণীক বচাই ৰখাটো সংগ্ৰহীত দেশ তথা-গোটেই বিশ্ববাসীৰ বাবে উন্মেষতীয়া কৰ্তব্য হৈ পৰিছে।

বছৰৰ যেই কোনো সময়তে হিমবাঘে পোৱালি জগায়। প্ৰতিবাৰতে দুটাৰ পৰা চাৰিটা পৰ্যন্ত পোৱালি জগে।



বন-মেকুৰী বা হেপা

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী

গোত্ৰ—ফেলিডি


প্ৰজাতি—ফেলিচ চাৰছ্

বন-মেকুৰী বা হেপা নামৰ বনৰীয়া প্ৰাণীবিধক অসমৰ গাঁৱে-ভুঞা, নগৰে-চহৰে প্ৰায় সকলো বিলাক ঠাইতে কমবেছি পৰিমাণে দেখা যায়। গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত বাস কৰাতকৈ এইবিধ বনৰীয়া মেকুৰীয়ে পাতলীয়া হাবি বননিবোৰত থাকিবলৈহে ভাল পায়। এনেবোৰ ঠাইত ইহঁতে নানা বিধৰ সৰু আকাৰৰ বনৰীয়া জন্তু ধৰি ধৰি খায়। এইদৰে চিকাৰত ধৰি খোৱা প্ৰাণী বিলাকৰ ভিতৰত নিগনি, এলুৰ, চৰাই আদি নানা বিধৰ ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ প্ৰাণীও পৰে। পাতলীয়া হাবি বননিত থাকিবলৈ লোৱা মেকুৰী বা হেপাই মানুহৰ পোহনীয়া হাঁহ কুকুৰালৈকে খেদা লয়। নিশাচৰ প্ৰাণী হলেও এইবিধ মেকুৰীক দিনৰ সময়তো ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়। দোকমোকালি আৰু গধূলিৰ মূনিচুনি বেলিকা ইহঁতে দিনত আশ্ৰয় লৈ থকা ঠাইবোৰৰ পৰা নাহকৈ ওলাই আহে আৰু চিকাৰ বিচাৰি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে। সুবিধা পালে গড়ালৰ ভিতৰৰ পৰা হাঁহ কুকুৰা ধৰি নিয়ে। কেতিয়াহো কেতিয়াবা ঘৰৰ ওপৰৰ চিলিঙৰ পৰা ই পাৰ চৰাইৰ পোতাৰলিও ধৰি লৈ যায়। বতৰ ডাৱৰীয়া হ'লে দিন দুপৰতে থকা ঠাইৰ পৰা ওলাই আহি ই পথাৰত চৰি ফুৰা হাঁহ-কুকুৰা ধৰি নিয়ে।

আকাৰত বনমেকুৰী ঘৰচীয়া মেকুৰীতকৈ ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ ঠেং কেইখন দীঘল আৰু সেই অনুপাতে নেজডাল তুলনামূলক ভাৱে চুটি হোৱা দেখা যায়। গাৰ নোমবোৰৰ বৰণ হালধীয়া চানেকীয়াটক মূগা হোৱা দেখা যায়। নোমৰ ওপৰত কোনো বিচিত্ৰ-ৰূপ দেখা নাযায়। নেজৰ আগত পখালি পখালিকৈ আঙঠিৰ দৰে ক'লা বনৰীয়া দাগ থাকে। নেজৰ আগ ভাগতো ক'লা নোম দেখা যায়। কাণৰ নোমবোৰ বগুচুৱা হয় আৰু কাণৰ আগ ভাগত কেইডালমান ক'লা বৰণৰ দীঘল নোম থকা দেখা যায়।

বঙালী ভাষাত এইবিধ প্ৰাণীক 'বন বিলাই' বোলা হয়। আমাৰ মানুহৰ কোনো কোনোৱে ইয়াক বনবোম্বাৰ আখ্যা দিয়ে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘৰচীয়া মেকুৰীৰ দুই এটা মডাই ঘৰৰ পৰা পলাই গৈ হাবিত থাকিবলৈ লয়গৈ। বহুত দিন হাবিত

খাৰ্জি ই নিজেই বনৰীয়া হৈ পৰে আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা একেবাৰে পাহৰি যায়। গধূলি পৰত বা দোক-মোকালিৰ সময়ত এই বিধ প্ৰাণীয়ে “আয়াও আয়াএ” কৈ



বন-চোৰাণী
বা
ছপা

চিঞৰি কুৰে। এই শব্দ ইমান হয় যে অকণপৰীয়া ভাৱে হাবি তলীয়া বাগতাই দি গৈ থাকোতে এই শব্দ কাণত পৰিলে প্ৰাৰ নোমবোৰ ডাল ডাল হয়। আশাৰ গাওঁ

বিলাকৰ কিছুমান মানুহৰ এটা ধাৰণা যে এইবিধ বন মেকুৰীৰ মাতত সুখ-দুখৰ বতৰা পোৱা যায়। সাধাৰণতে এইবিধ বন্যপ্ৰাণীয়ে “আয়াও আয়াও” শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ পাছতে অলপ দম লয় আৰু তাৰ আগ পাছতে এটা দীঘল সুবৰ মাত মাতে। এই মাতত “সুখ” বা “দুখ” শব্দ আদোপ কৰিব পৰা ধাৰণা প্ৰতিফলিত হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

বন মেকুৰীয়ে বছৰত দুবাৰকৈ পোৱালি জগায় বুলি জনা যায়। একে বাৰতে দুটা বা তিনিটা পৰ্যন্ত পোৱালি দিয়ে।



লতা-মাকৰি

শ্ৰেণী—তৃত্যপায়ী

বৰ্গ—মাঃসাহাৰী

গোত্ৰ—ফেলিডি

প্ৰজাতি—ফেলিচ্ বেঙ্গলেঞ্চিছ্

লতা মাকৰি নামৰ এইবিধ বেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা দেখা যায়। অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰায় আটাই কেইখন ৰাজ্যতে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান বিয়পি আছে। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুমাৰিকা অক্ষৰীপলৈকে সকলোবিলাক ৰাজ্যতে কমবেছি পৰিমাণে এইবিধ জন্তু বাস কৰা দেখা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি লতা-মাকৰিৰ বসতি স্থান দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ কেবাখনো দেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে বুলি জনা যায়। গোটেই গাতে নাহৰ-কুটুকী বাঘবদৰে কুটুকা-কুটুকী দাগ থকাৰ বাবে ইংৰাজী ভাষাত ইয়াক লিওপাৰ্ড কেট বোলা হয়। সেই অনুপাতে অসমীয়াত ইয়াক নাহৰ-কুটুকী বেকুৰী বুলি ক'ব পৰা গ'লহেঁতেন। ইতিমধ্যে লতা-মাকৰি নামেৰেই এইবিধ প্ৰাণী জনাজাত হোৱাৰ বাবে এইনামটোকে এইবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল।

লতা-মাকৰি আকাৰত বৰচীয়া বেকুৰীৰ সমানেই হ'ব। অৱশ্যে ইয়াৰ ঠোঁ কেইখন তুলনামূলক ভাবে দীঘল হোৱা দেখা যায়। গান নোমবিলাকৰ বৰণ অলপ বঙচুৱাকৈ হালধীয়া হয়। গোটেই গাতে ক'লা বৰণৰ কুটুকা-কুটুকী দাগ থাকে। দাগবোৰ কিছুমান দীঘলীয়া, কিছুমান চুটি আৰু আন কিছুমান ঘূৰণীয়া আৰু চুকীয়া-চুকি। দীঘলীয়া বা চকলা-পহীয়া দাগবোৰ দেহৰ দুয়ো কাষে পঞ্চালিতকৈ বা অলপ কোণীয়াতকৈ শাৰী শাৰী হৈ থকা দেখা যায়। এই শাৰীবোৰত অৱশ্যে বিশেষ ধাৰাবাহিকতা নাই। শাৰীবোৰ ঠায়ে ঠায়ে বিচ্ছিন্ন হৈ বেকা-বেঁকি ভাৱে নতুন শাৰীত পৰিণত হয়। দীঘল নেজডাল কুটুকা-কুটুকী হয় আৰু নেজৰ আগৰ দাগবোৰ আধা আঙঠিৰ নিচিনা। কপালৰ ওপৰত নাকৰ দুয়ো কাষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰলৈ বৈ পৰাটকৈ চাৰি চটামান ক'লা বঙৰ পটিৰ উৎপত্তি হয়। গালৰ দুয়ো কাষে দুচটা দুচটা আঁচ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভিত্তি ভাগত এচটা ক'লা বৰণৰ পটি পঞ্চালিতকৈ সজোৱা থাকে আৰু গাৰত থকা আঁচ দুডালৰ ভিতৰত তলৰ কালে থকা ডালৰ আগৰ ভাগ আৰু এই পটি ডালক স্পৰ্শ

কৰেহি। তপিনাৰ আগ ভাগত দুচটা কলা আঁচ পখালিতকৈ স্নাত্তবান ভাবে থাকে। এই বিধ প্ৰাণীয়ে মেকুবীৰ দৰে “মেও নেও” কৈ মতাও শুনা যায়। এনেদৰে মতা মাতবোৰ ইমান অস্পষ্ট যে দুটোৰ পৰা ইয়াৰ মাত নুশুনি।

এইবিধ বন মেকুবীক নিশাচন প্ৰাণী বুলিও ক’ব পাৰি। দিনৰ দিনটো ইহঁতে গছৰ ধোন্দত কিম্বা তেনে ধৰণৰ সুবিধা জনক ঠাইত আশ্ৰয় লৈ থাকি আত্মগোপন কৰে। গধূলি পৰত চিকাৰ বিচাৰি ই আশ্ৰয় লৈ থকা ঠাইৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে। মাটিত বা গছৰ ডালত বগাই ফুৰা সৰু-সুৰা প্ৰাণী বা চৰাই ধৰি ধৰি খায়। হাতোৰাৰ আঙুলিৰ নখবোৰ সাধাৰণ অৱস্থাত খাপৰ মাজে মাজে সোমাই থাকে। চিকাৰৰ প্ৰাণী ধৰিবৰ সময়ত মেকুবীয়ে এই নখ খাপৰ মাজৰ পৰা ইচ্ছানুযায়ী



লতা--মাকৰি

উলিয়াই ন’ব পাৰে। এই নখৰ সহায়ত ই চিকাৰৰ জন্ত বা চৰাই খাপ মাৰি ধৰে। দীঘলকৈ ওলাই অহা আগ--দাঁত কেইটাৰে জন্তটোক কেৰেং মেৰেং কৰিব নোৱাৰাকৈ কামোৰ মাৰি ধৰি মাৰি পেলায়। আমাৰ এই ফালৰ লতা--মাকৰি জাতীয় প্ৰাণীবোৰক ঘৰচীয়া হাঁহ কুকুৰা ধৰি মানুহৰ হানি বিধিনি ঘটোৱাৰ দৃষ্টান্ত বৰ বেছি নহয়। কিন্তু দক্ষিণাভাৰ ফালে বাস কৰা এই উপজাতিৰ প্ৰাণীবোৰে ঘৰচীয়া হাঁহ কুকুৰা আদি ধৰি ধৰি গোৱা বিষবাত পাৰ্গত বুলি জনা যায়।

লতা মাকৰিক পোহ মনাৰ পাৰি যদিও এইবিধ প্ৰাণীক কিশাণ কৰা টান। এই বিষয়ত হয়তো বহুতো নোকে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে। মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ এটা অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলোঁ। বাছাৰ ভিত্তাত কাট্‌লিছৰা নামৰ পাণ্ডা এখনৰ এখন মানুহে এবাৰ এটা লতা--মাকৰি জাতীয় প্ৰাণী কেনেদৰাকৈ হাবিৰ মাজৰ পৰা ধৰি আনি ঘৰতে প্ৰতিপালন কৰি নাখিছিল।

চেহেৰা-পাতি নাহৰ-কুটুকী বাঘৰ লগত অধিকল মিলি যোৱাৰ বাবে সেই মানুহ ঘৰে এই জন্তুকো এটা নাহৰ-কুটুকী বাঘৰ পোৱালি বুলি ভাবিছিল আৰু মাংস আদিৰ যোগান ধৰি এটা কাঠৰ বাকচত ভৰাই ৰাখিছিল। কালক্ৰমত জন্তুকো ডাঙৰ হলে প্ৰতিদিনে বহুতো পৰিমাণৰ মাংসৰ যোগান ধৰিব লগীয়া হ'ব বুলি ভাবি তাক ঘৰত পালন কৰা সম্ভৱ নহ'ব বুলি ভাবিছিল। মাটিজুৰিৰ বেজ অফিচাৰ জনে জন্তুকো নিজ চকুৰে দেখি আহি মোক জনালেহি। এইটো ১৯৬০ চনৰ কথা। সেই সময়ত মই কাছাৰ বন সং-বণ্ডলৰ ভাৰগ্ৰাণ্ত বিষয়া হিচাপে শিলচৰত আছিলোঁ। মই বেজ অফিচাৰ জনক এই জন্তুকো মানুহ জনৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মোৰ কাৰ্যালয়লৈ আনিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। মানুহ ঘৰে জন্তুকো হস্তান্তৰ কৰিবলৈ পাই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱা যেন ভাবিলে। জন্তুকো শিলচৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। তাক মোৰ বাস-ভৱনতে ৰাখিলোঁ। লাহে লাহে তাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ঘৰচীয়া মেকুৰীৰ দৰে দেখা গ'ল। তাক কাঠৰ বাকচটোৰ পৰা উলিয়াই আনি ঘৰৰ ডিঙৰতে থকৈ বেলি দি তাৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিলোঁ। ঘৰচীয়া মেকুৰীৰ দৰে সি মাতিমে ওচৰলৈ অহা হ'ল আৰু ইকালে গিফালে কৰি নিয়া গৰম আকলুৱাৰ দৰে মোৰ নিচেই ওচৰতে বহি থকা হ'ল। লাহে লাহে তাক বেছি সময়ৰ বাবে মুকলি কৰি ৰাখিবলৈ ধৰিলোঁ। মেকুৰীৰ দৰে “মেও মেও” কবিলেও ভগা মাতৰ দৰে শুনিবলৈ অস্পষ্ট হৈছিল। লাহে লাহে তাক ঘৰচীয়া মেকুৰীৰ দৰে ৰাখিবলৈ ধৰিলোঁ। এমাহ মান এইদৰে থকাৰ পিছত সি এদিন হঠাতে অন্তৰ্ধান হ'ল। ভেড়িয়াহে বুজিলোঁ যে সি হাবিলৈ পলাই যাবৰ বাবেহে এই ধৰণৰ ভাও ৰাখিছিল। এই অভিজ্ঞতাৰ পৰাই প্ৰমাণ হ'ল যে লতা-মাকৰি নামৰ বনৰেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক ঘৰচীয়া মেকুৰীৰ দৰে লালন পালন কৰি পোহ মানাৰ নোৱাৰি। স্বাধীন-চিহ্নীয়া ভাৱে হাবিৰ মাজত জীৱন যাপন কৰিয়েই ইহঁতে ভাল পায়।

ভাৰতবৰ্ষত লতা-মাকৰিৰ কেবাটাও উপজাতি থকাৰ কথা জনা যায়। দেহৰ নোৱৰ ধৰণৰ গভীৰতা আৰু গঠন প্ৰণালীৰ তাৰতম্য অনুসৰি এই উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীবিলাকক বিজ্ঞান সম্মতভাৱে পৰিচয় কৰা হয়। পোৱালি জগোৱা আৰু লালন-পালন কৰাৰ বিষয়ত এই বিধ বন-মেকুৰীৰ প্ৰকৃতি অন্য মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ দৰেই। বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে চালে এই প্ৰাণীবিধ সংৰক্ষণৰ বাবে উপযোগী। ভাৰতৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন অনুযায়ী লতা-মাকৰিয়ে প্ৰথম তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে। সেই বাবে এইবিধ প্ৰাণীক বিনা কাৰণত বধ কৰিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হ'ব লাগিব। ধুনীয়া-আকৃতিৰ প্ৰাণী হিচাপে ই সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰা স্বাভাৱিক।

সোণালী মেকুৰী

শ্ৰেণী—স্বন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী

গোত্ৰ—ফেলিডি

প্ৰজাতি—ফেলিচ টেসিফি

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন পৰিবেশত থকা নানাজাতৰ বনৰীয়া মেকুৰীৰ ভিতৰত সোণালী মেকুৰী নামৰ এবিধ মেকুৰীয়েই সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ আৰু দেখাতো ধুনীয়া। বনাঞ্চল অৰণ্যভূমিবিলাকতেই এইবিধ প্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান। নেপালৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূটান ছিতিমৰ মাজেদি অৰুণাচল, অসম আৰু অন্যান্য পাৰ্বত্য ৰাজ্য-বিলাকলৈ ইয়াৰ বিচৰণ ভূমি বিস্তাৰিত হৈ আছে। আন্তে-পাতে মেকুৰী হ'লেও ইয়াক পশ্চিম গোলাৰ্দ্ধত বাস কৰা এটা সৰু আকাৰৰ “বান্টনেট লায়ন” বা গিট্ৰা যেনহে লাগে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি এইবিধ মেকুৰীৰ বসতি স্থান পূবৰ ফালে ব্ৰহ্মদেশৰ মাজেদি আন কেইবাখনো দেশৰ বনভূমিবিলাকলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে।

সোণালী মেকুৰীৰ গাৰ নোমবোৰৰ বৰণ সাধাৰণতে বঙটকীয়াকৈ বগা হোৱা দেখা যায়। জন্তু ভেদে নোমবোৰৰ বৰণত গভীৰতাৰ তাৰতম্য পৰিলক্ষিত হয়। কিছুমান মেকুৰীৰ বৰণ ক'লা হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাধাৰণতে নোমৰ আৱৰণত কোনো ধৰণৰ বিচিত্ৰতা দেখা নাযায়। গৰমৰ দিনত কিছুমান মেকুৰীৰ পিছৰ ফালে সামান্য ধৰণৰ দাগ হোৱা দেখা যায়। গালৰ দুয়ো কাষে দুটা বগা বন্ধৰ দাগৰ উৎপত্তি হয়। চকুৰ ভিতৰ ফাল সামান্য বগা যেন দেখা যায়। মূৰৰ ওপৰৰ ফালে এটা ধোৱাবননীয়া আঁচ থাকে।

অসমৰ বনাঞ্চলত থকা সোণালী মেকুৰীক সহজতে হাবিৰ মাজত দেখা নাযায়। গভীৰ অৰণ্যত থকা প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে এইবিধ জীৱ সহজতে চকুত নপৰে। পৰ্বতীয়া অৰণ্য ভূমি আৰু পৰ্বতৰ নাৰনি বোৰত থকা বনভূমি বিলাকতহে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে সচৰাচৰ বিচৰণ কৰা দেখা যায়। বগালেণ্ড, মিজোৰাম, মেঘালয় আদি ৰাজ্যৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰেই এইবিধ প্ৰাণীৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। অৱশ্যে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি আৰু জুমখেতিৰ প্ৰসাৰতৰ ফলত সোণালী মেকুৰীৰ বাসস্থান ক্ৰমে সঙ্কোচিত হবলৈ ধৰিছে। সেই কাৰণে বৰ্তমান অৱস্থাত বিভিন্ন ঠাইৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু

অন্যান্য জনশূন্য পৰিবেশ বিলাকতে এইবিধ প্ৰাণীয়ে আশ্ৰয়ৰ স্থান বিচাৰি ল'বলগীয়া হৈছে। বেকালত বন্যজীৱ অৱস্থায় আৰু মহাদেউ গৰ্জ নামৰ আও-হাটীয়া ঠাইত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ পোতা চেৰেকক বিচাৰি পোৱা গৈছে। সহজতে বিচাৰি নোপোৱা এইবিধ প্ৰাণী দুৰ্গত প্ৰাণী বুলি পৰিগণিত হৈছে। ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনত এইবিধ প্ৰাণীয়ে প্ৰথমৰূপে উল্লিখিত স্থান পাইছে। সেই কাৰণে সোণালী বেকুৰী বন কৰা কান-আইন বিবোৰী।

বেকুৰী জাতীয় প্ৰাণীক বন কৰিব নাপাৰ বুলি আমাৰ মানুহৰ মাজত এটা বিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আহিছে। বেকুৰী বন কৰিলে সেইদৰে বন কৰা বেকুৰীৰ সন্তান নিশুৰীত পৈ যেনো এটা সোণৰ বেকুৰী বন বজাক গটাই দিবলৈ লাগিব। এই ধাৰণা ক'ব পৰা উৎপত্তি হ'ল ভালদৰে জমা মাৰাৰ। পিছে আমাৰ হাৰি বননিবিলাকত সোণালী বেকুৰী নামৰ এবিধ দুৰ্গত প্ৰাণী আগতে আগতে বাল কৰালৈ চাই এইবিধ



সোণালী বেকুৰী

বেকুৰীকে আমাৰ মানুহে সোণৰ বেকুৰীৰ আখ্যা দিছিল বুলি ভাবিবৰো খল নথকা নহয়। কিয়নো কি নথক বেকুৰী জাতীয় প্ৰাণী বন কৰা উচিত নহয় বুলি আমাৰ বহুতো মানুহে বে বিশ্বাস কৰে এই কথা ধুকপ।

সোণালী বেকুৰীয়ে গছৰ ৰোপত বা তেনে ধৰণৰ সুচল ঠাইত আশ্ৰয় লৈ পোৱালি জগায়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত পাণৰৰ কাকৰ মাজত সোমাই থাকিও ইহঁতৰ মাইকী বোৰে পোৱালি জগায়। অন্যান্য জাতৰ বেকুৰীৰ দৰেই সোণালী বেকুৰীয়ে একে কামতে একাধিক পোৱালি জগায়।

মাছবৈষ্ণেকুৰী

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী


গোত্ৰ—কেলিডি

প্ৰজাতি—কেলিছ ডাইডেৰিণ

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত কেইবাবিধো মেকুৰী গোষ্ঠীৰ বনৰীয়া জন্তু বাস কৰা দেখা যায়। জাতি অনুযায়ী কেবাবিধ বনৰীয়া মেকুৰীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে। সদ্যহতে বিবিধ বনৰীয়া মেকুৰীৰ জীৱনশৈলী বৰ্ণনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেইবিধ মেকুৰীক মাছটৈ মেকুৰী নামেৰেহে জনা যায়। সমগ্ৰ দেশৰ অনুকূল পৰিবেশত এইবিধ মেকুৰী জাতীয় বন্যপ্ৰাণী বিক্ষিপ্ত ভাৱে বাস কৰে। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ নীমনি ভাগত থকা ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদেৰে পৰিপূৰ্ণ ৰ ঠাই আৰু মুকলি হাবিৰ মাজেদি বৈ যোৱা নলা নদীৰ আশে পাশে এইবিধ মেকুৰীয়ে নিবলৈ থাকিবলৈ সূচন ঠাই বিচাৰি লয়। দক্ষিণৰ ফালে সাগৰৰ পাৰত থকা নদীৰ অৱস্ৰাৱিকা অঞ্চল সমূহতো এইবিধ মেকুৰীক বাস কৰা দেখা যায়। বৃষ্টিতে জলাশয় থকা ঠাই বিলাকতেই এইবিধ মেকুৰী জাতীয় প্ৰাণীৰ বাসস্থান হোৱা দেখা যায়। উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিম বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা আদিৰ অন্তৰ্গত কিছুমান ঠাইত ইয়াৰ বিচৰণ ভূমি থিৰপি আছে। দক্ষিণাত্যৰ ফালে ইয়াৰ উপস্থিতি কম বুলি জনা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম ফালে থকা উপকূল বৰ্তী স্থানবিলাকতো এইবিধ মেকুৰী সেবেঙাকৈ বাস কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক সীমাবন্ধা অতিক্ৰম কৰি মাছটৈ মেকুৰীয়ে পাকিস্তান, শ্ৰীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ইন্দোনেচিয়া আৰু মালয়ছিয়াৰ বহুতো ঠাইত বিস্তৃতি লাভ কৰিব পাৰিছে।

ঘৰচীয়া মেকুৰীবিলাকৰ সবহভাগেই যে মাছ খাবলৈ ভাল পায় এই কথা সকলোৱেই জানে। ভজা বা পোৰা মাছৰ গোন্ধ পালে ইহঁতৰ গাত উৰণি নাইকিয়া হয়। “মেও মেও” কৈ চিঞৰি ঘৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰাঘূৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চোৰ বা চুৰী প্ৰকৃতিৰ মেকুৰীৰ দৰে থাকিলে গিৰিহঁতৰ বৰ অপ্ৰতি হয়। বাজিটোৰ ডিঙৰতে গাঁচি খোৱা মাছখিনি খাই শেষ কৰি থৈ দিয়ে। চৌ কলহৰ জীৱনীয়া বাহেও এনে মেকুৰীৰ প্ৰতাপত বন্ধা নাপায়। বনৰীয়া মেকুৰীৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ বাছ ৰবি খোৱা প্ৰবৃত্তি প্ৰচল হোৱা দেখা নাযায়। এই প্ৰৱৰ্ত্তৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰা বনৰীয়া মেকুৰীক হাতে-হিনজুৱে বাছ খোৱা মেকুৰীৰ আখ্যা দিব লাগিব। ইংৰাজী ভাষাত এইবিধ মেকুৰীক-

ডালত উঠি ইফালে সিকালে বগাই ফুৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিঠিৰ উপৰি ভাগৰ মেৰুশৃঙা ডালৰ হেৰে হেৰে এডাল দীঘল পট্ট দেখা যায়। জন্তুটোৰ ঠেং আৰু নেজডালৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰৰ ক'লা নোম হোৱা দেখা যায়। মুখৰ আগ ভাগ আৰু ডিঙিত অঁকা-বঁকা দাগ হয়।



লতা-কটকী মেকুৰী

লতাফটকী মেকুৰীৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বিষয়ে স্পষ্টভাৱে জনা নাযায়। বছৰৰ কোনো নিদিষ্ট সময়ত এইবিধ বন-মেকুৰীয়ে পোৱালি জগায়নে কিয়া বছৰৰ যেই কোনো মাহতে ইহঁতে পোৱালি জগায় সেই কথা জনা নাযায়। গছৰ ওপৰত বগাই ফুৰা নিশাচৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে এইবিলাক তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ উপায় নাই বুলি ক'ব লাগিব।

মাৰ্বল কেট্, বা লতা-ফুটুকী মেকুৰী

শ্ৰেণী---স্কলপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---ফেলিডি

প্ৰজাতি---পাৰড'কেলিচ্ মাৰব'ৰাট

মাৰ্বল কেট্ নামৰ এবিধ আপু কপীয়া শ্ৰাণী পুৰ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত থকা অৰণ্যভূমি বিলাকত আলেঙে আলেঙে বাস কৰা দেখা যায়। জনবসতিৰ পৰা আঁতৰি হাবিত থাকে বাবে ইয়াক য'তে ত'তে সহজতে দেখা নাযায়। এইবিধ শ্ৰাণীয়ে সবছভাগ সময় গছ-গছনিৰ ডালে পাতে বগুৱা বাই কুৰিয়েই কটায় আৰু কাটিং ক'ব-বাতহে মাটিতৈ নামি আহে বুলি জনা যায়। গছৰ ডালত বগাই ফুৰা কেৰ্কেটুৱা আৰু নিগনি জাতিৰ শ্ৰাণীবিনাক ধৰি ধৰি খাই ইহঁতে জীৱন ধাৰণ কৰে। গছৰ ডালত পৰি জিৰণি লোৱা চৰায়ে কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে। সেই কাৰণে এইবিধ মেকুৰী থকা গছবিলাকত কোনো জাতীয় চৰায়ে বাহ সাজি কণী পাৰিবলৈ সাহস নকৰে।

লতা-ফুটুকী মেকুৰীৰ মূৰটোৰ আকাৰ গোল আৰু সেই অনুপাতে মুখখণ্ডলৰ আকৃতিও ঘূৰণীয়া। ইয়াৰ গাৰ নোমবোৰ মদকৱা বৰ্ণৰ হয় আৰু নোমত ফুলাম পাহিৰ দৰে চিন থাকে। গোধা-ফুটুকী বাঘৰ দেহত যি ধৰণৰ অঁকাবিকা দাগ থাকে, লতা-ফুটুকী মেকুৰীৰ দেহতো তেনে দাগেই দেখা যায়। অৱশ্যে আকাৰত লতা-ফুটুকী মেকুৰী গোধা-ফুটুকী বাঘতকৈ বহুতো সৰু হয় আৰু ইয়াৰ নোমত থকা পাহিবিলাকো তেনে ধৰণৰ উজ্জ্বল নহয়। কিন্তু গোধা-ফুটুকী বাঘৰ পোৱালি আৰু পুৰুষ বয়সৰ লতা-ফুটুকী মেকুৰীৰ দেহৰ মাজৰ পাৰ্থক্যৰ মাত্ৰা অতি সামান্য বুলি ক'ব পাৰি।

নেপালৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলত থকা বনাঞ্চলবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূটান আৰু ছিন্টিমৰ মাজেদি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে বিয়পি থকা সমস্ত ভূ-ভাগত লতা-ফুটুকী মেকুৰীৰ বসতিস্থান বিক্ষিপ্ত ভাৱে বিয়পি আছে বুলি জনা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক সীমা-ৰেখা অতিক্ৰম কৰি পূবৰ ফালে ব্ৰহ্মদেশ পৰ্যন্ত ইয়াৰ বিচৰণ ভূমি লক্ষ্যসাধিত হৈছে। অসমৰ বনভূমিবিলাককে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আটাই কেইখন ৰাজ্যলৈ ইয়াৰ বসতি স্থান বিয়পি আছে। জন্তটোৱে নখযুক্ত হাতোৰাৰ লহাৱত গছৰ ওপৰৰ

বীৰু কিছু কিছু বুলি কোৱা হয়। আমাৰ এই ফালৰ ঠাইবোৰত সাধাৰণতে এইবিধ বনৰেকুৰী দেখা নাযায়। সেই কাৰণে ইংৰাজী নামৰ লগত খাপ খুৱাই এইবিধ বনৰেকুৰীৰ নাছটো বেকুৰী বোলা হয়। নাছটো বেকুৰীয়ে উদৰ দৰে পানীৰ নাছ ধৰি



নাছটো বেকুৰী

নাযায়। কিন্তু পানীটোৰ নামি নোহোৱাকৈ সিহঁতে নাছ ধৰা কানত পাটকত। পানীৰ কাষৰ খিয় গৰা আৰু পানীৰ উপৰি ভাগত কেটীয়াটোকে হাউলি গৰা গছৰ ডালত জোপ

লৈ ই বহি থাকে। পানীৰ ওপৰত কমাই ফুৰা মাছ চকুত পৰিলে সি হাতোবাবে খাপ মাৰি ধৰি মুখত দিয়ে।

মাছুৰৈ মেকুৰীৰ গাৰ গঠন অন্যান্য জাতীয় বন-মেকুৰী বিলাকৰ তুলনাত অলপ খোপোৰা হয়। ইয়াৰ ঠেং কেইখন গাৰ তুলনাত চুটি। তদুপৰি ইয়াৰ নেজডালো সেই অনুপাতে চুটি হয়। গাৰ নোঁমখিলাকৰ বৰণ মটীয়া হয় আৰু তাৰ মাজত মুগা বৰণীয়া নোমৰ আভাস দেখা যায়। এই নোমবোৰত দীঘল দীঘল আৰু অলপ খোপোৰা দাগৰ উৎপত্তি হয়। এই জন্তুটোৰ পাছ ফালে, আৰু পিঠিৰ ওপৰৰ দাগবোৰ দীঘলীয়াতকৈ সজোৱা থাকে। সন্মুখৰ ফালে মূৰৰ ওপৰলৈকে দীঘলীয়া দীঘলীয়াতকৈ সমান্তৰাল ভাৱে বৈ পৰা কেইবা ডালো পট্ট থকা দেখা যায়। গালৰ নোমবোৰ বগা বা মাৰন বৰণীয়া হয়। গালৰ দুয়ো কাষত পখালিতকৈ কেইডাল মান পট্ট দেখা যায়। পিঠিৰ উপৰি ভাগৰ নোমবোৰ ক'লা হোৱা দেখা যায়। গাৰ তলৰ ফালে ফুটুকা-ফুটুকী দাগ থাকে। আগ ঠেং দুখনৰ ভিতৰ ফালে ক'লা বৰণৰ আঁচ থাকে। চুটি নেজ ডালত আঙঠিৰ নিচিনাকৈ পখালি পখালিতকৈ চকৰ থাকে।

মাছ ধৰি ধৰি ধোৱাৰ উপৰিও এইবিধ মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে নানাবিধ সৰু-সুৰা প্ৰাণী ধৰি খায়। নখ আৰু দাঁতৰ গঠন মেকুৰী তথা বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ সৈতে একে দেখা যায়।



কাৰাকাল্ বা চিয়েগোচ্

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাছাৰী

গোষ্ঠ---কেচিডি

বাস-বন-মেৰুৰী

ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিম আৰু উত্তৰ পাৰ্শ্বত অঞ্চলত এৰিৰ নানা প্ৰকাৰৰ বন্য প্ৰাণী দেখা যায়। এইবৰ মেকুৰীৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াৰ গাৰ মেৰুৰী আৰু শিঙী এই দুয়োবিধ প্ৰাণীৰ শাৰীৰিক বিন দেখা যায়। বন্যচ্চ এই প্ৰাণীৰ দৰে ইয়াৰ দেহৰ সন্মুখ ভাগ পাছৰ ভাগতকৈ ওখ হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ নেজডাল বন্যচ্চ নেজৰ দৰে চুটি নহয়। সাধাৰণ মেকুৰীৰ দৰে নেজডাল দীঘল হয়। তদুপৰি শিঙীৰ দৰে ইয়াৰ গলধনৰ দুয়ো কাষে ডাঠৰ দৰে দুকোছা নোমো দেখা নাযায়। ইউৰোপ, আমেৰিকা আদি মহাদেশত বিভিন্ন নামেৰে পৰিচিত শিঙী জাতীয় যিবিলাক প্ৰাণী বাস কৰে সেই আটাই বিলাকৰে নেজডাল ওখতে কাটি বগাব। মাচিলাকৈ চুটি হয়। তদুপৰি গাৰ দুয়ো কাষে গাৰ দীঘল নোমৰে এই প্ৰাণীৰ দেহত ফুটি উঠা বিচিত্ৰ বৰণৰ পৰিচয় দিয়ে। কাৰাকাল্ নামৰ প্ৰাণীৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে ইয়াৰ কাণ দুখনৰ ওপৰ ভাগত কেইডালমান দীঘল দীঘল নোম গজে। অসম আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্য কেইখনত সাধাৰণতে থকা বন-মেৰুৰী বা হোপাৰ কাণৰ আগ ভাগত এনে নোম থকা দেখা যায়।

কাৰাকাল্ৰ বসতিস্থান পঞ্জাব, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ আদিবৰ্ষাৰ আৱন্ত কৰি মধ্য প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ বিচ্ছিন্ন ভাৱে বিৰপি আছে। পাৰ্শ্বস্থানৰ সিন্ধুপ্ৰদেশ আৰু আৰু কছৰ বালি-সঁহীয়া ঠাইবিলাকতো এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰাৰ কথা জনা যায়। এচিয়া মহাদেশৰ অন্যান্য কেইবাখনো দেশলৈ এইবিধ মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান বিস্তাৰিত হৈ আছে। পশ্চিমৰ কালে অৱস্থিত ইৰাক, ইৰাণ আৰু আৱৰৰ নাম এই সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰিব পাৰি। এই একোৰধ প্ৰাণীকে আফ্ৰিকা মহাদেশতো বাস কৰাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। ভাৰতৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা কাৰাকাল্ৰোৰে মুকলি মূৰীয়া হাবি বননিত বাস কৰিবলৈ ঠাই নিৰ্বাচন কৰি নোৱা দেখা যায়। মকতুম অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা পাতলীয়া হাবি বোৰতো ইহঁতে বাস কৰে। লুকাই থকা স্বভাৱৰ কাৰণে ব'হে ত'হে ইহঁতক দেখা পোৱা নাযায়। এইবিধ প্ৰাণীয়ে নানা বিধৰ তৃণভোজী বনৰীয়া

প্ৰাণী ধৰি ধৰি খায়। এই বনৰীয়া প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত এন্দুৰ, নিগনি, এণ্টেলোপ্, আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। চিতা নামেৰে জনাজাত নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ দৰে এইবিধ প্ৰাণীয়েও খেদা খেদি কৰি বনৰীয়া জন্তুৰ ওপৰত জপিয়াই পৰে। চাৰি-ঠেঙীয়া



কাৰাকাল বা চিয়েগোচ্

প্ৰাণীৰ বাহিৰেও ম'ৰা চৰাই, কপৌ, কৰ্চন প্ৰভৃতি চৰাইবোৰ ধৰি ধোৱাত এই বিধ নেওৰ।

কুকুৰ গোষ্ঠীৰ জন্তুবিলাক

কুকুৰ পৰিয়ালৰ প্ৰাণীবিলাকৰ বাবে জন্তু জগতত এখন সুকীয়া আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ঘৰচীয়াই হওক কিম্বা বনৰীয়াই হওক এই পৰিয়ালত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা আনোৱাৰৰ চেহেৰা পাতি আৰু শৰীৰৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গৰ গঠন প্ৰণালীত এনে সামঞ্জস্য আছে যে সিহঁতৰ ভিতৰত কিবা লেখক ল'ব লগীয়া ব্যৱধান আছে বুলি ভাবিবলৈ টান লাগে। আমাৰ ঘৰে ঘৰে পোহা বিভিন্ন জাতৰ কুকুৰবোৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেই এই কথাৰ সত্যতা উপলব্ধি কৰিব পাৰি। বিলাতী, দেশী আদি নানা ধৰণৰ কুকুৰক নানা ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায়। দেখাত বেলেগ বেলেগ আকৃতিৰে সিহঁতক দেখিবলৈ পোৱা গ'লেও সিহঁতৰ গঠন প্ৰাণালীত বিশেষ পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত নহয়। ঘৰচীয়া কুকুৰবিলাকৰ ভিতৰত বহুতো জাতৰ কুকুৰৰ নোমবিলাক আশাতীত ভাৱে দীঘল হয়। জোপোহা নোম থকা কুকুৰবোৰ দেখিবলৈও ভাল লাগে। আকাৰত কিছুমান ডাঙৰ আৰু আন কিছুমান তেনেই সৰু হয়। কিছুমানৰ ঠেং কেইখন দীঘল আৰু পেটটো চিঁয়া হয়। এনে কুকুৰে অতি বেগত দৌৰ দি যাব পাৰে। আন কিছুমান আকাৰত তেনেই সৰু আৰু দেখাত মৰম লগা হয়। কিছুমানৰ কাণ দুখন তললৈ ওলনি পৰা হয়। আন কিছুমানৰ কাণ থিয় হয়। বনৰীয়াতকৈ হাবিয়ে বননিয়ে স্বাধীনচিতিয়া ভাৱে বাস কৰা কুকুৰবোৰৰ মাজত এনে বৈচিত্ৰ্য নাই। কুকুৰ পৰিয়ালৰ বনৰীয়া প্ৰাণীবোৰৰ অন্তৰ্গত কুকুৰ—নেচীয়া বাঘ, শিয়াল, বাঘ—শিয়াল বা খেক—শিয়াল, বঙা শিয়াল, বাং কুকুৰ, হান্টিং দগ, কায়তা, ডিক্কা আদি নানাবিধ প্ৰাণী আছে। কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰক কেনিডি নামৰ গোত্ৰ বা পৰিয়ালত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।

কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ মুখ মণ্ডল আৰু মূৰ ভাগ আগৰ ফালে ক্ৰমে জোঙা আৰু দীঘলীয়া হয়। বনৰীয়াতকৈ হাবিয়ে বননিয়ে স্বাধীনচিতিয়া ভাৱে বাস কৰা কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰৰ কাণ দুখন ওপৰৰ ফালে থিয়, গাটো দীঘলীয়া আৰু নেজডাল দীঘল আৰু অলপ জোপোহা হোৱা দেখা যায়। মেকুৰী তথা বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰৰ দৰে কুকুৰ জাতীয় প্ৰাণীবোৰেও ঠেঙৰ তলুৱাৰ আগ ভাগেৰে খোজ কাঢ়ে। সেইবাবে এই গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰকো ডিজিটিগ্ৰেট বা আঙুলিৰ আগেৰে খোজ কঢ়া প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। এই জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইহঁতৰ ধাতোকৰ আগঠেং দুখনত পাঁচোটা পাঁচোটাকৈ আঙুলি আৰু ধাতোক আঙুলিৰ আগ

ভাগত একো একোটা জোঙা বিষৰ হাকোটা নথ থাকে। পাছ তেঁ নুখনত সাধাৰণতে সাত্ৰ চাৰিটাকৈহে আঙুলি আৰু নথৰ উৎপত্তি হয়। অৱশ্যে জন্তু ভেদে ইয়াৰ সামান্য ব্যতিক্ৰম পৰিলক্ষিত হয়। বনৰীয়া কুকুৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰত্যেক প্ৰজাতিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জন্তুবোৰে একো একো বিধ নিৰ্দিষ্ট বৰণ আৰু আকৃতিৰ নোমৰ আৱৰণ পৰিধান কৰে। ঘৰচীয়া কুকুৰ বিলাকৰ দৰে জন্তুভেদে বিচিত্ৰ বঙৰ নোম ইহঁতে পৰিধান নকৰে। আফ্ৰিকা মহাদেশখনত বাস কৰা হান্টিং দগ্ বা চিকাৰী কুকুৰ নামৰ বাং কুকুৰ সদৃশ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে এই নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিলাক প্ৰাণীৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ কজলা হয়। ইহঁতৰ দেহ চিত্ৰ-বিচিত্ৰ কজলা নোমৰ আৱৰণেৰে ঢকা থাকে। আকৃতিত জন্তু ভেদে বিচিত্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা নানা প্ৰকাৰৰ স্বাভাৱিক পৰিবেশবোৰত যিবোৰ কুকুৰ কৈদৰ প্ৰাণী বাস কৰে সিহঁতৰ কোনো এবিধেও হান্টিং দগৰ বৈচিত্ৰ্য প্ৰদৰ্শন নকৰে। সেই কাৰণে হান্টিং দগক এই বিচিত্ৰতাৰ জলন্ত প্ৰাকৃতিক নিদৰ্শন বুলি আঙুলিয়াব পাৰি।

বনৰীয়া কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰ যে ঘৰচীয়া কুকুৰৰ দৰে সাংসাহাৰী জানোৱাৰ হ'ব এই কথাৰ পুনৰুৎপত্তি নিঃপ্ৰয়োজন। অৱশ্যে নিৰামিষ খাদ্যত যে ইহঁতৰ অভিকৰ্ষি নাই এই কথা ক'ব নোৱাৰি। দুৰ্গন্ধময় গেলাপচা মাছ-মাংস ভক্ষণ কৰিও ইহঁতৰ কিছুমানে হজম কৰিব পাৰে। কেচু-কুমাট, কীট-পতঙ্গ আদি নিম্ন খাপৰ জীৱ ইহঁত কিছুমানৰ আহাৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দেখা যায়।

কুকুৰ জাতীয় জন্তুবিলাকে অতি দ্ৰুত গতিত দৌৰ দি দি যাব পাৰে। অকল সেয়েই নহয়। ইহঁতৰ কিছুমানে বহুত দূৰ এইদৰে দৌৰি দৌৰি যাব লগীয়া হ'লেও ভাগৰি নপৰে। ইহঁতবোৰ এনে বিচিত্ৰ গুণৰ অধিকাৰী হ'ব পৰাৰ কাৰণ দুটা। প্ৰথমতে দেখা যায় যে ইহঁতে আঙুলি আৰু নথ বোৰ মেকুৰী গোষ্ঠী প্ৰাণীৰ বোৰৰ দৰে ইচ্ছানুযায়ী মেলিব আৰু জপাব নোৱাৰে। ঋমোচ মাখি চিকাৰৰ জন্তু ধৰিবৰ বাবে আৰু নখেৰে জন্তুটোক জখম কৰিবৰ কাৰণে এই নখবোৰ উপযোগী নহয়। ততা মাটিত অতি প্ৰবল বেগেৰে দৌৰ দি দি যোৱা কামৰ বাবে এই আঙুলি আৰু নখেৰে সৈতে ঠেঙৰ তলুৱা ভাগ অতি উপযোগী হয়। একেৰাহে ভাগৰ নলগাকৈ দৌৰ দি দি যাব পৰাৰ আনটো কাৰণ হ'ল অতিবিক্ত বায়ু ধাৰণ কৰিব পৰা হাওঁফাওঁৰ অদ্ভুত ক্ষমতা। ডাঙৰ আকাৰৰ হাওঁফাওঁ আৰু কলিজা ধাৰণ কৰিবৰ বাবে কুকুৰ জাতীয় প্ৰাণীবোৰৰ বুকুখনে তুলনামূলক ভাৱে আহল-বহল হয়। অতি বেগত দৌৰ দি দি যোৱা সময়খিনিত বুকুখনে অধিক পৰিমাণৰ বায়ু ধাৰণ কৰিব পৰা অৱস্থাত থাকে। সেই কাৰণে এই বিপৰ্যয়ৰ সময় ছোৱাত বায়ু সেৱন আৰু নিঃসৰণ নিয়ন্ত্ৰিত আৰু নিয়ন্ত্ৰিত ভাৱে বহুত পৰলৈকে চলি থাকিব পাৰে।

কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰৰ চিকাৰ পদ্ধতিতো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মেকুৰী বা বাঘৰ দৰে ইহঁতে জোপ লৈ চিকাৰৰ প্ৰাণী নথৰে। চিকাৰ কৰি মাৰিব লগীয়া জন্তুটোক ইহঁতে পাছ ফালৰ পৰা খেদি খেদি নিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চিকাৰৰ জন্তুটোৱে

তেতিয়া নিজৰ প্ৰাণ ৰচাবৰ বাবে উধাতু খাই পাৰেমানে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কুকুৰ জাতীয় প্ৰাণীয়ে তেতিয়া তাক পাছে পাছে খেদি নিয়ে। জন্তুটোৰ গতিবেগ অতিক্ৰম কৰি তাক আগ ভেটি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ঠেঙে মূৰে কামুৰি কামুৰি তাক লেৰাজান কৰি পেলায়। সেই অৱস্থাত জন্তুটোৰ গাৰ পৰা চৌপাটোপে ভেজ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সুবিধা বুজি কুকুৰে তাৰ চোকা দাঁত কেইটাবোৰ চিকাৰৰ জন্তুটোৰ ডিঙিতে কামোৰ মাৰি ধৰে। আচাৰ মাৰি মাৰি তাক মাটিত বগুৱাই পেলায় আৰু মাটিতে ঠেকেচি ঠেকেচি তাৰ প্ৰাণ বায়ু বাহিৰ কৰি দিয়ে।

কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ৪২ টাকৈ দাঁত থাকে। প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে মেকুৰী গোষ্ঠী প্ৰাণীৰ গড় হিচাপে ৩০ টা আৰু জহামাল জাতীয় প্ৰাণীৰ ৫৬ টাকৈ দাঁত থাকে। কুকুৰ জাতীয় প্ৰাণীলোৰৰ কেইটামান আগ দাঁত আগবোৰ দাঁততকৈ দীঘল হোৱা দেখা যায়। সেই অনুপাতে এই দীঘল আকাৰৰ দাঁত কেইটা অলপ বেছি দীঘল হয়। এই দীঘল দীঘল দাঁত কেইটা ইহঁতে চিকাৰৰ জন্তুক কামোৰ মাৰি ধৰা কামত ব্যৱহাৰ কৰে। চুটি দাঁত কেইটাবোৰে হাড় আৰু ছালত লাগি থকা মাংসবোৰ টানি টানি একত্ৰায়। এই দাঁতবোৰৰ ভিতৰত কেইটামানে জোঙা ৰূপ ধাৰণ কৰে। আগবোৰ দাঁতৰ উপবিভাগ অলপ খলা বন্দা হয়। জোঙা দাঁতবোৰে কেচিৰ দৰে মাংসবোৰ কাটে।



বাং কুকুৰ

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোষ্ঠী---কেগিডি

প্ৰজাতি---কুৰন্ আল্ পাইনচ্

বাং কুকুৰ এবিধ কুকুৰ জাতীয় বনৰীয়া জন্তু। তাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত এইবিধ জন্তু বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৱস্থিত অসম আৰু অন্যান্য ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য কেইখনত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ অভয়াৰণ্য খনকে কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ অন্যান্য কেইবাখনো সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এইবিধ প্ৰাণী থলুৱা ভাৱে বাস কৰি থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা দুখনতো এইবিধ প্ৰাণীয়ে বসতি বিস্তাৰ কৰি আছে। মেঘালয়ত বল্ফাক্ৰাম নামৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু এই উদ্যানৰ ভিতৰত মহাদেউ গৰ্জা নামৰ যিখন অনিল্য স্তম্ভৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ আছে সেই ঠাইতো বাং কুকুৰ থলুৱা ভাৱে বাস কৰা দেখা যায়। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ১৯৮১ খ্ৰীষ্টাব্দত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি বন্য প্ৰাণীৰ পিয়ল কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পিয়লৰ গণনা মতে এইবোৰ ঠাইত কেইবাটাও বাং কুকুৰৰ পৰিয়াল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৱস্থিত এই ঠাইবিলাকৰ বাহিৰে ভাটৰ ফালৰ অন্যান্য কেইবাখনো ৰাজ্যৰ অৰণ্যভূমিত এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। হিন্দী ভাষাভাষী মানুহবিলাকে এইবিধ প্ৰাণীক জঙ্গলী-কুতা বা বন-কুতা বুলি কয়। তাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ভাষাভাষী মানুহৰ মাজত ইয়াক বেলেগ বেলেগ স্থানীয় নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা এই কথা প্ৰমাণিত হয় যে গোটেইখন দেশৰ বহুতো ঠাইত থকা বনাঞ্চল কিছুমানে এইবিধ প্ৰাণী ধাৰণ কৰি আহিছে।

বিভিন্ন অঞ্চলৰ বেলেগ বেলেগ স্বাভাৱিক পৰিবেশত বাস কৰা এই প্ৰাণীবিলাকৰ গাৰ নোমবোৰৰ বৰণৰ গভীৰতাত সামান্য ভাৱৰ তাৰতম্য পৰিলক্ষিত হয়। এনে ধৰণৰ বাহ্যিক তাৰতম্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক ভাৱে এই আটাইবোৰ প্ৰাণীয়ে একেটা গোত্ৰ বা পৰিয়ালত একেলগে স্থান পাইছে আৰু একেটা বৈজ্ঞানিক নামৰ দ্বাৰা জন-সমাজত পৰিচিত হৈছে। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সচৰাচৰ বাস কৰা বাং কুকুৰ বিলাকৰ


গাৰ নোমৰ বৰণ সাধাৰণতে বঙচুৱাকৈ মুগা হোৱা দেখা যায়। জনা যায় যে হিমালয় শৈলমালাৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত বাস কৰা এই জাতীয় জন্তুবিলাকৰ গাৰ নোমৰ বৰণ চকুত লগাকৈ বঙা হয়। এই ধৰণৰ উজ্জ্বল বঙা বৰণৰ নোম পৰিধান কৰাৰ বাবেই এইবিধ প্ৰাণীক পূৰ্বতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বাং কুকুৰ নামৰ আখ্যা দিছিল বুলি অনুমান হয়। অৱশ্যে অতিপাত বঙা বৰণৰ নোমেৰে আবৃত বাং কুকুৰৰ লব্ধিক জন্তু সংখ্যা কিমান হ'ব পাৰে এই কথা সঠিক ভাৱে জনা নাযায়।

দক্ষিণাত্যৰ কোনো কোনো বনাঞ্চলত যিবিলাক বাং কুকুৰ বাস কৰে সেইবিলাক বাং কুকুৰৰ গাত গজা নোমবোৰৰ বৰণ বঙচুৱাকৈ গেকুৱা হয়।

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ বাহিৰত থকা এচিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ আন্টাই পৰ্বতমালাৰ মাজেদি গাফুৰিয়ালৈকে এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতি স্থান বিয়পি আছে।

এই যিনিতে বাং কুকুৰ আৰু অন্যান্য জাতীয় ৱাইল্ড দগ্ বা বনৰীয়া কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বিলাকৰ সন্মিলনে খাউকতে আলোচনা কৰা যাওক। আচলতে ৱাইল্ড দগ্ বুলি কলে হাবি বননিত স্বাধীনচিতিয়া ভাবে বাস কৰা আটাইবিলাক কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ কথাই বুজিব লাগিব। উল্ফ বা কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ নামেৰে জনাজাত যি বিধ বনৰীয়া জন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো কোনো ঠাইত বাস কৰে সেই বোৰ প্ৰাণী ৱাইল্ড দগ্ বা বনৰীয়া কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰে অন্যতম প্ৰতিনিধি বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা বাবে এইবিধ উল্ফ বা কুকুৰ-নেচীয়া বাঘক ভাৰতীয় কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ বা ইণ্ডিয়ান উল্ফ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়।

ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰে এচিয়া ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকা মহাদেশ কেইখনৰ কোনো কোনো পৰিবেশত কেইবাটাও উল্ফ নামৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। তাৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ টিৱাৰ উল্ফ, হোৱাইট্ উল্ফ আদি প্ৰাণীৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। আচলতে কল্প, জেকল আদি প্ৰাণীকো বনৰীয়া কুকুৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ শাৰীতে স্থান দিব পৰা যায়। আগি এইবোৰ প্ৰাণীক খাউকতে শিয়াল বুলি কৈ থব পাৰো। আফ্ৰিকা মহাদেশত বাস কৰা হাণ্টিং দগ্ নামৰ প্ৰাণী বিধো কুকুৰ জাতীয় জন্তুৰে অন্যতম প্ৰতিনিধি। এই ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাত বাস কৰা কায়তা নামৰ প্ৰাণী বিধৰ চেহেৰা পাতিলৈ মনত পৰে। আফ্ৰিকাৰ হাণ্টিং দগ্ আৰু আমেৰিকাৰ কায়তা নামৰ প্ৰাণী দুবিধৰ গাত আমাৰ বাং কুকুৰবিলাকৰ চৰিত্ৰ প্ৰতিফলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আকৰ্ষণ্য ভাৱে মিলি-জুলি চিকাৰৰ জন্তক লোভাজন কৰাত ইহঁতে বাং কুকুৰৰ অসীম পাবলক্ষিতা প্ৰদৰ্শন কৰে। এই সন্মিলনে অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশখনত বাস কৰা ডিকো নামৰ বনৰীয়া কুকুৰ বিলাকৰ কথা উল্লেখ নকৰি নোৱাৰি। ডিকো জাতীয় জন্তুবোৰ দেখাত আমাৰ দেশৰ দেশী কুকুৰৰ দৰেই লাগে। হাবি-বননিত বাস কৰা প্ৰাণী হলেও ব্যৱহাৰ পাতিলে ইহঁতে দেশী কুকুৰৰ চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়।



পোৰালিৰে সৈতে এজনী বাং-কুৰ

এতিয়া বাং কুৰ জাতীয় গ্ৰাণীৰ বিষয়ে অলপ বহল ভাৱে আলোচনা কৰা যাওক। আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে আঞ্চলিক ভিত্তিত বাংকুৰ জাতীয় গ্ৰাণীৰ গাঁৱ নোমৰ বৰণৰ গভীৰতাত তাৰতম্য থকা দেখা যায়। গভীৰ অৱণ্যভূমি বিলাকত বাল কৰা বাংকুৰবোৰে নাভে সন্মুখে মুকলি সুবীয়া ঠাইবোৰলৈ ওলাই আহি চিকাৰ উল-

উপযোগী জঙ্ঘৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰেহি। সিহঁততকৈ বনবান হিংসাকুৰীয়া প্ৰাণীয়ে কিম্বা নানুহে যাতে সিহঁতৰ কোনো হানিবিধিনিষট্টাৰ নোৱাৰে তাৰ বাবে সিহঁত সকলো সময়তে সতৰ্ক হৈ থাকে। হাবি-বননি বিলাকত পৰিয়াল অনুযায়ী একেলগে বাস কৰি ইহঁতে চিকাৰ কৰিবলগীয়া তৃণভোজী প্ৰাণীৰ সন্ধানত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে। এনেবোৰ অনুকূল পৰিবেশত থাকিলে ইহঁতৰ মৰণ নাই। অটব্য হাবিৰ ওখ চাপৰ গছ গছনিবোৰে জন্তুবোৰক প্ৰখৰ ব'দৰ উদ্ভাপৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। নদীনলা বিলাকত গোট খাই থকা পানী খাই ইহঁতে পিয়াহ নিবাৰণ কৰে। চিকাৰৰ জন্তুক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে একো একোটা পৰিয়ালৰ কেবাটাও জন্তু ঠায়ে ঠায়ে পেট পেলাই পৰি থাকে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা একাধিক পৰিয়ালৰ ভালেমান কেইটা জন্তু লগ লাগি একো একোটা চিকাৰীৰ দল গঠিত হয়। বাং কুকুৰৰ চিকাৰ পদ্ধতি অতি চমকুপ্ৰদ।

বাঘৰ নিচিনাকৈ গাইগুটীয়া ভাৱে ইহঁতে চিকাৰ নকৰে। একোটা পৰিয়ালত অস্তিত্বক হৈ থকা কেইবাটাও জন্তু লগ লাগি ইহঁতে চিকাৰ অভিযানত আগ বাঢ়ে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা একাধিক পৰিয়ালৰ জন্তু লগ লাগিও একো একোটা চিকাৰী দলৰ সৃষ্টি হয়। হৰিণ আদি অলপ ডাঙৰ আকাৰৰ জন্তু চিকাৰ কৰিব লগীয়া হ'লে ইহঁত গোটেই জাকে একগোট বান্ধি কামত আগ বাঢ়ে। এই চাৰিত্ৰিক গুণৰ অধিকাৰী হোৱাৰ বাবে এইবিধ হিংসাকুৰীয়া বন্য-প্ৰাণীক সমাজ সচেতন প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰিব লাগিব। একো একো ভোখৰ ঠাইত একেলগে কেইবাটাও জন্তু গোট খাই ইহঁতে চিকাৰৰ প্ৰাণীক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে খাপ পাতি বৈ থাকে। কোনো এটা হৰিণ বা হৰিণৰ জাক ওচৰেদি যোৱাৰ উমান পালেই ইহঁতে পাছ লয়। জন্তু কেইটাই তেতিয়া ভাগ ভাগ হৈ তাৰে এটা হৰিণক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হয়। কেইটামান বাং কুকুৰে জন্তটোক পাছ ফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে। আন কেইটামানে অলপ আগলৈ গৈ খাপ পাতি বয়গৈ। পাছত থকা বাং কুকুৰ কেইটাই তাক আক্ৰমণ কৰি পাছ ফালৰ পৰা কামুৰিবলৈ ধৰে। আগত খাপ পাতি বৈ থকা কুকুৰ কেইটাই দৌৰ দি পলাব খোজা জন্তটোক আগ ফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰে। এইদৰে অগাপিছাকৈ খেদি নিয়া জন্তটো পাছত অৱশ্যে হৈ দৌৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে। তেতিয়া গোটেই জাক বাং কুকুৰে তাৰ ওপৰত জপিয়াই পৰি কামুৰি তাৰ প্ৰাণবায়ু বাহিৰ কৰি দিয়ে।

চিকাৰ কৰি মৰা জন্তটোক বাং কুকুৰ কেইটাই সিহঁতৰ চোকা দাঁতৰে কামুৰি কামুৰি খাই শেষ কৰি পেলায়। আমোদজনক হ'লেও বাং কুকুৰে কামুৰি কামুৰি চিকাৰৰ জন্তটো নিৰ্মম ভাৱে মাৰি পেলোৱা কাহিনী অতি মৰ্মস্পৰ্শক বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰাণী জগতত এনে কাহিনী অন্যান্য জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বনাঞ্চল বিলাকত বাস কৰা হান্টিং দগ নামৰ কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বিলাকেও চিকাৰ কৰাৰ সময়ত ঠিক এনে ধৰণৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়। তদুপৰি আমে-ৰিকা মহাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা “কায়তা” নামৰ কুকুৰ ফৈদৰ বন্যপ্ৰাণী এবিধেও এনে পদ্ধতিত চিকাৰৰ জন্তুবোৰ মাৰি মাৰি খায়।

আকাৰত আমাৰ দেশত বাস কৰা বাং কুকুৰ বিনাকক ডাঙৰ আকাৰৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব নোৱাৰি। শিয়ান বিনাকতকৈ ই আকাৰত অলপ সৰু। কাশ্মীৰৰ ফালে বাস কৰা বাং কুকুৰ বিনাকে আমাৰ এই ফালৰ বাং কুকুৰবোৰৰ দৰে হৰিণ জাতীয় প্ৰাণী মাৰি খাবলৈ বিচাৰি নাপায়। সেই বাবে সেইবোৰ ঠাইত বাস কৰা বাং কুকুৰ বিনাকে এণ্টেলোপ, বনৰীয়া ছাগলী, হিমালয়ৰ খাব, আইবেক্স আদি প্ৰাণীক চিকাৰ কৰি কৰি খাই পেট পূৰ্ত্তাৰ লগীয়া হয়। ঠাই অনুযায়ী বনৰীয়া ম'হ, গৌণ বা মেঠোন আদি ডাঙৰ আকাৰৰ বলবান জাগোৱাৰ দুই এটাৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিবলৈও বাং কুকুৰবিনাকে পাছ নোহোঁহকে। এনে জন্তুক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইহঁতৰ জাকটোত যথেষ্ট সংখ্যক বাং কুকুৰ খান্দি লাগিব। অগাধাই নিজেই বিপদ চপাই লৈ দুই এটা বাং কুকুৰে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লগীয়া হয়। এনে ক্ষেত্ৰত জাকৰ মাজত মোমাই মাকৰ লগত চৰি ফুৰা পোৱালিবোৰৰ ওপৰত বাং কুকুৰৰ পানচোৱে চকু বাধে। পোৱালি দুই এটাৰ জুৰি মাজৰ পৰা আঁতৰাই আনিব পাৰিলেই সকলো কথান নেঠা মৰে। পিছে এই কাম সিমান সহজ বুলি ক'ব নোৱাৰি। কাৰণ ক্ষক বাপেকবোৰে সকলো সময়ত নিদ্রা পোৱালিবোৰক শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাখিবৰ বাবে সজাগ হৈ থাকে। চতুৰ বাং কুকুৰৰ জাকটোৱে কায়দা কৰি বনৰীয়া ম'হৰ পালৰ মাজৰ পৰা কেতিয়াবা দুই এটা পোৱালিক আঁতৰাই নিয়াত কৃতকাৰ্য্য হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মহা পৰাক্ৰমী বনৰজা বাঘ, গাহৰু-কুটুকী বাঘ, ভালুক আদি প্ৰাণীকো বাং কুকুৰে খেদা-খেদি কৰিবলৈ উদ্যত হয়। অৱশ্যে বেমাৰী কিম্বা বুঢ়া বয়সীয়া প্ৰাণী নহ'লে এনে জাতৰ স্বাস্থ্যবান প্ৰাণীক আক্ৰমণ কৰি বাং কুকুৰে নিজৰ বিপদ নিজেই চপাই নলয়।

বাং কুকুৰৰ পাৰিবাৰিক জীৱন অন্যান্য বনৰীয়া কুকুৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিনাকৰ পাৰিবাৰিক জীৱনতকৈ পৃথক হোৱা দেখা নাযায়। পোৱালি কেইটাবানৰে সৈতে এহাল মতা মাইকী বাং কুকুৰে একোখন সংসাৰৰ পাতিনি মেলে। পিছে মতা আৰু মাইকী বাং কুকুৰ হালে চিৰ জীৱনৰ লগৰী একেবাৰতে বাচি লয়নে কিম্বা ইহঁতৰ ভিতৰত এৰা এৰি হৈ প্ৰত্যেকে পৰৱৰ্তী বছৰত নতুন সংসাৰ পাতিব লগীয়া হয় তাক স্পষ্ট ভাৱে জনা নাযায়। সি যিয়েইকি নহওক এটা কথা সত্য যে একোজনী মাইকী বাং কুকুৰে এবাৰত কেবাটাও পোৱালি জগায়। দ চানেকীয়া ঠাই বা গাঁওৰ ভিতৰত তাই পোৱালি জগায়। পোনেই জগোতে পোৱালিবোৰৰ চকু কেইটা মুদ খাই থাকে। মাকৰ পিয়াহৰ গাখীৰ খাই অলপ টনকিয়াল হ'লে ইহঁতে ইফালে সিফালে ফুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। পাছত ডাঙৰ হ'লে সিহঁতে মাক বাপেকৰ লগত চিকাৰ অভিযানত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে।

শিয়াল

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাখাৰী

গোত্ৰ---কেনিডি


প্ৰজাতি---কেনিচ্ আওৰাচ্

আমাৰ গাঁৱে-ভূঞা আৰু নগৰ চহৰৰ কাষে পাজৰে বাগি দি বাগি দি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা শিয়াল নামৰ বন্যপ্ৰাণীৰ লগত আমাৰ মানুহক নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। এইবিশ্ব প্ৰাণীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা দুটো প্ৰকৃতিৰ কাৰ্যকলাপৰ লগতো আমাৰ কাকো চিনাকি কৰি দিব নালাগে। গধূলিৰ মূনি-চুনি বেলিকা, গভীৰ নিশাৰ কোনোবা এটা নিৰ্জন মুহূৰ্তত অথবা ৰাতি পুৱাৰ ডোকমোকালিৰ সময়খিনিত এটা শিয়ালে কোনোবা এঠাইত ওপৰলৈ মুখখন কৰি চিঞৰা “হোৱা” “হোৱা” শব্দ কোৱোৱা ঠহৰ ঠহৰকৈ আমাৰ কাণত বাজেহি। লগে লগে ওচৰে পাজৰে বিচৰণ কৰি ফুৰা আনবোৰ শিয়ালে একে লগে “হোৱা” “হোৱা” শব্দ কৰি কোঁহাল লগায়। ঘৰচীয়া কুকুৰ বিলাকেও একেলগে সিহঁতৰ লগতে পাৰে মানে ডুকিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এইদৰে বাওচালি লগাই এক ছলস্থল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে।

এইবিশ্ব বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ চাৰিত্ৰিক গুণাৱলীত বহুতো আশ্চৰ্যজনক কথা লুকাই আছে। খাওঁতে ফুৰোঁতে দিনে-নিশাই লগ পোৱা বিশ্বৰ বন্য-প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ আলৌকিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি আমি অকণো লক্ষ্য নাৰাখো। ইয়াক গভীৰভাৱে জানিবলৈও চেষ্টা নকৰো। আমাৰ হাঁহ কুকুৰাবোৰ ধৰি মহা পয়মানৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰকৃতিৰ এবিধ অলাগতিয়াল প্ৰাণী বুলি ইয়াক আমি সকলো সময়তে অৱজ্ঞা কৰোঁ। কুকুৰ লগাই দি তাক দূৰত খেদি টপ আহোঁগৈ। পিছে ইয়াকো কম বিশ্বৰ প্ৰাণী বুলি ক’ব নোৱাৰি। খেদি নিয়া কুকুৰ আৰু মানুহৰ চকুত বালি মাৰি ই ঠাইতে ঘূৰি জোপোহা গছৰ আঁত লুকাই থাকেগৈ আৰু শত্ৰু আঁতৰি গ’লে পুনৰ সেই ঠাইৰ পৰা ওলাই আহেগৈ ঠাইতে পোনোকা মাৰি অত্যাধিক হয়। তাৰ এই প্ৰবন্ধনা মূলক জিন্মা কৌশল সচাটকৈ চম্ভৱ। এইবিশ্ব প্ৰাণীৰ গাত এনে ধৰণৰ চালাক চতুৰ গুণ বিকশিত হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ মানুহে পশু বিলাকৰ মাজত ইয়াক ধূৰ্ত বুলি কয়।

ইউৰোপ মহাদেশৰ তুঙ্গা অঞ্চল আৰু আমেৰিকাৰ উত্তৰে থকা বৰফাচ্ছন্ন ঠাইবোৰত যিবিধ “উল্ফ” জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰে সেই বিধ জ্ঞানোৱাৰৰ গাৰ নোমবোৰৰ বৰণ বগলী পাখিৰ দৰে চো চোটকৈ বগা হয়। সিহঁতক “হোৱাইট উল্ফ” বা বগা কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ বোলে। তাৰে কিছুমান প্ৰাণীৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ মুগা হয়। সেই মুগা বৰণৰ নোমৰ মাজে মাজে ক’লা চানেকীয়া নোমৰ আৱিৰ্ভাৱ হয়। এই জন্তুবিলাকক সমূহীয়া ভাৱে “টিয়াৰ উল্ফ” নামেৰে অভিহিত কৰা হয়।

যিবিলাক কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী উত্তৰ মেৰুৰ বৰফাচ্ছন্ন ঠাইবোৰত বাস কৰে সেইবিলাকৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাক দীঘল হয়। সিহঁতৰ নেজডাল জোপোহা হয়। এই শাৰীৰিক গুণ “টিয়াৰ উল্ফ” জাতীয় প্ৰাণীবোৰৰ গাতো বিকশিত হোৱা দেখা যায়। ইউৰোপ মহাদেশখনৰ উত্তৰৰ ফালে থকা অঞ্চলবিলাকত বাস কৰা কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ বা “উল্ফ” বিলাকক “ইউৰোপীয়ান উল্ফ” অৰ্থাৎ ইউৰোপীয় কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ বুলি কোৱা হয়। ছাইবেৰীয়াৰ ফালে বাস কৰা কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ বিলাকক “টুঙ্গা উল্ফ” নামেৰে জনা যায়।



কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ

ভাৰত উপমহাদেশখনত যিবিলাক কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ বাস কৰে সিহঁত আটাই-বোৰকে ধাউকতে “ইণ্ডিয়ান উল্ফ” বা ভাৰতবৰ্ষীয় কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰে এটা উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল বিলাকত বাস কৰে। এইবিধ প্ৰাণীক “পেইল কুচেড্ উল্ফ” নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ ঠেঙত গজা নোমবোৰৰ

নবৰণ অলপ শেঁতা ধৰণৰ হোৱাৰ বাবে এইবিধ কুকুৰ--নেচীয়া বাঘক “পেইল ফুটেড উলফ” বোলা হয়। আমেৰিকাত “গ্ৰেইবী উলফ” নামেৰে এবিধ প্ৰাণী আছে। এইবিধ প্ৰাণীকে কামড়া বুলিও কোৱা হয়। অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশত বাস কৰা ডিঙ্গে নামৰ কুকুৰ পোষ্টাইদ বন্যপ্ৰাণী নিৰাকো কোনো কোনো পণ্ডিতে উলফৰে অন্যতম জাত বুলি ক’ব খোজে।

সামান্যপ্ৰাণী প্ৰাণী হিচাপে চিকাৰৰ জানোৱাবোৰৰ ধৰি ধোৱা বিষয়ত এই প্ৰাণী বিলাকে কম-বেছি পৰিমাণে একে প্ৰকৃতিৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়। অষ্ট্ৰেলিয়াত থকা ডিম্বোপিনীকে নেতিয়াৰা ঘৰচীয়া কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। ইহঁতে কেতিয়াবা অগ্ন্যবস্ৰিত ঠাইবোৰত গুলাই আহি মানুহ পেলনীয়া বস্তুবোৰতো মুখ দিয়েহি। ভাৰতবৰ্ষত থকা কুকুৰ-নেচীয়া বাঘবোৰে চিকাৰৰ উপযোগী বৃক্ষ পল্লৱভোজী প্ৰাণীৰ সন্ধানত অগ্নি বনাই ঘূৰি ফুৰে। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰ ফলত পৰা ইহঁতক ব্ৰহ্মণশীল অগ্নী প্ৰাণী বুলি ক’ব পাৰি। দিন দুপৰত আৰু ৰাতি ভাগত ইহঁতে গছৰ ছাঁ কিম্বা পাহাৰৰ পাণ্ডৰ সন্নিহিত-জংগ ঠাইত চেপেটা মানি পৰি থাকি ভিৰণি লয়। ওখ ওখ বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ স্তম্ভত পৰি পৰি থাকিও ইহঁতে ভিৰণিৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। মৰুভূমি অঞ্চলত বাস কৰা এই জাতীয় প্ৰাণী কিছুমান শুকান বালিৰ দৰৰ কাষত পৰি থাকি ব’দৰ প্ৰথম উত্তাপ নিৰাধৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰে। বালি গোট খাই খাই উৎপন্ন হোৱা ফিলাবোৰৰ কাষত সামান্যভাৱে গাঁত খান্দি তাতে পেট পেলাই পনি থাকে।

চিকাৰ আভ্যন্তৰীণ যোৱা বিষয়ত ইহঁতে দিন ৰাতিৰ ভেদাভেদ মানি চলা দেখা নাযায়। যেই কোনো প্ৰহৰতে ইহঁতে চিকাৰৰ জন্তু বিচাৰি অগ্নি বনাই ঘূৰি ফুৰে। চকুৰ আগত অগ্নি যেই কোনো প্ৰাণীকে আক্ৰমণ কৰি বধ কৰে আৰু বধলয়ই খাই দূৰা নিৰাধৰণ কৰে। গাৱঁৰ ওচৰে পাছৰে বাস কৰা কুকুৰ-নেচীয়া বাঘে ঘৰচীয়া জন্তু বিলাককো আক্ৰমণ কৰে। সন্নিহিত পালে মানুহৰ পাছ লয় আৰু অকলশৰীয়াটক হাবিতলীয়া পথেদি অহা যোৱা কৰা মানুহৰ প্ৰাণ বিনাশ কৰিবলৈ কুণ্ঠিত নহয়। হাবিতলীয়া ঠাইবোৰত বাস কৰা কুকুৰ-নেচীয়া বাঘবিলাকে সাধাৰণতে কানীয়া জন্তুৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। ইহঁতে চিকাৰ কৰি থকা বনৰীয়া জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত ৰাজস্থানৰ ফালে বাস কৰা কৃষ্ণাৰ, চিন্কাৰা আৰু গেজেল নামৰ তৃণ-ভোজী প্ৰাণী কেইবিধমানো পৰে।

মৰুভূমি অঞ্চলবিলাকৰ আশে পাশে নিম্ন মান চুটি চাপৰ গছ-গছনিযুক্ত ঠাই থাকে কৃষ্ণাৰ, চিন্কাৰা আদি জন্তু বিলাকে মৰুদ্যানৰ পৰিৱেশত অগ্নি ল’বলৈ গোট খায়হি। ওচৰতে খাপ পাতি বৈ থকা কুকুৰ-নেচীয়া জন্তুবোৰৰ দৃষ্টি এটাক আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণ বিনাশ কৰে। নেলতে কামোৰ মাৰ ধৰা তাৰ পৰা বিৰিঙি ওলোৱা তেজ শুহি শুহি খায়। অৱশেষত টানি আজুৰি তাৰ মাংস-খিনি খাই শেষ কৰি দিয়ে। মৰুভূমি অঞ্চলত বাস কৰা এবিধ শহাপছ ইহঁতে ধৰি ধৰি খায়।

সাধাৰণতে খৰালি মহীয়া এইবিধ প্ৰাণীয়ে পোৱালি জগায়। এবাৰত কেইবাটাও পোৱালি জগে। যিবোৰ কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ কাশ্মীৰৰ গিচিা ঠাণ্ডা ঠাইত বাস কৰে সেইবোৰে চ’ত বহাগ মাহতহে পোৱালি জগায়।

কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী

গোত্ৰ—কেনিডি

প্ৰজাতি—কেনিচ লুপাচ

কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ বা উলফ নামেৰে জনাজাত বন্যজন্তু দিখ কুকুৰ পৰিয়ালৰ প্ৰাণী। অসমৰ কোনো ঠাইতে এইবিধ প্ৰাণী বনৰীয়া অৱস্থাত বাস কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অতীজতে এইবিধ প্ৰাণী আনাব ইয়াত বাস কৰি আছিলগৈ নাই সেই কথাও স্পষ্টভাৱে জনা নাযায়। কিন্তু তথ্যমাত্ৰ ভাষাত কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ শব্দ কেইটা প্ৰচলন হৈ থকা কথালৈ চাই ক'বপাৰি যে এইবিধ জন্তু আমাৰ হাবি বননি বিনাকত এসময়ত বাস কৰিছিল। পৰিতাপৰ বিষয় যে এতিয়া আমাৰ ইয়াত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী দেখি পাবলৈ নাইকিয়া হৈ পৰিল। সেই বাবে ক'ব পৰা যায় যে আগি এইবিধ প্ৰাণী চিৰ-দিনৰ বাবে হেৰুৱালো। হিংসাকুৰীয়া আৰু মাংসাহাৰী জানোৱাৰ হোৱাৰ বাবে আমাৰ মানুহে বন বাহ কৰিয়েই হয়তো ইয়াৰ বংশ নিৰ্মূল কৰিলে। অসমৰ বাহিৰে পূৰ্বাঞ্চলত থকা অসমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য কেইখনতো এইবিধ প্ৰাণী এতিয়ালৈকে বতি আছেগৈ বুলি ক'ব নোৱাৰি। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য কেইবাখনো ৰাজ্যত এইবিধ প্ৰাণী থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। পৃথিৱীৰ অন্যান্য ঠাইত কুকুৰ-নেচীয়া বাঘক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কেইবা বিধৰো প্ৰাণী আছে। আমেৰিকাৰ উত্তৰ অঞ্চলত যিবোৰ কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ আছে সিহঁতক খাউকতে “টিঘাৰ উলফ” বুলি কোৱা হয়।

ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমৰ ফালে থকা ৰাজ্য কেইখন মানে কুকুৰ-নেচীয়া বাঘৰ সচৰাচৰ বসতি স্থান নিৰ্ণয় কৰিছে। উত্তৰ-পশ্চিমৰ ফালে থকা পৰ্বতীয়া ৰাজ্য কাশ্মীৰৰ নাম এই সম্পৰ্কত বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। এইখন পাৰ্বত্য ৰাজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজস্থানৰ মাজেদি দক্ষিণাত্যালৈকে যি বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগ আছে সেই ভূ-ভাগৰ ঠায়ে ঠায়ে অৱস্থিত কোনো কোনো হাবি বননিত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বিক্ষিপ্ত ভাৱে বাস কৰে। হিন্দী ভাষাত এইবিধ প্ৰাণীক নেক্ৰা বুলি কয়। পশ্চিমৰ ফালে থকা অন্যান্য ভাষাভাষী মানুহে ইয়াক বিভিন্ন নামেৰে চিনাক্তকৰণ কৰে।

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান এচিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ বহুতো ঠাইলৈ প্ৰসাৰিত হৈছে। আন কি আমেৰিকাৰ উত্তৰ অঞ্চলত উলফ জাতীয় প্ৰাণী কিছুমানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এচিয়া আৰু

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত আপোন মনেৰে বাস কৰা এই জাতীয় শিয়ালবোৰৰ নোমবোৰ সাধাৰণতে বগচীয়াটক মুগা হয়। ঠাই অনুযায়ী বাস কৰা শিয়ালৰ নোমবোৰৰ বৰণৰ গভীৰতাত কম-বেছি পৰিমাণে বিভিন্নতাৰ ভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। আমাৰ অসমৰ জনবায়ুয়ে যিবিলাক শিয়াল জাতীয় প্ৰাণী ধাৰণ কৰে সেইবিলাক শিয়ালৰ নোমৰ বং ধোৱাঁ বৰণীয়াটক মুগা হয় আৰু তাৰ মাজে মাজে দুই এডাল ক’লা বৰণীয়া



শিয়াল

বোৰ বিহলি হৈ থাকে। ভাৰতৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি এইবিধ প্ৰাণীয়ে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলঙ্কাতো বাস কৰে। দক্ষিণ ইউৰোপ আৰু দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ অন্যান্য বহুতো দেশলৈ এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান বিক্ৰিপ্ত ভাৱে বিস্তাৰিত হৈ আছে। ব্ৰহ্মদেশ, থাইলেণ্ড আদিতো এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰে। হিমালয় শৈলমালাৰ বুকুত এইবিধ প্ৰাণীয়ে প্ৰায় ৪০০০ মিটাৰ উচ্চতালৈ আৰোহণ কৰি তেনে-

বোৰ ঠাইতো কৃতকাৰ্য্যতাৰে বসতি কৰে। সাধাৰণতে এই পৰ্বতমালাৰ যিবোৰ ঠাই ১৩০০ মিটাৰ মানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৫০০ মিটাৰ উচ্চতাত থাকে তেনেবোৰ ঠাইতেই এইবিধ প্ৰাণীয়ে বাস কৰিবলৈ ভাল পায়। স্বাস্থ্য-নিবাস বিনাকৰ আশে-পাশে থকা ঠাইবোৰ ইহঁতে পছন্দ কৰে।

শিয়ালবোৰক সাধাৰণতে নিশাচৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। গধূলি হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে আহাৰ বিচাৰি বাহিৰলৈ ওলায় আৰু গোটেই নিশা আহাৰৰ সন্ধানত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে। দিনৰ দিনটো ওখ ওখ বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ মাজত অথবা গছৰ ওলাই থকা শিপা আৰু চেপেটা পাখৰৰ চাকনিৰ তলত সোমাই থাকে। পোৱালি জগোৱা মাইকী শিয়ালে পোৱালিৰে সৈতে গাঁতৰ ভিতৰতে সোমাই থাকি সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। মাকজনীয়ে গাঁতৰ ভিতৰলৈকে খোৱা বস্তুনোদ কঢ়িয়াই নি নি পোৱালি মখাক খুৱাইগৈ। অলপ ডাঙৰ হৈ টনকিয়াল নোহোৱা পৰ্যন্ত পোৱালি কেইটাই গাঁতৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে। অলপ ডাঙৰ হ'লে সিহঁতে লাহেকৈ গাঁতৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু ইফালে সিফালে পুলঙা-পুলুঙি কৰি চাই সুন্দৰ পৃথিবীখনৰ লগত চিনাকি হৈ ল'বলৈ যত্ন কৰে। আনন্দ ভাৱত তেতিয়া সিহঁত আত্মহাৰা হৈ পৰে। ইটোৱে সিটোৱে খেল ধেমালি কৰে আৰু মাকজনীক টনা-আঁজুৱা কৰি নঙৰ শান্তি কৰে। ধেমালিৰ ছলতে তেতিয়া মাকজনীয়ে সিহঁতক নানা শিক্ষা দি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ উপযোগী কৰে। ডাৱৰীয়া বতৰত শিয়ালে দিন-দুপৰতে বাহিৰলৈ ওলাই আহি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে আৰু খাদ্যৰ উপযোগী বস্তু বিচাৰি খুচাৰি লয়। ইয়াক সাধাৰণতে গাইগুটীয়া ভাৱে পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰা অৱস্থাত লগ পোৱা যায়। কেবাটাও শিয়াল একে ডোখৰ ঠাইতে একে সময়তে বাস কৰিলেও বাং কুকুৰৰ দৰে সিহঁতে একে ঠাইতে ধূপ খাই নাথাকে। একেটা পৰিয়ালৰ প্ৰাণী হলে সিহঁতৰ ভিতৰত সংযোগ ব্যৱস্থা অৱশ্যে অলপ কটকটীয়া হয়। অলপ ওচৰত থকা কিম্বা ভালেখিনি নিলগত ঘূৰাঘূৰি কৰি ফুৰা প্ৰাণীবোৰে কিবা প্ৰকাৰে সিহঁতৰ স্জাতিবৰ্গ অলপ ওচৰতে থকাৰ উমান পায়। সেয়ে নহ'লে এটা শিয়ালে "হোৱা" দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ওচৰে পাজৰে বিচৰণ কৰি ফুৰা শিয়ালবোৰে "হোৱা হোৱা" হৰ্ষ ধ্বনিৰে একে সময়তে যোগদান দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন।

শিয়ালে নিজতকৈ ডাঙৰ বিষৰ প্ৰাণীক চিকাক কৰি মাৰিবৰ বাবে যত্ন কৰা দেখা নাযায়। কেইবাটাও জন্তু লগ লাগি জাকৰুৱা ভাৱে কোনো প্ৰাণীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথাও এইবিধ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত জনা নাযায়। শহাপহু, ভেকুলী, নিগনি আদিৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণী খায়েই ইহঁতে জীৱন ধাৰণ কৰে। কীট-পতঙ্গ আদি নিম্ন খাপৰ জীৱবোৰ ধৰি ধৰিও ইহঁতে খায়। কাউৰী, শগুণৰ লগতে মৰি থকা জন্তুৰ মাংস বোৰ টানি আঁজুৰি খাবলৈ ইহঁতে ভাল পায়। গেলা-পচা মাংস আদিতো ইহঁতে সমানে অভিকৃচি দেখুৱায়। এই ক্ষেত্ৰত এইবিধ প্ৰাণীকো "স্কেভেজাৰ" বা চাফাই কৰা কামত অৰিহণা যোগোৱা অন্যতম প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰ ফালৰ পৰা বিবেচনা কৰি চালে শিয়াল জাতীয় প্ৰাণীক পৰম উপকাৰী জন্তু

বুলি ৰবি ন'ব পাৰি। তদুপৰি কীট-পতঙ্গ আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেচু-কুমটি পৰ্যন্ত অতি নিম্নস্তৰৰ জীৱজগতৰ কিছুমানক ভক্ষণ কৰি এইবিধ প্ৰাণীয়ে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যতা বঁকা কৰাত সহায় কৰে।

অকলশৰীয়া ভাৱে অনাই বনাই বুলি ফুৰোঁতে কিবা কাৰণত ভয় খাই এইবিধ প্ৰাণীয়ে কেতিয়াবা উচাপ খাই উঠে। ভয়ত আতঙ্ক হৈ হৈ তেতিয়া এক প্ৰকাৰৰ বিকট শব্দ মাতে। এই শব্দক “ফেউ ফেউ” বুলি কোৱা হয়। এই অৱস্থাত আমাৰ মানুহে শিয়ালক শিয়াল বুলি নতৈ ফেকুৱা বা ফেউবা বুলি কয়। সেয়েহে আমাৰ মানুহে ফেকুৱাক চিনাকি কৰি দিয়াৰ অভিপ্ৰায়েৰে “বাঘেই বনৰ ৰজা আৰু শিয়ালেই ফেকুৱা” বুলি এটা নীতি বচন মাতে। মল-তাগ কৰাৰ সময়ত কষ্ট হ'লেও শিয়ালে “ফেউ” “ফেউ” শব্দ উচ্চাৰণ কৰিবলগীয়া হয় বুলি বহুতে অনুমান কৰে। বাঘ, নাহৰ-কুটুকী বাঘ আদি মহা-পৰাক্ৰমী হিংসাকুৰীয়া জন্তুৰ লগত ডেটাডেট হ'ব লগীয়া হ'লেও শিয়ালে ভয়তে “ফেউ ফেউ” শব্দ উচ্চাৰণ কৰে। এই বিষয়ত এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে শিয়ালে উচ্চাৰণ কৰা “হোৱা হোৱা” শব্দৰ দৰে ফেকুৱাই একে সময়তে একেলগে ফেউ ফেউ শব্দ উচ্চাৰণ কৰি ছলছল পৰিবেশৰ সৃষ্টি নকৰে। সাধাৰণতে এটা ফেকুৱাই আৰু অতি বেছি দুটাই একে সময়তে “ফেউ ফেউ” কৰি চিঞৰা শুনিবলৈ পোৱা যায়।

হাৰিতলীয়া মানুহে ফেকুৱাই চিঞৰিলে ক'বাত বাঘ ওলাইছে বুলি ভাবে। বাঘৰ বুৰৰ পৰা বি দুৰ্গন্ধ বাহিৰ হয় সেই দুৰ্গন্ধইও শিয়ালক বিবুদ্ধিত পেলায়। ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘৰ গৌৰৱণ আৰু নাহৰ-কুটুকী বাঘৰ হোকোৰ হোকোৰ শব্দ শুনিবলৈ পালেতো কোনো কথাই নাই। তেতিয়া ভয়ত বিহ্বল হোৱা শিয়ালে ফেউ ফেউ কৰি টেটু কালি চিঞৰি চিঞৰি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। নিৰাপদ ঠাইত গৈ পোৱাৰ উশান পালেহে ধৰক বৈ উলাটি চাবলৈ সাহস কৰে। গাঁৱৰ ভিতৰলৈকে ঢেঁকীয়া-পতীয়া অথবা নাহৰ-কুটুকী বাঘ অহাটো অসম্ভৱ কথা বুলি বিবেচনা কৰিব লাগিব। কাৰণ হাৰিৰ মাজত ধকা পহু আদি বনৰীয়া জন্তু সত্বেই বিচাৰি নাপালেহে পেটৰ তাড়নাত এই দুবিধ হিংসুক প্ৰাণীয়ে গাঁৱৰ ভিতৰত লোমায়হি। গোহালিত বান্ধি থোৱা গৰু, ছাগলী আৰু পথাৰত চৰি কুৰা উলঙীয়া গৰু বা ছাগলী ধৰিবলৈ ইহঁতে জোপ লয়হি। সাধাৰণতে এনে কাম নাহৰ-কুটুকী জাতৰ বাঘেহে কৰা দেখা যায়। কিয়নো জনবসতিৰ কাষে পাৰ্শ্বৰে ধকা অলপীয়া হাৰিত বাস কৰিবলৈ লোৱাটো এইবিধ বাঘৰ সাধাৰণ নিয়ম। ধাপ মাৰি গৰুম ডেমহুৱা পোৱালি বা ছাগলী এটা ৰবি নিব পাৰিলে সিহঁতৰ চাউল কঠা দিনটোতলৈ মুকলি হয়। পিছে গাঁৱৰ মানুহে এইবিলাক হিংসাকুৰীয়া প্ৰাণীক গাঁৱৰ মাজৰ পৰা বাহিৰ কৰি খেদি দিবলৈ অভিনৱ উপায় অৱলম্বন কৰে। দুই এটা সাহসী ডেকা-ল'ৰাই পদুলিৰুৱলৈ ওলাই আহি উকি মাৰি মাৰি চিঞৰে আৰু “বাঘ ওলাইছে ও বাঘ ওলাইছে ও” বুলি চিঞৰি গাঁৱৰ সকলো মানুহক সতৰ্ক-বানী ওলাই দিয়ে। সিহঁতে ঢোল, পেপা, শিঙা আদি বজাই বাধক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে। তেতিয়া বাঘে উৰাতু খাই হাবিলৈ পলাই গুচি যায়গৈ।

কুকুৰ পৰিয়ালত যিমান বিলাক প্ৰাণী অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেই আটাইবিলাকক লগ লগাই দুটা মূল ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰে প্ৰথম ভাগত শিয়াল বিলাক পৰে। কুকুৰ-নেচীয়া বাঘ নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীবিলাকো এই ভাগতে পৰে। দ্বিতীয় ভাগত “ফক্স” নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীবিলাক পৰে। আমাৰ ভাষাত “জেকল” আৰু “ফক্স” নামেৰে জনাজাত আটাইবিলাক প্ৰাণীক বুজাবলৈ খাউকতে শিয়াল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হ’লেও আচলতে “জেকল” আৰু “ফক্স” নামেৰে অভিহিত কৰা প্ৰাণী বিলাকৰ শাৰীৰিক গঠনত অলপ পাৰ্থক্য আছে। জেকল জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ কপালখন তুলনামূলক ভাৱে উঠঙা হয়। এই উঠঙা কপালৰ ভিতৰত থকা হাড়ৰ মাজত এয়াৰ চেক নামেৰে জনাজাত এবিধ বতাহ সোমাই থকা মৌচাকৰ নিচিনা পদাৰ্থ থাকে। “ফক্স” জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ কপালখন তেনে ধৰণৰ উঠঙা হোৱা দেখা নাযায়। তদুপৰি সিহঁতৰ কপালত এয়াৰ চেকৰ নিচিনা বায়ুকোষ নাথাকে।

এই দুয়ো প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীৰ এটা উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য হ’ল এয়ে যে ইহঁতৰ এবিধেও গছৰ ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰে। তদুপৰি পানীৰ তলতো ইহঁতৰ এবিধেও বহুত পৰিলৈ ডুব মাৰি থাকিব নোৱাৰে। ইহঁতৰ ঠেং কেইখন দৌৰি যোৱা কামৰ বাবেহে উপযুক্ত। ঠেঙৰ হাতোৰাৰ নখবোৰ ইহঁতে মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে জপাব মেলিব নোৱাৰে। আচলতে এইবিলাক প্ৰাণীয়ে ঠেঙৰ পতাৰ আগ ভাগত উৎপত্তি হোৱা আঙুলি কেইটাত ভেজা দি দি খোজ কঢ়ে। সেই কাৰণে মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বিলাকৰ দৰে ইহঁতকে ডিভিটিগ্ৰেট বা আঙুলিৰে খোজ কঢ়া প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰৰ দৰে ইহঁতে চিকাৰৰ জন্তু হাতোৰাৰে খামোচ মাৰি ধৰিবও নোৱাৰে। এই কামৰ বাবে ইহঁতে চোকা বিধৰ দীঘল দীঘল আগদাঁত কেইটাকে ব্যৱহাৰ কৰে।



ৰাম শিয়াল বা খেক্ শিয়াল

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী

গোত্ৰ—কেনিডি.

প্ৰজাতি—ভল্ পেচ্ বেঙ্গলেন্ চিচ্

যিবিধ শিয়াল জাতীয় প্ৰাণীক সাধাৰণতে আমি প্ৰায় সকলোবোৰ ঠাইতে দেখিবলৈ পোওঁ সেইবিধৰ জীৱনালেখ্য ইতিমধ্যে স্থানান্তৰত ডাঙি ধৰা হৈছে। এই প্ৰৱন্ধৰ জৰিয়তে এতিয়া আন এবিধ সৰু আকাৰৰ শিয়ালৰ বৰ্ণনা আগ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। এইবিধ শিয়ালক “ইণ্ডিয়ান ফক্স” নামেৰে জনা যায়। আমাৰ অসমীয়া মানুহে তাকে ৰাম-শিয়াল বা খেকশিয়াল বুলি কয়। “জেকল্” আৰু “ফক্স” এই দুয়োবিধ প্ৰাণী মূলতঃ একে হ'লেও সিহঁতৰ মাজত কিছুমান শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণৰ পাৰ্থক্য থকা দেখা যায়। “জেকল্” বিলাকৰ কপালখন ওখ চানেকীয়া হয় আৰু “ফক্স” জাতীয় প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এই বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত নহয়। ৰামশিয়াল বা খেক্-শিয়াল নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীবিধক ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো ঠাইত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অসমতো এইবিধ প্ৰাণীক পোৱা যায়। কিন্তু অসমৰ বেলিকা ইয়াৰ সচৰাচৰ বাসস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি কেৱল নামনি অসমতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা দেখা যায়। উজনি অসমত এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নামনি অসমত থকা হাবিতলীয়া গাওঁবোৰৰ কাষে পাৰ্শ্বে যিবোৰ পাতলীয়া হাবি আছে সেইবোৰতে ৰামশিয়াল বা খেকশিয়াল নামৰ প্ৰাণীবোৰ বাস কৰে। ইহঁত বৰ চেঙা বিধৰ প্ৰাণী। ঠাইতে আৱিৰ্ভৱ হৈ পিছ মুহূৰ্ততে ক'ববাত লুকাই অন্তৰ্ধান হ'ব পৰাৰ ইহঁতৰ আচৰিত ক্ষমতা আছে। ই অতি খবতকীয়া গতিত দৌৰি যাব পাৰে। অতি দ্ৰুত গতিত বাগি দি গৈ গৈ ই শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীক বিভ্ৰান্ত কৰে। দুবুৰী জিলাত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ উৎপত্তি বেছি। কোক্‌ৰাঝাৰ আৰু আই-ভলী বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত থকা গোৰাং বেজৰ চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু চিলি বেজৰ মানাহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বহুতো ঠাইত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক বিক্ষিপ্ত ভাৱে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কছুগাওঁ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত থকা ৰিপু বনাঞ্চল আৰু কছুগাওঁ বনাঞ্চলতো এইবিধ প্ৰাণীক বিক্ষিপ্ত ভাৱে বাস কৰা দেখা যায়। উত্তৰ পাৰে থকা কোক্‌ৰাঝাৰ জিলাৰ অন্যান্য বনভূমি আৰু শ্ৰেণী-বিহীন হাবি বননি বিলাকতো এইবিধ প্ৰাণীক সেৰেঙা সেৰেঙাকৈ

বাস কৰা দেখা যায়। বৃহদপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা কামৰূপ জিলাৰ বনাঞ্চল কেইখন মানে এইবিধ প্ৰাণীৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ ভিতৰত মানাহ অভয়াৰণ্য তথা ব্যাঘ্ৰ যোজনাৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। অৱশ্যে গভীৰ অৱণ্য ভূমিত সাধাৰণতে এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা নাযায়।

সৰু আকাৰৰ এই শিয়াল জাতীয় প্ৰাণী বিশ্বক ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ বাহিৰে বাংলা দেশ আৰু পাকিস্থানতো বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াক ইংৰাজী ভাষাত “বেঙ্গল ফক্স” বুলি কোৱা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাই কিছুমানলৈ ইয়াৰ বসতিভূমি সম্প্ৰসাৰিত হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক বহল দৃষ্টি ভঙ্গীত “চিলিয়ান ফক্স”



বান-শিয়াল বা খেঁকু-শিয়াল

নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকা মহাদেশত এইবিধ ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ শিয়ালক আন কেইবিধমান সমধৰ্মী প্ৰাণীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। তাৰ ভিতৰত আফ্ৰিকা মহাদেশখনত বাস কৰা “ফেনেক্স ফক্স” আৰু “চিলভাৰ বেৰেড্ ফক্স” নামৰ প্ৰাণী দুবিধৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি।

“ইণ্ডিয়ান ফক্স” বা বানশিয়াল নামৰ প্ৰাণীবিধ আকাৰত তেনেই সৰু হয়। আমাৰ দেশত বাস কৰা নেচেকা একোটাতকৈ ইয়াক কোনো ঙ্গণে ডাঙৰ হোৱা দেখা নাযায়। পিট্ পিটাই দৌৰ দি দি ঘূৰি ফুৰাটো ইয়াৰ স্বাভাৱিক নিয়ম। বৰণত ইয়াৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোনবোৰ নুগা হয়। ইয়াৰ নেজডাল জোপোহা হয় আৰু এই নেজডালৰ

আগৰ ফালে থকা নোমবোৰ বঙা শিয়াল নামৰ আন এবিধ ভাৰতীয় শিয়ালৰ নেজত থকা নোম সোপাৰ দৰে বঙা নহৈ ক'লা চানেকীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক সেইদৰে বঙা শিয়ালৰ আহিত ইয়াৰ গলধনত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰে ক'লা চানেকীয়া বৰণ ধাৰণ কৰা দেখা নাযায়। দেখৰ অন্যান্য অংশত গজা নোমবোৰৰ স্বাভাৱিক বৰণৰ লগত ৰামশিয়ালৰ গলধন আৰু ডিঙিত গজা নোমবোৰৰ বৰণো অধিকল মিলি যায়। ৰাম-শিয়াল আৰু বঙা-শিয়াল নামৰ প্ৰাণী দুবিধৰ দেখত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণত এই ধৰণৰ পাৰ্থক্য থকাৰ বাবে দুয়ো-বিধ প্ৰাণীক অলপ নিলগৰে পৰা চিনি উলিয়াব পৰা যায়। অৱশ্যে ৰাম-শিয়ালতকৈ বঙা-শিয়াল আকাৰত ভাল-খিনি ডাঙৰ হয়। খোজ কাটলতো বঙা-শিয়ালে ৰামশিয়ালৰ দৰে তজ্জ্বৰীয়া বা চকুল প্ৰকৃতিৰ স্বভাৱ প্ৰদৰ্শন নকৰে। উত্তৰ ভাৰতৰ হিমালয় পৰ্বতমালাৰ নামনি ভাগত থকা হাবি বননিবোৰত যিবোৰ ৰামশিয়াল বাস কৰে সিহঁতৰ গাঁত গজা নোমবোৰ জাৰকালি অলপ দীঘল হয়। অৱশ্যে এই বিষয়ত সিহঁতে বঙা-শিয়ালক চেৰ পেলাব নোৱাৰে।

আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে ৰাম-শিয়ালবিলাকে ডাঠ হাবিত বাস কৰিবলৈ ভাল নাপায়। যিবোৰ ঠাইত পাতলীয়া গছ আৰু জোপোহা বিধৰ উদ্ভিদে প্ৰাধান্য লাভ কৰে আৰু য'ত মুকলি মূৰীয়া ঘাঁহনি পথাৰবোৰ থাকে তেনে ধৰণৰ আবাস ভূমি এইবিধ প্ৰাণীয়ে পছন্দ কৰে। এনে ঠাইত থকা নদীৰ পাৰৰ ওখ গৰা বা দ-চানেকীয়া ঠাইত থকা জোপোহা গছৰ ওপৰত বাস কৰিবৰ বাবে এইবিধ প্ৰাণীয়ে একো একোটা গাঁত ৰান্ধি লয়। ৰামশিয়ালক নিশাচৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব লাগিব। দিনৰ দিনটো ইহঁতে গাঁতৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে। কিবা কাৰণত গাঁত ৰান্ধি লোৱাৰ সুবিধা নহ'লে কিম্বা সচৰাচৰ বাস কৰিবলৈ বনাই লোৱা গাঁতটোৰ পৰা কেনেবাকৈ খেদা খালে ই দ চানেকীয়া ঠাই এডোখৰত সুবিধা জনক আওহতীয়া ঠাই বিচাৰি লৈ তাতে মনে মনে পৰি থাকে। গৰখীয়া ল'ৰা কিম্বা হাবিত খৰি লুবিবলৈ সোমোৱা কোনোবা মানুহৰ উমান পালে ই আশ্ৰয় লৈ থকা ঠাইডোখৰৰ পৰা ওলাই আহি ভিৰাই পকাই দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গধূলি পৰত যেতিয়া দিনৰ পোহৰখিনি লাহে লাহে মূৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ঠিক তেতিয়াই এইবিধৰ প্ৰাণীবোৰে লাহেহঁক গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে। প্ৰথমতে গাঁতটোৰ মুখলৈ মূৰ আগভাগ উলিয়াই ইফালে সিফালে পুলুঙা পুলুঙি কৰি চাই লয়। কোনো শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণী ওচৰতে থকাৰ গম পালে লাহেহঁক পোলাক মাৰি পুনৰ গাঁতটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। ওচৰত তেনেকুৱা বিধৰ কোনো প্ৰাণী নাই যেন গম পালেই একে কোবতে গাঁতটোৰ পৰা ওলাই দৌৰি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অলপ দূৰত গৈ থমক্ লাগি বহি পৰে আৰু পুনৰ ইফালে সিফালে লক্ষ্য কৰি বিপদমুক্ত হোৱাৰ বিষয়ে নিচিন্ত হ'বলৈ যত্ন কৰে। তাৰ পাছত খুচু খুচাই খুচু খুচাই ইফালে সিফালে খোৱাৰ উপযোগী বস্তু বিচৰা কামত লাগি যায়।

আই-ভেলী বন-সংৰক্ষণৰ অন্তৰ্গত থকা চিদ্‌লি বেজত বৰ্ভাঙি নামৰ এটা বিট অফিচ (খণ্ড কাৰ্যালয়) আছে। সেই ফালেদি যোৱা গীয়ামূৰীয়া পথটোৱেদি তুটান লৈ বাৰ পাৰি। চিদ্‌লি বেজটো আগতে গোৱালপাৰা-পূব বন-সংৰক্ষণৰ অন্তৰ্গত

আছিল। ১৯৬০ চন মানিলৈকে গোৱালপাৰা পূব বন সংমণ্ডলৰ সদৰ ঠাই ধুবুৰীতে আছিল। পাছত সদৰ ঠাই কোক্‌ৰাঝাৰলৈ উঠাই অনা হ'ল। ডিভিজনটোৰ নাম মলনি কৰি হলুগাওঁ ডিভিজন নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ল। আইনদীখনক উল্লেখতীয়া সীমা—বেখা কৰি পাছত আইভেনী ডিভিজন নাম দি আন এটা নতুন বন-সংমণ্ডলৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল। এই বন-সংমণ্ডলৰ প্ৰশাসনীয় কাৰ্য এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ পৰা পৰিচালনা কৰে। চিদ্‌লি বেজৰ সদৰ ঠাই হ'ল বাণী। বাণীৰ পৰা পূবৰ ফালে অলপ দূৰ আগবাঢ়ি গ'লে এটা তিনি আলিৰ সজ্জা হ'ল পায়। ইয়াতেই তিনিখন বনভূমিৰ সজ্জা ঘটিছে। প্ৰথমখন বনভূমিৰ নাম হল চিৰাং, দ্বিতীয়খন মানাহ আৰু তৃতীয়খন বেংতল। চিৰাং বিজাৰ্ভখন আকাৰত ডাঙৰ। মানাহখনো কম নহয়। হলুগাওঁ ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত থকা গোৰাং বেজ, ঝাৰবাৰী বেজ আৰু ওলুটাপানী বেজ চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰতে পৰে। মানাহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন বৰডাঙি মানতে আবদ্ধ কৰি মানাহ অভয়াৰণ্যলৈকে বিয়পি আছে। সবলডাঙ্গা নদীখন হলুগাওঁ ডিভিজনত আছে। সবলডাঙ্গা নদীখনে হলুগাওঁ ডিভিজনৰ পশ্চিম সীমা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছে। বেংতলখন আকাৰত তেনেই সৰু বিজাৰ্ভ।

ওপৰত বৰ্ণনা কৰা বনভূমিবিলাকৰ বিভিন্ন পৰিবেশত যিবিলাক বন্য-প্ৰাণীয়ে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰি জীৱন সংগ্ৰামত জয়লাভ কৰিব পাৰিছে সেইবিলাকৰ ভিতৰতে ৰামশিয়াল নামৰ প্ৰাণীবিধো পৰে। বৰডাঙিৰ পৰা পাৰ্ৱতী বিট আৰু তাৰপৰা কুকলুং বেজলৈ যাৰ পৰা এটা পথ আছে। আইনদীখনৰ ঠিক পাততে পাৰ্ৱতী নামৰ বিট অক্ষিচক্ৰ আছে। এবাৰ বৰডাঙিত কেইটামান ৰামশিয়াল বা খেকশিয়াল জাতীয় প্ৰাণী লগ পোৱাৰ কথা মনত পৰে। সন্ধিয়া পৰত তেতিয়া চকুৰে গাঁৱ নোম দেখিব নোৱাৰাৰ অৱস্থা হৈছিল। জীপ গাড়ীখন ৰাখিবৰ বাবে ড্ৰাইভাৰক নিৰ্দেশ দিলো। জন্তু কেইটাই ভিৰাই পকাই নৰ দিৰলৈ আবদ্ধ কৰিলে। সিহঁতৰ পাছে পাছে হাঁহনি পথাৰখনৰ মাজলৈ জীপখন নমাই দিলো। কিছুদূৰ গৈ সিহঁতে এজোপা জোপোহা গছৰ আঁতৰ লুকানগৈ। তাৰ মাজতে গোমাই থকা অৱস্থাত সিহঁতক বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হ'ল। আমাৰ সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ কৰি সিহঁত কেইটা ঠাইতে অন্তৰ্দ্ধান হ'ল। আন্ধাৰ বেছি হৈ অহাত সিহঁতক বিচাৰি উলিয়াব পৰা অসম্ভৱ হৈ পৰিল। অলপ নিলগত অৱশ্যে গাড়ীৰ লাইটৰ পোহৰত জন্তু কেইটাক একাচেকাকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল।

কীট-পতঙ্গ, কেচু-কুমটিৰ পৰা আবদ্ধ কৰি নানা জাতৰ সৰু-সুৰা জন্তু আৰু চৰাই ধৰি খাই এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে জীৱন ধাৰণ কৰে। থকা গাঁতত সুৰক্ষ কৰা কামত এইবিধ প্ৰাণীয়ে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লগীয়া হয়। গাঁতৰ ভিতৰলৈ সোমাবৰ বাবে বাহিৰত কেইবাখনো মুখ থাকে। তাৰে এখন মুখৰ ভিতৰলৈ বিটো সুৰক্ষ নিৰ্মাণ কৰা হয় সেই সুৰক্ষৰ ভিতৰত আহল-বহলকৈ এটা কোঠা বনোৱা হয়। জন্তুটোৱে এই কোঠাটোৰ ভিতৰতে আশ্ৰয় লৈ শুই থাকে। বাকী কেইটা সুৰক্ষ কিছু দূৰলৈ আগবাঢ়ি গৈ তাতে শেৰ হৈ যায়। এনে সুৰক্ষত জন্তুটোৱে ৰাস নকৰে। গতিকে কোনো শক্ত

জাতীয় প্ৰাণীয়ে কিয়া মানুহে জন্তুটোক আধাতে মূৰ খোৱা সুৰভক্ত বিচাৰি নাপায়। এনেয়ে বনাই বখা গাঁতৰ মুখৰ মাটিবোৰ গুচাই তাক বিচৰা বিচৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতেই সি আচল গাঁতটোৰ দুৱাৰ মুখলৈ তাৰ মূৰটো উলিয়াই ইফালে সিফালে চাই লয়। শত্ৰু প্ৰাণীয়ে একাণপতীয়াটক গাঁত খান্ধোতে গাঁতৰ মুখৰ পৰা মাটিখিনি বগৰাবলৈ লওঁতেই সি চকুৰ পচাৰতে পলাই পত্ৰ দিয়ে। শত্ৰু জাতৰ প্ৰাণী বা মানুহে তেতিয়াহে গম পায় যে সি বা তেওঁ বিচৰা বিচৰি কৰা জন্তুটো ইতিমধ্যে পলাই কোনোবাখন পালেগৈ। গাঁতৰ ভিতৰত তাক বিচাৰি হাবাথুৰি খালে কোনো লাভ নাই। এইবিধ প্ৰাণীৰ আৰু এটা মন কৰিব লগীয়া চাৰিত্ৰিক লক্ষণ হ'ল এয়ে যে মাটিত খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি যাওঁতে ইয়াৰ জোপোহা নেজডাল মাটিত চোচৰি চোচৰি যোৱা যেন লাগে।

নানা কাৰণত ৰামশিয়াল বা “ইণ্ডিয়ান ফক্স” নামৰ প্ৰাণীবিধৰ জন্তু-সংখ্যা নাহে কমি আহিছে। কিছুমান স্বাভাৱিক পৰিবেশত ইয়াৰ বংশ একেবাৰেই নিমূল হৈছে। এনে অৱস্থা আহি পোৱাৰ মূল কাৰণ কেবাটাও। জন-সংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাত কিছুমান স্বাভাৱিক পৰিবেশ চিৰকালৰ বাবে অন্তৰ্ধান হৈছে। ঘৰচীয়া হাঁহ কুকুৰা আদিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা বিধৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে কিছুমান হাবিতলীয়া মানুহে ইয়াক খেদি খেদি মাৰে। গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনি তাক নগুৰ শাস্তি কৰি মাৰে। নাৰকীয় অত্যাচাৰ কৰি তাৰ জীৱটো সি-পুৰীলৈ পঠাই দিয়ে। ইয়াৰ গাৰ ছালখন বখলিয়াই সেই ছালৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা ছামৰা নানা লাগতিয়াল কামত ব্যৱহাৰ কৰে। তদুপৰি এনে ধৰণৰ বহু পৰিমাণৰ ছাল সংগ্ৰহ কৰি বেপাৰৰ পথ মুকলি কৰে। অৱশ্যে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীকো পৃথিৱীৰ বুকুত বচাই ৰাখিবৰ বাবে সংৰক্ষণ কামী ব্যক্তি সকল আৰু চৰকাৰ এতিয়া সজাগ হৈছে।

এইবিধ শিয়ালে গাঁতৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা কুঠৰিতে পোৱালি জগায়। এবাৰত একাধিক পোৱালি জগে। পোনেই জগোতে পোৱালিৰ চকু মূৰ খাই থাকে। মাকে বাহিবৰ পৰা খোৱা বস্তু নিনি সিহঁতক গাঁতৰ ভিতৰতে খুৱাইগৈ। নাহে নাহে পোৱালি অলপ টনকিয়াল হ'লে নাহেকৈ বাহিবলৈ ওলাই সুন্দৰ পৃথিৱীখনৰ লগত পৰিচয় হয়হি।



বঙা শিয়াল

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী

গোত্ৰ—কেনিডি


প্ৰজাতি—ভল্‌পেচ্ ভল্‌পেচ্

ইয়াৰ আগৰ প্ৰবন্ধৰ জৰিয়তে বাম শিয়াল বা খেঙ্-শিয়াল নামৰ এবিধ ‘ফক্সৰ’ বৰ্ণনা আগ বঢ়োৱা হৈছে। বাম-শিয়ালক ইংৰাজী ভাষাত “বেঙ্গল ফক্স” বুলি কোৱা হয়। বহল দৃষ্টিভঙ্গীত ইয়াক ‘ইণ্ডিয়ান ফক্স’ বা ভাৰতীয় শিয়াল বুলি যে অভিহিত কৰা হয় সেই কথা স্থানান্তৰত উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। বৰ্তমানে ‘বেঙ্ ফক্স’ বা বঙা শিয়াল নামেৰে জনাজাত আন এবিধ “ফক্স” জাতীয় ভাৰতীয় প্ৰাণীৰ বিষয়ে কোৱা হ’ব।

বঙা শিয়ালৰ যি কেইবিধ প্ৰাণী ভাৰত-উপ মহাদেশখনৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰে সেই কেইবিধ প্ৰাণীৰ বিশদ বৰ্ণনা নিৰ্দিষ্টভাৱে আগ বঢ়োৱাৰ আগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ তিন্ তিন্ এলেকাত বাস কৰা বঙা-শিয়াল ফৈদৰ প্ৰাণীবিন্যাসৰ বিষয়ে অল্প বহল ভাৱে আলোচনা কৰা যাওক। বঙা-শিয়াল বিন্যাসৰ বসতি স্থান ভাৰতবৰ্ষত হলেও এচিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ অন্যান্য বহুতো ঠাইত থলুৱা ভাৱে ইয়াক বাস কৰা দেখা যায়। ইউৰোপ মহাদেশত থকা বঙা শিয়াল বিন্যাসক সাধাৰণ শিয়াল বা ‘কমন ফক্স’ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়।

মধ্য এচিয়া আৰু উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ কিছুমান ঠাইলৈ এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতি-স্থান বিয়পি আছে। উত্তৰৰ ফালে থকা মেক্সিকলৰ ঠাইবিন্যাসত আন এবিধ বঙা শিয়াল ফৈদৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। সেইবিধ শিয়ালক তুয়াৰ দেশীয় শিয়াল বা “আক্-টিক ফক্স” নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। উত্তৰ মেক্সিকোৰ যিবোৰ ঠাইত তুয়াৰ শিয়াল বাস কৰে সেই একে বিন্যাস ঠাইতে ইউৰোপীয় বঙা-শিয়ালকো বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তুয়াৰ-শিয়ালৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰ কোমল-আমলকৈ মৰম লগা হয়। গাত এনে ধৰণৰ নোম থকাৰ বাবে এইবিন্যাস প্ৰাণীয়ে বাণিজ্য জগতত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰিব পাৰিছে। এই শিয়ালবিন্যাসৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোম ঋতু অনুযায়ী পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায়। তাৰে কিছুমানৰ গাত গজা নোমবোৰ জাৰকালি বগলী চৰাইৰ পাখিবোৰৰ দৰে চো চোটকৈ ৰঙা হয়। এইনোমবোৰে তেতিয়া অলপ দীঘল চানেকীয়া হৈ অতি মনোমোহা ৰূপ ধাৰণ কৰে। গৰমৰ দিনত এই নোমবোৰ অলপ চুটি হয়। পেটৰ তলৰ ফালে গজা নোমবোৰৰ বাহিৰে আনবোৰ নোম বঙচুৱাকৈ

মুগা হয় আৰু তাৰ মাজত ফুটুকা-ফুটুকী দাগৰ চিক্‌মিকনিয়ে বিৰাজ কৰে। আন কিছুমান তুষাৰ শিয়ালৰ গাত হোৱা নোমবোৰ একেবাৰে ক'লা হয়। কিছুমান জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত এই বৰণে গেকুৱা বা মুগা বৰণীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰে। ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাত থকা এই শিয়াল বিলাকৰ নোমাল ছাম্বাৰ পৰা তৈয়াৰী কৰা আৰু সাধাৰণতে ভয় মহিলা সকলে কোট চোলাৰ আকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা পোছাকৰ চাহিদা অত্যন্ত বেছি। অৱশ্যে এইবিলাক বিলাসী সামগ্ৰীৰ দাম অতিপাত বেছি হোৱাৰ বাবে ধনী মানুহৰ বাহিৰে সৰ্বসাধাৰণে সেইবোৰ পোছাক পৰিধান কৰা দেখা নাযায়। স্বাভাৱিক পৰিবেশত এইবিলাক বহুমূলীয়া প্ৰাণীক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবৰ বাবে কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে সেই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে জনা নাযায়। বাণিজ্য জগতত তুষাৰ শিয়ালৰ এবিধক



ৰঙা শিয়াল

নীলা শিয়াল (ব্লু ফক্স) আৰু আন এবিধক বগা-শিয়াল (হোৱাইট ফক্স) নামেৰে জনা যায়। কানাদাৰ ফালে আন দুবিধ ফক্স কৈন্দৰ দেখনিয়াৰ প্ৰাণী “ফক্স ফাৰ” বিলাকত প্ৰতিপালন কৰি ৰখা হয়। তাৰে এবিধক আৰ্দ্‌ভাঙি শিয়াল (ৱল্ফ ফক্স) আৰু আন এবিধক কপালী শিয়াল (চিল্ডাৰ ফক্স) নামেৰে জনা যায়। অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশতো সেই দেশৰ মানুহে অন্যান্য ঠাইৰ পৰা ৰঙা শিয়াল গোষ্ঠীৰ কিছুমান দেখনিয়াৰ স্নাত আমদানি কৰি নি পাম আকাৰে প্ৰতিপালন কৰিছে। সেই কাৰণে ‘ফাৰ’ ব্যৱসায়ত অষ্ট্ৰেলিয়াই সবগু বিপুলত এখন বিশিষ্ট আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

এতিয়া ভাৰত উপ-মহাদেশখনত নিগাজীকৈ বাস কৰা ৰঙা শিয়াল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰৰ বিষয়ে অলপ বহল ভাৱে আলোচনা কৰা যাওক। পশ্চিমৰ ফালে কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেপালেদি ছিক্কিমলৈকে এই গোটেই পাৰ্বত্য অঞ্চলত এই বিধ প্ৰাণী

বাস কৰে। অসমত ইয়াক দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে বিবিধ শিয়াল বাস কৰে সেইবিধ প্ৰাণীতকৈ বঙা শিয়াল আকাৰত ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাকে তুলনামূলক ভাৱে দীঘল হয়। নোমাল নেজডাল জোপোহা নিৰব হোৱাৰ বাবে জন্তটোক বেচ নোদোকা যেন দেখি। নোমবিলাক বঙচুৱাকৈ বগা বৰণৰ হয়। বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰা জন্তবিলাকৰ গাঁৱ নোমৰ বৰণৰ গভীৰতাত হীনভেটি পৰিলক্ষিত হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ আন এটা দৈহিক গুণৰ বিশেষত্ব হ'ল এয়ে যে ইয়াৰ কাণ দুখনৰ পাছৰ ফালে গজা নোমখিনি অলপ ক'লা হয়। নেজ ডালৰ আগ ভাগত অলপ বগা বৰণীয়া নোমৰ আভাস থাকে।

ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা বঙা শিয়াল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ তিনিটা উপজাতি আছে। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পৰ্বতীয়া ঠাই বোৰত যিবিধ বঙা শিয়াল বাস কৰে সেইবিধ জন্তক পাহাদী শিয়াল বা “ছিল ফল্ল” নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল “ভল্ পেচ্ ভল্ পেচ্ মহান্না”। ৰাজস্থানৰ মৰভুনি অঞ্চলত বাস কৰা বিধ বঙা শিয়ালক মৰভুনি নিবাসী শিয়াল (ডেজাৰ্ট ফল্ল) নামেৰে জনা যায়। মৰভুনি বাসী বঙা শিয়ালৰ সচৰাচৰ বাসস্থান ৰাজস্থানৰ মৰভুনিমিয়ে গৰকা বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগে। নিৰ্ণয় কৰিছে। পাকিস্তানৰ সিন্ধু প্ৰদেশত সাধাৰণতে যিবিধ বঙা শিয়াল বাস কৰে সেই বিধক “ছোৱাইত ফুটেড ফল্ল” বা বগা ঠেঙীয়া শিয়াল নামেৰে জনা যায়। এই দুটা উপজাতিৰ প্ৰাণীবিলাকক ক্ৰমে “ভলপেচ্ ভলপেচ্ থ্ৰিফিট” আৰু “ভলপেচ্ ভল্ পেচ্ পুছিনা” নামেৰে জনা যায়।

আৰুকাৰি বঙা শিয়ালৰ গাত গজা নোমবোৰ অধিক দীঘল হয় আৰু সেই সময়ত জন্তটো নোদোকাকৈ ধুনীয়া হৈ পৰে। বসন্ত কাল আহি পোৱাৰ লগে লগে এই নোম--বোৰ লাহে লাহে সন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সেই সময়ত জন্তটোক সহজে চিনি উলিওৱা টান হৈ পৰে।

কাশ্মীৰৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাকত যিটো উপজাতিৰ বঙা শিয়াল বাস কৰে সেই উপজাতিৰ প্ৰাণীবিলাকে গভীৰ অৰণ্যভূমিৰ মাজত থাকিবলৈ ভাল নাপায়। যিবোৰ ঠাইত চুটি চাপৰ বিধৰ সৰু সূৰা গছ গছনি থাকে আৰু যিবোৰ ঠাইৰ হাবি জঙ্গলবোৰ কাটি তাত জুই বনাই মানুহে খেতি পথাৰ কৰে তেনেবোৰ ঠাইতে এইবিধ প্ৰাণীয়ে বাস কৰিবলৈ ভাল পায়। ৰাজস্থানৰ মৰভুনি বিলাকত বাস কৰা শিয়ালবিলাকে মৰভুনিৰ বালিসয় ঠাইবোৰতে চেপেটা মাৰি পৰি থাকিবলৈ ভাল পায়। বালি, শিল আদিয়ে তৰপুৰ নদী নলাবোৰৰ পাৰত থকা বালিসয় ঠাইবোৰত অনাই বনাই ঘূৰি কুৰাটো ইহঁতৰ সাধাৰণ নিয়ম। এই বালি-জঁহীয়া শুকান ঠাইবোৰৰ মাজে মাজে তুফা কদম জাতীয় কিছুমান সৰু আৰু মজলীয়া আকাৰৰ গছ গজে। তেনে ধৰণৰ কিছুমান ঠাইত আৰুণ আঠা আৰু সিজু অথবা শনসুতা জাতীয় বসাল উদ্ভিদে দেখিবলৈ পোৱা যায়। বঙা শিয়াল জাতীয় প্ৰাণীয়ে তেনেবোৰ ঠাইত পৰি থাকি দিনৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। মাটিত গাঁত খান্দি লৈ তাৰ ভিতৰতে গিৰিলৈ সোমাই থাকে। এইবিলাক ঠাইত

কিছুমান বিৰাট আকাৰৰ পাখৰৰ দ্বাৰা গঠিত সৰুসুৰা পাহাৰ আৰু টিলা থাকে। চেপেটা চেপেটাকৈ ওলৰি থকা পাখৰৰ তলত আৰু গুহা গহ্বৰৰ নিচিনা ঠাইত এইবিধ প্ৰাণীয়ে কেতিয়াবা আশ্ৰয় লৈ থাকে।

বঙা শিৱাল বিলাকক নিশাচৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব লাগিব। দিনৰ ভাগত সিহঁতে গাঁতৰ ভিতৰত কিম্বা অন্যান্য সুবিধাজনক ঠাইত আশ্ৰয় লৈ থাকি সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। গধূলি পৰত বাহিৰলৈ ওলাই আহি গোটেই নিশা আহাৰ বিচাৰি ইকালে সিকালে অনাই বনাই ঘূৰি কুৰে। পৰ্বতীয়া ঠাইত বাস কৰা বঙা শিৱাল বিলাকে বৰটেক উৰিব নোৱাৰা বিধৰ কিছুমান চৰাই আৰু সৰুসুৰা প্ৰাণীবোৰ ধৰি ধৰি খায়। বৰুতুৰিৰ বালিৰ্জীৱীয়া ঠাইবোৰত বাস কৰা শিৱালবিলাকে নিগনি আদি প্ৰাণীবোৰ ধৰি ধৰি খায়।

গাঁতৰ ভিতৰতে বাহকী জনীয়ে এবাৰত তিনি চাৰিটা পৰ্বন্ত পোৱালি জগায়।



হায়েনা

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী

গোত্ৰ—হাইনিদি

প্ৰজাতি—হায়েনা হায়েনা

ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমৰ ফালৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বাস কৰা হায়েনা এবিধ বিচিদ্ৰ বন্য প্ৰাণী। পশ্চিম বঙ্গ, বিহাৰ, উৰিষ্যা, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্য প্ৰদেশ আদি কেইবাখনো ৰাজ্যত এইবিধ প্ৰাণীক বিক্ষিপ্ত ভাৱে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিধ প্ৰাণী জীৱনলৈ কুকুৰ বা শিয়াল জাতীয় প্ৰাণীবিন্যাসৰ সৈতে একে যেন লাগে। সুখৰ আকৃতিও সাইলাখ একো একোটা শিয়াল জাতীয় প্ৰাণীৰ নিচিনাই হয়। ঠেং আৰু ঠেঙৰ হাতোৱাত উৎপন্ন হোৱা আঙুলিৰ নখবোৰ কুকুৰ কৈদৰ প্ৰাণীবোৰৰ নখৰ দৰেই হোৱা দেখা যায়। পিছে জীৱবিদ্ পণ্ডিত সকলে এইবিধ প্ৰাণীৰ শৰীৰৰ জকা, লাওখোলা আদি বিজ্ঞান সন্মত ভাৱে পৰীক্ষা কৰি ঠাৱৰ কৰিছে যে হায়েনাবিন্যাসক প্ৰকৃততে কুকুৰ অথবা শিয়াল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ সুৰ লাওখোলা আৰু দাঁতবোৰৰ গঠন প্ৰাণী আচলতে মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিন্যাসক লগতহে মিলি যায়। এইবিন্যাসক বিসঙ্গতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি জীৱবিদসকলে এইবিন্যাসক প্ৰাণীৰ বাবে এটা আছুতীয়া গোত্ৰ বা পৰিয়ালৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই স্বতন্ত্ৰ গোত্ৰ বা পৰিয়ালৰ নাম তেওঁলোকে হাইনিদি ৰাখিছে। এইদৰে কুকুৰ পৰিয়াল আৰু মেকুৰী বা ৰাছ পৰিয়ালৰ প্ৰাণীবিন্যাসৰ পৰা এইবিন্যাসক প্ৰাণীক পৃথক কৰি বৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

ভাৰত উপ মহাদেশখনৰ অন্তৰ্গত যিবিধ হায়েনা বাস কৰে সেইবিধ হায়েনাক “ষ্টাইপড্ হায়েনা” বা গাভৰু আঁচ থকা হায়েনা বুলি কোৱা হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ দেহত যিবিলাক নোমৰ উৎপত্তি হয় সেই নোমবিন্যাসৰ বৰণ মুগা চানেকীয়া হয়। এই নোমবোৰ বিশুদ্ধ ভাৱে অপ্ৰজপীয়া হৈ থাকে। পিঠিৰ কাষৰ পৰা পেটৰ তললৈ বৈ যোৱাৰ নিচিনা কিছুমান দীঘল দীঘল আঁচ থাকে। জন্তুটোৰ দেহত এনে ধৰণৰ আঁচবোৰ থকাৰ বাবেই এইবিধ হায়েনাক “ষ্টাইপড্ হায়েনা” বা আঁচ থকা হায়েনা নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। “ষ্টাইপড্ হায়েনাৰ” বাহিৰে অন্য কোনো জাতৰ হায়েনা আমাৰ দেশত বাস কৰা দেখা নাযায়। আফ্ৰিকা মহাদেশত আন এবিধ হায়েনা

জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰে। তাত থকা হায়েনাবিলাকৰ গাত এক প্ৰকাৰৰ ফুটকী-ফুটকী লাগ থাকে। সেই কাৰণে সেইবিধ হায়েনাক “স্পটেড হায়েনা” বুলি কোৱা হয়।



চায়েনা

জাহাৰ অসৰীয়া ভাষাত সেইবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ ফুটকী-হায়েনা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। চাৰিত্ৰিক গুণত জাহাৰ পেশত বাল কৰা আঁচ-থকা বা চেলাপতীয়া হায়েনা

আৰু আফ্ৰিকাত থকা ফুটুকী-হায়েনাৰ মাজত দেখা ন'বলগীয়া পাৰ্থক্য আছে বুঝি ক'ব নোৱাৰি। ফুটুকী-হায়েনা বিনাৰে চিকাৰ কৰি জন্তু মাৰে আৰু এই বিষয়ত সিহঁতে বাং কুকুৰৰ চৰিত্ৰ অনুকৰণ কৰে।

আমাৰ দেশত বাস কৰা বিধ হায়েনাৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাবলীৰ বিষয়ে অলপ বহল ভাৱে আন্দোচনা কৰা যাওক। হায়েনাৰ মূৰটো তুলনামূলক ভাৱে কুকুৰ, শিয়াল আদি জন্তুৰ মূৰতকৈ ডাঙৰ আৰু মোটা হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ ডিঙি আৰু গলধন আশাতীত ভাৱে ডাঙৰ আৰু মঙহাল হয়। ডিঙি আৰু গলধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাছ তপিনাতলৈ থকা অংশ মঙহাল হৈ ওখহি থকাৰ নিচিনা দেখি। ইয়াৰ গাত ডিঙি কঁকাল আদি অঙ্গৰ কোনো চিনচাব আছে বুলি কোৱা টান। তদুপৰি গাত উৎপন্ন হোৱা লিংলিঙীয়া আৰু ঠনঙা নোমবোৰে বিশৃঙ্খলভাৱে গোটেই গাটো আবৰি থাকে। কুৰুচ্ চেহেৰাৰ জন্তুটোৰ দেহত লেখমাত্ৰ সৌন্দৰ্য আছে বুলিও ক'বলৈ টান লাগে। বৈচিত্ৰ্যৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে ইয়াৰ মূল্য আছে। তদুপৰি শগুণ, কাউৰীৰ নগতে মৰা জন্তুৰ গেলা-পচা মাংসাদি ভক্ষণ কৰি ই মানৱ জাতিৰ উপকাৰ সাধন কৰে। অকল মাংসই নহয়। বাঘ আদি মাংসাহাৰী জানোৱাৰে খাব নোৱাৰি এৰি যোৱা হাড়ৰ টুকুৰা-বোৰ টানি আঙুৰি ইয়াৰ শক্তি সম্পন্ন দাঁতেনে ভাঙিচুৰাৰ কৰে। এই হাড়বোৰ ভক্ষণ কৰি ই 'অতি মহজ্ঞে' হজম কৰিবও পাৰে। শিল যেন টান হাড়বোৰ পেটলৈ থেবণ কৰি এইবিধ উচ্ছিষ্ট ভোজী প্ৰাণীয়ে সেইবোৰ খাদ্য কেনেকৈ হজম কৰে তাক ভাবিলে তবৰ নামানি নোৱাৰি। বৃদ্ধ বয়সত কিম্বা বেমাৰ আজ্ঞাবত পৰি মৃত্যু হোৱা জানোৱাৰ মাংসাদি ভক্ষণ কৰাটো এইবিধ প্ৰাণীৰ বাবে সাধাৰণ নিয়মত পৰে। ঢেঁকীয়া-পটীয়া বাঘ, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ আদি মাংসাহাৰী জন্তুৱে চিকানৰ মাৰি অনা জন্তুবোৰ হাবিৰ মাতল এডোখৰ ঠাইত ৰাপি বখলিয়াই বখলিয়াই পায়। সেই মাংসৰ ভাগ পোৱাৰ আগত শগুণ, কাউৰীৰ নগতে হায়েনাই ওচৰতে খাপ পাতি বৈ থাকে। খাপ মাৰি এটুকুৰা মাংস বাঘৰ পৰা কাঢ়ি আনিব পৰাৰ আশাত কেতিয়াবা কোনো এটা ভোকাতুন হায়েনাটো মৰাশৰ তেনেই কাষ পায়গৈ। বাঘে খেদা মাৰি গি তাক ক'ববাত দৈ আছেগৈ। বেচেয়া হায়েনাটোৱে চুচুক-চামাক কৰি মাংসৰ আশাত আকৌ ওচৰ পায়হি। এইদৰে সিহঁতৰ মাজত বহুত পৰা জুৰি খেদা-খেদিৰ লীলা-খেলা হৈ থাকে। পেট ভৰি খোৱাৰ পাছত বাঘে যেতিয়া সেই ঠাই ত্যাগ কৰি আঁতৰ হয় তেতিয়াহে হায়েনাই তাৰ ভাগ পায়।

হায়েনাক বহুখচীয়া বিধৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। ইফালে সিফালে লক্ষ্য নকৰাকৈয়ে ই তলমূৰ কৰি আহাৰৰ সন্ধানত আগবাঢ়ি গৈ থাকে। য'তে গেলা-পচা মাংস কিম্বা মৰি থকা সৰু-সুৰা প্ৰাণী পায় তাতে ই বৈ যায় আৰু তেনে বস্তু খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। সাধাৰণতে এৰেহা মঙহ, গেলা-পচা বস্তুৰ সন্ধানত অন্যাই বনাই ঘূৰি ফুৰা বিধৰ প্ৰাণী হ'লেও ভোকাতুন অৱস্থাত দুই এটা হায়েনাই জীয়া জন্তুকো হঠাৎ আক্ৰমণ কৰি শাণ বায় বাহিৰ কৰি দিয়ে। কেতিয়াবা আঁতৰত পৰিও এইবিধ প্ৰাণীয়ে এনে আক্ৰমণ প্ৰদৰ্শন কৰে। গেলা-পচা মাংসাদি ভক্ষণ কৰি চাকাই কামৰ দাৰা পৰিবেশ উন্নত কৰি

এইবিধ প্ৰাণীয়ে মানৱ জাতিৰ উপকাৰ কৰে। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰ কালৰ পৰা হায়েনাক “কেভেজাবৰ” আখ্যা দিয়া হয়।

কেভিয়াৰা কেভিয়াৰা হায়েনা গোষ্ঠীৰ দুই এটা প্ৰাণীয়ে আভুৰত পৰি বা পেটৰ আলাত ঘৰচীয়া জন্তুকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। চৰণীয়া পথাৰত চৰি কুৰা ছাগলী বা ভেড়া জাতৰ দুই এটা প্ৰাণীয়ে কেভিয়াৰা হায়েনাৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগীয়া হয়। বল শক্তিৰ কালৰ পৰা বিবেচনা কৰি চালে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হিংসাকুৰীয়া বহুতো বন্য-প্ৰাণীয়ে ইয়াৰ আগত তুৰিমুৰি কৰিবলৈ সাহস নকৰে। মানুহক অৱশ্যে ই অৰ্ধে-মৰ্ধে আক্ৰমণ নকৰে। মানুহ দেখিলে নাহেঁতক কালৰি কাটি গৈ হাবিৰ মাজত সোৱায়গৈ। চোতালত বিচনা পাৰি শুৱাই বখা দুই এটা কেচুৱাই কেভিয়াৰা হায়েনাৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উদাহৰণ বিৰল নহয়। সেই কাৰণে বিহাৰ, উৰিষ্যা আদি ৰাজ্যৰ হাবিতলীয়া মানুহ কিছুমানে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি নিজৰ কেচুৱা ন’বা-ছোৱালীক হায়েনাৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব দগীয়া হয়। সাধাৰণতে চিকাৰ-বিলাসী হিংসাকুৰীয়া প্ৰাণী নহ’লেও অভাৱ অনাটনৰ তাৰণাত পৰি হায়েনা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীয়ে এনে আচৰণ দেখুৱাব লগীয়া হয়।

হায়েনাই গভীৰ অৱণ্যভূমিত থাকিবলৈ ভাল নাপায়। মুকলি-হাকলি হাবি-বননি বোৰতে সাধাৰণতে এইবিধ প্ৰাণীয়ে বাস কৰে। যিবোৰ হাবিতলীয়া ঠাইৰ মাজেদি বা কাষেদি নদী-নিজৰা বৈ গৈছে আৰু ব’ত বালিৰ্জহীয়া মাটি আৰু শিলায় পাহাৰবোৰ আছে তেনেবোৰ ঠাই বিচাৰি লৈ এই প্ৰাণীবোৰে তাতে চিৰকাল বাস কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। প্ৰখৰ ব’দৰ উদ্ভাপৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ ইহঁতে গুহা-গছৰ কিছা চটা-চটে ওলমি থকা চেপেটা পাহাৰৰ তলৰ সুবিধাজনক ঠাই উলিয়াই লয়। দিনৰ ভাগত ইহঁতে এনেবোৰ অনুকূল ঠাই কিছা গছ গছনিৰ ছাঁয়াবৃত্ত ঠাইত চেপেটা খাই পেট পেলাই পৰি থাকে। সন্ধিয়াৰ সময়ত নাহেঁতক তেনেবোৰ ঠাইৰ পৰা ওলাই আহে। গোটেই ৰাতি আহাৰৰ সন্ধানত হাবিৰ মাজে মাজে চলি চলি বুলি কুৰে। এইবিধ প্ৰাণীয়ে এক প্ৰকাৰৰ কঁচ কঁচ শব্দৰ উচ্চাৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে হায়েনা বিলাকে এক প্ৰকাৰৰ দীঘলীয়া মাত মাতে। ইয়াক হায়েনাৰ হাঁহি বুলি কোৱা হয়।

হায়েনাই বছৰৰ যেই কোনো সময়তে পোৱালি জগায়। এবাৰত একাধিক পোৱালি জগে বুলি জনা যায়।



ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাক

ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ বাবে জন্তু-জগতত এখন সুকীয়া আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগীয়া হৈছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ এইটোৱেই যে এই আটাইবিলাক জন্তুৰ দেহত কিছুমান নিজস্ব শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণৰ বিকাশ সাধন হয়। এই গুণবান্ধিৰ বিশেষত্ব এয়ে যে ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ বাহিৰে অন্য কোনো জন্তুৰ গাত এই-বিলাক গুণৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। লাগে এই গোষ্ঠীৰ কোনো এবিধ প্ৰাণী আকাশ-চুৱী হিমালয় পৰ্বতমালাৰ বৰকাছ্য ঠাইবোৰতেই থাকক নাইবা দ্বিতীয় এবিধ প্ৰাণী উত্তৰ মেৰুৰ অগম্য বৰফৰ চপৰাবোৰৰ ওপৰতে থাকক ইহঁতৰ মাজত কিছুমান স্বতন্ত্ৰ উমৈহতীয়া চাৰিত্ৰিক আৰু শাৰীৰিক গুণ বিকশিত হয়। সেই কাৰণে এই পৃথিৱীখনৰ বিভিন্ন এলেকাং ভিন্ ভিন্ স্বাভাৱিক পৰিবেশত থলুৱা ভাৱে নিগাজীকৈ বাস কৰিবলৈ নোৱাৰে বেনেগ বেনেগ প্ৰজাতিৰ ভালুকবোৰক সম্বৰ্ণী প্ৰাণী বুলি পৰিচয় কৰা বিষয়ত অকণো অস্ববিধা নহয়। এচিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ ভিতৰত কেবাৰিধো ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰে। তাৰে তিনি নে চাৰি প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰে। ইহঁতবোৰৰ গাত কিছুমান দৈহিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণবান্ধিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰা দেখা যায়।

অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশৰ বাহিৰে আন আটাই কেইখন মহাদেশক ভালুক কৈদৰ এবিধ নহয় এবিধ প্ৰাণীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। পোন প্ৰথমতে এচিয়া মহাদেশখনৰ কথাই ধৰা যাওক। এইখন মহাদেশৰ অন্তৰ্গত অৱস্থিত কেৱল ভাৰত উপ-মহাদেশখনতে সৰ্বমুঠ চাৰিবিধ ভালুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিগাজীকৈ বাস কৰি আছে। তাৰে এবিধক হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক বা গছ-ভালুক বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয় বিধৰ নাম হ'ল "স্লথ বিৱেৰ" অথবা মাটি-ভালুক। এই দুয়োবিধ প্ৰাণীক ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ বাহিৰেও অসম আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ আন আন চুবুৰীয়া ৰাজ্য সমূহৰ জলবায়ু আৰু মাটি পানীৰ অনু-কূল পৰিবেশে ধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবিলাক ঠাইতে থলুৱা ভাৱে বাস কৰা তৃতীয় বিধ ভালুকক হালয় ভালুক নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। এই বিধ ভালুক-কো অসম তথা পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত সেৰেঙা-সেৰেঙাকৈ বাস কৰি থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। চতুৰ্থবিধ ভাৰতীয় ভালুকক হিমালয়ৰ মুগা ভালুক নামেৰে জনা যায়। এইবিধ ভালুকক অৱশ্যে অসমত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। হিমালয় পৰ্বতৰ বৰফৰেখাৰ ওপৰলৈ থকা সেৱেঙা ঠাইবোৰে এইবিধ ভালুকৰ বাবে অনুকূল

পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰে দুই এটা প্ৰাণী কেতিয়াবা অকস্মাৎ পৰ্বতৰ নামনিৰ হাৰি বগনি বিলাকত আবিৰ্ভাৱ হয়হি।

এচিয়া মহাদেশৰ উত্তৰ অঞ্চলত থকা সেমেকা ঠাইবোৰত আৰু ইউৰোপ মহাদেশত তেনে ধৰণৰ জনবায়ুয়ে গৰকা কোনো কোনো ঠাইত আন এবিধ অনুপ ডাঙৰ আকাৰৰ মুগা বৰণীয়া ভালুক বাস কৰে। এইবিধ ভালুকক ইউৰোপীয় মুগা ভালুক নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। ইয়াৰে এবিধ ভালুক নতুন গোলার্ধৰ উত্তৰ আমেৰিকাত বাস কৰে। এইবিধ ভালুকক আমেৰিকাৰ মুগা ভালুক বুলি কোৱা হয়। হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক নামেৰে যিবিধ ভালুক গোল্ধীৰ প্ৰাণী ভাৱেও পিছিয়া ঠাইত বাস কৰে সেয়াই বিধ ভালুকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আন এবিধ ডাঙৰ আকাৰৰ ক'লা ভালুক আমেৰিকাত থাকে। এইবিধ ক'লা ভালুকক আমেৰিকাৰ ক'লা ভালুক বুলি কোৱা হয়। আমেৰিকাৰ তৃতীয় বিধ প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ ভালুকক গ্ৰিজলি ভালুক বুলি কোৱা হয়। আমেৰিকাৰ কানাডা আৰু মাকিন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰত বাস কৰা এইবিধ প্ৰাণীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাতাত তীব্ৰ ভাৱে কমি আহিছে। নানা কাৰণত হ্ৰাস মানুহৰ হাতৰ কাৰণেও কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰাত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে বিপদৰ সমুখীন হ'ল। এইবোৰক মাকিন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত থকা ইয়েলোষ্টোন নেচনেল পাৰ্কৰ প্ৰান্তত গ্ৰিজলি ভালুক আছিল এতিয়া সিমানে সংখ্যক গ্ৰিজলি ভালুক পাবলৈ সক্ষম হ'ল বুলি প্ৰকৃতিবিদ সকলৰ কোনো কোনোৱে অভিযোগ তুলিছে। প্ৰত্যেক গভীৰ ভাৱে অনুসন্ধান আৰু একনিষ্ঠ ভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি এইখন মেলাই পোৱা বাস কৰা গ্ৰিজলি বিয়েৰৰ সংখ্যা কমি অহাৰ কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰি বৰ্ত্তমানৰ দৰ্শন আকৰ্ষণ কৰিছে। প্ৰতি বছৰে ইয়েলোষ্টোন নেচনেল পাৰ্ক দৰ্শন কৰিবলৈ অহা মানুহৰ তাত ভিৰ হয়। সৰহ ভাগ মানুহে তালৈ নিজৰ নিজৰ গাড়ী লৈ আহে। সৰহ দেশৰ মানুহৰ বাবে এইটো এটা তেনেই সাধাৰণ কথা। কাৰণ প্ৰত্যেক ধৰ্ম্মানুষ্ঠান তাত মটৰ গাড়ী আছেই। এঘৰ মানুহৰ একাধিক গাড়ী থকাটো তাত মানুহৰ বাবে কোনো আচৰিত কথা নহয়। সি যিয়েই কি নহওক ইয়েলোষ্টোনৰ দৰ্শনাৰ্থী ভ্ৰমণকাৰী সকলে সাধাৰণতে কোনোবা এখন হোটেল বা মোটেলত ৰাতি খপিবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি লয়। নানা কাৰণত পাৰ্কৰ ভিতৰত ৰখা জাবৰ পেলোৱা বাৰচবোৰ কেতিয়াবা পেলনীয়া বস্ত্ৰৰে উপচি পৰে। কৰ্ত্তৃপক্ষই এই ধৰণে গোট খোৱা জাবৰবোৰ দাতব্য আছুতীয়া ঠাইবোৰত পেলাই দিয়েগৈ। এইদৰে জাবৰ পেলোৱা ঠাইবোৰক 'গাৰেজ ডাম্প' বুলি কোৱা হয়। গ্ৰিজলি ভালুকৰ একোটা একোটা বুজন সংখ্যাৰ জন্তু সেই জাবৰ পেলোৱা ঠাইবোৰত গোট খায়হি। জাবৰৰ মাজত মিহলি হৈ থকা পেলনীয়া খোৱা বস্ত্ৰবোৰ বুলি বুলি ৰাই সিহঁতে অসীম তৃপ্তি লাভ কৰে। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আজি কালি এইদৰে পেলাই দিয়া জাবৰবোৰ মাটিৰ তলত পুতি পেলুৱাৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। ফলত গ্ৰিজলি বিয়েৰ বিলাকৰ খোৱা বস্ত্ৰৰ অভাৱ ঘটিছে। এতিয়া তাত একেলগে গোট খোৱা বহু সংখ্যক গ্ৰিজলি ভালুক দেখি পাবলৈ নাইকিয়া হৈ পৰিল। ভালুকবোৰ আঁতৰি আঁতৰি গুচি গৈ গভীৰ অৰণ্যভূমি আৰু পৰ্বতীয়া ঠাইত

আশ্ৰয় লৈছেগৈ। প্ৰকৃতি-প্ৰেমী অভিজ্ঞ ব্যক্তি সকলৰ দুই এজনে আক্ষেপেৰে অভিনত প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে পাৰ্ক কৰ্তৃপক্ষৰ জাবৰ পুতি পেলোৱা নীতিটো প্ৰশংসনীয় হোৱা নাই। কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰিঞ্জলি ভালুকবোৰক পাৰ্ক এৰি এনি খাদ্যৰ অন্বেষণ নিলগলৈ আঁতৰি লবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। খাদ্যৰ অভাৱত হয়তো বহুতৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আন বহুতে ব্যাধৰ হাতত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হৈছে। সেয়েহে জাবৰ পুতি পেলোৱা নীতিৰ পৰিবৰ্তন ঘটোৱা উচিত বুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দুই এজনে মত প্ৰকাশ কৰিছে।

আলাত্ৰাতো কিছু সংখ্যক গ্ৰিঞ্জলি ভালুক আনোৱে আনোৱে বাস কৰিছে। এইখন ৰাজ্য শীত গওলৰ আচুতীয়া ঠাইত থকাৰ বাবে বিচিত্ৰ আৰু আপুৰুগীয়া বন্যপ্ৰাণী কেইবিধ মানব বাবে এই ঠাইবোৰ স্বৰ্গপুৰীৰ নিচিনা হৈছে। তাত থলুৱা ভাৱে বাস কৰা আকৰ্ষণীয় বন্যপ্ৰাণী কেইবিধ মানও বিপদগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোনো কোনো বনভূমি কিছুমান অন্য কাৰণত মুকলি কৰিবলৈ নোৱা নীতিয়েই এনে ধ্বংস কাৰ্যৰ বাবে পোনপটীয়া ভাৱে দায়ী বুলি সংৰক্ষণ কাৰী প্ৰকৃতি-বিদ্ মৰুৱাৰ বহুতে আক্ষেপ কৰিছে। ইয়াত থকা গ্ৰিঞ্জলি ভালুকবোৰৰো একেই অৱস্থা হৈছে।

গ্ৰিঞ্জলি ভালুক সমধনী আৰু গ্ৰিঞ্জলি ভালুকতকৈ দেখাত মনোমোহা আন এবিধ লেখত নবদলীয়া প্ৰাণী আমেৰিকাৰ উত্তৰৰ ফালে থকা উত্তৰ মেৰুৰ নৰ্থফৰ্চ চাক খুৱাই বগা সাগৰৰ পাৰত বাস কৰে। সাগৰৰ পাৰত বুলি নকৈ সাগৰতে নিগাজীকৈ থলুৱা ভাৱে বাস কৰা প্ৰাণী বুলি এইবিধ ভালুকক ক'ব পাৰি। বিয়নো মেক অঞ্চলৰ যিবোৰ শীতল সাগৰীয় পানী বৰফৰ চাৰ্ণিয়ে চিৰকাল ঢাকি ৰাখে সদ্যহতে উল্লেখ কৰা বিধ ভালুকে তেনে বিলাক বৰফৰ চাৰ্ণিৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈ থাকে। এইবিধ ভালুকক মেক দেশীয় ভালুক বা বগা ভালুক বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ সচৰাচৰ বসতি স্থান আৰু বিচৰণ ভূমি এচিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ এক অঞ্চল বিলাকত বিয়পি আছে।

এইবিধ প্ৰাণীয়ে চেপেটা মাৰি সাগৰৰ উপৰি ভাগত গোটমাৰি জমা হোৱা বৰফৰ ওপৰতে পৰি পৰি থাকে। বৰফৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰি খাদ্যৰ সন্ধানত ইফালে সিফালে অহাই বনাই ঘূৰি ফুৰে। সাগৰৰ পানীলৈ নামি গৈ সাঁতুৰি সাঁতুৰি মাছ আৰু অন্যান্য গোষ্ঠীৰ সাগৰত থকা প্ৰাণীবোৰ ধৰি ধৰি খায়। সাগৰত সাঁতুৰি ফুৰা চিল বা চি-লয়ন নামৰ প্ৰাণীয়ে বগা ভালুকৰ প্ৰভাপত জাহি বহুসুন্দৰ দেখে। পানীৰ তললৈ বুৰ মাৰি নিজৰ প্ৰাণটো ৰচাবলৈ চেষ্টা কৰা চিলকো এইবিধ ভালুকে খেদি খেদি ধৰে। সম্ভৱণ বিদ্যাত অসীম পাৰদৰ্শিতা থকা এইবিধ ভালুকে কেতিয়াবা চিলৰ নিচিনা জাৰ্ণিবাসী প্ৰাণীকো চেৰ পেলায়। ব'দ এচেৰেঙা ল'বলৈ বুলি বাসলৈ উঠি উঠি অহা চিলৰ জাকৰ মাজত সোমাই এই বিধ ভালুকে মহা পয়ামালৰ সৃষ্টি কৰে। কেতিয়াবা অৱশ্যে নিজেই ঠেকত পৰি বিপদগ্ৰস্ত হয়। ক'বৰাত অকলশৰীয়াতকৈ বৰফৰ ওপৰতে চেপেটা মাৰি পৰি থকা চিলক ই জোপ লৈ মাৰে। গাৰ নোমবোৰৰ

বৰণ বগলী চৰাইৰ পাৰিষোৰৰ দৰে চৌ চৌটক বগা হোৱাৰ বাবে বৰকৰ ওপৰত পৰি থকা বগা ভালুক চিল জাতীয় প্ৰাণীৰ নাজত সহজে ধৰা নপৰে।

দক্ষিণ আমেৰিকাত আন এবিধ ভালুক জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। এইবিধ ভালুকৰ ‘শ্বেক্টেকুল্ড বিয়েৰ’ বা চশমা পিন্ধা ভালুক নামেৰে জনা যায়। সাধাৰণতে ব্যঞ্জনিত থকা হাবি-বননিৰে এইবিধ ভালুকে বাস কৰাৰ উপযোগী ঠাইবোৰ নিৰ্ণয় কৰে। চকুৰ চাৰিওফালে চশমাৰ নিচিনা এটা বগা দাগ থকাৰ বাবে এইবিধ ভালুকক চশমা-পিন্ধা ভালুক বোলা হয়। নানা কাৰণত এইবিধ বিচিত্ৰ জন্তুৰ সংখ্যা কমি আহিছে। আন্তৰ্জাতিক ভিত্তিত ইয়াক বিপদগ্ৰস্ত প্ৰাণীৰ তালিকাত ঠাই দিয়া হৈছে। ইংলণ্ডৰ জাৰ্চি নামৰ ঠাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰা জাৰ্চি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ ন্যাস সমিতি নামৰ অনুষ্ঠানে এইবিধ দুৰ্ভাগ্য প্ৰাণীক বৰত পুৰি পোৱালি জগোৱা আঁচনি হাতত লৈছে। এই বিষয়ত তেওঁলোকে বহুদূৰ কৃতকাৰ্য্যতাও লাভ কৰিছে। হাজাৰে হওক এবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী হিচাপে এনে আঁচনি হাতত লোৱা কাৰণটো প্ৰশংসনীয় বুলি নকৈ নোৱাৰি।

আফ্ৰিকা মহাদেশখনত ভালুক জাতীয় প্ৰাণীৰ উৎপত্তি বেছি নহয়। অৱশ্যে একেধাৰে সাই বুলিও ক’ব নোৱাৰি। কিয়নো এইখন মহাদেশৰ অন্তৰ্গত থকা সবাতোত এবিধ ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী আনেতে আনেতে বাস কৰে। হিমালয়ৰ ক’লা ভালুক জাতীয় প্ৰাণীৰ লগত সবাতোবাসী ভালুকৰ চেহেৰা কম-বেছি পৰিমাণে মিলি যায়।

এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশখনলৈ আহোঁ। এইখন মহাদেশত ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা নাযায়। আচলতে অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশত বাস কৰা জন্তুবিলাকৰ কথাই বেলেগ। এইখন মহাদেশত বাস কৰা সবহভাগ জন্তুৰ মাইকী জনীৰ পেটত এটা বোলা থাকে। পোৱালি জগাৰ পিছত মাকজনীয়ে পেটত ওলমি থকা এই মোনা-টোতে পোৱালি ভৰাই লৈ কুৰে। তাতে মোমাই থাকি থাকিৱেই পোৱালিটো ক্ৰমে ডাঙৰ হয়। এইখন মহাদেশত “কুৱালা” নামৰ এবিধ ভালুকৰ নিচিনা প্ৰাণী বাস কৰে। এইবিধ প্ৰাণী আকাৰত তেনেই সৰু হয় আৰু দেখাত ইয়াক ল’ৰা-ছোৱালী বিনাকৈ খেলা এটা পুতলাৰ নিচিনা লাগে। তাৰ মানুহে ইয়াক “নেটভ বিয়েৰ” বা থলুৱা ভালুক বুলি কয়। আচলতে ভালুক জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ লগত ইয়াৰ কোনো সন্মত নাই। সেইখন মহাদেশতে বাস কৰা কালোজাৰ নামৰ প্ৰাণী এবিধৰ লগত এইবিধ প্ৰাণীক সাজুবিধ পৰা যায়।

মাটি ভালুক বা স্লুবিয়ৰ

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাখাৰী

গোত্ৰ—আৰ্চিদি

বৰ্জাতি—বেলোৰচাচ্ আৰ্চিন্

“স্লুবিয়ৰ” বা মাটি-ভালুক নামেৰে জনাজাত ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিধক কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ দেশৰ প্ৰায় সকলো মানুহে দেখিবলৈ পাইছে। ছাবি বননিত বুকলি মূৰীয়াতকৈ বুকি কৰা অৱস্থাত এইবিধ জন্তুক অধে-মধে দেখি পাবলৈ আশা কৰিব নোৱাৰি। কাজিৰঙা অভয়ৰাণ্য তথা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আদি সংৰক্ষিত বনভূমিবিজ্ঞকত কোনো কোনোৱে কেতিয়াবা ইয়াক নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে। চিৰিয়াখানা বিলাকত লালন গালন কৰি ৰখা এইবিধৰ দুই এটা জন্তুক অৱশ্যে বহুতে দেখিছে। কোনো কোনো ৰান্ধৰ নচোৱা মানুহে কেতিয়াবা মাটি ভালুক একোটাৰ নাকত ৰচি লগাই আনি খেল দেখুৱাইহি। এইবিলাক মানুহ ভাটিৰ কালৰ পৰা আহে। বজাৰৰ একাষত বা ৰাজ-পথৰ দাঁতিত ভালুক ৰান্ধৰ আদিৰ নাচ চাবলৈ বহুতো মানুহ গোট ৰায়। নাচ শেষ হ’লে দৰ্শক সকলৰ দুই এজনে নাচ দেখুওৱা মানুহজনক অলপ অচৰপ পইছা দিয়ে। বেচেৰাই লেইদৰে পোৱা পইছাবে পেট প্ৰৱৰ্ত্তায় আৰু জন্তুটোৱে খাব পৰা বস্তু কিণি কুটি তাকো খুৱায়। নাকত ৰচি লগোৱা জন্তুটোক সি বজাৰে বজাৰে লৈ কুৰে। হ’তে মানুহৰ সমাগম হয় তাতে খেল দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে।

মাটি ভালুকৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাক দীঘল আৰু ঠৰতা ধৰণৰ হয়। এই দীঘল দীঘল নোমবোৰৰে লৈতে সেই জন্তুটোক একেবাৰে জঘলা যেন দেখি। আনহাতে দেখা যায় যে এইবিধ ভালুক জাতীয় প্ৰাণীৰ দেহত নিজৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সৌন্দৰ্য্য আছে। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা কোনো এবিধ ভালুকৰ দেহত এনে ধৰণৰ দীঘল দীঘল নোমৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অলপ চুটি বিধৰ ঠেং কেইখনেৰে ৰাটিত খোজ কাটি কাটি গৈ থকা অৱস্থাত জন্তুটোক চাই বৰ আনন্দ পোৱা যায়। নাচ দেখুৱাবলৈ অহা এইবিধৰ ভালুক দেখিবলৈ পালে ল’ৰা-ছোৱালী বিলাকে বৰ আনন্দ পায়।

অন্য ভালুক জাতীয় প্ৰাণীবোৰৰ দৰে এইবিধ ভালুকোও তাৰ দীঘল চানেকীয়াতকৈ লেহুকা ওঁঠ দুটা ইচ্ছানুসাৰী লৰাৰ চৰাব পাৰে। এই ওঁঠ দুটাৰ সহায়ত

এইবিধ প্ৰাণীয়ে খোৱা বস্তু মুখত তুলি লয়। দাঁতেৰে কামোৰ মাৰি ধৰি সেই বস্তু টুকুৰা টুকুৰাকৈ ভাঙি পেলায় আৰু জিভাৰ সহায়ত পেটলৈ গ্ৰেৰণ কৰি দিয়ে। ইয়াৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাকৰ বৰণ সাধাৰণতে ক'লা চানেকীয়া হয়। এই নোম বোৰৰ উপৰি ভাগত অস্পষ্ট ধৰণৰ ফুটুকা ফুটুকী দাগৰ ছিটিকনিয়ে বিৰাজ কৰে। কিন্তু এই দৰে উৎপন্ন হোৱা দাগৰ তিৰবিৰণি ইমান সামান্য যে সেইবোৰ সাধাৰণতে চকুত ধৰা নপৰে। সেই বাবে অনপ নিলগৰ পৰা চাই পঠিয়ালে জন্তটোক একেবাৰে ক'লা যেন দেখি। হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক নামেৰে পৰিচিত প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে মাটি ভালুকৰ



মাটি-ভালুক

বুকুত কোনো প্ৰকাৰৰ বগা দাগ থকা দেখা নাযায়। কেতিয়াবা অৱশ্যে এই প্ৰকাৰৰ দুই এটা জন্তুৱে এনে ধৰণৰ বৈচিত্ৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনে অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গছ-ভালুক অৰ্থাৎ হিমালয়ৰ ক'লা ভালুকৰ দৰে এইবিধ ভালুকৰ দুই এটাৰ বুকুত ইংৰাজী ভাষাৰ “ভি” আখৰটোৰ নিচিনা বগা বৰণৰ দাগে বিৰাজ কৰে। অৱশ্যে সাধাৰণতে এনেবিধৰ মাটি-ভালুক লগ পাবলৈ আশা কৰিব নোৱাৰি। এক বাতে কেতিয়াবা এনে দাগ থকা মাটি ভালুকক লগ পালে তাক প্ৰাকৃতিক বিস্ময়ৰ অন্যান্যত্ৰ নিদৰ্শন বুলি গণ্য কৰিব লাগিব।

‘মায়া’। ঠাঠি হাৰিও নানা জাতৰ বনু বনাৰীয়া গছৰ উৎপত্তি-স্থল আৰু
‘মায়া’ বা বনাৰীয়া বাই এইবোৰ ভালুকে দ্ৰৱন ধাৰণ কৰে, সাধাৰণতে তেনে ধৰণৰ
‘মায়া’ বা বনাৰীয়া বাইকো মাটি ভালুকে বাস কৰিবলৈ ভাল পায়। তদুপৰি বীট-গছ,
‘মায়া’ পৰি আদি নানা বিধ গছ-পাতৰ জীৱ এইবিধ প্ৰাণীয়ে ধৰি খায়। দিনৰ
ভাৰত ইহঁত গছৰ কেৰে। কিসা পাখৰৰ ফাকৰ মাজত পৰি থাকি সময়খিনি অতি-
বায়। ‘মায়া’ গৰু। হোৱাৰ লগে লগে এইদৰে আশ্ৰয় লৈ থকা ঠাইৰ পৰা লাহেকৈ
‘মায়া’ বা বনাৰীয়া বাইকো আঁঠেই নিশা আহাৰৰ সন্ধানত ইফালে সিফালে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে।
‘মায়া’ বা বনাৰীয়া বাইকো যলমূল আদি বিচাৰি বিচাৰি খায় আৰু পোক-পৰুৱা আদি বঁতে যিহকে
পায় তাকে বুঢ়াল খাই পেটৰ ক্ষুধা নিৰাৰণ কৰে। পাছ দিনা ৰাতি পুৱালৈ আৰম্ভ
কৰোঁতে নো কৰোঁতেই ইহঁতে এইদৰে আহাৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰা ঠাইবোৰ ত্যাগ কৰি
প্ৰাণ্য নোৱাৰা ঠাইবোৰলৈ গুচি যায়গৈ আৰু দিনটোৰ সময়খিনি আৰামত কটাবৰ বাবে
স্বপ্ন কৰি যায়। বতৰ সোমেকা হলে দিন দুপৰতো বাহিৰলৈ ওলাই আহি অনাই
বনাই ঘূৰি ফুৰে। যিবোৰ ভিতৰুৱা ঠাইত মানুহৰ সন্নাগম কম তেনেবোৰ ঠাইত দিন
দুপৰত বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈও এইবিধ ভালুকে ভয় নকৰে।

মোচাক আৰু উইপোক খাবলৈ এইবিধ ভালুকে বৰ ভাল পায়। গছৰ খোন্দত
খকা মাৰি-মোৰ বাহবোৰ ইহঁতে বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ায়। মোৰ বাহবোৰ ভাঙি তাৰ
ভিতৰৰ পৰা মোচাকবোৰ কামুৰি কামুৰ খায়। মো-জাতিবোৰে গিহঁতৰ শুঙেৰে বান্ধি
এইবিধ ভালুকৰ বিশেষ অপকাৰ কৰিব পাৰে যেন নালাগে। উই পোকৰ হাফলবোৰ

হাতোৰাখনেৰে খুন্দা মাৰি ভাঙি তাৰ ভিতৰৰ পৰা উই পোকৰ কণী আৰু, নতুনকৈ জগা পোহালিবোৰ ধৰি ধৰি খায়। হাবিৰ মাজত এইদৰে ভাগি-ছিগি থকা উই হাফলু দেখিবলৈ পানে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা যায় যে ভালুক জাতীয় প্ৰাণীয়ে সেই হাফলুটো ভাঙিছে আৰু এইদৰে ভাঙি ওচৰতে ক'বৰাত লুকাই আছে। হাবিৰ মাজত থকা দুই এজোপা গছ বেনাৰী হৈ উঠি পৰে। কেতিয়াবা বতাহত ভাঙে আৰু উঠি পৰে। এইদৰে মাটিত পৰি থকা গছৰ বাকলিত নানাবিধ পোকে ধৰে। ভালুকে পৰি থকা পচা গছৰ বাকলি হাতোৰা খনেৰে ওচাই এই পোকবোৰ ধৰি ধৰি খায়। হাবি বনলিত বৰি থকা জঙ্ঘৰ গেলা-পচা বগুহ ইহঁতে টানি আজুৰি খায়। মানুহে বাৰীত লগোৱা কুঁহিৰাৰ, গোনধান আদি খাই ইহঁতে ক্ষতিসাধন কৰে।

জাবৰ দিনত সাইকী ভালুকে পোহালি জগায়। জনপ ডাঙৰ নোহোৱালৈকে পোহালিবোৰে হাকৰ লগ নেৰে। মাকে কেতিয়াবা সিহঁতক পিঠিত বোকোচা বান্ধি লৈ কুৰে।



হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক

শ্ৰেণী—স্বন্যপায়ী

বৰ্গ—সাহায্যী

গোত্ৰ—আৰ্চিদি

প্ৰজাতি—চেলেনাৰ্ক্‌টাছ ৰিবেটেনাছ

এই পৃথিৱীখনৰ ওপৰি ভাগত থকা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নানা পৰিবেশত কেইবা প্ৰকাৰৰ ভালুক জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা ভালুক কেইবিধমানৰ জীৱনালেখ্য ব্ৰহ্মাৰত বৰ্ণনা কৰা হৈছে, আৰু প্ৰসঙ্গক্ৰমে পৃথিৱীৰ অন্যান্য ঠাইত বসতি কৰা বিভিন্ন জাতৰ ভালুকৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ অধিকাংশ ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ সৰ্বাধিক অৱস্থা উপলব্ধি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এই প্ৰসংগত হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক নামৰ এবিধ ভালুকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। আমাৰ কোনো কোনো মানুহে এইবিধ প্ৰাণীক গছ-ভালুক বুলি কয়। গছৰ ওপৰত বগাই কুৰিৰ পৰাৰ ক্ষমতা আছে বুলিয়েই হয়তো এইবিধ জন্তুক পৰিচয় কৰি দিহাৰ বাবে গছ-ভালুক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লগীয়া হৈছে। পিছে আমাৰ দেশত “সুখ-বিয়েৰ” নামৰ এবিধ ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী আছে সেইবিধক আমাৰ মানুহে মাটি-ভালুক বুলি কয়। আচলতে “সুখ-বিয়েৰ” আৰু হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক এই দুয়োবিধ প্ৰাণীয়েই গছত উঠিব পাৰে। সি যিয়েই কি নহওক গছ ভালুক বুলি ক'লে আৰু হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক নামেৰে জনাজাত প্ৰাণী বিধকে বুজিব লাগিব। হিন্দী ভাষাত এইবিধ ভালুকক বিচ্ বুলি কোৱা হয়।

গছ-ভালুকৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰ চুটি চুটি আৰু অলপ মিহি ধৰণৰ হোৱা দেখা যায়। মাটি-ভালুকৰ গাত গজা নোমবিলাকৰ তুলনাত এইবিধ ভালুকৰ নোমবোৰ পৰিপাট্টকৈ সজাই খোৱা যেন দেখি।

এইবিধ ভালুকৰ লেখত লবলগীয়া শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হল এয়ে যে ইয়াৰ বুকুত ইংৰাজী ভাষাৰ “ডি” আখৰটোৰ নিচিলা এটা বগা নোমৰ দাগ থাকে। বহি থকা অৱস্থাত সন্মুখৰ কালৰ পৰা চাই পঠিয়ালে এই দাগটো টল্ টল্‌কৈ জিলিকি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইবাবে এইবিধ ভালুক জাতীয় প্ৰাণীক এই বগা বৰণৰ দাগৰ সহায়ত অতি সহজে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি। অসম আৰু অসমৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ৰাজ্য কেইখনৰ হাবি-বননি বিলাকত বিবোৰ গছ-ভালুক বাস কৰা দেখা যায় সেইবিলাকৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰ তুলনা মূলক ভাৱে চুটি আৰু মিহি হয়।

তদুপৰি এই নোমৰ আৱৰণৰ ভিতৰৰ ফালে কোনো প্ৰকাৰৰ কোমল-আমল নোম বা উলৰ উৎকৰ্ষ সাধন হোৱা দেখা নাযায়। অসম তথা পূবাস্থৰ অন্যান্য ৰাঙাবিলাকৰ জলবায়ু মৃদু আৰু সেমেকা হোৱাৰ বাবে শৰীৰৰ তাপমান নিয়ন্ত্ৰণ বন্ধিবলৈ অতিৰিক্ত কোমল নোমৰ আৱশ্যক নহয়। সেই কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে এনে ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ প্ৰয়োজন নোদেখিলে। হিমালয় শৈলমালাৰ ওপৰৰ ফালে বাস কৰা গছ ভালুক বিলাকে জাৰ কালি অতিপাত শীতল সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হয়। গতিকে শৰীৰৰ তাপমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবৰ বাবে এইবিলাক ভালুকৰ নোমৰ তলৰ ফালে ছালৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰৰ কোমল আমল নোমৰ উৎপন্ন হয়। গিৰিৰাজ হিমালয় শৈলমালাৰ ওপৰৰ ফালে হিমালয়ৰ মুখা ভালুক নামৰ যিবিধ ভালুক জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰে সেইবিধ ভালুকক গছ ভালুক বা হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক আকাৰত তুলনামূলক ভাবে সৰু হোৱা দেখা যায়।



হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক

হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক নামেৰে জনাজাত ভালুক জাতীয় প্ৰাণীৰ নোমৰ বৰণ আৰু কাৰুকাৰ্য লগত অৰিকল মিহি যোৱা আৰু এখিৰ দ'লা ভাবুৰ পাশ্চিম গোৱাৰ্ছন উত্তৰ আমেৰিকাত বাস কৰে। সেইবিধ ভালুকক আমেৰিকাৰ ব'লা ভালুক নামেৰে জনা যায়। দেখাত একে হলেও আমেৰিকাৰ ক'লা ভালুক আকাৰত ভালেকখিনি ডাঙৰ হয়। দেখাতো এই বিধ প্ৰাণীয়ে এক ভয়মৰ ৰূপ ৰাখা দেখা যায়। আমেৰিকাৰ মুগা-ভালুক আৰু গ্ৰিজলি-ভালুক নামেৰে জনাজাত দুবিধ নামজনা ভালুকৰ পাছতে আমেৰিকাৰ ক'লা-ভালুক নামৰ প্ৰাণীবিধে স্থান পাইছে।

হিমালয় শৈলমালাৰ ওখ ওখ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত যিবিলাক ক'লা ভালুক বা গছ ভালুক গোটীৰ প্ৰাণী বাস কৰে সেইবিলাকে জাবকান্দিৰ সমষ্টিৰ পৰ্বত্য অঞ্চলৰ শীতল পৰিবেশত অতিৰাহিত কৰিবলৈ অকণো অসুবিধা নাপায়। শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা

নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পাব উদ্‌শিনি সংৰক্ষণ কৰি বাৰিব পৰা কোৱল নোৱৰ ভিতৰলৈ আহিব
 খনে সিহঁতক এই বিষয়ত সঁহাৰ কৰে। তাৰ নিৰ্জন পৰিবেশবোৰত সিহঁতে পাখৰ
 কঁক, গুহা-গছৰ আদি সুবিধা জনক ঠাই বিচাৰি লৈ দিনৰ দিনটো তাতে
 চেপেটা মাৰি পৰি থাকে। তিন্ তিন্ ঠাইৰ উন্নত অলম্বানুৱে গৰকা উৎকৃষ্ট পৰিবেশ
 বিলাকত হেঁচাবলৈ বাস কৰি থাকিব পৰাটো এইবিধ প্ৰাণীৰ অন্যতম গুণ। গধূলি
 বেলিকা পশ্চিম আকাশত বেলিচোৱে ডুব মাৰলৈ আহন্ত কৰোঁতে নৌ কৰোঁতেই এইবিধ
 ডালুকে আশ্ৰয় লৈ থকা ঠাইবিলাকৰ পৰা লাহেহেঁচৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহে। গোটেই
 নিশা ধোৱা বস্ত্ৰৰ সন্ধানত ইকালে সিকালে অদাই বনাই ধুৰি কৰে। বাতিপুত্ৰৰ বেলি-
 চোৱে পূব আকাশত উঠিবলৈ যো-জা কৰোঁতে নৌ কৰোঁতেই ই পুনৰ আশ্ৰয় নোৱা
 ঠাইত সোমায়গৈ। দিনৰ দিনটো তাতে পৰি পৰি থাকে। গধূলিৰ সময়খিনি পুনৰ
 ধুৰি অহাৰ উমান পালেহে গাটো কেবেং মেবেং কৰি আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ
 চিন্তা কৰে। এই দৃষ্টভঙ্গীৰ কালৰ পৰা গৰি-পিটিকি চাব নগীয়া হলে এইবিধ অদ্ভুত
 নিশাচৰ প্ৰাণী বুলি কব লাগিব। গভীৰ নিশা ইকালে সিকালে ধুৰি পকি কুৰা সময়-
 খিনিতে ই য'তে বিহকে পায় তাকে ৰাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। ধোৱা বস্ত্ৰবিলাকৰ
 ভিতৰত কল-মূল জাতীয় ৰাস্যও এইবিধ প্ৰাণীয়ে সন্ধান পছন্দ কৰে। হাবিৰ মাজত
 আপোনা-আপুনি উপৰ হোৱা গছৰ পকা পকা ফল মাটিতে সৰি নোক বা
 নোকৰা কৰি থাকে। মাটি-ডালুক জাতীয় প্ৰাণীবোৰে এইবোৰকে বুটলি বুটলি ৰাৱ।
 হিমালয় পৰ্বতত বিবিলাক গছে ডালুকৰ বাবে ধোৱা বস্ত্ৰ যোগান ধৰিব পাৰে সেই-
 বিলাক গছৰ ভিতৰত পিৰেৰ (নাচপতি) এম্বিকট, ৱালনট্ (আখৰোট) আদিৰ নাম
 বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। এইবোৰ বনৰীয়া গছৰ পকা পকা ফলবোৰ
 আপোনা-আপুনি সৰি পৰে আৰু ডালুকবোৰে সেইবোৰ বুটলি বুটলি ৰাৱ।

এইবিধ ডালুকেও বে গছৰ ওপৰলৈ উঠিব পাৰে এই কথাৰ উল্লেখ ইতিমধ্যে
 কৰি অহা হৈছে। মাটি ডালুক বা “সুৰা বিৱেৰ” দৰে এইবিধ ডালুকেও গছৰ ওপৰলৈ
 উঠি নৌ-বাহবোৰ ভঙা কাৰ্বত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱায়। গছৰ ওপৰৰ কোনোবা এঠাইত মাৰি
 নোৱে বাহ পতাৰ উমান পালে মাটি ডালুকে গছ আপোৰ ওপৰলৈ উঠি নৌ বাহৰ
 ভিতৰলৈ আগুৱাবলৈ হাতোৰাখন সুৰুৱাই দি আঙুলিৰে মুঠি মাৰি মাৰি নৌ চাকবোৰ
 উলিয়াই আনে আৰু সেইবোৰ হেপাহ পলোৱাই ৰাৱ। ইহঁতৰ গাত নৌ-গুটিবোৰে
 সিহঁতৰ বিৰাজ ওভেৰে বিহিলেও জন্তুটোৰ কোনো অপকাৰ নহয়। কি কোৱল
 অৱলম্বন কৰি ইহঁতে নৌগুটিৰ ওভৰ বিৰাজ গুণৰ পৰা নিজক বন্ধা কৰিব পাৰে সেই
 কথাৰ বহুলা ডালুদৰে জনা নাযায়। বাতিভঙ্গীয়া বানুহৰ বাৰীত এইবিধ ডালুকে কেতি-
 যাবা দুই এবিধ ৰাস্যকল্যাণ হানি বিবিলি ৰটাৱ। এইদৰে অনিষ্ট সাধন কৰা বস্ত্ৰৰ ভিতৰত
 কুঁহিৱাৰ আৰু ধোৱাৰ জাতীয় কল্যাণ দুখিৰ পৰে। কুঁহিৱাৰ বস খাবলৈ ইহঁতে ডাল
 পায়। পুৰঠ গোৰালবোৰো ছিতি ছিতি ৰাৱ। কীট-পতঙ্গ জাতীয় ক্ষুদ্ৰত প্ৰাণী,
 সিহঁতে পাবি ধোৱা সৰু সৰু কণী আৰু এই কণীবোৰ কুটি ওলোৱা পোক আৰু
 নেটাবোৰ এইবিধ ডালুকৰ উপাদেয় আহাৰ। জন্তুটো ডালুৰ আকাৰৰ ধোৱাৰ বাবে

এইবিলাক আহাৰে ইয়াৰ পেট ভৰাব নোৱাৰে। হান্টিত চৰি কুৰা কিছুমান স্তন্যপায়ী আৰু অন্যান্য গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক দুৰ্বিধা বুদ্ধি এই ৰিধ ভালুকে আক্ৰমণ কৰে। সিহঁতৰ জীৱন বিনাশ কৰি পেট পূৰ্ত্তোৱাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰে। জগৎপ্ৰতিৰ কাষে পাৰ্জৰে থকা হাবি বোৰত বাস কৰিবলৈ লোৱা ভালুকে কেতিয়াবা দ্বৰচীয়া প্ৰাণীৰো হানিবিধিনি ঘটায়।

ভালুকে হঠাৎ আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণ বিনাশ কৰা দ্বৰচীয়া জন্তু বিলাকৰ ভিতৰত ছাগলী, বাৰ-ছাগলী, ভেড়া আদি অনপ সৰু আকাৰৰ জন্তুবিলাক পৰে। চৰণীয়া পথাৰত মুকলি মনেৰে ঘাঁহ ৰাই চৰি ফুৰা অৱস্থাত কিয়া ইহঁতে গছৰ তলত নিচিন্ত মনেৰে জিৰণি লোৱা সময়খিনিত গৰখীয়াৰ অনুপস্থিতিৰ সুযোগলৈ ভালুকে ইহঁতৰ কোনোবা এটা দুৰ্ভগীয়া জন্তুৰ ওপৰত অপ্সিয়াই পৰে। পিঠিত তাৰ থকাও হাতোৰা ধনেৰে চকা এটা মাৰি প্ৰাণ বায়ু সিপুৰীলৈ পঠিয়াই দিয়ে। পাছত মৃত জন্তুটো তাৰ চোকা দাঁতৰে কানোৰ মাৰি ধৰি হাবিৰ মাজলৈ টানি নিয়ে। সেইদৰে জন্তুটো নি হাবিৰ মাজৰ সুবিধাজনক ঠাইত তাৰ মাংস খিনি দগজি দগজি ধায়গৈ।

ভালুকে সাধাৰণতে মুনুহলৈ ভয় কৰে। ওচৰেদি মানুহ পাৰ হৈ যোৱাৰ উমান পালে ই ঠাইতে চেপেটা মাৰি আত্মগোপন কৰিবলৈ যত্ন কৰে। হাজাৰে হওক ভালুক হ'ল এবিধ মাংসাছাৰী হিংসাকুৰীয়া বনৰীয়া জন্তু। মানুহৰ বুদ্ধি বিক্ৰমৰ লগত ই কেতিয়াও অগাভেটা হ'বলৈ সুবিধা নাপায়। তেনেদৰে মানুহক এবিধ অগীম বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন ক্ষমতাশীল আৰু দুৰ্ভয় প্ৰাণী বুলি বিবেচনা কৰিবলৈ তাৰ আহৰি নাই। সেই কাৰণে কেতিয়াবা অকস্মাতে ভয় ধাই আতুৰত পৰিলে আত্মৰক্ষাৰ বাবে ই মানুহকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। অকলশৰীয়া হাবিতলীয়া পথেদি খোজ কাঢ়ি যোৱা মানুহে কেতিয়াবা এনে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হয়। এনে ভয়াবহ পৰিস্থিতিত হিংসাকুৰীয়া বন্যপ্ৰাণী কেইবিধ মানব পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কি কৌশল অৱলম্বন কৰা আৱশ্যক সেই সম্পৰ্কত অসলীয়া সমাজৰ মাজত এখাৰি নীতিবচন প্ৰচলিত আছে।

বচন ফাকি হ'ল এই:-

“ম'হত লৰ

ৰাষত থৰ

ভালুকত পৰ

হাতীত বাপি”

বনৰীয়া ম'হে খেদি আহিলে লৰ দি বা দৌৰ দি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ নীতি বচনে কৈছে। হাবিত বাঘ দেখিলে বোলে একেধৰে তাৰ চকুলৈ চাই থাকিব লাগে। তেতিয়া হেনো বাঘটোৱে মানুহজনক তাতকৈ বলবান আৰু দুৰ্ভয় প্ৰাণী বুলি ভাবি লাহেহৈক আঁতৰি দিয়ে। এনে বৰসাহ কৰি বাঘৰ লগত তুৰি-মুৰি কৰিবলৈ উপস্থিত বুদ্ধি বিচাৰি উলিয়াব পৰা মানুহ সতকাই পাবলৈ টান। তদুপৰি বাঘৰ কি বিপুল। মানুহজনে আগভেটি ধৰাৰ ইচ্ছিত পালে সি আঁতৰি নগৈ তাৰ ওপৰতে অপ্সিয়াই পৰিবও পাৰে। তেতিয়া দেখোন সকলো শেষ। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজক

ৰক্ষা কৰিবলৈ হলে হেনো। বাগি দি দি দৌৰ দিব লাগে। হাতী এটা প্ৰকাণ্ড জানো-
ৰাব। ই ঠাইতে ঘূৰা-পকা কৰি দৌৰিব নোৱাৰে। গতিকে তাৰ আক্ৰমণৰ পৰা
নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে বাগি দি দি দৌৰ দিবলৈ নীতি বচনৰ বিধান দিছে।

এতিয়া ভালুকৰ কথাটো আহে। হাবিভূমীয়া লুঙ-লুঙীয়া পথেদি খোজ কাঢ়ি
অকলশৰে গৈ থকা দুই এজন পথিকে কেতিয়াবা অকস্মাতে ভালুকৰ সন্মুখীন হ'ব
লগীয়া হয়। শুনা যায় যে ভালুক জাতীয় প্ৰাণীয়ে কেনেবাকৈ মানুহক আক্ৰমণ কৰিব
লগীয়া হলে কিম্বা মানুহৰ সৈতে যুক্ত প্ৰযুক্ত হব লগীয়া হ'লে পাছ ঠেং দুখনৰ
ওপৰত থিয় হৈ লয়। হাতোবাখনত থকা দীঘল দীঘল নখেৰে মানুহ জনৰ নাকে
মুখে আঁচুৰিবলৈ ধৰে। পাছফাঁড়ৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিব লগীয়া হ'লে পিঠিত আঁচোবা-আঁচুৰি
কৰি পিঠিখন আৰু ডিঙি ভাগ থকা সৰুকা কৰে। হাতত কোনো প্ৰকাৰৰ অস্ত্ৰ নাথ-
কিলে মানুহজন সহায়হীন হৈ পৰে। হাতত থকুৰিৰ নিচিনা অস্ত্ৰ থাকিলে তাক হেনো
সেই থকুৰিখনৰ ফাকত খামোচ মাৰি ধৰিবলৈ আগ বঢ়াই দিব লাগে। সি থকুৰিৰ
ফাকত খামোচ মাৰি থকাৰ সুযোগ লৈ থকুৰিখন ফাকৰ পৰা টানি উলিয়াই আনিব
লাগে। এগে এগে তাৰ পেটত সেই থকুৰিখন থুচ মাৰি বহুৱাই দিব লাগে। এনে
দুঃসাহসিক কাম কৰিবলৈ অৱশ্যে অসীম ধৈৰ্য আৰু সাহসৰ প্ৰয়োজন হয়।
বহুতো সাহসী মানুহে এনে ধৰণৰ কামত কৃতকাৰীতা লাভ কৰি খ্যাতি উপাৰ্জন কৰা
কথা শুনিবলৈ পোৱা যায়।

এতিয়া ওপৰত উল্লেখ কৰা নীতি বচনৰ উপদেশৰ কথাটো আহে। ভালুক
হেনো মৰা মানুহৰ শ স্পৰ্শ নকৰে। মৰা শ দেখিলে সি নিলগৰ পৰা উঠি আঁতৰ
হৈ গুচি যায়। সেই বাবে হেনো ভালুক দেখিলে মৰভাও ধৰি মাটিতে পৰি দিব
লাগে। এই কামকে অতি দুঃসাহসিক কাম বুলি কব লাগিব।

ভালুক জাতীয় প্ৰাণী বিলাকৰ আৰু এটা বিশিষ্ট গুণ আছে। সেইটো হল এয়ে
যে এইবিলাক প্ৰাণীয়ে বহুত দিনলৈকে নোখোৱা নোবোৱাকৈ পৰি থাকিব পাৰে।
এনে অৱস্থাৰ বৃদ্ধাবলৈ ইংৰাজী ভাষাত "ছাইবাৰনেচন্" শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই
শব্দটোৱে অসমীয়া ভাষাত কোনো অস্ত্ৰে "জান" কালি শুই নিবলৈ কটোৱা অৱস্থা-
টোক বুজায়। ১৯৬৮ চনত আমেৰিকালৈ যাওঁতে মই এবাৰ চেণ্ট লুই নামৰ ঠাইত
প্ৰতিষ্ঠিত এখন চিৰিয়াখানা দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলো। চিৰিয়াখানা চৌহদৰ সবহ ভাগ
ঠাই তেতিয়া বৰফৰ তলত পোত খাই আছিল। তেতিয়া ফ্ৰিফ্ৰীয়া বতাহ মাৰিছিল।
মই মূৰত এটা টুপী পিন্ধি লৈছিলো। কাণ দুখন সোণোকা আৰু কোমল বিধৰ দুচটা
আৱৰণেৰে ঢাকি লৈছিলো। মূৰৰ ওপৰেদি মেৰিয়াই ৰাখিব পৰা এডাল প্লাষ্টিক
চেপেটা শলাই ঢাকনি দুখন লবচৰ নোহোৱাকৈ কাণ দুখনত হেচা মাৰি ধৰি ৰাখিছিল।
বেচ উন্মূ নগাৰ অৱস্থা অনুভৱ কৰিছিলো। এবাৰ ঢাকনি দুখন এৰ-ৱাৰলৈ
চেপ্টা কৰোঁতে অতিপাত ঠাণ্ডাত কাণ দুখন হলে বিন্দাদি বিদ্ধিছিল। পাছত আকৌ
ঢাকনি দুখন কাণত নগাই লৈহে ৰক্ষা পৰিলো। এই চিৰিয়াখানাত "প'লাৰ কিয়ৰ"
(বগা ভালুক) নামৰ এবিধ বেক পেশীয ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বধা হৈছিল। চিৰিয়া-

খানাত এইবিধ শ্ৰাণী চাবলৈ মোৰ মন গৈছিল। এজন কৰ্মচাৰীৰ পৰা জানিব পাবিলোঁ যে বগা ভালুক নামৰ শ্ৰাণীয়ে তেতিয়া গাঁতৰ ভিতৰত লোমাই ওই আছে। দুমাহ মানৰ পাছতহে তাৰ পৰা ওলাই আহিব। বুজিব পাবিলোঁ যে এই শ্ৰাণীবিধৰ তেতিয়া “হাইবাবনেচনৰ” সময়।

“হাইবাবনেচনৰ” কালত একে দোঠাবিয়ে নোখোৱা নোখোৱাকৈ জন্তুটোৱে কেনেটেক জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটো ভাবিহে তৰফ মাৰিব লাগে। এই অৱস্থাটোক জনশন বৃত্তৰ আখ্যা দিব পাৰি। গাঁতৰ ভিতৰত পৰি থকা অৱস্থাত সিহঁতৰ পাকস্থলী সিক্তিকৰ হৈ থাকে আৰু উশাহ লোৱা যন্ত্ৰই সকলো সময়তে কাম কৰে। শবীৰত পুঞ্জীভূত হৈ থকা চৰী আতীয়া পদাৰ্থই জন্তুটোৰ বাদ্যৰ অভাৱ পূৰণ কৰে।

পৰৱৰ্তী কালৰ সময় ছোৱাত এই বিধ ভালুকৰ মিলন হয়। জাৰ কালি পোৱালি জগে। পাছৰৰ ওচা বা গছৰ লিপাব কাঁকৰ মাথত মাইকী জনীয়ে পোৱালি জগায়। জগাব পাছত পোৱালি কেইটা লুতৰ পুতুৰকৈ মৰম লগা হয়। মাকৰ লগত সুখাৰুি কৰি কবিয়েই পোৱালি কেইটা ক্ৰমে ডাঙৰ হবলৈ ধৰে। সেই সময়তে মাকে তাঁহাতক নানা ধৰণৰ শিক্ষা দিয়ে।



হিমালয়ৰ মুগা ভালুক

এণী সন্ধ্যাপানী

ৰংগা সাহাৰী

শাস্তা আৰু চাৰি

লেখক — আৰু চাৰি আৰু চাৰি

দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাকৰ বৰণৰ ভিত্তিতাগ কৰিব লগীয়া হ'লে গোটেই
বৃক্ষবীক্ষণে নিশ্চয় এনেকাল ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰা ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী-
বিলাকক বিভিন্ন প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। তাৰে কেইবিধ মানৰ গাৰ নোমবোৰ
ক'লা হয়। আন দুবিধ মানৰ ক্ষেত্ৰত এই নোমে মুগা ৰূপ ধাৰণ কৰে। সৰ্বাতোকৈ
শমত দেখা যায় যে উত্তৰ মেৰুৰ বৰফে গৰকা ঠাই বিলাকত যিবিধ ভালুক বাস কৰে
সেই বিধৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাকৰ বৰণ বগলী চৰাইৰ পাখিৰ দৰে চো চো কৈ
বগা হয়। এতেকে পাউকতে কৈ থৰ পাৰি যে তিনিবিধ বেলেগ বৰণ ভালুক গোষ্ঠীৰ
এণী বিলাকৰ গাত প্ৰজাতি অনুযায়ী বিকশিত হৈছে। আমাৰ ভাৰত উপ-মহাদেশখনত
সচৰাচৰ বাস কৰা দুবিধ ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে।
তাদে এণীৰক মাটি-ভালুক বা “স্লথ-বিয়েৰ” আৰু আন বিধক গছ-ভালুক বা হিমালয়ৰ
ক'লা ভালুক নামেৰে পৰিচয় কৰিও দিয়া হৈছে। এই প্ৰৱন্ধত যিবিধ ভালুকৰ জীৱনালৈখ্য
বৰ্ণনা দিবলৈ পোৱা হৈছে সেইবিধৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ মুগা হয়।
তাকে হিমালয়ৰ মুগা ভালুক নামেৰে জনা যায়। ইয়াক ভাৰত উপ-মহাদেশৰ ভৈয়াম অঞ্চল
বিলাকত বাস কৰা সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শৈলমালাৰ ওৰ ওৰ পৰ্বতীয়া ঠাই-
বিলাকত এই বিধ ভালুকক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মুগা ভালুকৰ সচৰাচৰ
বাসস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি কেবল ভাৰতবৰ্ষৰ হিমালয় পৰ্বতমালাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা
নাই। ইউৰোপ আৰু এণ্ডা মহাদেশ দুখনৰ উত্তৰ অঞ্চলত থকা বহুতো এলেকাঠল
ইয়াৰ আবাস ভূমি বিৰূপি আছে। পশ্চিম গোলার্ধৰ উত্তৰ আমেৰিকাত আন এবিধ
প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ মুগা ভালুক বাস কৰে। এইবিধ ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক আমেৰিকান
মুগা-ভালুক নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। ইউৰোপ মহাদেশৰ উত্তৰ অঞ্চলত থকা
কিছুমান ঠাইত যিবিলাক মুগা বগলীয়া ভালুক বাস কৰে সেই বিলাক আকাৰত প্ৰকাণ্ড
আৰু আকৃতিত ভয়ঙ্কৰ হয়। এইবিধ মুগা ভালুক ইউৰোপীয় মুগা-ভালুক নামেৰে
জনা যায়। উত্তৰ আমেৰিকাৰ উত্তৰ পশ্চিমত থকা অলাস্কা নামৰ ভূ-ভাগত নামবিধৰ

আপুৰুগীয়া বন্যপ্রাণী বাস কৰে। এই প্রাণী বিলাকৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ মুগা-ভালুক নামেৰে জনাজাত প্রাণীবিধক অন্যতম বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাত আলেক্সাৰ কানে বাস কৰা মুগা-ভালুক বিলাক আকাৰত আনবিলাক মুগা ভালুকতকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। ওপৰত উল্লেখ কৰা আটাইবিলাক মুগা-ভালুকক বুজাবলৈ “আৰচাচ্ আৰ্কটাচ্” নামৰ শব্দ দুটা সৰ্বত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই বৈজ্ঞানিক নামৰ তৃতীয় স্থানত সংযোগ কৰি স্থানীয় ভাৱে বুলি কৰা অন্তৰিলাকক চিনাকি কৰি দিয়া হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ হিমালয় পৰ্বতমালাত যিবিধ মুগা-ভালুক বাস কৰে সেইবিধৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ’ল “আৰচাচ্ আৰ্কটাচ্ ইছাৰ্বেলিনাচ”।



হিমালয়ৰ মুগা-ভালুক

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা আৰু হিমালয়ৰ মুগা-ভালুক নামেৰে পৰিচিত ভালুক গোষ্ঠীৰ প্রাণীবিধ আকাৰত হিমালয়ৰ ক’লা ভালুকতকৈ ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ দেহাটোও মজবুত আৰু আটল হোৱা দেখা যায়। কিন্তু ইউৰোপ

আৰু আমেৰিকা মহাদেশত যি যি উপ-প্রজাতিৰ ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰে সেই দুবিধ মুগা ভালুকৰ তুলনাত হিমালয় পৰ্বতমালাৰ বনফে গৰুৱা ঠাইবোৰত বাস কৰা মুগা ভালুক জাতীয় প্ৰাণীবিলাক আকাৰত তুংনামূলক ভাৱে সৰু হয়। উত্তৰ পাশ্চিম আৰু মধ্য হিমালয়ৰ সুউচ্চ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰে এইবিধ প্ৰাণীৰ বাসে সচৰাচৰ বসতি স্থানবিলাক নিৰ্ণয় কৰে। যিবোৰ পৰ্বতীয়া ঠাইত ওখ ওখ মনল ভাৰতীয় গছবোৰৰ সীমানেখা স্থায়ী ভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আৰু যি সীমাৰেখাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোড-ডেজন্ প্ৰভৃতি সৰু আকাৰৰ গছ আৰু বিস্তীৰ্ণ ঘাঁহনি পথাৰৰ দৰে হেলনীয়া ঠাইবোৰ বিয়পি আছে এনেবোৰ সেউজীয়া পথাৰলৈ সময় বুলি মুগা ভালুকবোৰ নাগি নাগি আহে। জাব কালি ইহঁতে গুহা গছৰত কিম্বা পাখৰৰ তলত আশ্ৰয় লৈ নোখোৱা নোবোৱাকৈয়ে বহুত দিন পৰি থাকে। এইদৰে একে নেঠাইয়ে পৰি থকা অৱস্থাক “হাইবাননেচন” বুলি কোৱা হয় বুলি ইতিপূৰ্বে স্থানান্তৰত উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। এই সময়ত শৰীৰত গোটিখাই থকা চৰীৰোৰে জন্তটোক নোখোৱাকৈ জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰে।

গৰম দিনবোৰ আহি পালে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওপৰৰ ফালত ঠাইবোৰত গোট মাৰি থকা বনফৰ চপৰাবোৰ লাহে লাহে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বৰফবোৰ গলি গলে সেই ঠাইবোৰত নানাবিধৰ ঘাঁহ আৰু অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ উদ্ভিদৰ উৎপন্ন হয়। সেউজীয়া ঘাঁহনিবোৰত বনৰীয়া লিলি আৰু অন্যান্য জাতীয় উদ্ভিদবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া সেই ঠাইবোৰলৈ অনুপম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য নাগি আহে। মুগা ভালুক জাতীয় প্ৰাণীবোৰে তেতিয়া ওপৰৰ ফালে উৎপত্তি হোৱা এই নতুন পৰিবেশবোৰলৈ লাহে লাহে গতি কৰে। কুমলীয়া ঘাঁহ খাবলৈ বুলি সেইবোৰ ঠাইত গোট খোৱা তুং-ভোজী বনৰীয়া প্ৰাণীবোৰ ইহঁতে ধৰি ধৰি খায়। পোক, পৰুৱা, কীট-পতঙ্গ আদি নিৰুপায়ৰ জন্তুৱে ইহঁতৰ খাদ্যাভাৱ আংশিক ভাৱে পূৰণ কৰে। এইবোৰ : পৰ্বতীয়া ঠাইত সচৰাচৰ বাস কৰা নিগলি, এলুৱ, মাৰমাট্ আদি প্ৰাণীবোৰকো ইহঁতে ধৰি ধৰি খায়। খোৱা বস্তুৰ অভাৱ হলে ইহঁতে আগতে গৰি থকা জন্তুৰ থেলা-পচা মাংসবোৰ বিচাৰি বিচাৰি খায় আৰু তেনে বস্তুবোৰে খাদ্যাভাৱ আংশিক ভাৱে পূৰণ কৰে।

কোৱা থাকল্য যে এই পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত কিছুমান জনজাতীয় মানুহে নিগাৰীকৈ বাস কৰে। সিহঁতে ছাগলী, ভেড়া আদি জন্তুও পোহে। গৰখীয়া ল'ৰাবিলাকে এই জন্তুবোৰ চৰাবলৈ মুকলি বুৰীয়া ঠাইবোৰলৈ যায়। সিহঁতে এই ঘৰতীয়া জন্তুবোৰ আকৈ আকৈ ঘাঁহনি পথাৰবোৰত চৰিবলৈ বেলি দিয়ে। আগৰ মুগা-ভালুকে সুযোগবুজি এই ঘৰতীয়া প্ৰাণীবোৰৰ দুই এটাক ধৰি কৰে।

এইবিধ ভালুকক পাখৰৰ মাজৰ সুবিধা জনক ঠাই আৰু গাঁতত লোৱাই পোৱালি জগোৱা দেখা যায়। পোনেই জগোতে পোৱালিবোৰৰ চকু জাপ খাই থাকে। দুই এদিনৰ পাছতে সিহঁতৰ চকু বেল খালে পোৱালি মখাই কেবেং বেবেং কৰিসকৈ ধৰে। খোজ কাঢ়ি ইকাল লিকাল কৰিব পৰা হলে মাক জনীয়ে ধোলাৰি ছলতে সিহঁতক শিকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইবিধ ভালুককও এবাৰত একাধিক পোৱালি জগায়।

মালয় ভালুক

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাছাৰী

গোত্ৰ—আৰ্চিদি

প্ৰজাতি—হেলার্কটচ্ মালয়ানচ্

ভাৰত উপ মহাদেশৰ অন্তৰ্গত সচৰাচৰ বাস কৰা চতুৰ্ভুজ বিধ ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক মালয় ভালুক নামেৰে জনা যায়। এইবিধ ভালুকৰ উৎপত্তি কম। সেই কাৰণে মাটি ভালুক আৰু গছ ভালুক নামেৰে পৰিচিত আন দুবিধ ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ দৰে ইয়াক অধিক বৰে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অলমকে কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো কোনো হাৰি বননিত ইয়াক লেবেঙা লেনেঙাকৈ আনেঙে আনেঙে বাস কৰা দেখা যায়। এই বিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান বা বাতাসিক পৰিবেশ আৰু বিচৰণ ভূমি কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ হৈ থকা নাই। দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ বুন্দেশ্বৰ মাৰ্জেনি পাৰ হৈ গৈ ইন্দোনেচিয়া আৰু মালয়ালিয়া পৰ্যন্ত এইবিধ ভালুকক ঠাই অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত ভাৱে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সুৰাত্ৰা, জাভা, ষাণ্ডা, চিলিবিট্ আদি দ্বীপপুঞ্জত এই বিধ প্ৰাণীয়ে নিগ্ৰাহীকৈ বাস কৰিবলৈ উপযুক্ত পৰিবেশ বিচাৰি লৈছে। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ সিদ্ধান্তে বৰা চীন দেশৰ বহুতো ঠাইত এইবিধ বন্যপ্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান বিস্তাৰিত হৈ আছে। এইবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ মালয় ভালুক নামৰ শব্দ বুটাব বাহিৰে অন্য কোনো নাম অলপীয়া জাৰাত প্ৰচলিত হৈ থকা দেখা নাযায়। অন্যান্য দুবিধ আৰাধ এই ফালৰ ঠাইবিলাকত বাস কৰা ভালুকৰ দৰে এইবিধ ভালুককো গছৰ ওপৰলৈ উঠিব পাৰে।

মালয়ালিয়াৰ কালে এইবিধ বন্যপ্ৰাণীৰ উৎপত্তি দেখি। - সেই দেশৰ নাম অনুযায়ী এইবিধ ভালুকৰ নাম মালয় ভালুক হৈছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। আনৰ এই কালৰ মাটি পানী আৰু জলস্ৰোতৰে এইবিধ প্ৰাণীক জি-পুপি কালৰ পৰা আভিভেকৈ ধৰণ কৰি আহিছে। সিহে এইবিধ প্ৰাণীৰ জন্ম সংস্থা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাতাসিক পৰিবেশ বিলাকত আশাতীত ভাৱে কমি অহাৰ উমান পোৱা গৈছে। কিয়নো ইয়াক আশাৰ এই কালৰ মাদুৰবিলাকে কাটিব কেতিয়াহে হাৰি বননিত লগ পায়। নবৰ ভাৰত কেন্দ্ৰত বুদ্ধত ইংৰাজী ভাষাৰ "জি" আকৰটোৰ লিপিখন কৰা লগ থকা মাটি ভালুক বা হিমালয়ৰ কাল ভালুক নামৰ ভালুক বিধৰ অৱস্থায় পৰিভৱীয়া মাদুৰ

ভেটা-ভেটি হয়। কোনো কোনো হাবিতলীয়া মানুহে কেতিয়াবা অকস্মাতে হাবিত দুই এটা ভালুকৰ পোৱালি নিঠকুৱা অৱস্থাত লগ পাই মৰমতে ধৰি লৈ আছে। সেই ভালুকৰ পোৱালি তেওঁলোকে সবহ ভাগ ক্ষেত্ৰতে গুৱাহাটীৰ চিৰিয়া-খানালৈ প্ৰতি পালনৰ বাবে পঠাই দিয়ে। এই ভালুক পোৱালিবিনাকৰ সবহভাগকেই বুকুত আঁচ ধৰা হিমালয়ৰ ক'লা ভালুকৰ বংশধৰ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। মানৱ ভালুকৰ জন্তু-সংখ্যা আশাৰ হাবি



মানৱ ভালুক

বননিবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণৰ হোৱা হ'লে এই দৰে ধৰি অনা ভালুক পোৱালিৰ ভিতৰত দুই চাৰিটা মানৱ ভালুকৰ পোৱালিও থাকিলহেঁতেন। ১৯৬০ চন মানত এটা মানৱ ভালুকৰ পোৱালি ধৰি আনি গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাত প্ৰতিপালন কৰি ৰখা হৈছিল। কিছু দিনৰ অন্তত তাৰ মৃত্যু হ'ল।

মেঘালয়ৰ শ্বিলং নগৰত লেডী হাইদৰী পাৰ্ক নামৰ বিধৰ প্ৰমোদোদ্যান পৰি-
পাটিকৈ বধা হৈছে সেইখনত নানাবিধ ফুলজাতীয় উদ্ভিদে শোভাৰ্হন কৰি বসক ঝমক
পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। নানা জাতীয় দেশী বিদেশী ফুল নগোৱা ভেটিবোৰ বিচিত্ৰ
ধৰণৰ ফুলৰ ধোপাৰে উপচি থাকে। পানীত গজা ফুল-ধৰা গছবোৰে দ-চানেকীয়া
ঠাইবোৰ ধুনীয়াতকৈ সজাই পৰাই ৰাখে। মেঘালয়ৰ এই পাৰ্কখনৰ ভিতৰতে কিছুমান
আকৰ্ষণীয় বন্যপ্ৰাণী আটোৱটোকাৰিকৈ বন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। পুৱা গধূলি ইয়াত
মানুহৰ ভিৰ হয়। দৰ্শক সকলে তাত প্ৰৱেশ কৰি নানা বিধৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু ধোপা
ধোপে ফুল ফুলি থকা গছ নতাব সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰাৰ উপৰিও প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে
নানা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। আপুৰুগীয়া বন্যপ্ৰাণী কিছুমান প্ৰতিপালন কৰি
বন্ধাৰ ব্যৱস্থা থকাৰ বাবে এই প্ৰমোদোদ্যানখনক “মিনি জু” অৰ্থাৎ “সুত্ৰ চিৰিয়াখানা”ৰ
আখ্যাও দিয়া হয়।

কুহু সংস্কৰণৰ এই চিৰিয়াখানাতো এটা মালয় ভালুক গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বধা হৈছিল।
অন্তটো আকাৰত বেচ ডাঙৰ আৰু দেখনত ধুনীয়া আছিল। যিটো সৰু ধৰণ
আহিত বনোৱা সজা বা আবেষ্টনীৰ ভিতৰত এই দৰ্শনোপযোগী অদ্ভুতশেষ্যক বধা
হৈছিল পুৱা গধূলি তাৰ কাষত সদায়েই দৰ্শকৰ সমাবেশ হৈছিল। ধেমেলীয়া প্ৰকৃতিৰ
অদ্ভুটোৱে দৰ্শক সকলৰ পৰা কিবা ধোৱা বস্তু পোৱাৰ আশাত হাতোকা এখন নোহাৰ
নেইলিঙৰ বাহিৰৰ ফালে আগ বঢ়াই বঢ়াই দিছিল। তাৰ তেনে ধেমেলীয়া ব্যৱহাৰত
দৰ্শকসকলে আনন্দ পাইছিল। এদিন এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাই চিৰিয়াখানাৰ আনন্দ পৰি-
দেশ্য অন্ত পেলালে। ঘটনাটো ঘটিছিল ঠিক এনেদৰে।

কুহু সংস্কৰণৰ এই চিৰিয়াখানা তথা প্ৰমোদোদ্যানত প্ৰতিপালন কৰি বধা
আপুৰুগীয়া বন্যপ্ৰাণীবিলাকক বিজন কৰ্ম্মায়ে তলাকাৰ কৰিব লগীয়া হৈছিল তেওঁৰ
নাম বাহাদুৰ চেত্ৰী আছিল। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো অৱশ্যে ভাল দৰে এতিয়া মনত
নপৰে। কৰ্ত্তব্যনিষ্ঠাৰ ফালৰ পৰা এওঁৰ বেচ নাম আছিল। বন্যপ্ৰাণী বিলাকক সময়-
বতে ধাবলৈ দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই উদ্যানখনৰ পৰিবেশ ফুঁ মাৰি তাত ধাব
পৰাটক পৰিষ্কাৰ কৰি বন্ধাৰ ব্যৱস্থাত কাম এওঁৰ তত্ত্বাবধানতে সম্পাদিত হৈছিল। উদ্যানৰ
ভিতৰতে তেওঁ বাস কৰা বাঁহ কাঠৰ ঘৰটো আছিল। মানুহজনে এই ঘৰটোত অকলে
অকলে বাস কৰিছিল। এদিন সন্ধিয়াৰ পাছত তেওঁ ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাই জুইশালৰ
কাষতে বহি তাত বন্ধাৰ কামত ব্যস্ত আছিল। এনেতে মালয় ভালুকটো সজাৰ ভিতৰৰ
পৰা কেনেবাটক ওলাই আহি এওঁ তাত বান্ধি থকা ঘৰটোৰ ভিতৰত সোৱালগৈ।
উৰাতু খাই মানুহজনে ভিৰাই পকাই বাহিৰলৈ পৌৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ভালুক-
টোৱে তেওঁক পাছে পাছে ধেদি নি গেইটৰ কাষ পোৱালেগৈ। গেইটখন ভেটিয়া
বন্ধ অৱস্থাত আছিল। গেইটৰ ওপৰলৈ উঠি মানুহজনে পাব হ’বলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই
ভালুকটোৱে তেওঁৰ পিঠিত তাৰ শক্তিময় হাতোকাখনেৰে ধাপ মাৰি পাবে মানে আঁচ-
বিৰলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেজৰ টোপাৰে তাৰ গোটেই দেহ বাঙলি হ’ল। বাটেদি
অহা ধোৱা কৰা মানুহে তাৰ সেই দুৰাৱস্থা দেখি চিঞৰ বাধৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাত

ভালুক পলাল। বেচেৰাক চিকিৎসান বাবে হস্পিতাললৈ নিয়া হ'ল যদিও ডাক্তৰে তেওঁক
ৰচাৰ নোৱাৰিলে। ১২ ঘণ্টামান সংগ্ৰাম কৰি শেষত তেওঁ মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'ব
লগা হ'ল। কি মৰ্দ্ভেদী ঘটনা! মূলকি হৈ টাউনত ভ্ৰমণ কৰি কুৰিবলৈ লোৱা
এই আপৰঙ্গীয়া জন্তুটোকো পাছত ওলি বিহু কৰি নিৰ্মম ভাৱে ৰখ কৰিব লগা হ'ল।
মালয় ভালুক জাতীয় এই প্ৰাণীটোকো মেঘালয়ৰ কোনোবা এখন হাৰিৰ পৰা বনি অ-
নাইছিল। পিছে হলে কি হব। মৃত্যুৱে তাক ছাত্ত বাউলি দি মাতি
আনিলে আৰু শেষত সি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল। মেঘালয়তো এই জাতীয়
প্ৰাণী বনৰীয়া অৱস্থাত বৰ বেছি পৰিমাণে আছে বুলি ক'ব নোৱাৰি।

মালয় দ্বীপপুঞ্জত সাধাৰণতে বাস কৰি থকা বিধৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে এইবিধ
ভালুকক মালয়-ভালুক বা মালয়দেশীয় ভালুক বুলি কোৱা হয়। আচলতে ইয়াক “মাল-
য়ান চান বিয়েৰ” নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। অলৰীয়া ভাষাত আমি বজিতা
খুৱাই ইয়াৰ নামকৰণ কৰিবলৈ হলে “মালয়ৰ সূৰ্য-মুখী” ভালুক বুলি কব পাৰোঁ।
ইমান দীঘলীয়া নামেৰে জন্তুটোক মাতিবলৈ আমাৰ সময় তো নায়েই ধৈৰ্যবো অডাৰ।
সেই বাবে আমি এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক মালয় ভালুক বুলিয়েই ক'ম। মালয়চিয়ান
হাৰিবোৰত উৎপন্ন হোৱা গছৰ ডালত বহি এই বিধ প্ৰাণীয়ে বাতিপুহাৰ ব'দ চেৰেঙাৰ
উমখিনি উপভোগ কৰে। ওচৰৰ গছৰ ডালত উঠি সেই দেশৰ এবিধ হলৌ বান্ধবে
ইয়াক দেখি পাবে মানে উকি মাৰি চিঞৰে। ব'দ লোৱাৰ অভ্যাস থকাৰ বাবেই এই
বিধ প্ৰাণীক “মালয়ান চান বিয়েৰ” অৰ্থাৎ “মালয়: সূৰ্যমুখী ভালুক” বুলি কোৱা হয়।



পাণ্ডা জাতীয় প্ৰাণীবিলাক

এচিয়া মহাদেশৰ কোনো কোনো ঠাইত পাণ্ডা নামেৰে জনাজাত দুবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দেখাত এইবিলাক প্ৰাণীক নিচেই সৰু আকাৰৰ ভালুক বেন লাগে। তাৰে এবিধক “জায়েন্ট পাণ্ডা” আৰু আন বিধক “ৰেড পাণ্ডা” নামেৰে জনা যায়। “ৰেড পাণ্ডা” বা ৰঙা পাণ্ডা নামৰ জন্তু বিধ ভাৰতবৰ্ষীয় প্ৰাণী। হিমালয় শৈলমালাৰ ওখ ওখ পৰ্বতীয়া ঠাইৰ হাৰিবননি বিলাকত এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। ইহঁতৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ চক লেটন দৰে উজ্জ্বল হয়। নেপাল, ভূটান, ছিমিয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। হিমালয় পৰ্বতৰ সিপাৰে চীন দেশৰ কোনো কোনো ঠাইত আন এবিধ পাণ্ডা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰে। এইবিধ পাণ্ডাক “জায়েন্ট পাণ্ডা” অৰ্থাৎ সৈতাকায় পাণ্ডা নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। “জায়েন্ট পাণ্ডা” আকাৰত “ৰেড পাণ্ডা”তকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ গাত কজলা বৰণৰ নোমৰ উৎপত্তি হয়। বিচিত্ৰ বৰণৰ নোমৰ আৱৰণেৰে সৈতে জন্তুটো মৰম লাগি যোৱাতকৈ ধুনীয়া হয়। এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ জন্তু-সংখ্যা এতিয়া চীন দেশত আশাতীত ভাৱে কমি আহিছে। সেই কাৰণে এই বিধ প্ৰাণীক আন্তৰ্জাতিক ভিত্তিত বিপদাপন্ন প্ৰজাতি বুলি গণ্য কৰা হৈছে। তদুপৰি প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত ইয়াৰ বংশ বৃদ্ধি কৰি অতীতৰ অৱস্থা ফুৰাই আনিবলৈ সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে।

“ৱাৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাণ্ড” (বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী ন্যাস সমিতি) নামৰ বিশ্ববিদ্যা অনুষ্ঠানে “জায়েন্ট পাণ্ডা”ৰ ছবিখনক প্ৰতীক ৰূপে গ্ৰহণ কৰি এই বিধ প্ৰাণীৰ প্ৰতি সকলোৰে গুৰুত্ব আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। “জায়েন্ট পাণ্ডা” নিচিনা মৰম লগাতকৈ ধুনীয়া অথচ বিপদৰ সন্মুখীন হৈ পৃথিবীৰ বুকুৰ পৰা একেবাৰে নিঃশিষ্ট হৈ যোৱাৰ আশঙ্কা থকা এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সাধাৰণ সহায়ত “ৱাৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাণ্ড” বিশ্বৰ সকলো সচেতন নাগৰিকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে। এইবিধ প্ৰাণীৰ ছবিখনৰ অৱিয়তে সন্মাই সৰিনয়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা আপুৰুগীয়া বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে।

কেইজনমান বৈজ্ঞানিক তথা বন্যপ্ৰাণী বিদে চীন দেশত “জায়েন্ট পাণ্ডা”ৰ অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে সম্পাদন কৰা অনুসন্ধান আৰু পিয়ল কাৰ্ভৰ ফলাকল এতিয়া আনিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ পৰা আনিব পৰা গৈছে যে চীন দেশৰ বিবোৰ ঠাইত সাধাৰণতে এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে নানা কাৰণত সেই স্বাভাৱিক পৰিবেশ বিলাকৰ সজোচন ঘটিছে। চীন চৰকাৰে

অবশ্যে অভয়াবন্য সঙ্গ আছুতীয়া পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি এইবিধ আপুৰুগীয়া প্রাণীক যাউতিবুগীয়াটক সংৰক্ষণ আৰু সংস্থাপন কৰিবৰ বাবে যাদৃতীয় ব্যৱস্থা হাওঁত লৈছে।

এইবিধ বিচিত্ৰ প্রাণীয়ে যিবিলাক গছৰ পাত ভক্ষণ কৰি জীৱন ধাৰণ কৰে সেই বিলাক গছৰ ভিতৰত এবিধ বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদক সৰ্বপ্রধান স্থান দিব লাগিব। এইবিধ বাঁহৰ পাতবোৰ বাঁহ ইহঁতে পেটৰ ক্ষুধা নিবাবৰণ কৰে। অন্য কোনো জাতীয় গছৰ পাত আদি খোৱা বিধৱত এইবিধ পাণ্ডাই অকণো অভিকণটি প্রদৰ্শন কৰা দেখা নাযায়। বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ বিলাকৰ এটা লেখত লৰ্ণ লগীয়া বৈচিত্ৰ্য হ'ল এয়ে ইহঁতে অন্যান্য গছ-গছনিৰ দৰে প্রতি বছৰতে ফুল নধৰে। প্ৰায় ২০।২৫ বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদবিলাকৰ ফুল ধৰে। যি বছৰত ইহঁতৰ ফুল ধৰে সেই বছৰত এটা ভাওঁত বাঁহৰ আটাইবোৰ গছেই একে সময়তে একেলগে ফুল ধৰে। বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ আন এটা বৈচিত্ৰ্য হ'ল এয়ে যে ফুল ধৰাৰ পাছত আটাইবোৰ বাঁহ নথি যায়। সৰ্বাধিক ভাৱে পুষ্পৰ বিকাশ হোৱা এই প্রাকৃতিক বিস্ময়ক সাময়িকী পুষ্পধাৰণ বৃদ্ধি অভিহিত কৰা হয়। ফুল ফুলা বাঁহৰ পৰা বিৰোৰ গুটি বাটিত সৰি সৰি পৰে সেই গুটিবোৰৰ পৰা অল্পৰ গজি পুৰঠ বাঁহ-গছ হ'বলৈ কেইবাটাও বছৰ লাগে। বিশেষজ্ঞ সকলে অনুমান কৰিছে যে ১৯৮৫ চনত চীন দেশত থকা আৰু "জায়েন্ট পাণ্ডাই" পাত খোৱা আটাই-বোৰ বাঁহ ফুলিব। এইবাবে ফুল ধৰা বাঁহ-গছবোৰ সেই বছৰত একেলগে নথি গ'লে "জায়েন্ট পাণ্ডা" বিলাকৰ জীৱনলৈ দুৰ্ভিক্ষ নামি আহিব। সেই বাবে পৃথিবীৰ বিভিন্ন দেশত থকা বন্যপ্রাণী বিদ্-সকল এতিয়া মহা চিন্তাত পৰিছে। "জায়েন্ট পাণ্ডাক" বন্ধা কৰিবলৈ তেওঁলোকে গভীৰ ভাৱে চিন্তা কৰি প্ৰতিকাৰৰ পথ উদ্ধাৱন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে।

"জায়েন্ট পাণ্ডা" আৰু "শ্বেত পাণ্ডাৰ" সচৰাচৰ বাসস্থান অতীততে দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ ব্ৰহ্মদেশলৈকে বিস্তৰি আছিল। "জায়েন্ট পাণ্ডা" এতিয়া বৰ্ষা ৰেখত পাৰলৈ নাইকিয়া হ'ল। গছৰ ওপৰৰ ডালে-পাতে বগাই কুৰা প্রকৃতিৰ বৃক্ষশালী প্রাণী হলেও পাণ্ডা বিলাকে যাদে সময়ত পুৰণি বৃদ্ধি আটাইলৈকে দাবি আহে আৰু বাটিত পথি থকা খোৱা বস্তবোৰ বিচাৰি বিচাৰি ধাৰহি। ইহঁতৰ দাঁতবিলাক অতিপাত বজবুত আৰু শক্তিসম্পন্ন হয়। এই দাঁতৰ সহায়ত ইহঁতে অতি টান বস্ত আৰু বাঁহ থকা পদাৰ্থ ভাঙি-ছিঙি চুৰাব কৰিব পাৰে। সেইবোৰ খোৱা বস্ত হজম কৰাত ইহঁতৰ অকণো অসুবিধা নহয়।

যেহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰি সীয়াৰ অন্তৰ্গত কেৱল "শ্বেত পাণ্ডা" বা বঙা পাণ্ডা নামৰ প্রাণীবিধকহে বাস কৰা দেখা যায়, সেইবাবে পৰবৰ্তী প্ৰবন্ধৰ সহায়ত এইবিধ প্রাণীৰ জীৱনালেখ্য অৱন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। কোৱা বাহুল্য যে "শ্বেত পাণ্ডা" অন্যতম নাম হ'ল "কেই বিয়েৰ"। তাকে কলনীয়া ভাষাত বেকুৰী-ভালুকৰ আখ্যা দিয়া হৈছে।

মেকুৰী-ভালুক বা বঙা পাণ্ডা

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—মাংসাখৰী

গোত্ৰ—এলিওৰিডি

প্ৰজাতি—এলিওৰাচ্ ফুৰ্গেনচ্

মেকুৰী-ভালুক বা বঙা-পাণ্ডা নামৰ এবিধ প্ৰাণীৰ বিষয়ে এই প্ৰবন্ধত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আমাৰ অসমৰ বনভূমি বিলাকত এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা নাযায়। হিমালয় শৈলমালাৰ ওখ ওখ পৰ্বতীয়া ঠাইৰ গছ-গছনিবিলাকত এই বিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অথচ নাগালেণ্ড, মেঘালয় আদি পাহাৰী ৰাজ্যবিলাকত থকা হাৰি-বননি বিলাকত পাণ্ডা গোষ্ঠীৰ কোনো প্ৰাণী বাস কৰাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। ঠিক সেইদৰে অসমৰ অন্তৰ্গত থকা কাৰ্বি আংল আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা দুখনৰ স্বাভাৱিক পৰিবেশ বিলাকত বঙা-পাণ্ডা বাস কৰি আছে বুলি জনা নাযায়। সেই কাৰণে গিৰিৰাজ হিমালয়ৰ ওখ ওখ পৰ্বতীয়া বনভূমি বিলাকেই এইবিধ প্ৰাণীৰ বাবে সচৰাচৰ বাসস্থান বুলি ধৰি লব লাগিব। নেপাল আৰু ভূটানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছিক্কিমৰ মাজেদি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে যি পাৰ্বত্য ভূ-ভাগ আছে সেই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলতে এইবিধ প্ৰাণীয়ে নিগাৰ্জীকৈ বাস কৰিছে। হিমালয় শৈলমালাৰ সুউচ্চ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰ অতিক্ৰম কৰি ইহঁতৰ কিছুমান প্ৰাণী চীন দেশৰ দক্ষিণ অঞ্চলত সোমায়গৈ। দক্ষিণৰ ফালে ব্ৰহ্মদেশৰ কোনো কোনো ঠাইত এইবিধ প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰহ্মদেশত বাস কৰা বঙা পাণ্ডা বিলাকৰ নোৰবোৰ তুলনা মূলক ভাৱে দীৰ্ঘ হয়। তদুপৰি সেইখন দেশৰ স্বাভাৱিক পৰিবেশ বিলাকে ধাৰণ কৰা বঙা-পাণ্ডা বিলাকৰ মূৰবিলাক আকাৰত তুলনা-মূলক ভাৱে ডাঙৰ হোৱা দেখা যায়। সেইখন দেশত সাধাৰণতে বাস কৰা বঙা-পাণ্ডা বিলাকৰ দাঁতবোৰ অধিক শক্তিশালী আৰু মোটা বুলি জীৱৰন্ পণ্ডিত সকলে অভিন্নত প্ৰকাশ কৰিছে। ইহঁতৰ দেহৰ দীৰ্ঘতা হিমালয়ত বাস কৰা বিলাক প্ৰাণীৰ দেহৰ দীৰ্ঘতাতকৈ তুলনামূলক ভাৱে বেছি বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। তদুপৰি এই ভূ-ভাগত নিগাৰ্জীকৈ থলুৱা ভাৱে বাস কৰা বঙা-পাণ্ডা বিলাকৰ মূৰৰ আকৃতি ধোপোৰা আৰু মূৰীয়া ধৰণৰ হোৱা দেখা যায়। ইহঁতৰ ঠোঁট কেইখন অধিক চুটি আৰু বঙহাল হয়।

বঙা-পাণ্ডা বিলাকৰ অন্যতম নাম হ'ল মেকুৰী-ভালুক। ইয়াৰ দ্বাৰা ইটো কথা বুজা যায় যে প্ৰকৃতে ই ভালুকৰ দৰে হ'লেও কেৱল অধিকল মেকুৰীৰ নিচিনা হয়। সেই কাৰণে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক মেকুৰী-ভালুক অৰ্থাৎ মেকুৰীৰ নিচিনা ভালুক বুলি কোৱা হৈছে। প্ৰকৃতে এইবিধ প্ৰাণীক মেকুৰী গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বুলি কোৱা



বঙা-পাণ্ডা

পধ্যেই ক'ব নোৱাৰি। ভালুকৰ লগত সামান্য ভাৱৰ দৈহিক সামঞ্জস্য থাকিলেও জীৱবিদ পণ্ডিত সকলৰ মাপকাঠিত ইহঁতক ভালুক কৈদৰ প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। সেই বাবে পাণ্ডা বিলাকৰ বাবে “এলিওৰিডি” নামৰ এটা বঙাল গোত্ৰ বা পৰিয়ালৰ স্ৰষ্টি কৰা হৈছে।

বঙা-পাণ্ডা নামৰ প্ৰাণী বিলাকক বৃক্ষবাসী প্ৰাণীৰ আখ্যা দিব পাৰি। গছৰ ওপৰত বগুৱা বাই বাই কুখাটোৱেই এইবিধ প্ৰাণীৰ চিহ্নভন বীতি। অৱশ্যে আৱশ্যক হ'লে ইহঁতে মাটিটোও নানি আহে। ঠেঙৰ পতাৰ অ'গ ভাগত থকা আঙুৰি কেইটাত কোঁচাব আৰু মেলিব পৰা বিধৰ নথ থাকে। এই দৰে কোঁচাব আৰু মেলিব পৰা আঙুলিৰ নথৰ সহায়ত গছৰ ডালত খামোচ মাৰি ধৰি ধৰি সিহঁতে অতি সহজে বগাই কুৰিব পাৰে। শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ গভীৰ ডাৱে বগুৱা কিয়া চক্লেট বৰণীয়া হয়। সেই বাবে হাবিৰ মাজৰ কোনোবা এজোপা গছৰ ডালত বহি থাকিলে ই নিলগৰ পৰা টল্ টল্ টক জিলিকি থাকে। পাতৰ আঁতত নিৰলে বহি থাকি ই শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। গছৰ ডালৰ কেৰেঙনি বা ধোন্দৰ ভিতৰত নিতাল মাৰি শুই থকা অৱস্থাত ইয়াক সহজে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰি। ঠেঙৰ অ'গ ভাগত গজা নোমবোৰৰ বৰণ ক'লা চানেকীয়া হয়। বগা বনৰীয়া মুখৰনৰ দুয়োকাষে দুচটা বগুৱা বৰণৰ দীঘল চানেকীয়া পাৰি থাকে। এই পাৰিৰ দুয়োকাষে দুচটাকৈ ধনুভিৰীয়া দাগ থাকে। বিভিন্ন বঙৰ কাৰুকাৰ্য্যৰে সূৰ্শোভিত হৈ থকাৰ বাবে জন্তুটোৰ মুখখনে অঁকাৰিকা গাৰ ৰূপ লয়। ইয়াৰ জোপোহা নেজ ডালতো খাপ খাপকৈ সজোৱা ক'লা বনৰীয়া দাগ থাকে।

বঙা-পাণ্ডা নিশাচৰ প্ৰাণী। দিনৰ দিনটো গছৰ ওপৰত উঠি থাকিয়েই ই সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। গছৰ ধোন্দৰ ভিতৰত নিৰলে সোমাই থাকে। দুটা ডালৰ মাজত উৎপন্ন হোৱা সুবিধাজনক ঠাইত চেপেটা মাৰি পৰি থকাটো ইয়াৰ আভিগত স্বাভাৱিক নিয়ম। এনেবোৰ ঠাইতে গভীৰ চোপনিত লালকাল হৈ জন্তুটোৱে একে লেঠাবিয়ে দিনৰ দিনটো পৰি পৰি থাকে। এনে ধৰণৰ নিশাচৰ প্ৰাণীক দৰ্শনৰ উপযোগী কৰি ৰাখিবৰ বাবে পশ্চিমীয়া উন্নত দেশৰ চিৰিয়াখানা বিলাকত বিশেষ ব্যৱস্থাৰ আয়োজন কৰিব লগীয়া হয়। যিটো সজাৰ ভিতৰত নিৰ্জু প্ৰকৃতিৰ নিশাচৰ প্ৰাণী বধা হয় সেইটো সজা বা আবেষ্টনীৰ ভিতৰখন শক্তিশালী বৃদ্ধ লাইটৰ সহায়ত গোটেই নিশা পোহৰ কৰি ৰখা হয়। লাইটৰ উজ্জ্বল পোহৰত নিশাচৰ প্ৰাণী কেইটাই ৰাতিকে দিন হৈছে বুলি ভাবি আছুতীয়াকৈ সজাই ৰখা ঠাইত নিৰলে পৰি থাকে। দিনত এই সজাৰ ভিতৰখন ক'লা চিত কাপোৰেৰে বেৰি কুৰি আন্ধাৰ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। জন্তু ঠেইটাব দেহৰ ওপৰত চিলমিলীয়া পোহৰ পৰিবলৈ দিয়া হয়। ৰাতিৰ আন্ধাৰ হৈছে বুলি ভাবি সিহঁতে তেতিয়া ইফালে সিকালে ঘূৰাঘূৰি কৰি আহাৰ বিচৰা কামত লাগি ৰায়। চিৰিয়াখানা চাবলৈ অহা লোক সকলে তেতিয়া সিহঁতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য কৰি আশ্বাস পায়। আগ্ৰহী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এইবিধ প্ৰাণীৰ জীৱন বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুবিধা হৈ পৰে।

নানাবিধ বনৰীয়া গছৰ ফলমূল খাই বেড-পাণ্ডা বিলাকে জীৱন ধাৰণ কৰে। গছৰ কোমল শিপা, আলু, কুঁহিপাত আদি নিৰামিধ খাদ্যৰ প্ৰতি এইবিধ প্ৰাণীৰ অ ভকতি বেছি।

গছৰ ধোন্দৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ সময়খিনিতে এইবিধ প্ৰাণীৰ মাইকীজনীয়ে পোৱালি জগায়। বঙা-পাণ্ডা বোৰক মৰম লাগি বোহাটক ধুনীয়া আকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব লাগিব। কিছুমান পাহাৰী ঠাংগে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ দুই এটা পোৱালি হাবিৰ মাজৰ পৰা ধৰি আনি ধৰত পোহৰেহি। ই অতি সহজে পোহ ৰানে আৰু মানুহৰ হাক বচন সনা বিষয়ত বহুদূৰ ডাঙ প্ৰদৰ্শন কৰে।

উদ্. উইজেন, গ্ৰেবেলা, মাৰ্ট'ন প্ৰভৃতি উদ্ভ-সমূহ

উদ্, উইজেন, গ্ৰেবেলা, মাৰ্ট'ন প্ৰভৃতি কেইবিধমান সৰু আকাৰৰ প্ৰাণীক একে লগে সানবি লৈ “মাছ্ টেলিডি” নামৰ এটা বিশেষ গোত্ৰ বা পৰিয়ালত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাবলীত এই প্ৰত্যেক বিধ আনোৱাৰন দেখত গাইগুটীয়া ভাৱে কিছুমান স্বতন্ত্ৰ ৰূপ আৰু গুণৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনহাতে উইনহাডীয়া ভাৱে ইহঁতৰ দেখত এনে কিছুমান গুণ আৰু ৰূপৰ বিকাশ সাধন হৈছে যে জীৱবিদ্ পণ্ডিতসকলে সিহঁত আটাইবোৰকে লগ লগাই এটা বিশেষ গোত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ একাধিক কাৰণ বিচাৰি পাইছে। গুৰিমাঁত বিলাকৰ গঠন প্ৰণালী আৰু বিশিষ্ট আকৃতি প্ৰকৃতিৰ গুণাগুণে ইহঁতক একেটা পৰিয়ালত স্থান দিয়াত বহুতো সৰল বোকাইছে। শৰীৰৰ অন্যান্য অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গ কিছুমান গাইগুটীয়া ভাৱে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি দেখা গৈছে যে প্ৰত্যেক বিধ প্ৰাণীয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ৰূপ বা গঠন প্ৰণালীৰ দ্বাৰা আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে। সাধাৰণতে দেখা যায় যে বি বি পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাত বেলেগ বেলেগ আভৰ প্ৰাণী বাস কৰে সেই সেই পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাই সিহঁতৰ জীৱনত অসীম প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে উদ্ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ কথাই ধৰা যাওক। ইহঁতে সাধাৰণতে পানীত নাদুৰি সাতুৰি কুৰে আৰু পানীত থকা মাছ ধৰি ধৰি ৰাই জীৱন ধাৰণ কৰে। নাও চলোৱা বঠাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে ইহঁতৰ ঠেঙৰ পতাত একোখন পাতলীয়া ছাল থাকে। আঙুলি কেইটাক লগলগ কৰি ৰখা এই ছালখনে পানীত সাৰ্তোঁৰা কামত ইহঁতক সহায় কৰে। শৰীৰত নোমৰ আৱৰণ থকা বিধন ছাল থাকে সেইখন ছালত গজা নোমবিলাকৰ গঠন প্ৰণালী এনে যে সেই নোমবোৰৰ মাজেদি পানী সৰকি গৈ জন্তোটক লেৰেমা কৰি ভিজাই নাৰাখে। সেই কাৰণে বাবে বাবে ৰামলৈ উঠি পুনৰ পানীত নাৰিব লগীয়া হলেও সাৰ্তোঁৰা কাৰ্যৰ বাবে জন্তোটো কেতিয়াও অকামিলা নহয়। সেই অনুপাতে ইয়াৰ নেজডালো মোটা আৰু মণ্ডহাল হয়। পানীৰ তলে তলে দিক্ নিৰ্ণয় কৰি আগ বাঢ়ি যোৱা কামত এই নেজডালে জন্তোটক সহায় কৰে। শৰীৰত এইখিনি বিশিষ্ট ৰূপ আৰু গুণৰ বিকাশ সাধন নোহোৱা হ’লে সম্ভৱণ কাৰ্যত উদ্ ইমান ব্যতপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিগোহেঁতেন। সেইদৰে মাছ ধৰি ধৰি ৰাই জীৱ ধাৰণ কৰা বিষয়তো অসুবিধা হ’লহেঁতেন।

একেটা গোত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা আন কেইবিধ মান প্ৰাণীয়ে কিন্তু সমধৰ্মী পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাত থাকি জীৱন নিৰ্বাহ নকৰে। জীৱন ধাৰণৰ বাবে সিহঁতে পানীত

বাস কৰা মাছৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভৰ নকৰে। উইজেল, বেজাৰ, মাৰ্টিন গ্ৰভৃতি জন্তুনে এই বিষয়ত আঙুলিয়াব পাৰি। ইহঁতৰ আঁচাই কেইবিধেই বাসত বাস কৰা বিধৰ প্ৰাণী। ইহঁতে বাসত বগাই ফুৰা সৰসুৰা প্ৰাণী আৰু মাটিত গজা উদ্ভিদৰ ওপৰতে ভাৰসা ৰাখি জীৱন কটায়। কোনো কোনো জাতৰ প্ৰাণীয়ে মাটিৰ উপৰি ভাগত উৎপন্ন হোৱা ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ তলত সোমাই থাকি সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। তাৰ মাজতে বাহ সাজি সাজি থাকিবলৈ লয় আৰু মাইকী জনীয়ে সময়ৰতে ভাতে পোৱালিও জগায়।

উইজেলবিলাকে সাধাৰণতে গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই থাকি সময় কটায়। পাবিলে হাতোৰাৰ আঙুলি আৰু নখবোৰৰ সহায়ত নিজেই বসবাসৰ উপযোগী গাঁত খান্দি লয়। সুযোগ পালে আন জানোৱাৰে বাস কৰিবলৈ বুলি নিৰ্মাণ কৰি লোৱা এৰেহা গাঁততে ঠিক ঠাক কৰি থাকিবলৈ লয়। গাঁতত বাস কৰা নিগনিক সিহঁতৰ গাঁতৰ পৰা বলপূৰ্বক খেদি দি সেই গাঁত দখল কৰি নিজে থাকিবলৈ লয়। গাঁতৰ ভিতৰতে চেপেটা মাৰি নিজৰ পোৱালি কেইটাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এলুৱে কেতিয়াবা উইজেলৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগীয়া হয়। বেজাৰ তথা গেবেলা বিলাকে মাটিৰ উপৰি ভাগত উৎপন্ন হোৱা ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ তলতে ঠাই নিৰ্বাচন কৰি লৈ গাঁতৰ নিচিনা দ ঠাইত থকাৰ সুবিধা কৰি লয়। এনেবোৰ ঠাইতে সোমাই সোমাই থাকি ইহঁতে সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। আৱশ্যক অনুযায়ী খাদ্যৰ অন্বেষণত তলমূৰ কৰি ইফালে সিফালে ঘূৰা ঘূৰি কৰি কৰে। এইবিলাক কাৰণত ইহঁতৰ ঠেঙৰ আগভাগত থকা হাতোৰাৰ নখ-বোৰ গাঁত খন্দাৰ উপযোগী হোৱা দেখা যায়। এনে শাৰীৰিক গঠন প্ৰণালীক পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাই কপদান দিয়ে। মাৰ্টিন জাতীয় প্ৰাণীবিলাকে গছৰ ওপৰত বগাই ফুৰি খাদ্য অন্বেষণত আত্ম নিয়োগ কৰে। সেইবাবে সিহঁতৰ ঠেং আৰু নখ গছত উঠাৰ উপযোগী হয়। সি যিয়েই কি নহওক কিছুমান উমৈহতীয়া কপ আৰু গুণৰ বিকাশে বিবিধ চৰিত্ৰৰ এই জানোৱাৰ শৌৰ্যক একেলগে লগ লগাবলৈ সমল যোগাইছে। তলৰ প্ৰৱন্ধ কেইটাৰ জৰিয়তে এই জন্তু কেইবিধৰ প্ৰজাতিগত কপৰেখা অঙ্কন কৰিবলৈ হয় কৰা হৈছে।



উদ্

শ্ৰেণী---স্বন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

শ্লোক---মাছ চেনিদি

প্ৰজাতি---লুটী লুটী

উদ্ নামৰ বিবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবিধ প্ৰাণীৰ লগত আমাৰ মানুহক নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিব লাগিব বুলি ভাবিব নোৱাৰি। আকাৰত এইবিধ প্ৰাণী তেনেই লক্ষ। নেউল জাতীয় প্ৰাণীৰ দুই এটাক কেতিয়াবা বেনেটক কৰাত অকস্মাতে দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক সেইদৰে পানীৰ কাষত কিম্বা, পানীত সাতুৰি কৰা অৱস্থাত উদ্ জাতীয় প্ৰাণীকো দেখি পাবলৈ আশা কৰিব পাৰি। দেখনে জননে দুয়ো বিধ প্ৰাণীকে প্ৰায় একে যেন লাগে। চাৰিত্ৰিক গুণত সিহঁতৰ মাজত ভালেখিনি পাৰ্থক্য পৰিনক্ষিত হয়। উদ্ বেনেটক পানীত নাৰি সাতুৰি কৰিব পাৰে ঠিক সেইদৰে নেউলে পানীত সঁতোৰা কাষত পাৰ-দক্ষিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে। নেউপৰ গাত উংপৰ হোৱা নোমবোৰ তুলনামূলক ভাৱে উদ্ৰ দেহত পজা নোমবোৰতকৈ দীঘল হয়। এই নোমবোৰে অনপ জোপোহা ৰূপ ধাৰণ কৰে। আনহাতে উদ্ৰ দেহত বিকাশ সাধন হোৱা নোমবোৰ চুটি আৰু ঘন হয়। ঘন ঘনকৈ গজা এই নোমবোৰ জন্তোটোৰ গাত এনে ভাৱে নিপিত ৰাই লাগি থাকে যে সেইবোৰৰ মাজত পানী সোৱাই জন্তোটোক লুতুৰি পুতুৰি কৰিব নোৱাৰে। সেই কাৰণে এইবিধ প্ৰাণীয়ে মাছৰ দৰে বহুত পৰলৈ একে লেঠাৰিয়ে পানীত নাৰি সাতুৰি সাতুৰি কৰিব পাৰে। বাৰলৈ উঠি আছিলে পানীৰোৰ গাৰ পৰা নিগৰি নিগৰি বাগৰি গলে নিশিঘতে জন্তোটো শুকান বুলি হৈ পৰে। ইয়াৰ গাটো দীঘল চানেকীয়াটক পোলোঙা হোৱাৰ বাবে ই অতি ক্ষীণভাবে পানীৰ উপৰি ভাগত সাতুৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে ই বুৰ মাৰি পানীৰ তলে তলে বহুত দূৰলৈ অনাৱালে ক্ৰত গতিত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। পানীৰ তলদি বুৰ মাৰি গৈ গৈ কিছু দূৰ নিলগত ই পানীৰ উপৰি ভাগলৈ মূৰখন উলিয়াই ইফালে সিকালে চাবলৈ আৰম্ভ কৰে। খন্তেক পাছতে আকৌ পানীত ডুব মাৰি অভ্যৰ্জন হয় আৰু এইদৰে লীলা খেলা কৰি কৰিয়েই বহুতখিনি সময় একেভাবে পানীতে কটাই দিয়ে। পানীৰ তলত সাতুৰি কৰা মাছ বুৰেৰে কাষোৰ মাৰি ৰখি বাৰলৈ উঠাই আহে আৰু সেই মাছ তাৰ চোকা দাঁতৰে চিঙি গিলি ধৰে।

পানীত সাঁতুৰি সাঁতুৰি পৰিভ্ৰমণ কৰা কামত ঠেঙৰ ভাৰ হাতোৰা কেইখনে জন্তটোক সহায় কৰে। ইয়াৰ হাতোৰাৰ আগ ভাগত উৎপন্ন হোৱা আঙুলি কেইটাক সংলগ্ন কৰি বন্ধা এখন পাতলীয়া ছালৰ উৎপত্তি হয়। এই ধৰণৰ পাতলীয়া ছালৰ দ্বাৰা আঙুলি কেইটা সংলগ্ন হৈ থকাৰ বাবে জন্তটোৱে সহজে পানীত সাঁতুৰিব আৰু বুৰমাৰি মাৰি যাব পাৰে। পানীত ওপঙি ওপঙি সাঁতুৰি যাওঁতে ই আগ ঠেঙৰ হাতোৰা দুখন বঠাব কৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু পাছতঃ দুখনেৰে লৈতে নেজডাল এনেদৰে পানীত ওপঙাই আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি গৈ থাকে। পানীৰ উপৰি ভাগত ওপৰমুঠাক ওপঙি থাকি নিজৰ বুকুখনকে টেবুলৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মাছ আদি খাদ্য সামগ্ৰী এই টেবুলৰ ওপৰতে থৈ আগ ঠেঙৰ হাতোৰাৰে মুখত দিয়েগৈ। খবতকীয়া গতিত পানীৰ তলে তলে বুৰ-মাৰি বুৰমাৰি যাব লগীয়া হলে ই পাছ ঠেঙৰ হাতোৰা দুপাত জোৰেৰে কোষাবলৈ



আবৃত্ত কৰে। নেজডালে নাহৰীয়াৰ ভাঁৱৰ দৰে গতি পথ নিৰ্ণয় কৰাত জন্তটোক সহায় কৰে। বুৰৰ আগৰ ফালে যি কেইডাল ঠৰঙা ঠৰঙা ডাঢ়ি থাকে সেই ডাঢ়ি কেইডালে পানীৰ তলত থকা খোৱা বস্তুৰ উমান লোৱা কামত সহায় কৰে।

মাছ খাই খায়েই জীৱন ধাৰণ কৰা প্ৰাণী হিচাপে ই গোটেই জীৱনটো মাছৰ লগত লীলাখেলা কৰিয়েই কটাই দিয়ে। কেতিয়াবা অকলশৰীয়া ডাৱে মাছ ধৰি থকা

স্বাস্থ্য এইবিধ প্রাণীর দুই এটাক ক'ৰবাতি দেখিবলৈ পোৱা গ'লেও সাধাৰণতে কেবা-
টাও উল্ একেলগে পানীত নাহি বাহু ধৰা কামত লাগি যায়। এটা এটা পৰিৱালৰ
প্রাণী লগলাগি একে একোটা বাহু ধৰা দলৰ সৃষ্টি হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা
কবাটাও পৰিৱালৰ উপৰোৰ লগলাগি বাহু ধৰা কামত লাগি যায়। বিল, নদী আদিত
হ'ব হৈ থকা পানীৰ কাষত বাহুৰ হাড়মূৰ কিছুমান পৰি থকা অৱস্থাত দেখিবলৈ পালে
চাৰ পৰা সহজে অনুমান কৰিব পৰা যায় যে সেইবোৰ ঠাইৰ আশে পাশে ক'ৰবাতি
উল্ জাতীয় প্রাণীয়ে বাহু পাতি নিগাজীকৈ থাকিবলৈ লৈছে। কোনো কোনো গাঁও-
নীয়া মানুহে পথাৰৰ আলিবাটবোৰ কাটি কাটি কিছা বোৱতি পানীত ভেটা সাজি ঠায়ে
ঠায়ে লোৰ ধালি তাত খোছা, চেপা, খোকা আদি বাহু ধৰা সবজী গধূলি বেলিকা
পাতি থৈ আহে। পানীত সাঁতুৰি কুৰা বাহু এই ফালবোৰৰ ভিতৰত সোৱাই পৰিলে
পুনৰ ওলাই আহিব নোৱাৰা হৈ পৰে। খোছা, চেপা পাতি ৰখা মানুহকিলাকৈ ৰাতি-
পুৱাই বিচনাৰ পৰা উঠি গৈ এইদৰে লাগি ধৰা বাহুবোৰ খালিত ডৰাই ঘৰলৈ আহে।
উল্জাতীয় প্রাণীয়ে ফালত লাগি থকা বাহুবোৰ উলিয়াই আনি ৰাতিটোৰ ভিতৰত
বহুত পৰিমাণৰ বাহু ৰাই শেষ কৰি দিয়ে। পাছ দিনা ডোক-মোকালিত গিৰিহঁতে
পৰ্ধাবলৈ আহিহে দেখিবলৈ পায় যে উদ্দে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বহুতো বাহু ৰাই ৰাস্তা
কৰিছে। আধা খোৱা বাহুৰ হাড় মূৰ কিছুমান হৈ সেইবোৰ ঠাইত সিঁচৰতি হৈ পৰি
থকা অৱস্থাৰ পৰা বুজিবলৈ বাকী নাথাকে যে এই কাণ্ড-কাৰখানা যিনি উল্ জাতীয়
প্রাণীয়ে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কৰি থৈছে।

সোঁত বলি থকা পানীৰ পথত ভেটা দি পানী যাৰ বাবে আহল বহনকৈ লোৰ
ধালি ৰখা হয়। এই লোৰটোৱেদি পানীত সাঁতুৰি কুৰা বাহুবোৰ পাৰ হৈ যাতে বাৰগৈ
নোৱাৰে তাৰ বাবে পানী বাগৰি যোৱা পথত বাঁহৰ কাঠীৰে তৈয়াৰ কৰা একোখন
বাগ থিয় কৰি কৰি খুটিৰ সহায়ত মজবুতকৈ ৰাছি ৰখা হয়। যি ফালৰ পৰা পানীৰ
সোঁত বাগৰি আহি বাগখনৰ মাজেৰে সবকি সবকি বিপৰীত ফালে থকা দ চানেকীয়া
ঠাইবোৰলৈ যাবলৈ ধৰে সেই ফালে বাহু-কাঠৰ খুটি পুতি একোখন জাল বা কাপোৰ
ওলোৱাই ৰখা হয়। উল্জাতীয় বাহুবোৰে ওপৰৰ ফালৰ পানীলৈ সাঁতুৰি সাঁতুৰি যাবলৈ
চেষ্টা কৰোতে থিয়কৈ পাতি খোৱা বাগখনত বাধা প্ৰাপ্ত হয়। তেতিয়া সিহঁতে অপ-
মায়ী ৰাণখন অতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এইদৰে আপ মাৰি আপ মাৰি দিয়াৰ
ফলত বাহুবোৰ গৈ বাগৰ লিপাৰ জালখনত পৰেগৈ। জালখন অলপ আহল-বহল
আক ওলমি পৰা আকতিত বনাই ৰখাৰ বাবে ফালত পৰা বাহুবোৰে পুনৰ আপ মাৰি
আকৌ পানীত পৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও শেষত নোৱাৰা হৈ পৰে। গধূলি পৰৰ পৰা
আৰম্ভ কৰি পাছ দিনাৰ ডোক-মোকালিৰ সময়খিনিলৈকে গোটেই নিশা অপিয়াই
পৰা বহুত পৰিমাণৰ বাহু এইদৰে বাগত ধৰা পৰে। একে লেঠাৰিয়ে বাৰত বহুত
সময় কটাৰ লগীয়া হোৱাত সিহঁতৰ বহুতে ঠেবেঙা লাগি ৰাতিৰ ভিতৰতে নৃত্য
আঁকোৱালি ল'ব লগা হয়। লেকেটা জীৱৰ কিছুমান বাহু অৱশ্যে ধৰকবাই ধৰকবাই
বাগৰ ওপৰতে অপিয়াই থাকে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা ষাণ্ঠ গোটৰেই নিশা বিবোৰ নাছ গোট খাই থাকে উদ্ভাৱীয়া প্ৰাণীবোৰৰ বাবে সেইবোৰ ভোজ-ভাত হয়। সিহঁতে বাতাব্যক্তি উজাগৰে থাকিও ভেটাৰ কাষতে জোপ লৈ থাকি আলত পৰা নাছ সোপাৰ গতি লগায়। সেই কাৰণে আমাৰ মানুহে কোনো অৰোগ্য লোকৰ হাতত কোনো মূল্যবান বস্তু গটাই দি পাছত নোপোৱা হলে “উদ্ভাৱীয়া ভেটা বৰীয়া” কৰাৰ বচন কাকি নাহে।

উদৰ দৰে কেচামাছ জীৱাই জীৱাই খাই জীৱন ধাৰণ কৰা প্ৰাণী পৃথিৱীত বহুতো আছে। এইবিলাক বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ ভিতৰত চিল, চি-লয়ন, হালবাচ, মেক দেশীয় বগা ভালুক আদিৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। উদৰো বহুতো জাত আছে। বিভিন্ন জাত বা প্ৰজাতিৰ উদৰবিলাকে পৃথিৱীখনৰ ভিন্ ভিন্ ঠাইত থকা বেলেগ বেলেগ পৰিবেশত বাস কৰে। তাৰ ভিতৰত এবিধ সমুদ্ৰবাসী উদৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। এইবিধ সাগৰৰ পানীত বাস কৰা উদৰ জীৱন অতি বহুসংখ্যক আৰু বিস্ময় বৰ্জিত বুলি কব পাৰি। ওপৰলৈ পেটটো কৰি সাগৰৰ পানীত ওপঙি ওপঙি সাঁতুৰি ফুৰা অৱস্থাত ইয়াক দেখি বৰ ভাল লাগে। চিল, চি-লয়ন আদি সমুদ্ৰবাসী মাংসাহাৰী প্ৰাণীৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰি ই সাগৰৰ নাছবোৰ ধৰি আয়। নাছে সময়ে সাগৰৰ উপকূলৱৰ্তী বালি-খঁইয়া ঠাইবোৰলৈও উঠি আহে আৰু সেইবোৰ দেশত বাস কৰা বিষাক্ত সাপৰ লগত যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত হয়। প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ উত্তৰ অক্ষৰ অলপাংশত এসময়ত প্ৰচুৰ পৰিমাণে সমুদ্ৰবাসী উদৰ বাস কৰিছিল। এতিয়া সিহঁতৰ সংখ্যা আশা-ভীত ভাৱে কমি আহিল। ইয়াৰ মূল কাৰণ হল এয়ে যে এইবিধ প্ৰাণীৰ ছালৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা নোমাল বস্ত্ৰৰ চাহিদা ইমান বেছি যে সেইবিলাক দেশত থকা উদ্যোগপতিসকলে গাঠিৰ ধন ভাঙি সমুদ্ৰবাসী উদৰ মৰা কামত মানুহ নিয়োগ কৰিছিল। এইবিধ বিচিত্ৰ চাৰিত্ৰিক গুণ সম্পন্ন সমুদ্ৰবাসী উদৰ বাহিৰে আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকা মহা দেশত আন কেইবা বিধো আভ্যন্তৰিণ জলাশয় বিলাকত বাস কৰা উদৰ গোটীয়া প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত কানাডাবাসী উদৰ আৰু ব্ৰাজিলবাসী উদৰ নামেৰে জনজাত দুবিধ উদৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি।

উদৰ নিচিনাকৈ কেচামাছ খাই খাই জীৱন অতিবাহিত কৰা এবিধ বাঁক বা পিচাচন উৎপত্তিৰ বিধৰে বহুতো জনশ্ৰুতিয়ে আমাৰ সমাজত তাহানিৰে পৰা প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে। এই বাঁকবিলাকে উদৰ দৰে ভেটাত পৰা নাছবোৰ হেনো ধৰি ধৰি খায়। ইচ্ছানুযায়ী বস্তুকতে অস্ত্ৰক্ৰীয়া হ’ব পৰাৰ ইহঁতৰ গাত আলৌকিক ক্ষমতা আছে বুলি মানুহে ধাৰণা কৰে। অৱশ্যে বিজ্ঞান সন্মত ভাৱে এনে বহুসংখ্যক প্ৰাণীৰ আৱিৰ্ভাৱ কোনো জীৱবিদ পণ্ডিতৰ দৃষ্টিগোচৰ এতিয়ালৈ হোৱা নাই। আন হাতে এনে এবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে মানুহৰ জীৱনলৈ বহুতো বিলৈ বিপত্তি কঢ়িয়াই অনাৰ কাহিনী মানুহৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায়। পাঠক পাঠিকাৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে তেনে এটা অপূৰ্ণ কাহিনী বৰ্ণনা কৰাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলো। এখন গাঁৱত দুজন সখি আছিল। ইজনে নিজক ৰুতি কাপোৰ উপহাৰ দি পাছত দুয়ো একেলগে ৰহি ভোজ-ভাত খাই এদিন এওঁলোক দুজনে সখি পাতিছিল। এদিন দুয়োজন সখিয়ে লগ লাগি বিল এখনৰ

পানতৈ গৈ বোৱতি পানীৰ সোঁত বান্ধি এটা ভেঁটা বনালেগৈ। ভেঁটোটাৰ ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান লোৰ কাটি তাত খোকা, খোছা, চেপা আদি লগাই ৰাখিছে। আহল বহল ধৰণৰ এটা পানী বাগৰি যোৱা পথ কাটি তাত এখন বাগ নিৰ্মাণ কৰি দুয়োজন সখি গধূলি বেলিকা ঘৰ মুখে ৰাওনা হ'ল। কথা পাতি পাতি খোজ কাটি আহি ঘৰ পাওঁতে দাঁজ লাগি ভাগিনৰ সময় হ'ল। এজনক পদূলি মুখত ৰাখি আংজনে নিজৰ ঘৰৰ ফালে খোজ ললে। যোৱাৰ পাছত অলপ নিলগৰ পৰা তেওঁ সখিয়েকক সন্ধান কৰি ক'লে। "সখি, কাহিলৈ ৰাতিপুৱা বেলি নৌ উঠোৱেই অ'হি মাছৰ ভেঁটোৰ বাৰ লাগিব। নহ'লে উদে গোটেইবোৰ মাছ খাই শেষ কৰিব।" ওচৰতে থকা এটা বাঁক সিহঁতৰ কথাবোৰ হেনো শুনি আছিল। সেই নিশা পূৰ্ণিমা আছিল। জোনাৰ ফৰিং কুটা পোহৰত গোটেই নিশা দিন যেন হৈ পৰিছিল। বাঁকটোৱে সখিয়েকক কপ ধাৰণ কৰি দোভাগ নিশা জোনা পোহৰত আহি প্ৰথম জন সখিয়েকক দুৱাৰমুখ পালেহি। পদূলি মুখ পায়েই সখিয়েকক মাত লগাই মাছৰ ভেঁটালৈ ততাতৈয়াটক যাবলৈ লগ ৰবিলে। সখিয়েক ৰাতিপুৱালৈ বেছি সময় নাই বুলি ভাবি চকু আখি মুহাৰি হাতত দুটামান খাটৈ আৰু পাটি দৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল। দুয়োজনে লৰা-চপৰাকৈ ভেঁটাৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। লগত অহা মানুহজন যে তেওঁৰ সখি নহয় আৰু বাঁক এটাইহে যে সখিৰ কপ লৈ তেওঁৰ লগে লগে আহিছে এই কথা প্ৰথম মানুহ জনে ধৰিবই নোৱাৰিলে। মাছৰ ভেঁটালৈ গৈ পোৱাৰ পিছত মানুহজনে খোকা, চেপাৰ পৰা মাছবোৰ উলিয়াই আনি আনি ৰালৈ বোৱত ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বাগত পৰা মাছবোৰ পাচিত চালিলে। যিমানেই মাছ আৰু পাচিত চালে সিমান পৰিমাণৰ মাছেই লগে লগে নাইকিয়া হৈ যায়। আচলতে সখি কপী বাঁকটোৱে এই মাছবোৰ লগে লগে খাই শেষ কৰি দিয়ে। তেতিয়াহে মানুহজনে বুজিব পাৰিলে যে তেওঁৰ লগত অহা জন আচলতে তেওঁৰ সখি নহয়। সি এটা সখিকপী বাঁকহে। খঙে তাৰ মূৰ চলিৰ আগ পালেগৈ। কিবা প্ৰকাৰে বাঁকটোক মাৰি পেলাবৰ বাবে সি বুদ্ধি পাঙিলে। বাঁকটোৱেও তেওঁৰ অভিপ্ৰায় বুজিব পাৰিলে। সি চকুত বান মাৰি জোনাক নিশাৰ পোহৰখিনি আঁতৰাই অন্ধকাৰ কৰি পেলালে। আন্ধাৰে মুহাৰে দুয়োটাৰ মাজত এখন তয়াময়া যুঁজৰ আবৃত্তি হ'ল। মানুহজনে ছেগ বুজি দা এখন হাতত উঠাই ল'লে আৰু বাঁকটোৰ ডিঙিতে ধাপ মাৰি তাক দুচেও কৰি পেলালে। তাৰ গাটো মাটিতে পৰি ঠেৰেঙা লাগিল। মূৰটোৱে মাটিৰ ওপৰেদি বগাই বগাই গৈ এজোপা প্ৰকাণ্ড গছৰ ওপৰত উঠিলগৈ। গছৰ টিকনি আগলৈ উঠি সি মৰিলো ও মৰিলো ও" বুলি চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মৰিলো ও মৰিলো ও শব্দ কেইটা পাছত মন ও মন ও" শব্দৰ দৰে উচ্ছাৰিত হ'ল। ইয়াৰ পৰাই "মৰ চৰাই" নামৰ এবিধ বিচিত্ৰ কাৰ্পানক পক্ষীৰ উদ্ভৱ হ'ল বুলি জনা যায়। আকীয়া সমাজৰ মাজত পৰিচিত আৰু অন্য ভাষাত যম-ডাকিনী নামেৰে জনাজাত এইবিধ পক্ষীৰ সন্তেজ বিজ্ঞান জগতত পোৱা নাযায়। ৰাতি বিয়লি ক'ৰবালৈ অকল শৰীয়া ভাৱে বাৰ লগীয়া হ'লে সেই কথা ৰাতিৰ আন্ধাৰত প্ৰকাশ্যে আলোচনা কৰিব

নাপায় বুলি জনাবুজ্জা মানুহৰ বহুতে বৰ খোজে। সি যিয়েই কি নহওক বাক নামেৰে জনাজাত এবিধ উদৰ নিচিনাকৈ কেচামাছ খোৱা ভুত বা পিশাচ কালিকা লগা পুখুৰী বা বিনৰ কাষত আঁঠুকালিও বাস কৰে বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে।

এতিয়া আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা উদ্ভীয়াতীয়া প্ৰাণীৰ বিষয়ে জানিব লগীয়া বাকী কথাখিনি আলোচনা কৰা যাওক। ভৈয়াম অঞ্চলৰ জনাশয় বিলাকৰ কাষে পাছৰে যে উদ্ভীয়া বাস কৰে এই কথা কোনো অবিদিত নহয়। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওখ ওখ ঠাইত থকা বিনৰ নিচিনা জনাশয়বিলাক আৰু নদী নদীৰ আওহতীয়া পৰিপৰিবেশত এইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। বাৰিষা কালত যেতিয়া পাহাৰী নদীবোৰ পানীৰে ওপাচ পৰে তেতিয়া পৰ্বতৰ নামনিৰ ফালে সাধাৰণতে বাস কৰা উদ্ভীয়া একোটা পৰিয়ালে পাছৰ অভিমুখে পানীয়ে পানীয়ে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। খৰালিৰ দিনবোৰ আহি পালে গিহঁতে আকৌ ভৈয়ামলৈ ওলোটাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। ভৈয়াম অঞ্চলৰ নদীৰ পানীত সাধাৰণতে বাস কৰা কিছুমান মাছে কণী পাৰিবৰ বাবে বাৰিষা পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰলৈ নদীয়ে নদীয়ে উছাই যায়। এই মাছবোৰ ধনি ধনি খোৱাৰ অভিপ্ৰায়েৰে ভৈয়ামত বাস কৰা উদ্ভীয়া কিছুমানে নদীৰ পানীয়ে পানীয়ে গিহঁতৰ পাছ লয়। মাছৰ লগে লগে এই উদ্ভীয়াৰে খৰালি মহীয়া ভৈয়ামলৈ বিপৰীতমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে।

পানীত নামি নামি মাছ ধৰি খোৱা বিধৰ প্ৰাণী হলেও উদ্ভীয়াকে পাছৰ কাঁক, মাটিৰ তলৰ ফালে উপস্থিত হোৱা সৰু সূতা গাঁত আদিত চেপেটা মাৰি মাৰি পৰি থাকে। যিবোৰ ঠাইত ওখ ওখ বাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ গজে আৰু যিবোৰ ঠাইলৈ নদী নদী আদিৰ পৰা বৰ বেছি দূৰ নহয় এইবিলাক প্ৰাণীয়ে তেনেবোৰ ঠাইতে নিগাজীকৈ থাকিবলৈ সুবিধাজনক পৰিবেশ বিচাৰি লয়। নিচেই বাতিপুৱাই ইহঁতে থকা ঠাইবিলাকৰ পৰা চিকাৰৰ বাবে ওলাই আহে। ভৰ দুপৰীয়াৰ সময়খিনি ইহঁতে অলপ জিৰণি লয়। আবেলি পৰত আকৌ ওলাই আহে আৰু গধূলি পৰ্যন্ত মাছ ধৰা কামতেই ইফালে সিফালে ঘূৰে আৰু সুবিধা বুজি পানীত নামি মাছ ধৰি খায়। মাছৰ বাহিৰে কেঁচু, কুমটি, কেঁকোৰা আদি নিম্ন খাদ্যৰ প্ৰাণী ইহঁতৰ আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। পানীত চৰি ফুৰা হাঁহৰ পোৱালিৰ ঠেঙত কোনোৰ মাৰি ধৰি ই পানীৰ তল পোৱায়গৈ।

পানীৰ কাষৰ সুবিধাজনক ঠাইত সুৰঙ্গ নিৰ্মাণ কৰি লৈ উদ্ভীয়াকে তাৰ ভিতৰতে পোৱালি জগায়। সুৰঙ্গৰ ভিতৰৰ ফালে এঠাইত এটা আহল বহল কোঠালি থাকে। কোঠালিটোলৈ অহা যোৱা কৰিব পৰা একাধিক নিৰ্গম পথ থাকে। তাৰে এটা পথ পানীৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকে। পোৱালিবোৰে ডাঙৰ নোহোৱালৈকে মাকৰ পিছে পিছে পিছে ঘূৰি কৰে।

কোনো কোনো হাৰিতলীয়া মানুহে উদ্ভীয়া পোৱালি ধৰি আনি ঘৰত প্ৰতি পালন কৰি ৰাখে। এনে উদ্ভীয়া কুকুৰ পোৱালিৰ দৰে মানুহক অনুসৰণ কৰি মৰম লগায়। উদ্ভীয়া ছালৰে ভৈয়াম কৰা টুপি পিন্ধিলে বহুতো বেনাৰৰ পৰা বন্ধা পাৰ পাৰি বুলি কোৱা হয়।

সক-বখীয়া উদ্

শ্ৰেণী—জ্ঞানাপারী

বৰ্গ—বাংলাহাৰী

গোত্র—মাছ-চেলিদি

প্রজাতি—এনোনিয় চিনেৰিয়া

আমাৰ অসমত বিবিধ উদ্ জাতীয় প্রাণী সাধাৰণতে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিবিধ জানোৱাৰে পানীত নানি নানি মাছ ৰবা কামত অসীম প্ৰাৰ্থনৰ্ভা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে সেইবিধ প্রাণীৰ জীৱন বুজাবি বিষয়ে স্থানান্তৰত আলোচনা কৰা হৈ গৈছে। এইবিধ উদ্ৰ বাহিৰে আন এক প্ৰকাৰৰ উদ্ৰ আমাৰ এই কালৰ ঠাইবোৰতে যাজে সসৰে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই দুবিধ উদ্ৰ দাবীৰিক শুণাঙৰ পাৰ্থক্য



সক-বখীয়া উদ্

ইয়াৰ সাধাৰণ ৰে নিলগৰ পৰা দৃষ্টিগোচৰ হলে সিহঁতক বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ প্রাণী হিচাপে চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ টান হৈ পৰে। তদুপৰি নিম্নৰূপৰ প্রাণী হোৱাৰ বাবে আৰু সাধাৰণতে জনসংখ্যাৰ আঁতৰত আকোচে আকোচে বাস কৰা

বিধৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে সিহঁতক গভীৰ ভাৱে আক্ৰিষ্ট; আৰু যি নকৰে।। পানীত নাৰি মাছ ধৰি ধৰি খোৱাৰ বাবে এইবিধ উদ্ভেদ, সাউৰি সাউৰি আৰু মাজে সময়ে বুৰ মাৰি মাৰি সময় কটায়। কেঁচু, কুমটি, কেকোৰা কুম্ভেলুকা আদি হীল-বৰ্গৰ প্ৰাণী ধৰি ধৰি খোৱা কামতো এইবিধ প্ৰাণীয়ে অভিকৰ্চি প্ৰদৰ্শন কৰে।

এইবিধ উদ্ভেদ দেখিব গঠন অনুপ গোপোৰা বিধৰ হয়। সেৱৰ অন্যান্য অংশৰ অক-প্ৰত্যক্ষ বিশেষ শাৰীৰিক বা চাৰিত্ৰিক গুণৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা নাযায়। হেঁচৰ আগ ভাগত থকা ছাতোকাত যি কেইটা আঙুলি আছে সেই আঙুলি আনবিধ উদ্ভেদ আঙুলিৰ দৰে দীঘল হোৱা দেখা নাযায়। আঙুলি কেইটাক সংলগ্ন কৰি বন্ধা পাঁতলীয়া ছালবন্ধৰ বিকাশ সাধনে সাধন হয়। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ নামনি ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অগৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰলৈকে ইয়াৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি বিয়পি আছে। দক্ষিণ ভাৰতৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল বিনাকতো এইবিধ উদ্ভেদ বাস কৰা দেখা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি সৰু নখীয়া উদ্ভেদ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমিয়ে ব্ৰহ্মদেশ, মালয়ালম, উলোনেছিয়া আদি দেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে।

উইজেল

শ্ৰেণী—তন্যপাৰী

বৰ্গ—স্বাস্থ্যদ্বাৰী

গোত্র—স্বাস্থ্য টেলিফি

প্রজাতি—স্বাস্থ্য টেলিফি হাইবেলিকা

উইজেল এবিধ নেউল বা উৰণ নিচিনা সৰু আকাৰৰ শ্ৰাণী। দেখাত উৰণ নিচিনা হলেও এইবিধ শ্ৰাণীয়ে উৰণ চাৰিডিক গুণবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা নাযায়। উৰণ উৰণচৰ শ্ৰাণী। ই যেনেকৈ পানীত নাগুৰি সাঁতুৰি একে লেঠাখিৰে বহুত সময় কটাই দিব পাৰে ঠিক সেইদৰে বামত বগাই খগাই থাকিবও পাৰে। উইজেলৰ চৰিত্ৰত এই গুণৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এইবিধ শ্ৰাণী কুকুৰ নেকৰীৰ দৰে বাম ঠাইত বাস কৰে আৰু বামত বগাই ফুৰা মানাৰি গিন্নিৰাণৰ শ্ৰাণী চিকাৰ কৰি খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। এলুৰ, নিগনি, চৰাই, নাইপিলা আদি শ্ৰাণীক ইয়াৰ চোকা দাঁত কেইটাবোৰে কামোৰ মাৰি ধৰি পেটলৈ পঠিয়াই দিয়ে। পোৱা, পৰুৱা, কীট-পতঙ্গ আদি ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ জীৱৰাণ ধৰি ধৰি খোৱা বিষয়তো এইবিধ শ্ৰাণীয়ে সমানে অভিজ্ঞ কঢ়ি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়। উইজেল বৰ খবতখীয়া আৰু ক্ষুধাৰীয়া শ্ৰাণী। একে ভোখৰ ঠাইতে বৈ থাকি সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ ই ভাল লাগায়। খুচু খুচাই খুচু খুচাই ইফালে সিকালে ঘূৰি ফুৰা বিধৰ শ্ৰাণী হোৱাৰ বাবে ইয়াক সাধাৰণতে একে ঠাইতে বৈ থকা অৱস্থাত দেখি পাবলৈ আনা কৰিব নোৱাৰি। বাটিয়েদি খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি কিবা খোৱা বস্তু বিচাৰি ফুৰা অৱস্থাত ইয়াক বনু-ভিৰীয়াটক কুৰা হৈ খোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অলপ নিলগত থকা খাদ্য জাতীয় শ্ৰাণীক সহজে দেখি পাবৰ বাবে ই ঠাইতে থকাক লাগি বৈ যায়। পাছ তেঁও নুখনৰ ওপৰত দুঠেঙীয়া শ্ৰাণীৰ দৰে থিয় হৈ ইফালে সিকালে ডিঙি মেলি চাবলৈ ধৰে। আনৰ ভাষাত এইবিধ শ্ৰাণীক দীঘল বুৰীয়া নেউল বুলি ক'ব পাৰি।

উইজেলসে কেতিয়াবা গছৰ বোন্ধৰ ভিতৰত লোৱাই থাকি জিৰণি লয়। ভাগৱতগী গছৰ কেৰেপনিৰ নাজত লোৱাই থাকি আকৰ্ষি সময়খিনি কটাই দিয়ে। "হাৰ্ণি নাজত উৰণৰ হোৱা বিবিলাক ডাঙৰ আকাৰৰ গছ বতাহত উৰণি পৰি দাঙি পঢ়িবলৈ আহিব কৰে। জাইবিলাক গছৰ তলত থকা কীৰবোৰতো কেতিয়াবা এইবিধ বিচিত্ৰ শ্ৰাণীয়ে

সোমাই সোমাই থাকে। ইয়াৰ চকু দুটা অলপ নিলগৰ পৰা চালে টল্‌টল্‌কৈ জিলিকি থকা দেখা যায়। জোঙাল দুখখনত যিবোৰ ছিঙিখোৱা দাঁতৰ উৎপত্তি হয় সেই দাঁত বোৰ খুৰ যেন চোকা হয়। চিকাৰ কৰি ধৰা কোনো প্ৰাণীৰ সহিত এই কেইটা দাঁতেৰে জন্তুটোৱে এবাৰ কানোৰ বাৰি ধৰিলে সি পলাই সাৰিব নোৱাৰে। ইয়াতকৈ আকাৰত সৰু কিম্বা ইয়াৰ সমান আকাৰৰ কোনো জন্তুৰ কথাই নাই। আনকি ইয়াটোক আকাৰত



টাইগেল

অলপ ডাঙৰ বিধৰ প্ৰাণীয়েও কেতিয়াবা ইয়াৰ হাতত প্ৰাণ বিলৰ্জন দিব লগীয়া হয়। চিকাৰৰ জন্তুটোৰ কোন ডোৰৰ আলুহুৱাঠাইত কানোৰ বাৰি ধৰিলে জন্তুটোৱে লবচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ মৃত্যু বৰণ কৰিব লগীয়া হয় টাইগেলে সেই কথা ভালদৰে জানে। মৃত্যুৰ পৰৱৰ্ত্ত কালে থকা বসন্তত চোকা দাঁত কেইটা বহুদূৰৈ বিধ পাবিলে জন্তুটো

নিমিষতে অচেতন হৈ পৰে। তেতিয়া সি ডাক মাটিত খেঁকেচা মাৰি মাৰি মৃত্যুৰ মুখলৈ
ঠেলি দিয়ে। বগৰা-বগৰিকৈ ওপৰ তল কৰিব নগীয়া হ'লেও জন্তোটোক কামোৰ মাৰি
ধৰা দাঁতৰ খামোচ ই এৰি নিদিয়ৈ। ডিঙিৰ নলীত কিছা পিঠিৰ ওপৰেদি বাগৰি যোৱা
ৰাজহাড় ডালত ই দাঁতেৰে কামোৰ মাৰি ধৰিবলৈ পালে সতকাই এৰি নিদিয়ৈ। এইবিধ
প্ৰাণীয়ে হাঁহ-কুকুৰা আদি ঘৰচীয়া প্ৰাণীকো সুবিধা পালে ধৰি ধৰি ধায়।

উইজেল জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ গাটো অস্বাভাৱিত ভাৱে দীঘল হোৱা দেখিবলৈ
পোৱা যায়। ইয়াৰ ডিঙিটোও সেইদৰে দীঘল হোৱাৰ বাবে গোটেই প্ৰাণীটোৱে দীঘ-
লীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰে। জন্তোটোৱে যেনেকৈ দীঘল চানেকীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰে ঠিক
সেইদৰে ইয়াৰ ঠেং কেইখন দীঘল হোৱা দেখা নাযায়। নোমাল নেজ ডালৰ দীৰ্ঘতাও
সিমান বেছি নহয়। দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বং সাধাৰণতে বদকম্বা বা ছাই-
বৰবীয়া হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ অৱশ্যে কেবাটাও উপ-প্ৰজাতি আছে। উপ-প্ৰজাতি
অনুযায়ী এই জন্তুবিলাকৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমৰ উজ্জলতা সামান্য ভাৱে বেলেগ
বেলেগ হয়। পেটৰ তলৰ ফালে গজা নোমবোৰৰ বৰণ প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰত বগা
চানেকীয়া হোৱা দেখা যায়।

ভৈয়াম অঞ্চলত থকা বিভিন্ন পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাত সাধাৰণতে থকা বিধৰ প্ৰাণী
হ'লেও উইজেলৰ কেইটামান উপ-প্ৰজাতি হিমালয় শৈলমালাৰ ওখ ওখ পৰ্বতীয়া
ঠাইবিলাকতো বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হিমালয় পৰ্বতমালাত আন এটা
বেলেগ জাতৰ উইজেল বাস কৰে। এইবিধ উইজেলক আৰমাইন অথবা ষ্টোট নামেৰে
অভিহিত কৰা হয়। ইয়াৰ বুকু আৰু তল পেটত গ্ৰন্থ পৰিমাণে বগা বৰণীয়া
নোমৰ উৎপত্তি হয়। আচলতে মুখখনৰ তল ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তল পেটেদি
পাছ ঠেং মুখখনৰ ভিতৰ ভাগলৈকে শৰীৰৰ গোটেই অংশই কপাহৰ দৰে বগা বং
ধাৰণ কৰে। ইউৰোপ মহাদেশৰ উত্তৰ অঞ্চলত বিবিলাক ষ্টোট বাস কৰে
সিহঁতৰ দেহৰ গোটেই খিনি নোবে শুক্ল বৰ্ণ ধাৰণ কৰা দেখা যায়।
ইয়াৰ বগা বৰণীয়া নোম থকা ছালখন বৰলিৱাই এক প্ৰকাৰৰ সোমাল
চোলা ভৈয়াৰ কৰা হয়। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওপৰৰ ফালে বিবিলাক ঠাই বছৰৰ
সবছৰ ভাগ সময় বৰফেৰে ঢাক খাই থাকে তেন্তেওৰো নীতল ঠাইতো শেঁতা বৰণীয়া
উইজেল বা জোঙা বুৰীয়া নেউল নামৰ আন এবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। এই দুবিধ
উইজেল জাতীয় প্ৰাণীৰ বাহিৰে হালধীয়া পেটীয়া উইজেল আৰু পিঠিত
থকা উইজেল নামৰ আন দুবিধ প্ৰাণী হিমালয় শৈলমালাৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত
বাস কৰে।

হগ্-বেজাৰ বা গেবেলা

শ্ৰেণী---সুনাপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---মাছ-টৌলিচি

প্ৰজাতি---আৰ্কটান্সি কল্যাবিচ

উদ, উইজেল, মাৰ্টেন, ক্লাক, বেজাৰ প্ৰভৃতি কেবাৰিখ প্ৰাণীক একে লগ লগাই এটা স্বতন্ত্ৰ গোত্ৰ বা কুলত স্থান দিয়া হৈছে। এই প্ৰাণীবিলকৰ দেহত যে কিছুমান উনৈহতীয়া গুণৰ বিকাশ হৈছে সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। বেলেগ বেলেগ পৰিবেশত তিন্ তিন্ জাতৰ এই জন্তুবিলক বাস কৰাৰ বৈচিত্ৰ্যলৈ চাই আৰু সিহঁতৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণত তিন্ তিন্ কপৰ বিকাশ সাধন হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি এই আটাই কেইবিৰ প্ৰাণীক একেলগে লগাই একোটা গোত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যদিও জাত অনুযায়ী সিহঁত তিন্ তিন্ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণ প্ৰদৰ্শন কৰে। জীৱবিদ পণ্ডিতসকলে এই আটাইবিলক প্ৰাণীৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গাদিক বিজ্ঞান সন্মত ভাবে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি চাই প্ৰত্যয় গৈছে যে ইহঁতক একেলগে লগাই একোটা গোত্ৰ বা কুলত স্থান দিয়াৰ একাধিক যুক্তি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ক্লাক নামেৰে জনাজাত প্ৰাণী বিলাকক আমেৰিকাতহে বাস কৰা দেখা লয়। বেজাৰ বিলাক এচিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশীয় প্ৰাণী। তাৰে ভিতৰত হগ্-বেজাৰ নামেৰে জনাজাত এবিধ প্ৰাণীৰ বিষয়ে সদ্যহতে আলোচনা কৰিবলৈ হোৱা হৈছে।

দেখাত এটা গাহৰি জাতীয় প্ৰাণীৰ নিচিনা হোৱাৰ বাবে আৰু খুচ খুচাই খুচ খুচাই আহাৰ বিচাৰি ফুৰা গাহৰিৰ চাৰিত্ৰিক গুণ থকাৰ বাবে এইবিধ বেজাৰক হগ্-বেজাৰ বা গাহৰি-খুজীয়া বেজাৰ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ মানুহে ইয়াক গেবেলা বা গেবেলা পছন্দ বুলি কয়।

খোৱা বোৱা সম্পৰ্কত এইবিধ প্ৰাণীয়ে আমিয় আৰু গিৰামিয় এই দুয়োপ্ৰকাৰ-খাদ্যৰ ওপৰত সৰানে অভিকৰ্চ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা মান। অমিয়-ভোজী অথবা মাংসাহাৰী প্ৰাণী হিচাপে মাছ-মাংস আৰু কীট-পতঙ্গ আদিলৈ যে ইয়াৰ আগ্ৰহ অলপ বেছি হ'ব এই কথা হয়তো স্বতঃসিদ্ধ ভাবে গঁচা বুলি মানি ল'ব লাগিব। খোৱা বস্তু বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে হুণ শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। নিলগত থকা বস্তু ই মহাজে চকুৰে মানিব নোৱাৰে। সেই বাবে নাকৰ আগ ভাগেৰে মাটিত পৰি থকা গছৰ শুকান পাত,

জানৰ আদি ইফাল সিফাল কৰি ই খাদ্যৰ উপযোগী বস্তুবোৰ বিচাৰি বিচাৰি কৰে। ছাবি বননিৰ মাজত বিবিলাক থকাও পাখৰ থাকে আৰু বি ঠাইত এই পাহাৰবোৰে ফাট যেনিলে একো একোটা ফাঁক বা গাঁতৰ উৎপত্তি হয় এইবিধ প্ৰাণীয়ে তেনেবোৰ ঠাইতে চেপেটা মাৰি মাৰি পৰি থাকে। নিজৰ আগ ঠেং দুখনৰ হাতোৰাত থকা নখৰ সহায়ত ই মাটিতে গাঁতৰ নিচিনা এডোখৰ দ ঠাই তৈয়াৰ কৰি লয়। এইদৰে নিজে খান্দি লোৱা গাঁতৰ ভিতৰতে গোসাই থাকি থাকিও ই সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। কেঁচু, কুখটি, কেবুলুৱা আদি নিম্ন খাপৰ প্ৰাণী ই ধৰি ধৰি খায়। গছৰ কলমূল, কঁহিপাত



ইগু-বেজাৰ বা গেবেলা

আদি খাবলৈও ই ভাল পায়। আশ্চৰ্য্যকৰ বাবে শত্ৰু ভাৰতীয় প্ৰাণীক ভয় খোৱাই বেদি দিবৰ বাবে ই মুখৰ পৰা একপ্ৰকাৰ কুচু-কুচু শব্দ উচ্চাৰণ কৰে আৰু গাত গজা নোমবোৰ ঠৰঙা কৰি দি ভদ্ৰটোৱে ধনু এখনৰ দৰে এক প্ৰকাৰৰ কুঁহা আকৃতি ধাৰণ কৰে। গাৰ দীঘল নোমখিনি এইদৰে ঠৰঙা কৰি দি ই এই নোমবোৰৰ ভিতৰৰ ফালে উৎপন্ন হোৱা শেঁতা বৰণীয়া কোমল নোমবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰি শত্ৰুক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে। এক প্ৰকাৰৰ অকটা গোন্ধযুক্ত ৰস নিঃসৰণ কৰিব পৰা এবিধ গ্ৰন্থি এইবিধ প্ৰাণীৰ দেহতো উৎপন্ন হয়। এই গোন্ধযুক্ত আৰু বিষাক্ত গুণ থকা পদাৰ্থৰ সহায়তো ভদ্ৰটোৱে শত্ৰু ভাৰতীয় প্ৰাণীক আঁতৰ কৰিব পাৰে।

বাটেল বা হৰিাবজাৰ

শ্ৰেণী—ভূন্যাপায়ী

বৰ্গ—মাংসাহাৰী


গোত্ৰ—ৰাষ্ট্ৰচেলিদি

প্ৰজাতি—মেলিভা কেপেন্‌চিচ্

বাটেল বা হৰি বেজাৰ নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীবিধক হগ্-বেজাৰ বা পেবেলাৰ অন্যতম প্ৰতিভু বুলি ক'ব পাৰি। এইবিধ প্ৰাণীক কিন্তু দেখাত এটা ভালুক আতীৰ প্ৰাণী যেনহে লাগে। জন্তুটোৰ আকাৰৰ তুলনাত ইয়াৰ ঠেং কেইখন চুটি হোৱা দেখা যায়। সেই হিচাপে ইয়াৰ নোমাল নেজ ডালেও দীঘল ৰূপ ধাৰণ কৰে। মুখ বঙলৰ আকৃতি সাইলাখ হগ্ বেজাৰৰ মুখৰ দৰে জোঙাল নহৈ অলপ ভোটোকা হয়। ঠেঙৰ পতা বা হাতোৰা কেইখন বহল হয়। এইবিধ প্ৰাণীৰ পিঠিৰ উপৰি ভাগত যিবিলাক নোমৰ উৎপত্তি হয় সেই নোমৰ বৰণ সাধাৰণতে বগা আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত নাখন বৰণীয়া হোৱা দেখা লয়। আচলতে সুৰৰ ওপৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিঠিৰ ওপৰেদি নেজৰ ওপৰ ছোৱালৈকে বিয়পি থকা গোটেই সোপা নোমেই পীতবৰ্ণ মিশ্ৰিত শুকুলা বৰণ ধাৰণ কৰে। খুতৰি, বুকু আৰু পেটৰ তল আৰু কাষত যিবোৰ নোমৰ উৎপত্তি হয় সেইবোৰ নোমৰ বৰণ কাউৰী চৰাইৰ পাখি যেন ক'লা হোৱা দেখা যায়।

অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য আটাই কেইখন ৰাজ্যত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী নিগাজীকৈ বাস কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে সে নাই সেইবিধয়ে স্পষ্ট ভাৱে জনা নাযায়। হিমালয় পৰ্বত-মালাৰ নামনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণাত্যৰ মালভূমি অঞ্চল বিলাকলৈকে এই বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগৰ অনুকূল ঠাইত এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি বিয়পি আছে। এই সম্পৰ্কত এটা কথা উল্লেখ কৰা উচিত হ'ব যে বৰষুণ প্ৰধান এলেকা বিলাকত থাকিবলৈ এই বিধ জন্তুৱে সিমান ভাল নাপায়। সেই কাৰণে যিবিলাক ঠাইত কম পৰিমাণে বৰষুণ হয় আৰু যিবোৰ ঠাইত শিলঙাটি আৰু বালিৰ পৰিমাণ বেছি হয় এইবিধ প্ৰাণীয়ে তেনেবোৰ ঠাইতে থলুৱা ভাৱে বাস কৰিবলৈ উপযুক্ত পৰিবেশ নিৰ্বাচন কৰি লয়। মাঘ ফাগুণ মহীয়া গছৰ পাতবোৰ সৰি সৰি লঠঙা হোৱা বনভূমি আৰু অলপ সেমেকা জলবায়ুয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰা ঠাইবোৰে ইয়াৰ বাবে অনু-কূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই দৃষ্টান্তৰ ফালৰ পৰা বিবেচনা কৰি চাই ক'ব

পাৰি যে অগমৰ অন্তৰ্গত থকা কোনো কোনো বনভূমিয়ে এইবিধ বিচিত্ৰ শাণীৰ বাবে
বনকল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। নদী নলাৰ পাৰত থকা থিয় গৰাখ ওচৰৰ ঠাই-



বাটেল বা হনি-বেজাৰ

বোম্বত ইহঁতে থাকিবলৈ ভাল পায়। সচৰাচৰ থাকিবৰ বাবে এনেধৰণ নদীকুলীয়া
পৰিবেশ বাচি বাচি লোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। নদী নলাবিলাকৰ আঙ-

হতীয়া ঠাইবোৰত যিবোৰ থিয় গ'ৰা থাকে সেইবোৰতে একোটা গাঁও স্থাপন কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে। সেই কাৰণে শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীয়ে তাক সহজে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে। অসম উপত্যকাৰ সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চলবোৰ আৰু মেদা-লয়ৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাকৰ কোনো এঠাইতো এইবিধ প্ৰাণীৰ লগত দেখা দেখি হোৱা মোৰ বনত নপৰে। মোৰ সহকৰ্মী বন্ধু সকলৰ মুখৰ পৰাও মই তেনে সন্তোষ কেতিয়াও পোৱা নাই। ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দৰ কথা। কাছাৰ জিলাৰ এডোখৰ ঠাইত এইবিধ প্ৰাণীৰ এটা জন্তক এবাৰ মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। ঘটনাটো ঘটছিল মাটিজুৰি বেজৰ জন্তুগত থকা গোহাবলল নামৰ বিট অকিচৰ ওচৰৰ এখন হাবিত। সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চল খনৰ নাম হ'ল ইনাৰ লাইন বিজাৰ্ড। বিভাগীয় ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এডবা গছ-পুলিৰ বাগান পৰিদৰ্শনৰ বাবে হাবিত সোমাইছিলো। লুলুতীয়া হাবিতলীয়া বাট এটাইদি খোজ কাঢ়ি গৈ গৈ বাগানখন পাবলৈ পাবি। বিট অকিচাৰ জনৰ নাম আছিল সুবৰ্ণ বিলু পাল। বেজ অকিচাৰ জনৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ। তেওঁৰ উপাধিটো কিন্তু মনত আছে। পুৰস্কাৰস্থ বেজাৰ বুলি ক'লে সেই অঞ্চলৰ মানুহে তেওঁক ভালদৰে চিনি পায়। তেওঁলোক দয়োজনে মোৰ লগত হাবিত প্ৰবেশ কৰিলে। হাবিতলীয়া পথ-টোৱেদি আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি গৈ হঠাৎ এটা বিচিৰ আকৃতিৰ বনবীয়া জন্তু পথটোৰ একাধৰ পৰা আনটো কাষলৈ দৌৰি দি হাবিৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিলো। জন্তুটো দেখাত এটা গাহৰি জাতীয় প্ৰাণীৰ নিচিনা লাগিল। সুৰৰ তালুৰ পৰা পিঠিয়েদি নেজলৈকে বাগৰি পৰা গোটেই ডোৱৰ ঠাইত যিবোৰ গাৰ আছিল সেইবোৰে বগলী চৰাইৰ পাখিৰ দৰে বগা বৰণ ধাৰণ কৰাত নিঃশব্দ পৰা জিলিকি আছিল। জন্তুটোৰ বুকুত আৰু তল পেটত গজা নোমবোৰৰ বৰণ টলকিৰ নোৱাৰিলোঁ। খন্তেকৰ বাবে দেখা দি পলকতে অন্তৰ্ধান হোৱাত জন্তুটোক চিনাক্ত কৰি উলিওৱাটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিল। মোৰ অনুগামী কৰ্মচাৰী কেইজনেও এই বিষয়ত মোক সহায় কৰিব নোৱাৰিলে। পাচত শিলচৰলৈ ঘূৰি আহি এই জন্তুটো কোন জাতৰ বন্যপ্ৰাণী হ'ব পাৰে তাক খবৰছি মাৰি জানিবলৈ বাবে ব্যৱস্থা হৈ পৰিলোঁ। বন্যপ্ৰাণী বিষয়ৰ কিতাপ-পত্ৰ বিলাকৰ পাতবোৰ লুটিয়াই জন্তুটোৰ পৰিচয় সম্পৰ্কে নিশ্চিত হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিলোঁ। অৱশেষত এইটো জানোৱাৰ এই প্ৰৱন্ধত উল্লেখ কৰা বাটেল বা হনি বেজাৰ জাতীয় প্ৰাণী হ'ব পাৰে বুলি নিজে নিজেই পতিয়ন গ'লোঁ।

বাটেল বা হনি বেজাৰ সাংসাহাৰী প্ৰাণী। হাবি-তলীয়া ঠাইবোৰত বাস কৰা নিগনি, এলুৰ, হান্ট নামৰ এবিধ পৰ্বতীয়া এলুৰ, শহাপছ আদি প্ৰাণী ধৰি ধৰি থাকে। কেঁচু-কুমটি, কীট-পতঙ্গ আদি নিম্নস্তৰৰ জীৱবোৰেও এইবিধ প্ৰাণীৰ বাবে বিকল্প আহাৰৰ যোগান ধৰিব পাৰে। গাওঁ-ভূঁইৰ কাষে পাৰে থকা পাতলীয়া ধৰণৰ হাবি-বনবিবোৰত বাস কৰা বাটেলবোৰে ঘৰচীয়া হাঁহ-কুকুৰাবোৰ অনিষ্ট সাধন কৰে। তেনে-বোৰ জনপূৰ্ণ ঠাইত বাস কৰা বাটেলবিলাকে নিজৰ জীৱটোকো ছাত্ৰ বুলি লৈ কুৰি লগীয়া হয়। অন্য ভাষাত ক'ব পাৰি যে গাঁৱলীয়া মানুহৰ আবাসস্থান থকা ঠাইত থকা জন্তুবোৰৰ জীৱন কেতিয়াও বিপদমুক্ত হ'ব নোৱাৰে। ঘৰচীয়া জন্তুবোৰক

তাৰ আক্ৰমণৰ পৰা বক্ষা কৰিবৰ বাবে গাঁৱলীয়া মানুহে তাক খেদি খেদি মাৰে ।
 ঘৰচীয়া বা বনৰীয়া জন্তুৰ মৰা-শ আৰু এই মৰা-শ বিলাকৰ গেলা-পচা অৱশেষবোৰ
 এইবিধ প্ৰাণীয়ে বিচাৰি বিচাৰি খায় । নতুনকৈ পুতি থৈ অহা মৰাশৰ মৰিশালি খালি
 মানুহৰ মৰা শব মাংস উলিয়াই উলিয়াই খায় বুলি এইবিধ প্ৰাণীৰ এটা দুৰ্ণাম আছে ।
 বাটেল জাতীয় প্ৰাণীয়ে যেই কোনো জাতৰ জন্তুৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ শৰ্ষা নকৰে ।
 টেঁকীয়াপতীয়া বাঘৰ নিচিনা মহা পৰাক্ৰমী জন্তুৰ আগত তুৰি-মূৰি কৰিবলৈ অৱশ্যে
 ই সাহস নকৰে । ইয়াৰ চোকা চোকা দাঁত আৰু মজবুত হাড়োবা দুখনক ই আয়নত্কা
 আৰু আক্ৰমণৰ সজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰ গাৰ ছালখন অলপ ডাঠবিধৰ
 হোৱাৰ বাবে আক্ৰমণকাৰী প্ৰাণীয়ে ইয়াক সহজে পৰাভয় কৰিব নোৱাৰে । ইয়াৰ
 নেজ ডালৰ তলত অকটা গোন্ধৰ বস ধাৰণ কৰিব পৰা এক প্ৰকাৰৰ মোনা থাকে ।
 শত্ৰুজাতীয় প্ৰাণীক আঁতৰ কৰা বিষয়াত এই মাংস গ্ৰন্থিয়ে ড'ঙটোক সহায় কৰে ।



বিচ্ বা ষ্টোন মাৰ্টেন

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---মাছ টেলিদি

প্ৰজাতি--মাৰ্টেচ্ ফইনা ইণ্টাৰমিদিয়া

উদ আৰু উইজেল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত মাৰ্টেন নামেৰে জনাজাত কেই-বিধমান বিচিত্ৰ আকাৰৰ প্ৰাণী পৃথিৱীখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰে। উমৈহতীয়া ভাৱে এই প্ৰাণী বিলাকক মাৰ্টেন নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। জাত অনুযায়ী ইহঁতক বিভিন্ন নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। মাৰ্টেন যৈদৰ কিছুমান প্ৰাণী গছৰ ওপৰত বাস কৰে। আন কেইবিধ মানে তাকো মাৰ্টৰ ওপৰত বগাই বগাই কুৰিহে জীৱন ধাৰণ কৰে। খাউকতে গছত বগাই ফুণ মাৰ্টেন বিলাকক বৃক্ষবাসী মাৰ্টেন আৰু দ্বিতীয় গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰক মছলনিবাসী মাৰ্টেন বুলি ক'ব পাৰি। উইজেল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত মাৰ্টেন বিলাকক আটাইতকৈ দেখনিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। এচিয়া মহাদেশ, ইউৰোপ মহাদেশ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ মাৰ্টেন বাস কৰে।

ভাৰত উপ মহাদেশৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা এবিধ মাৰ্টেন জাতীয় প্ৰাণীৰ জীৱনালেখ্য বৰ্ণনা কৰিবলৈ সদ্যহতে লোৱা হৈছে। আমাৰ অভিধানৰ (ইংৰাজ-অসমীয়া অভিধান) মাৰ্টেনক এবিধ নেউল বিশেষ বুলি কোৱা হৈছে। আচলতে মাৰ্টেনক নেউল জাতীয় প্ৰাণী বুলি ক'ব নোৱাৰি। ইয়াক এবিধ উইজেল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বুলিহে ক'ব লাগিব। অসমীয়া ভাষাত উইজেলৰ প্ৰতিশব্দ পাবলৈ নোহোৱাৰ বাবে মাৰ্টেন জাতীয় প্ৰাণীক বুজোৱা কোনো শব্দ বিচাৰি পোৱা নাযায়। যেহেতু এইবিলাক প্ৰাণীক অসমৰ চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সেইবাবে মাৰ্টেন শব্দটোক আমাৰ ভাষাত কোনো সালসলনি নঘটোৱাকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা উচিত হ'ব।

ষ্টোন মাৰ্টেন নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীবিধক হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওখ ওখ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত বাস কৰা দেখা যায়। ভৈয়াম অঞ্চলবিলাকৰ পৰা হিমালয় পৰ্বতৰ কৰ্দৈ-সীৰিয়া পাহাৰ আৰু আকাশ চুহী পৰ্বতবোৰলৈ পাহাৰ বগাই বগাই উঠি উঠি গৈ থাকিলে বাটত নানা বিধৰ গছ গছনি থকা পৰ্বতীয়া পৰিবেশবোৰ দেখিবলৈ পোৱা

যায়। এইবিলাক ঠাইৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে মনপ্ৰাণ আনন্দ ভাৱত আত্মত হয়। কিছুমান ঠাইত নানা জাতৰ সৰল গছ প্ৰধান্য লাভ কৰে। আন কিছুমান ঠাইত আমাৰ ভৈয়াম অঞ্চল বিলাকত উৎপন্ন হোৱাৰ নিচিনাকৈ নানাবিধৰ বহলপতীয়া গছহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰ্বতীয়া পথাৰোৰ অনুসৰণ কৰি গৈ থাকিলে ৫০০ মিটাৰ মান উচ্চতাৰ পৰা ডাঙৰ আকাৰৰ গছবোৰে সোৱানি মাগে। সেইবোৰ ঠাইত



বিচ্ বা টোন মাটোন

ৰোডডেজেন, খুজা আদি সৰু আকাৰৰ গছহে উৎপন্ন হয়। ইবোৰো ওপৰৰ ফালে যি বিলাক পৰ্বতীয়া হেলনীয়া ভূমিখণ্ড আছে সেইবিলাকত য'হ জাতীয় উদ্ভিদৰ প্ৰাচুৰ্য বেছি। তাৰ ওপৰৰ ফালে থকা পৰ্বতীয়া ঠাই বিলাক বছৰৰ সকলো সময়তে বৰফৰ চামণিয়ে ঢাক খুৱাই ৰাখে। ডাঙৰ জাতীয় গছ-গছনিৰ শেষ সীমা আৰু বৰফৰ স্থায়ী সীমাৰেখাৰ

ৰাজত যিবোৰ পৰ্বতীয়া ভূমি বিদ্যমান হৈ অপূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ঘোষণা কৰিছে সেই-
বোৰ ঠাইতে ষ্টোন মাৰ্টেন নামৰ প্ৰাণীবিধক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাজে
সময়ে এইবিধ প্ৰাণীয়ে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হোৱা অলপ নিম্ন স্তৰৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰলৈ
নানি আহে। সিহঁতৰ কিছুমানে তেনেবোৰ ঠাইতে নিগাজীকৈ বাস কৰিবৰ বাবে
সুবিধাজনক ঠাই বিচাৰি লয়। কিছুমান থিয় হৈ থকা গছৰ ভিতৰখন কিবা কাৰণত
পচি গলে গোটেই গছজোপাৰ এটা ডাঙৰ অংশ বাহৰ চুঙাৰ দৰে ফোপোলা হৈ পৰে।
আমাৰ ষ্টোন মাৰ্টেন জাতীয় প্ৰাণীৰ দুই এটাই এনে ধৰণৰ জীয়া গছৰ ফোপোলাৰ
ভিতৰতে সোমাই থাকি অৱসৰৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰি দিয়ে। বতাহত উষ্মি
পৰা গছৰ ধোন্দৰ মাজতো ইহঁতে সোমাই থাকিবলৈ ভাল পায়। কোনোটোৱে মাটিৰ
তলত একোটা আহল বহল গাঁত খান্দি লৈ তাৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে। এই
পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত তওল নামৰ এবিধ উতনুৱা গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই
সোমাই থাকে। সেইবিলাক ঠাইত এবিধ সৰু আকাৰৰ শহাপহ জাতীয় প্ৰাণীও বাস
কৰে। মাৰ্টেনবিলাকে সুবিধা বুজি এই দুয়োবিধ প্ৰাণীকো ধৰি ধৰি খায়। তদুপৰি
ইহঁতে গছৰ ওপৰলৈ বগাই বগাই উঠি গৈ নানাবিধৰ ঢংই, এন্দুং, বেক্টেৰা আদি
প্ৰাণীকো ধৰি বোকাতে সমানে পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰে।

মাইকী ষ্টোন মাৰ্টেন বিলাকে গছৰ ধোন্দ আৰু পাখৰৰ ফাঁকৰ মাজত বাহ সাজি
তাতে পোৱালি জগায়। ইহঁতে একেবাৰতে কেবাটাও পোৱালি দিয়ে।



হালধীয়া ডিঙীয়া মাটেন

শ্ৰেণী---স্বন্যপাৰী

বগ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---গাছ্ টেলিদি

প্ৰজাতি---চাবনিয়া কুজিগোলা

ইয়াৰ আগৰ প্ৰৱন্ধৰ অৱস্থাতে ষ্টোন মাটেন নামৰ এবিধ প্ৰাণীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। গিৰিৰাজ হিমালয়ৰ এৰ ওৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলবিলাকত আন এবিধ মাটেন জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰে। এইবিধ মাটেনৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাকে বিচিত্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ক'লা, যুগা আৰু হালধীয়া নোমৰ সংমিশ্ৰণত এইবিধ মাটেনৰ দেহৰ আৱৰণ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে। ডিঙিত হালধীয়া বৰণৰ নোমৰ পৰিমাণ বেছি হোৱাৰ বাবে ইয়াক হালধীয়া ডিঙীয়া মাটেন বুলি কোৱা হয়।

হিমালয় পৰ্বতমালাৰ বিবিলাক ঠাই ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছনিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে আৰু যিবোৰ ঠাইত সাধাৰণতে বনফ নপৰে তেনেবিলাক পৰ্বতীয়া ঠাইতে এই বধ প্ৰাণী বাস কৰে। মাটিটলৈ নামি ইফালে সিফালে যুৱা যুৱি কৰি কুৰা বিষৰ প্ৰাণী হলেও সবৰ্হাৰিনি সময় গছৰ ওপৰত উঠি থকা অৱস্থাত ইয়াক দেখিবলৈ পোৱা যায়। দিন বাতিৰ ভেদাভেদ নৰখাটক সকলো সময়তে চিকাৰ কাৰ্যত আত্মনিয়োগ কৰা দেখা যায়। গছৰ ওপৰৰ ফালে থকা ডালে-পাতে বগাই কুৰা কামত হালধীয়া ডিঙীয়া মাটেনে অলীৰ পাবদণ্ডিতা প্ৰদৰ্শন কৰে। কেৱল গছৰ ডালে ডালে বগুৱা বাই যুৱি কুৰা কামতহে যে এইবিধ মাটেন জাতীয় প্ৰাণীয়ে পাৰ্গতালি দেখুৱাব পাৰে এনে নহয়। এটা ডালৰ পৰা আন এটা ডাললৈ আপ মাৰি মাৰি গৈ বহুতখিনি ঠাইত পৰিভ্ৰমণ কৰি কুৰা কামতো এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক অন্য বহুতো বৃক্ষবালী জানোৱাৰে চেৰ পেলাব নোৱাৰে। সেই বাবে গছৰ ডালে পাতে বগাই কুৰা অন্যান্য প্ৰজাতিৰ বৃক্ষবালী প্ৰাণীবিলাকে ইয়াৰ প্ৰতাপত জাহি মধুসূদন দেখিবলগীয়া হয়। গছৰ ডালে পাতে বগাই কুৰা কেৰ্কেটুৱা আদি স্বন্যপাৰী জানোৱাৰ আৰু নানা জাতীয় চৰাইক ই চল বুজি ধৰে। তদুপৰি এই বিলাক প্ৰাণীয়ে গছৰ ওপৰৰ সুবিধাজনক ঠাইত বাহ সাজি থাকিবলৈ ল'লে এই জাতীয় মাটেন বিলাকে নিহঁতৰ বাহবোৰ বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ায়। কেৰ্কেটুৱাৰ সৰু-সুৰা পোৱালি আৰু বাহত পানি খোৱা চৰাইৰ কণী ইয়াৰ অন্যতম আহাৰৰ ভিত্তৰত পৰে। গছৰ ডালৰ পৰা বাহে সৰে ই মাটিটলৈ নামি আহে আৰু মাটিত বগাই কুৰা নানা



বিধ ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ প্ৰাণীবোৰ ধৰি ধৰি খায়। এই প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত নিগলি, এলুৱ, শহাপলু আদি জালোৱাৰ আৰু ডবিক গোষ্ঠীৰ নানাবিধ চৰাইৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। মৰি থকা জীৱ জন্তুৰ গেলা পচা মাংসবোৰ খাবলৈও এইবিধ প্ৰাণীয়ে সন্ধোচ বোধ নকৰে। কীট-পতঙ্গ, সাপ, ছেঠি, নাইপিয়া আদি প্ৰাণীও ইয়াৰ আহাৰৰ ভিতৰত পৰে।

হাৰিৰ মাজত উৎপন্ন হোৱা নানাবিধ গছৰ ফল মূল আদি খোৱা বিষয়তো এইবিধ মাৰ্টে'নে অভিকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে। ফুদাৰ বেগুৱে ধাৰণ কৰা বোৰসবোৰ চুহি চুহি খায়।

হালৰীয়া ডিঙীয়া মাৰ্টে'নৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি ব্ৰহ্মদেশৰ মালয়াচিয়া, ইন্দোনেচিয়া আৰু চীন দেশৰ বহুতো ঠাইলৈকে বিস্তাৰিত হৈ আছে। দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে আন এটা প্ৰজাতিৰ হালৰীয়া ডিঙীয়া মাৰ্টে'ন বাস কৰে। এইবিধ মাৰ্টে'নক নীলগিৰিৰ মাৰ্টে'ন নামেৰে অভিহিত কৰা হয়।



মাৰ্ব'ল ৰঙৰ হেপা

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---মাংসাহাৰী

গোত্ৰ---মাছ-টেলিদি

প্ৰজাতি---ভৰ্মেনা পেৰেণ্ডুনা

ভাৰত উপমহাদেশখনৰ পশ্চিম প্ৰান্তত মাৰ্ব'ল ৰঙৰ হেপা বা মাৰ্ব'ল পোলকেট নামৰ এবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰে। আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত পোলকেট বাস কৰাৰ বিষয়ে সঠিক ভাৱে জনা নাযায়। পৃথিৱীৰ অন্যান্য বহুতো ঠাইত কেইবাবিধো পোলকেট ধনুৱা ভাৱে বাস কৰে। ইউৰোপ মহাদেশৰ কোনো কোনো ঠাইত পোলকেট নামৰ এবিধ বেলেগ প্ৰজাতিৰ পোলকেট বাস কৰে। দেখাত এইবিধ প্ৰাণীক উইজেল নামৰ প্ৰাণীৰ সৈতে একে যেন লাগে। এইবিধ পোলকেটৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোম বিলাক মিহি আৰু কোমল আমল হয়। জাব-কালি আহি পালে এই নোমবোৰৰ বৰণ সলনি হৈ বগা পৰে। ইউৰোপ মহাদেশৰ কিছুমান মানুহে এইবিধ প্ৰাণীৰ ছালখন বৰলিয়াই তাৰ পৰা এক প্ৰকাৰৰ নোমাল বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰে। ইংলণ্ডৰ কোনো কোনো ঠাইতো আন এবিধ পোলকেট নামৰ প্ৰাণী বাস কৰি থকাৰ কথা জনা যায়।

মাৰ্ব'ল ৰঙৰ হেপা বা মাৰ্ব'ল পোলকেট নামৰ যিবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে এই প্ৰৱন্ধত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেইবিধ প্ৰাণীৰ বাসস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি এচিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ বহুতো ঠাইলৈ বিয়পি আছে। ভাৰত উপ মহাদেশ খনৰ ভিতৰত কেৱল বেলুচিস্থানতহে এইবিধ প্ৰাণীক স্থানীয় ভাৱে বাস কৰা দেখা যায়। উইজেল নামৰ প্ৰাণীতকৈ এইবিধ প্ৰাণী আকাৰত ভালেনমানখিনি ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ নেজডাল নোমাল আৰু জেপোহা হয় আৰু জন্তটোৰ গাত গজা নোমবিলাকো সেই অনুপাতে অলপ দীঘল হয়। দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাকে বিচিত্ৰ বৰণৰ অঁকাবিকা কপ ধাৰণ কৰে। মুখৰ আগভাগ বগা হয় আৰু কপালৰ ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ মণ্ডলৰ দুয়ো কাষলৈ বৈ পৰা দুটা বগা বৰণীয়া দাগৰ উদ্ভৱ হোৱা দেখা যায়।

সাধাৰণতে নিশাচৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হলেও মাৰ্ব'ল ৰঙৰ হেপাবোৰে দিন দূপৰতো চিকাৰ কাৰ্যত বাহিৰ হয়। নিগলি, এন্দুৰ, নাইপিৱা, জেঠি, চৰাই আদি নানাবিধ প্ৰাণী

চিকাৰত নিধন কৰে। উইজেল জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে এইবিধ প্ৰাণীয়েও চিকাৰ কৰি মাৰিবলৈ লোৱা প্ৰাণীৰ মৃত্যু তাৰ চোকা দাঁত কেইটাৰে কামোখ মাৰি ধৰে। এবাৰ কানোৰ মাৰি ধৰিলে অন্তটোৱে তাৰ মূৰৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে। অন্যান্য



শৰিল বঙৰ হেপা

হেপা বা উইজেল জাতৰ প্ৰাণী বিলাকৰ দৰে এইবিধ প্ৰাণীয়েও ঘৰচীয়া হাঁহ-কুকুৰান গড়ালত প্ৰবেশ কৰি গিৰিহঁতৰ হানি বিঘিনি ঘটায়। ইয়াৰে এটা উপপ্ৰজাতিৰ প্ৰাণী কান্দীৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিলাকত বাস কৰাৰ কথা জনা যায়।

নেউল কৈদৰ প্ৰাণীসমূহ

আমাৰ অসমৰ প্ৰায় সকলো মানুহেই নেউল দেখিছে। সৰু আকাৰৰ নোমাল জন্তুবিধক বিভিন্ন ঠাইত কম বেছি পৰিমাণে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ডাঠ হাবিৰ মাজত এই বিধ প্ৰাণীক সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যিখোৰ ঠাই নল, খাগৰি ইকৰা আদি ওখ ওখ ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে তেনেখোৰ ঠাইত এইবিলাক প্ৰাণীয়ে বাস কৰিবলৈ লয়। মুকলি-মুৰীয়া হাবি বননি-বিলাকেও ইহঁতৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। অসম আৰু অসমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আটাই কেইখন ৰাজ্যতে নেউল কৈদৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাৰত-বৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকৰ অনুকূল পৰিবেশ বিলাকতো নেউল জাতীয় প্ৰাণী বাস কৰা দেখা যায়। ইহঁতৰ কেইবাটাও উপ-জাতি আছে। এই উপজাতীয় নেউল বিলাকে বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰে। নেউল বা মংগুচ গোষ্ঠীৰ আটাইবিলাক প্ৰাণীক একেদৰে বগাই যিটো গোত্ৰ বা পৰিয়ালৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে সেইটো গোত্ৰক হাৰপেচ টিদি নামেৰে অভিহিত কৰা হয়।

আকাৰত নেউল জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ কিছুমান ডাঙৰ আৰু আন কিছুমান তুলনামূলক ভাৱে সৰু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গিৰিৰাজ হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পাৰ্শ্বত অৰুণবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামনিৰ ভৈয়াম অৰুণখোৰালৈকে ইয়াৰ সচৰাচৰ বসতি-স্থান যিৱপি আছে। ৰাজস্থানৰ মৰুভূমিয়ে গৰকা বিস্তীৰ্ণ ভূভাগ আৰু দক্ষিণাত্যৰ মালভূমিতো এবিধ নহয় এবিধ নেউলে ধলুৱাভাৱে বাস কৰিবৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশ বিচাৰি লৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকতো নেউল জাতীয় প্ৰাণীক বাস কৰা দেখা যায়। সমগ্ৰ পৃথিবীৰ আন আন বহুতো দেশত বিভিন্ন জাতৰ নেউল জাত অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাত বাস কৰে। আফ্ৰিকা মহাদেশখনতে সৰ্বাধিক জাতৰ নেউল আছে। ইউৰোপ মহাদেশৰ কেৱল স্পেইনতহে মাত্ৰ এবিধ নেউল বাস কৰে। এচিয়া মহাদেশৰ ভাৰত উপ-মহাদেশখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মধ্য এচিয়া আৰু সুদূৰ দক্ষিণ-পূব এচিয়াত থকা বিভিন্ন দেশত নেউল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী কম বেছি পৰিমাণে বাস কৰে। এইদৰে বিভিন্ন দেশ-বিশেষত বাস কৰি থকা নেউলৰ কম পক্ষেও ৩০টা প্ৰজাতি আছে বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে।

নেউলবিলাকক মাটিত বগাই কুৰা চাৰিত্ৰিক গুণ-সম্পন্ন প্ৰাণীৰ আখ্যা দিব পাৰি। ইহঁতৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা কোনো এবিধ প্ৰাণীকো গছৰ ওপৰলৈ উঠিব পৰা দেখা নাযায়। চিকাৰ কৰি জীৱন ধাৰণ কৰা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হিচাপে নেউল গোষ্ঠীৰ

প্ৰাণীবোৰে অসীম পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়। এইবিলাক প্ৰাণীয়ে সাধাৰণতে যিবিলাক নিম্ন খাপৰ প্ৰাণীক চিকাৰ কৰি ধৰে সেইবিলাকৰ তিতবত নানা বিধৰ চৰাই, ভেকুলী, বেং, নিগনি, এন্দুৰ, নাইপিয়া আদি পৰে। কেঁকোৰা পালেও ইহঁতে এৰি নিদিয়ৈ। কীট-পতঙ্গ, কেচু-কুমটি, বিছা, পলু আৰু অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ প্ৰাণীবোৰ ইহঁতে বিচাৰি বিচাৰি খায়। কেতিয়াবা ইহঁতৰ দুই এটা প্ৰাণীয়ে ঠেকত পৰি নিজতকৈ অলপ ডাঙৰ আকাৰৰ প্ৰাণীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ কুঠাৰোধ নকৰে।

নেউল ফৈদৰ প্ৰাণীবোৰক নিৰ্জু প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী যেন লাগে। সাধাৰণতে ইহঁতে তলমূৰ কৰি খুচ্ খুচাই খুচ্ খুচাই ঘূৰি ফুৰে আৰু খাদ্যৰ উপযোগী জীৱ পালে মুখেৰে কামোৰ মাৰি ধৰে। তাৰ লগত দেখা দৈনিকৈ ফেৰ মাৰিব পৰা জন্তুৰ লগত ভেটা-ভোটা হ'লে সি আত্ম-ৰক্ষাৰ বাবে কিম্বা আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হয়। সেই সময়ত জন্তুটোৰ গাত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰ জিলিম খাই ঠৰঙা হৈ পৰে। প্ৰতিদ্বন্দীক ভয় খুৱাই নিজৰ অৱস্থা শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে এই বিলাক প্ৰাণীয়ে এনে ধৰণৰ ভীতি সূচক প্ৰচণ্ড ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ উপায় অৱলম্বন কৰে। আত্ম ৰক্ষাৰ সজুলি হিচাপে কোনো কোনো বিধ নেউলে আন এবিধ বিষাক্ত পদাৰ্থৰ সহায় লয়। বদ্‌গুণ থকা এই পদাৰ্থখিনি জন্তুটোৰ দেহতে উৎপত্তি হয়। জন্তুটোৰ নেজৰ তলৰ ফালে এক প্ৰকাৰৰ নাস প্ৰস্থি বা জোলোঙা থাকে। জন্তুটোৰে ইচ্ছানুযায়ী এই জোলোঙা বা টোপোলাৰ পৰা অকটা গোন্ধ নিঃসৰণ কৰিব পাৰে। কোনো কোনো বিধ নেউলে আত্ম-ৰক্ষাৰ বাবে এই সজুলিৰ সহায় লয়। মূৰৰ চিত্ৰ বিচিত্ৰ বৰণ আৰু কদৰ্ঘ আকৃতি প্ৰকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিও দুই এবিধ নেউলে শত্ৰুপক্ষীয় জালোৱাৰক বিভ্ৰান্ত কৰে।

নেউল গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ আন এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে ইহঁতে বিধাক্ত সাপৰ লগত যুঁজ কৰি জয় লাভ কৰিব পাৰে। সাপৰ বিষাক্ত পদাৰ্থৰ পৰা এই জাতীয় প্ৰাণীবোৰে কেনেকৈ নিজকে ৰক্ষা কৰে সেই বহুসংখ্যক তাৎপৰ্য তালদৰে জনা নাযায়। কোনোৱে কোনোৱে ক'ব খোজে যে সাপৰ লগত যুঁজ লাগি থাকোঁতে এইবিলাক প্ৰাণীয়ে নিজৰ গাৰ নোমবোৰ ঠৰঙা কৰি দিয়ে। তেতিয়া সাপে তাৰ কালজিভা খনেৰে জন্তুটোৰ গাত বিষাক্ত পদাৰ্থ নিষ্ক্ষেপ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে। আন কিছুমান মানুহৰ পৰা শুনিবলৈ পোৱা যায় যে সাপৰ লগত যুদ্ধত হৈ থকা সময় ছোৱাত নেউলে এক প্ৰকাৰৰ বনৌষধ ব্যৱহাৰ কৰে। তদুপৰি এই বিষয়ত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পৰা যায় যে সাপৰ লগত যুঁজ কৰি থাকোঁতে ই এনে ধৰণেৰে লাট বাগৰ মাৰি নিজৰ দেহাটো পৰিচালনা কৰে যে সাপে তাৰ গাত বিষাক্ত পদাৰ্থ নিষ্ক্ষেপ কৰিবলৈ সুবিধা নাপায়। সি যিয়েই কি নহওক এটা কথা সত্য যে অহি নকুলৰ যুদ্ধই মানৱ জগতত এটা বৃদ্ধিৰ নোৱাৰা সাধৰৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা কেইবিধমান নেউলৰ জীৱনালেখ্য পৰৱৰ্তী প্ৰৱন্ধৰ জৰিয়তে ডাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল।

নেউল

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---সাংসাহাৰী

গোষ্ঠ---হাৰপেচুটিদি

প্ৰজাতি---হাৰপেচুটেচ্ এডৱাৰ্ডিয়াই নিউলা

অসমত যিবিধ নেউল জাতীয় প্ৰাণী সাধাৰণতে বাস কৰে সেইবিধ নেউলক বুজাবলৈ আমি কেৱল নেউল শব্দটোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইংৰাজী ভাষাত ইয়াক সাধাৰণ নেউল বা কমন্‌ মংগুচ বুলি কোৱা হয়। এইবিধ প্ৰাণীক আমাৰ এই ফালৰ ঠাইবোৰত প্ৰায়েই দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাতলীয়া হাবি বননি বিলাকৰ মাজত উৎপন্ন হোৱা জোপোহা গছৰ তলত, বাটৰ কাষৰ দ-চানেকীয়া ঠাইত আৰু বাৰীৰ কাষৰ নলাৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই এইবিধ প্ৰাণীয়ে খোৱা বস্তুৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰে। ডাঠ হাবিৰ মাজত বাস কৰিবলৈ এইবিধ প্ৰাণীয়ে বৰ ভাল নাপায়। জন বসতিৰ কাষে পাৰ্শ্বৰে থকা সৰু-সুৰা হাবি বননি বিলাকত বাস কৰিবলৈ লৈ পৰোক্ষ ভাৱে মানুহৰ পৰা বহুতখিনি উপকাৰ পায়। যিবোৰ ঠাইত মানুহে বেঙেনা, কেৰেলা আদি নানাবিধৰ কচল লগায় সেইবোৰ ঠাইতে কীট-পতঙ্গ, বেং, নিগনি আদিয়ে থাকিবৰ বাবে সুবিধা কৰি লয়। এইবোৰ প্ৰাণীক ধৰি ধৰি খাবৰ বাবে নেউল জাতীয় প্ৰাণীবোৰে ওচৰৰ হাবি বননিবোৰত থলুৱা ভাৱে বাস কৰিবলৈ সুবিধাজনক ঠাই বিচাৰি লয়। বাৰীৰ কাষে কাষে মানুহে খাল খালি যিবোৰ চাপ নিৰ্মাণ কৰি লয় সেইবোৰ চাপ আৰু খালত বগুৱা ৰাই ফুৰি ইহঁতে নানা বিধৰ প্ৰাণী চিকাৰ কৰি ধৰে। মানুহ ওচৰ চাপি অহাৰ উমান পালে লাহেকৈ জোপোহা গছৰ আঁৰত লুকাই আত্মগোপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিছু দূৰ তলমূৰ কৰি আগবাঢ়ি গৈ ইফালে সিফালে পুলুঙা পুলুঙিকৈ চাবলৈ ধৰে। লাহেকৈ হাবিৰ মাজত সোমাই খন্তেকতে অন্তৰ্ধান হয়।

জোপোহা গছৰ তল, পাখৰৰ ফাঁক, গছৰ ধোলা, ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ গুৰি ভাগত বাটৰ উপৰি ভাগলৈকে ওলাই থকা শিপা, বতাহত উৰালি পৰা গছৰ তলৰ মুকলি ঠাই আদিত সোমাই সোমাই থাকি এই জাত প্ৰাণীয়ে দিনৰ সবহখিনি সময় কটাই দিয়ে। বাটত গাঁত খান্দি খান্দি লৈ তাৰ ভিতৰত একোটা আহল বহল খোৰোং বনাই লয়। কিবা কাৰণত মানুহে এনেবোৰ ঠাইত আপোনা-আপুনি উৎপন্ন হোৱা হাবি জঙ্গলবোৰ কাটিব লগীয়া হ'লে তাত সোমাই থকা নেউল কেইটাই চকুৰ পচাৰতে মৌৰ দি পলাই



ନିଉଟ

যায়। অতি খবতকীয়া যোগত ইহঁতে মাটিৰ ওপৰেদি দৌৰি দৌৰি যাব পাৰে। নগ-
ৰীয়া ঠাইবোৰত মানুহৰ সংগমক আওকাণ কৰি এই নেউলবিলাকে খাল, নলা, চুহু-
পাতনি আদিত ভুমুকি মাৰেহি। মানুহৰ গম পালে টলকতে অন্তৰ্জান হৈ হাবিৰ মাজত
সোমাই গৈ। দিন বাতিৰ ভেদাভেদ নৰখাক এইবিধ প্ৰাণীয়ে চিকাৰ বিচাৰি ইফালে
সিকালে ঘূৰি ফুৰে। সাপ, নাইপিয়া, জেঠি আদি সৰীসৃপ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ পৰা আবদ্ধ
কৰি ভেকুলী, কেঁচু, কুমটি, কুম্ভেলুকা, কেৰেলুৱা বিচা, পলু আদি নানা বিধৰ ক্ষুদ্ৰ
আকাৰৰ প্ৰাণীবোৰ ই ধৰি ধৰি খায়। মাটিত বাহ সজা চৰাই আৰু এনে প্ৰকৃতিৰ
চৰায়ে পাৰি খোৱা কণী বিচাৰি বিচাৰি নেউলে চলাথ কৰে। গছৰ ফল মূল আদি
খোৱা বিষয়তো এইবিধ নেউলে অভিকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে। মৰা জন্তুৰ গেলাপচা মাংস
খাবলৈও এইবিধ প্ৰাণীয়ে অকণো সন্দোচবোধ কৰা দেখা নাযায়। সুবিধা পালে ঘৰ-
চীয়া হাঁহ কুকুৰাকো ই আক্ৰমণ কৰে। বাতি গড়ালৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব পৰা
গুমুঙা এটা বিচাৰি লৈ সেই ফালেদি গড়ালৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। এবাৰ গড়ালৰ
ভিতৰত সোমাই নৰ পাৰিলে ই সেই গড়ালত থকা আটাইবোৰ হাঁহ কুকুৰাক মাৰি
শেষ কৰি পেলায়। যি কেইটা হাঁহ-কুকুৰা খালে তাৰ পেটৰ ভোক মৰে সেই কেইটা
খাই শেষ কৰি দিয়ে। বাকীবোৰ আধা আধি খাই অৱশিষ্টখিনি গড়ালৰ ভিতৰতে এৰি
থৈ যায়। কোনো কোনোটো হাঁহ-কুকুৰা একেবাৰে নোখোৱাকৈ গোটে গোটে
গড়ালতে এৰি থৈ যায়। বাহত থকা পোৱালিক খুৱাবৰ বাবে দুই এটা চৰাই টানি
আজুৰি লগতে লৈ যায়। পিছ দিনা বাতি পুৱাহে গিৰিহঁত গিৰিহঁতনীয়ে গড়ালৰ দুৱাৰ
খুলি চাই গম পায় যে নেউলে গড়ালৰ আটাই কেইটা প্ৰাণীকে মাৰি শেষ কৰি থৈ
গৈছে। ঘৰত চোক কুকুৰ থাকিলে অৱশ্যে নেউলে এনে ধাণৰ উৎপাত কৰিব
নোৱাৰে।

অলপ নিলগৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে নেউলৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ
মদকুৱা হোৱা দেখা যায়। আচলতে বৰণত এই নোমবোৰে খাপ খাপ ৰূপ ধাৰণ
কৰে। সেই কাৰণে গোটেই জন্তুটোৰ গাত এক প্ৰকাৰৰ চিকমিকনিয়ে বিৰাজ কৰে।

ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাৰ অন্তৰ্গত তিনিটা উপজাতিৰ নেউল বাস কৰে। উত্তৰ
ভাৰত আৰু পূৰ্বাঞ্চলত যি বিধ 'নেউল সাধাৰণতে বাস কৰে সেই বিধ নেউলৰ নোম
বিলাক তুলনামূলক ভাৱে দীঘল হয়। ৰাজস্থানৰ মৰুভূমি অঞ্চলত বাস কৰা নেউল-
বোৰৰ নোমবোৰ এনে ধৰণেৰে দীঘল হোৱা দেখা নাযায়। তদুপৰি মৰুভূমি এলেকাত
বাস কৰা নেউলবোৰৰ নোম বৰণত বঙচুৱা হয়। দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে যিটো উপ-
জাতিৰ নেউল বাস কৰে সেই উপজাতিৰ নেউলৰ নোমবোৰ একেবাৰে চুটি চুটি হয়।

এই প্ৰসংগত উল্লেখ কৰা বিধ নেউলৰ বাহিৰে আন কেবাটাও প্ৰজাতিৰ নেউল
ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই বিলাকৰ ভিতৰত
ডিঙিত আঁচ থকা এটা প্ৰজাতিৰ নেউল দক্ষিণ ভাৰতৰ পশ্চিমঘাট পৰ্বতমালাত বাস
কৰে। এইবিধ নেউলক ডিঙিত আঁচ থকা নেউল নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। এচিয়া
মহাদেশত বাস কৰা নেউল জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত আকাৰত এইবিধ নেউল

আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি জনা যায়। বুগা বৰণীয়া নোনৰ আৱৰণ থকা আন এবিধ নেউল দক্ষিণ ডাক্তৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবিনাকত বাস কৰা দেখা যায়। এইবিধ নেউলক বুগা বৰণীয়া নেউল বুলি কোৱা হয়। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নেউলক কেঁকোবা খোৱা নেউল বুলি কোৱা হয়। এইবিধ নেউলৰ বসতিস্থান নেপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমলৈ বঙ্গদেশ, মালয়ালিমা আদি দেশলৈ বিস্তৰিত হৈ আছে।

নেউল আতীৰ শাণীৰোৰে বছৰৰ বেই কোনো সময়তে পোৱালি জগায়।

বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীসমূহ

জন্যপাৰী অৰু বিলাকৰ ভিতৰত মানৱ জাতিয়ে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই শ্ৰেষ্ঠতাৰ ওপৰিতে হ'ল মানুহৰ বুদ্ধি বৃত্তিৰ বিকাশ সাধন। পৃথিৱীত পোন প্ৰথমতে জীৱৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোটি কোটি বছৰ বাগৰি বোহাৰ অত্যন্ত এতিয়ালৈকে জীৱ জগতত যি উৎকৰ্ষ সাধন হৈছে সেই উৎকৰ্ষ সাধনৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ত মানৱ জাতিয়ে স্থান লৈছে। আনহাতে মানৱ জাতিৰ হাতত হাত মিলাই অন্যান্য যি যি বিলাক ইতৰ প্ৰাণীয়ে উৎকৰ্ষ সাধনৰ পথত এৰোজ দু-খোজকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিলাকৰ ভিতৰত বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বিলাকক স্থান দিব পাৰি। বান্দৰক 'বা-নৰ' অৰ্থাৎ অকপাৰ্থত নৰ কিম্বা বিকল্পে "নৰ" বুলি গণ্য কৰিব পৰা যায়। জীৱবিদ্ সকলেও মানুহৰ লগতে বানৰ কৈমৰ অনানুহ প্ৰাণী বিলাকক সামৰিলে প্ৰাইমেট বৰ্গ বা গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। মানুহ বান্দৰৰ পৰাই উৎপত্তি হ'লনে কিম্বা অন্য কিম্বা ধৰণৰ বিশিষ্ট ৰূপ লৈ পোন প্ৰথমতে পৃথিৱীত উৎপত্তি হ'ল এই বিষয়ে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন অভিমত প্ৰকাশ কৰিব খোজে। পিছে মানুহ আৰু বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণী বিলাকৰ মাজত বিৰিণি ব্যৱধান পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায় সেইখিনিয়ৈ সমগোষ্ঠীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ - তদ্ব বিশ্লেষণ কৰাত ভালেখিনি অন্তৰায়ৰ সৃষ্টি কৰা দেখা যায়। জীৱ বিজ্ঞানী সকলৰ বহুতে এই অভিমত পোষণ কৰে যে বান্দৰৰ পৰা মানুহলৈ উৎকৰ্ষ সাধন কৰি পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পথত উৎপত্তি হোৱা বহুতো প্ৰাণী ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা বিলুপ্ত হৈছে। মাটিৰ তলত বা বৰফৰ তলিত পোত খাই থকা কিছুমান জীৱায় পৰীক্ষা কৰি এওঁলোকে বহুতো তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মানৱৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল হোমো চেপিয়ান্চ। মানুহ আৰু বান্দৰৰ মধ্যভাগত থকা কেবাবিধো অৱলুপ্ত প্ৰাণীৰ জকা ইতিমধ্যে জীৱবিদ সকলৰ দুষ্ট এজন বিজ্ঞানীয়ে ফচিল ৰূপত বিচাৰি উলিয়াইছে।

এতিয়া মগজু বিকাশৰ কথাখিনি ঠাউকতে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰা হওক। এই মগজুৰ পূৰ্ণ বিকাশ সাধনক আশ্ৰবকাৰ শ্ৰেষ্ঠতন্ সজুলি বুলি গণ্য কৰিব লাগিব। নিম্নতৰৰ প্ৰাণীবিলাকৰ দেহত মগজুৰ বিকাশ সামান্য হোৱাৰ বাবে আশ্ৰবকাৰ বাবে সিহঁতে নিজৰ দেহতে থকা নানা বিধৰ সজুলি ব্যৱহাৰ কৰিব লগীয়া হয়। আশ্ৰবকাৰ সজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণীৰ লগত বৃদ্ধ বাগবত প্ৰবৃত্ত হৈ নিজৰ ৰং ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ইতৰ প্ৰাণী বিলাকে নিজৰ দেহতে উৎপত্তি হোৱা নানা অক আৰু শিং আদিৰ বিশেষ ৰূপ আৰু উৎকৰ্ষ সাধনক এই বিধৰত উদাহৰণ

স্বৰূপে আত্মনিয়মিত দেখুৱাব পৰা যায়। মানৱ জাতিৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক সজুলিৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। শিহ্নে মানুহৰ বগজৰ চুড়াত বিকাশে এই আটাই ঘোৰ আয়োজনক কাৰ্য কৰিবলৈ সৰ্ব্ব হৈছে।

বহুতো বিহীনত বাল্মব গোষ্ঠীৰ ইতৰ প্ৰাণী বিলাকে মানুহৰ চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে। বুদ্ধি বৃত্তিত কিন্তু ইহঁত মানৱ জাতিৰ পৰা বহুতো আঁতৰত আছে। উদাহৰণ স্বৰূপে ক'ব পাৰি যে মানুহৰ দৰে বাল্মব গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ দুখনকৈ হাত থকা স্বৰূপে দলি নবা বা কৰ্মটি মাৰি শত্ৰুক বিভাৱণ কৰা কামৰ বাবে সিহঁতে এই হাত দুখন ব্যৱহাৰ কৰিব বা কৰ্মটি মাৰি শত্ৰুক আঁতৰ কৰা কামৰ বাবে সিহঁতে এই হাত দুখন ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে। তেনে ধৰণৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক তথা মানসিক বিকাশ সাধনত ব্যুৎপত্তি লাভ কৰা কিছুমান মানৱ সদৃশ প্ৰাণীয়ে খণ্ড সেও মানি ইতিমধ্যে যে পৃথিৱীৰ বিদ্যৰ লৈ যাব লগা হ'ল এই কথা ভাবাৰো থল নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। সি বিৱেই কি মহত্বক বৰ্তমান যুগত বাল্মব বিলাকেই যে মানুহৰ পাছতে বগজ বিকাশত স্থান অধিকাৰ কৰি লব পাৰিছে এই কথা সৰ্বসন্মত ক্ৰমে মানি লোৱা নিতান্ত প্ৰয়োজন।

আমাৰ দেশত বাল্মব বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি বিবিধ প্ৰাণীক ধূজো সেইবিধ বাল্মব জাতীয় প্ৰাণীয়ে সকলো বিলাক প্ৰাইমেট গোষ্ঠীৰ আনোৱাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে। অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশখনৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আন আটাই কেইখন মহাদেশতে বাল্মব গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ এবিধ নহয় এবিধে স্বাভাৱিক পৰিবেশত বাস কৰি আহিছে। শৰীৰৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গ বিলাকৰ গঠন প্ৰণালী আৰু প্ৰাণী বিলাকৰ চাৰিত্ৰিক গুণাগুণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাইমেট বিলাকক ষোটাষোটি ভাবে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত গছত বগাব পৰা চিকা জাতীয় প্ৰাণী বিলাকক সামৰি লৈ লেমুৰ নামেৰে জনাজাত বিবিলাক প্ৰাণী আছে সেই বিলাকেই বাল্মব জাতীয় প্ৰাণীৰ নিম্নস্তৰত স্থান পাইছে। এই লেমুৰ কৈশৰ প্ৰাণী বিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ লাজুকী বাল্মব নামৰ প্ৰাণী বিধো পৰে। দ্বিতীয় স্থানত ঠাই পাইছে টাৰচিয়াৰ নামেৰে জনাজাত প্ৰাণী বিলাকে। টাৰচিয়াৰ নামৰ প্ৰাণীক অৱশ্যে আমাৰ ইয়াত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অসমৰ কথাই নকওঁ। গোটেই ভাৰত উপ মহাদেশখনৰ অন্য কোনো ঠাইতে এই কৈশৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ইহঁতৰ কিছুমানে সুহাড্ৰা, জাভা, বৰ্ণিও, চিলিবিচ আদি দ্বীপপুঞ্জত বাস কৰিবৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশ বিচাৰি লৈছে। সাধাৰণ বাল্মব, হনুমান বাল্মব, হলৌ বাল্মব আদি প্ৰাণীৰ প্ৰতিনিধি বিলাকে ভাগে ভাগে এচিয়া, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকা মহাদেশ কেইখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন পৰিবেশত বাস কৰে। আটাই কেইখন মহাদেশত একে একে বিধৰ বাল্মব গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখা নাযায়। আমাৰ দেশত বাল্মব জাতীয় যি কেইবিধ প্ৰাণী বাস কৰে ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকা মহাদেশত সেইবিলাকক স্বাভাৱিক অৱস্থাত দেখা নাযায়। ইয়াত থকা সাধাৰণ বাল্মবক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাণী বিলাকক ধাউকতে সেকেক বুলি কোৱা হয়। আফ্ৰিকা মহাদেশখনত বেকেকৰ ঠাই মাগায়ে আৰু বেবোন বিলাকে থল কৰিছে। আফ্ৰিকাৰ হাবি অঞ্চল বিলাকত কিছুমান দীঘলনেজীয়া বাল্মব জাতীয়

গ্ৰাণী বাস কৰে। ইহঁতে গৰু জাগ সৰু গছৰ ওপৰত কঠোৰ আৰু কালি কেতিয়া-বাৰে বাটটো লাগি আহে। সেইখন মহাদেশৰে সুকলি-সুখীয়া হাঁহসি পক্ষীবিলাকত নাটত বগাই কৰা কেইবিধ বান বাসৰ জাতীয় গ্ৰাণী বাস কৰে। তাৰে-এবিধক হোচাৰ বাসৰ বুলি কোৱা হয়। কোনো কোনোৱে ইহঁতক বিনিটেৰী বাসৰ বুলিও কয়। সেলা বাহিনীৰ সৈন্য বিলাকৰ দৰে আৰু বান্ধি পৰিভ্ৰমণ কৰি কুৰাৰ চাৰিত্ৰিক গুণ থকাৰ বাবেই এই গ্ৰাণী বিলাকক বিনিটেৰী বাসৰৰ আখ্যা দিয়া হৈছে। দক্ষিণ আমেৰিকাত কপোচিল্ মাৰ্চোচেট, ভাৰাথিণ প্ৰভৃতি বিভিন্ন জাতৰ সৰু আকাৰৰ বাসৰ জাতীয় গ্ৰাণী বাস কৰে। ওপৰত হালৌ বাসৰ নামৰ বিধি বাসৰ জাতীয় গ্ৰাণীৰ নাম উল্লেখ কৰা হ'ল সেইবিধ বাসৰৰ প্ৰতিনিধি বিলাকক ঠাউকতে গীৰন বুলি কোৱা হয়। আফ্ৰিকাত থকা বাফ্ৰিল, বেৰোন আদি গ্ৰাণীৰে আমাৰ দেশত থকা দানাবিধ বাসৰৰ ঠাই অধিকাৰ কৰিব পাৰিছে। চিম্পাঞ্জী, পৰিলা আৰু ওবাং ওটান নামেৰে জনাজাত বৃহৎ আকাৰৰ মানৱ সদৃশ বাসৰে এপ্ বা গ্ৰেইট এপ্ নাম লৈছে। ওবাং ওটান ইণ্ডোনেচিয়াৰ জালৰ গ্ৰাণী আৰু পৰিলা, চিম্পাঞ্জী নামেৰে জনাজাত গ্ৰাণী দুবিধৰ সচৰাচৰ কলতিহান হ'ল আফ্ৰিকা-মহাদেশৰ গভীৰ অৰণ্যভূমিবিলাক।

ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা বিভিন্ন কৈলৰ বাসৰৰ প্ৰতিনিধি বিলাকৰ বিষয়ে ইয়াৰ পাছত উদ্ধৃতি কৰা গ্ৰন্থ বিলাকৰ জৰিয়তে বৰ্ণনা আগ বঢ়াবলৈ বন্ধ কৰা হ'ল।



বৃক্ষাবোহী চিকা

শ্ৰেণী----স্তন্যপায়ী

বৰ্গ----পাইৰেট

গোত্ৰ----টুপাইদি

প্ৰজাতি----আহানা ইলিহাট

ইয়াৰ আগতে মাটিত বগাই ফুৰা আৰু মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰত বাস কৰা এবিধ চিকা জাতৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি অহা হৈছে। সেইবিধ প্ৰাণীৰ জীৱনালেখ্য বৰ্ণনা কৰাৰ সময়ত এই কথা উনুকিয়াই অহা হৈছিল যে মাটিত বগাই ফুৰা চিকা জাতীয় প্ৰাণীবোৰক পতঙ্গ-ভোজী প্ৰাণীবোৰৰ লগত সাঙুৰি থকা হৈছে। বৰ্তমান যিবিধ গছত বগাব পৰা বা সাধাৰণতে গছৰ ডালে পাতে বগুৱা বাই ফুৰা চিকা জাতৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে এই প্ৰৱন্ধত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেই জাতৰ প্ৰাণীকো পূৰ্বতে জীৱবিদ পণ্ডিত সকলে পতঙ্গ-ভোজী প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে হান দিছিল। এতিয়া গছত বগাই ফুৰা চিকা বিলাকক বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ মাজলৈ টানি অনা হৈছে। এই নিম্নস্তৰৰ স্তন্যপায়ী জন্তু বিলাকক এইদৰে বান্দৰৰ গোষ্ঠীলৈ টানি আনিব লগীয়া হোৱাৰ একাধিক বুদ্ধি জীৱবিদ সকলে বিচাৰি পাইছে। মালয়া-চিয়াৰ মানুহে এইবিধ প্ৰাণীক কেৰ্কেটুৱা নামেৰে অভিহিত কৰিব খোজে। গোটেই পৃথিৱীখনৰ অন্যান্য দেশত থকা মানুহবিলাকে অৱশ্যে ইয়াক গছত বগুৱা চিকা বুলিয়েই কয়। বৃক্ষাবোহী চিকাবিলাকে মাটিত বগাই ফুৰা আনবিলাক চিকাৰ দৰে জীৱন ধাৰণৰ বাবে কটী পতঙ্গৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভৰ নকৰে। নানা জাতীয় গছৰ ফলমূল আদি ভক্ষণ কৰাৰ উপৰিও ইহঁতে চৰাই আদি নানা বিধৰ প্ৰাণীক ধৰি ধৰি খায়। মগজুৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে চিকা জাতীয় প্ৰাণীবোৰে এই বিষয়ত বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই। মাটিৰ ওপৰত বগুৱা বাই ফুৰা পতঙ্গভোজী চিকাবোৰৰ কথাই নাই; আনকি গছত বগুৱা বাই ফুৰা চিকাবোৰেও এই বিষয়ত উন্নত পৰ্যায়ৰ বান্দৰবিলাকৰ দৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই।

বান্দৰ গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা আটাইবোৰ প্ৰাণীৰে যে অ-মানুহ বান্দৰ কিছু-মানৰ দৰে মগজুৰ বিকাশ ঘটিছে এই কথাও সত্য বুলি ক'ব নোৱাৰি। কাৰণ লাজুকী বান্দৰ, লাহি লাজুকী বান্দৰ, পোতো, পালাগো প্রভৃতি কিছুমান বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ

নগৰে উন্নতিৰ পথৰ আন আন কিছুমান বাল্যবৰ দৰে আগবাঢ়িব পৰা নাই। সেই-
 বাবে নগৰৰ উৎকৰ্ষ সাধন নোহোৱাকৈ থকা আৰু শাৰীৰিক তথা চাৰিত্ৰিক ভগ্নাৱলীত
 সিহঁতৰ পৰম্পৰাৰ মাজত বৰেই সাদৃশ্য থকা প্ৰাণী বিলাকক লগ লগাই এটা বহুত উপ-
 গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই উপগোষ্ঠীটোক প্ৰচিন্ধাই নামেৰে অভিহিত
 কৰা হৈছে। বৃক্ষাবোহী চিকা বিলাককো এই উপগোষ্ঠীতে স্থান দিয়া হৈছে।
 বেকেক, হনুমান-বাল্যব, হলো বাল্যব, চিম্পাঞ্জী, গৰিলা, ওৰাং ওটান আদি চালাক
 চতুৰ প্ৰাণীক লগ লগাই চিন্ধাই নামৰ এটা উপগোষ্ঠীত স্থান দিয়া হৈছে।

বৃক্ষাবোহী চিকাৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুটা জাতৰ জন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰি সীমাৰ অন্তৰ্গত
 ৰাল কৰে। ইয়াৰে এবিধক “ইণ্ডিয়ান ট্ৰি শ্ৰো” আৰু আন বিধক “মালয়ান ট্ৰি শ্ৰো”
 বুলি কোৱা হয়। এই দুবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ খাচ জলৱীয়া ভাষাত জনে “ভাৰত-
 বৰ্ষীয় গছত বগুৱা চিকা” আৰু “মালয়দেশীয় গছত বগুৱা চিকা” নাম দুটা হয়তো
 ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। অলপ সংক্ষিপ্ত আকাৰত সিহঁতক ভাৰতৰ বৃক্ষনিবাসী চিকা
 আৰু মালয়ৰ বৃক্ষনিবাসী চিকা বুলি ক’ব পাৰি।

ভাৰতৰ বৃক্ষনিবাসী চিকাৰ বসতি স্থান আৰু বিচৰণ ভূমি দক্ষিণাত্যৰ কালে
 থকা কোনো কোনো ঠায়ে নিৰ্ণয় কৰিছে। এই বিধ বৃক্ষনিবাসী চিকাৰ বসতি
 স্থান সুদূৰ বিয়পা নহয়। গঙ্গা নদীৰ উত্তৰৰ কালে থকা বিতীৰ্ণ সমভূমি আৰু হিমালয়
 শৈলমালাৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত এইবিধ চিকাক সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।
 গঙ্গা নদীৰ দক্ষিণ পাৰে থকা কিছুমান অনুকূল পৰিবেশত উৎপত্তি হৈ ইহঁতৰ সচৰাচৰ
 বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি দক্ষিণ প্ৰান্তত অৱস্থিত উপকূলবৰ্তী ঠাই বিলাকলৈ সম-
 সাৰিত হৈছে। আনহাতে দেখা যায় যে মালয়ৰ বৃক্ষ-নিবাসী চিকা নামেৰে জনাজাত
 ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণীৰ বসতিস্থান দেশখনৰ উত্তৰ আৰু পূৰ্বাঞ্চলত বিয়পি আছে।

বৃক্ষাবোহী চিকাবিলাকে যে সকলো সময়তে গছৰ ডালে পাতে পৰিভ্ৰমণ কৰিয়েই
 সময়বোৰ অতিবাহিত কৰে এই কথা আখৰে আখৰে সঁচা বুলি কব নোৱাৰি। কথা
 ইবানেই যে গছৰ ওপৰলৈ নখৰ সহায়ত বগুৱা ৰাই যাব পৰাৰ গুণ ইহঁতে আৱৰ
 কৰি ল’ব পাৰিছে। সময় আৰু সুবিধা বুজি এই প্ৰাণীবিলাকে মাটিলৈও নানি আহে
 আৰু খোৱা বস্তুৰ সন্ধানত ইফালে সিফালে ঘূৰি কৰে। গছৰ তলখন উপচি থকা তল-
 লৰা শুকান পাত, জাবৰ আদি খুচৰি মুচৰি ইহঁতে তাৰ তলত লোৱাই থকা পোক
 পৰুৱা, কীট-পতঙ্গ আদি বিচাৰি বিচাৰি খায়। বহুতো বিষয়ত ইহঁতে কেৰেক্টুৱা
 গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা প্ৰাণীবোৰৰ চৰিত্ৰিক গুণ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়।

বৃক্ষাবোহী চিকাৰ মাইকী জনীয়ে এবাৰত মাত্ৰ এটাকৈ পোৱালি জগায়। সাধা-
 ৰণতে এটা মতা আৰু এজনী মাইকী চিকা লগ লাগি সংসাৰিক জীৱনৰ পাতনি মেলে।
 যিডোখৰ ঠাইত ইহঁতহালে বাহ সাজি থাকিবলৈ লয় সেইডোখৰ ঠাইলৈ জাতৰ আনবোৰ
 চিকাক আহিবলৈ নিদিয়।

লাজুকী বান্দব

শ্ৰেণী—জল্যপায়ী

বৰ্গ—গাইবোঁট

গোত্ৰ—লবিচিদি

প্ৰজাতি—মিড্ৰিচেৰাহ্ কণ্ঠকাঃ

লাজুকী বান্দব নামৰ প্ৰাণী বিশ্বৰ অলপৰ হাৰি-জলম বিলাকত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইংৰাজী ভাষাত এইবিধ প্ৰাণীক 'গ্লো লবিচ্' বুলি কোৱা হয়। এই একে বিধ প্ৰাণীকে বুজাবলৈ আমাৰ কোনো কোনো মানুহে নিলাজী বান্দৰ বুলি দৃঢ় ব্যৱহাৰ কৰে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিন্ ভিন্ ঠাইত গ্লো লবিচ আৰু গ্লেন্দাৰ লবিচ নামৰ দুবিধ প্ৰাণী বাস কৰে। অলপৰ বাহিৰেও পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় আটাই কেইখন ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যত লাজুকী বান্দৰৰ বসতি স্থান বিয়পি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাক্ষুণ্যৰ বাহিৰে লাজুকী বান্দৰক দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ কেবাখনো দেশত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গ্লেন্দাৰ লবিচ নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীবিশ্বক আমাৰ এই কালৰ ঠাই-বোৰত বাস কৰি থকা দেখা নাযায়। এইবিধ দক্ষিণ ভাৰতীয় প্ৰাণী। আমাৰ ভাষাত এই দ্বিতীয় বিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ "লাহি লাজুকী বান্দৰ" শব্দাৱলী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বসতিস্থান দক্ষিণৰ কালে সাগৰৰ সিপাৰে থকা শ্ৰীলঙ্কা পৰ্যন্ত বিয়পি আছে।

লাজুকী বান্দৰৰ তিনিটা উপ-প্ৰজাতি আছে। যিটো উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী অলপকে কেন্দ্ৰ কৰি পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য কেইখনত সাধাৰণতে বাস কৰে সেই উপ-প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীক বিজ্ঞান সন্মত ভাষাত মিড্ৰিচেৰাহ্ কণ্ঠকাঃ বেকলেঞ্চিচ্ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ বসতি স্থান ভাৰতবৰ্ষৰ চাক্ষুণ্যৰ বাহিৰে বাংলাদেশৰ চিটাগঙেদি ব্ৰহ্মদেশলৈকে বিস্তাৰিত হৈ আছে।

এই সুযোগতে লাজুকী বান্দৰৰ সৰ্বশৰী প্ৰাণীবিলাকৰ বিষয়ে অলপ বহলাই আলোচনা কৰা যাওক। বান্দৰ গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত লাজুকী বান্দৰৰ নিচিনা জন্তু কেইবিধমানক সৰ্ব-নিম্ন স্থাপত্য স্থান দিয়া হয়। কিয়নো বগজুৰ বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য জাতীয় বান্দৰ বিলাকৰ দৰে এই কেইবিধ বান্দৰে আগ বাঢ়িব পৰা নাই। ইহঁতৰ কেইবিধমান প্ৰাণী আফ্ৰিকা মহাদেশৰ হাৰি বননি বিলাকত নিৰলে বাস কৰে। তাৰ ভিতৰত পোন প্ৰথমতে "হাৰি কেঁচুৱা" (বুচ থেৰি) নামেৰে জনাজাত এবিধ প্ৰাণীৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। দ্বিতীয় বিধ প্ৰাণীৰ নাম হ'ল "পোডো"।

নাইজেরিয়াৰ কালে “আগ্‌ৱান্টিবো” নামৰ আন এবিধ সমপৰ্যায়ৰ প্ৰাণী বাল কৰে। দেশাত “আগ্‌ৱান্টিবো” নামৰ প্ৰাণীবিধক “স্নেনদাৰ নৰিচ” বা নাহি লাজুকী বান্ধবৰ সৈতে একে বেন লাগে। “পোভো” নামেৰে জনাজাত প্ৰাণীবিধক “ৱো নৰিচ” বা লাজুকী বান্ধবৰ সৈতে একে দেখি। ইহঁত আটাইবোৰেই নিশাচৰ প্ৰাণী। দিনৰ ভাগত ইহঁতে গছৰ খোন্দত কিম্বা তেনে ধৰণৰ সুবিধা জনক ঠাইত নুৰা বান্ধি পৰি থাকে। গধূলি হোৱাৰ লগে লগে এইদৰে আশ্ৰয় লৈ পৰি থকা ঠাইবোৰৰ পৰা ওলাই আহে। গোটেই নিশা গছৰ ডালে পাতে বগাই বগাই আহাৰ বিচাৰি ঘূৰি কৰে। সেই বাবে দিন পূৰ্বত সহজতে ইহঁতক হাবিৰ মাজত দেখি পাৰলৈ আশা কৰিব নোৱাৰি।



লাজুকী বান্ধ

এনে ধৰণৰ নিশাচৰ প্ৰাণীবিলাকৰ দৰ্শন দিনৰ ভাগত সম্ভৱপৰ কৰিবলৈ উন্নত দেশৰ চিৰিয়াখানা বিলাকত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আগ্‌ৱান্টিবো নামৰ যিবিধ লাজুকী বান্ধবৰ নিচিনা প্ৰাণী আছে সেইবিধ প্ৰাণীক দৰ্শক সকলে সহজে দেখি পাৰৰ বাবে “নাইট হাউচ” বা “বাতি থকা ঘৰ” নিৰ্মাণ কৰা হয়। এই নাইট হাউচ বিলাকত লক্ষিয়ান বিজুলি বাতি জলাই গোটেই নিশা পোহৰ কৰি ৰখা হয়। বিজুলি বাতিৰ পোহৰকে দিলৰ পোহৰ বুলি ভাবি এই নিশাচৰ প্ৰাণীবিলাকে তেতিয়া নুৰা পাতি উঠি থাকে। দিনৰ ভাগত এই নাইট হাউচ বিলাকৰ চাৰিও ফালে ক’লা কাপোৰৰ আঁৰৰে

দি অন্ধকাৰ কৰি ৰখা হয়। তাত চিলিমিলি পোহৰৰ ৰশ্মি পেলাই দৰ্শকসকলে জন্তু কেইটাক সহজতে দেখি পাৰৰ বাবে সুবিধা কৰি ৰখা হয়। জন্তু কেইটাইও সেই চিলিমিলি পোহৰ বাতিৰ জোনৰ পোহৰ বুলি ভাবি মুকলি মনেৰে ইফালে সিফালে বগাই ফুৰে। দৰ্শকসকলে সিহঁতৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিবলৈ সুবিধা হৈ পৰে। বিসকল আগ্ৰহী বৈজ্ঞানিকে সিহঁতৰ জীৱন ধাৰণৰ নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ একাধাৰে চিন্তে অনুসন্ধান তথা পৰ্যবেশনৰ কাম হাতত লব খোজে তেওঁলোকে নাইট হাউচত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা জন্তু কেইটাকে প্ৰতিনিধিমূলক প্ৰাণীৰ আৰ্হিত ল'ব পাৰে।

মানুহৰ কেচুৱাৰ নিচিনা মৰম লগা প্ৰাণী হলেও শ্লো লৰিচ্, শ্লোন্দাৰ লৰিচ্ বুচবেৰি, পোতো আগৱান্টিয়ে প্ৰভৃতি প্ৰাণী বিলাকক মৰমৰ পোহনীয়া প্ৰাণী (Pet) হিচাপে ঘৰত ৰাখি পালন কৰাৰ উপযুক্ত প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। দিনৰ ভাগত বাহিৰলৈ ওলাই নাহা নোখোৱা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে আকৰ্ষণীয় বন্য প্ৰাণীৰ বৈশিষ্ট্য সিহঁতৰ এটাকো আদৰ কৰিব নোৱাৰি। তদুপৰি পোতো, বুচবেৰি আদি প্ৰাণীৰ এটা বেয়া অভ্যাস আছে। পেচাৰ কৰিব লগীয়া হ'লে ইহঁতে হাতৰ তলুৱাতে (আগঠেঙৰ হাতোৰা) কামফেৰা কৰি পেলায়। এনে প্ৰকৃতিৰ কৰ্মৰ অভ্যাস থকাৰ বাবে সেই দেশৰ ধলুৱা মানুহে এইবোৰ প্ৰাণী মৰমৰ পোহনীয়া জন্তু হিচাপে ঘৰত ৰাখিবলৈ ভাল নাপায়। লাজুকী বান্দৰ আৰু লাহি লাজুকী বান্দৰৰ গাত এইবিধি বদ্ৰ গুণৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা নাযায়।

চুটি চুটি নোমৰ আৱৰণখনৰ সৈতে এই লাজুকী বান্দৰ নামৰ প্ৰাণীবিধ দেখিবলৈ কোমল আমল হয়। ইয়াৰ গাটোক মেকুৰী জাতীয় প্ৰাণীৰ গাটোৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। চকু কেইটা পখালি পখালিকৈ সজাই থোৱা যেন লাগে আৰু ইয়াৰ চকুৰ মণি কেইটাই গোল গোল ৰূপ ধাৰণ কৰে। বহল ধৰণৰ মুখ মঙলৰ সৈতে এইবিধ প্ৰাণীৰ মুখখনত মানুহৰ মুখৰ স্বৰূপ প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। চকু দুটাৰ চাৰিওফালে এচটা বগা বৰণীয়া নোমৰ চকৰ থাকে। আকাৰত এইবিধ প্ৰাণী সিমান ডাঙৰ নহয়। দীঘলে দীঘলে নাকৰ আগ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেজলৈকে প্ৰায় একুটি মানুহে হ'ব। ইয়াৰ নেজডালক অৱশ্যে নেজৰ আখ্যা দিব নোৱাৰি। এই নেজডাল ইমান চুটি যে বাহিৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে নেজৰ কিনা চিন্‌চাব আছে বুলি কোৱা টান। ইয়াৰ গাটো অলপ আটিল হয় আৰু এই আটিল দেহাটোৰ ওপৰত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বং ছাই বৰণীয়া হয়। মূৰৰ ওপৰ ভাগৰ পৰা পিঠিয়েদি নেজৰ ওৰিলৈকে বৈ পৰা আঁচ ডাল বগা চানেকীয়া হয়। ইয়াৰ ঠেঙৰ আগ ভাগত থকা হাতোৰাৰ তলুৱা আৰু নখৰ নিচিনা ধূৰণীয়া আকাৰৰ নখ থাকিলেও দেখা যায় যে তৰ্জনী আঙুলিত যিটো নখৰ উৎপত্তি হয় সেই নখ হাঁকোটাৰ নিচিনাকৈ দীঘল হয়। এই দীঘল আৰু হাঁকোটাৰ নিচিনা নখৰ সহায়ত জন্তুটোৱে পাথৰৰ কাঁক কিম্বা গছৰ বাকলিৰ ভিতৰৰ পৰা কীট-পতঙ্গ আদি খোৱাৰ উপযোগী বস্তু উলিয়াই আনে। ইয়াৰ হাতৰ মুঠিটো বৰ মজবুত হয়। গছৰ ডাল বা অন্য কোনো ঠাইত খামোচ মাৰি ধৰিলে এই মুঠিটো টানি একেধাৰে নোৱাৰি। হাত খনেৰে খোৱা বস্তুবোৰ তুলি আনি ই মুখত দিয়ে আৰু

বন্ধটো মুখত দিয়াৰ লগে লগে সি বাবু বাবু কৰি চোবাই, ডাক খুবুটি কৰি পেলায়। এবাৰ ডাক মুখৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলে কোনো গ্ৰাণীয়ে জীৱন বন্ধা কৰি জীয়াই থাকিবলৈ আশা কৰিব নোৱাৰে। চুৰি লোপোৱা ঠাইৰ পৰা বোৱা বন্ধ হাতেৰে ধৰি আনিব নগীয়া হলে ই পাছ ত্ৰৈঃ মুখৰ ওপৰত থিয় হৈ বেঙা বেলি আগ ত্ৰৈঃন হাতোৰাৰে বন্ধটো ধৰি আনে আৰু ততালিকে মুখত সি ৰাই পেলায়।

এইবিধ বিচিত্ৰ গ্ৰাণীৰ পাৰিবাৰিক জীৱন সম্পৰ্কে সিহান স্পষ্টভাৱে জনা নাযায়।



লাহি লাভুকী বাল্য

শ্ৰেণী—তৃত্যাপাঠী

বৰ্গ—গ্ৰাইবেট


মোত্ৰ—লবিচিদি

শ্ৰব্ৰাতি—লবিচ টাৰিগ্ৰেনছ

স্নো লবিচ আৰু স্নোন্দাব লবিচ নামৰ দুবিধ বাল্যৰ মোটীৰ গ্ৰাণীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আগৰ প্ৰবন্ধত উল্লেখ কৰা হৈছে। এই দুবিধ ভাৰতীয় বন্যগ্ৰাণীৰ লগত শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণত বহুতো সাদৃশ্য থকা পোভো, বৃহৎবেধি, আগুয়াণ্টিচো আদি যি কেইবিধ বিভিন্ন গ্ৰাণী আফ্ৰিকা মহাদেশৰ হাবি বনসিখোবত আশেতে আশেতে বাস কৰে, সেই কেইবিধ গ্ৰাণীৰ বিষয়েও ইতিমধ্যে খুশখুশ ভাৱে আলোচনা কৰি অহা হৈছে। স্নোন্দাব লবিচ নামটোৱেই ইজিপ্ত দিৱে যে এইবিধ গ্ৰাণীৰ পাটো কীণ আৰু লেংগেঙীয়া হৰ আৰু লম্বটোৰ নেহত বহুদূৰ পৰিমাণ ভেদেই কৰ থাকে। আচলতে গছত বহুদূৰ পাতৰেঙৰ দৰে এইবিধ আলোহাবৰ পাটো একেধাৰে পাতল আৰু ঠেং কেইখন দীঘল চানেকীয়া হোৱা দেখা যায়। এইবিধ গ্ৰাণীক বুজাবলৈ আৱাৰ অসলীয়া ভাষাত লাহি লাভুকী বাল্যৰ বুলি কেইটা প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ। এতিয়াও এই একেটা নামেৰে এইবিধ গ্ৰাণীক নামকৰণ কৰাৰ বাহিৰে অন্য পথ বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই।

লাহি লাভুকী বাল্যৰ নামৰ লক্ষ আকাৰৰ গ্ৰাণীবিধক আৱাৰ এই কালৰ ঠাই-বিলাকত দেখি পাবলৈ আশা কৰিব সোৱাৰি। অসমৰ ভৌগোলিক চাৰি সীমাৰ কংখাই নকণ্ড। উত্তৰ ভাৰত, উত্তৰ পূব ভাৰত, পশ্চিম ভাৰত আৰু বংগ ভাৰতৰ কোনো এডোখৰ ঠাইতো এইবিধ গ্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। দক্ষিণ ভাৰতৰ অদ্ৰু প্ৰদেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুমাৱিকা অস্তৰীপলৈকে যি বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগ আছে সেই ভূ-খণ্ডৰ অন্তৰ্গত অৱস্থিত কোনো কোনো বনভূমিৰে এইবিধ বিভিন্ন গ্ৰাণীৰ বাবে অনু-কূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। সংক্ষেপতে ক'ব পাৰি যে লাহি লাভুকী বাল্য হাড়ে হিমজুৱে দক্ষিণ ভাৰতবৰ্ষীয় গ্ৰাণী। ভাৰতৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা অভিক্ৰম কৰি এইবিধ বন্য গ্ৰাণীৰ লচৰাচৰ বসতিহাতে দক্ষিণৰ কালে সন্মুখ অভিক্ৰম কৰি এলিফাণ্টকে সন্মুখাধিত হৈ আছে।

এইবিধ লাজুকী বান্দৰৰ কাণ দুখন তুলনা মূলক ভাৱে সাধাৰণ লাজুকী বান্দৰৰ কাণ দুখনতকৈ দীঘল হয়। ইয়াৰ মূৰৰ আকৃতিয়েও লাজুকী বান্দৰৰ মূৰৰ দৰে ঘূৰণীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা যায়। পখালি পখালিকৈ সজোৱা চকু হালৰ ৰণি দুটা ষাটলুঙাটিৰ দৰে গোল গোল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দুয়োটা চকুৰ মাজ ভাগত থকা নাকৰ উঠঙা ঠাইখিনিৰ ব্যৱধান ইমান সামান্য যে এই দুয়োটা চকু গাতে গা লাগি থকা যেন দেখি। সাধাৰণ লাজুকী বান্দৰৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ দৰে ইয়াৰ গাত থকা নোমবোৰো কোমল আনল হয় আৰু এই নোম লোপাই নটীয়া বা ধোঁৱাবৰণীয়া ৰং ধাৰণ কৰে। চকু দুটাৰ চাৰিওফালে এচটা ক'লা বৰণীয়া নোমৰ পাৰি থাকে। নাকৰ চাৰিও ফালে থকা নোমবোৰৰ বৰণ অলপ অলপ বগা হয়। ঠিক সেইদৰে পেটৰ তলৰ ফালে গজা নোমবোৰেও শুকুলা ৰং ধাৰণ কৰে।



লাহি লাজুকী বান্দৰ

চাল-চলন আৰু খোৱা-বোৱাৰ নীতি নিয়ম সম্পৰ্কত এইবিধ প্ৰাণী আৰু লাজুকী বান্দৰৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য থকা দেখা নাযায়। লাজুকী বান্দৰৰ দৰে এই বিধ প্ৰাণীয়েও নিশাচৰ প্ৰাণীৰ চাৰিত্ৰিক গুণাবলী প্ৰদৰ্শন কৰে। দিন দুপৰত ই গছৰ কেৰেপনি, গা-গছৰ ধোম আদিৰ ভিতৰত নুৰা বান্ধি শুই থাকে আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত

খোৱা বস্ত্ৰৰ সন্ধানত তেনেবোৰ ঠাইৰ পৰা নাহেহৈ ওলাই আহে। বাতাবাতি গছৰ ডাল-পাতত বগুৱা বাই বাই ইফালে সিফালে ঘূৰি কৰে। ব'তে খাদ্যৰ উপযোগী বস্তু পায় ত'তে তেনেবোৰ বস্তু বুটলি বুটলি খায়। কীট-পতঙ্গবোৰৰ পৰা আবদ্ধ কৰি জেঠি, নাইপিয়া, ডেকুলী, পাভৰেং, নিগনি, এলুৰ আদি ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ প্ৰাণী চিকাৰ কৰি ধৰে আৰু বস্তুকতে কামুৰি ভাঙি পেটৰ ভিতৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। ফল মূল আৰু নিৰানিষ খাদ্যৰ প্ৰতিও এইবিধ প্ৰাণীয়ে সমানে অভিকৃচি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়। পাছ ঠেং দুখনৰ সহায়ত গছৰ ডালত খামোচ মাৰি ধৰি ই মানুহৰ নিচিনাকৈ দুটা ঠেঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰে থিয় হ'ব পাৰে। গছৰ ডালত এইদৰে থিয় হৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা বেঙা বেলি আগ ঠেঙৰ হাতোৰা আৰু আঙুলিৰ সহায়ত ই দূৰৰ বস্তু ধৰিব পাৰে। খোৱা বস্তু মুখত দিয়াৰ লগে লগে ই দাঁতেৰে চোবাই টুকুৰা-টুকুৰ কৰি পেলোৱা আৰু লগে লগে পেটৰ ভিতৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। সবহৰিনি সময় এইবিধ প্ৰাণীয়ে গছৰ ওপৰতে কটাই দিয়ে আৰু কাচিং কেতিয়াবাহে মাটিলৈ নামি আহে। গছৰ পাতত গোট খাই থকা নিয়বৰ টোপাল ই হাতৰ তলুৱাৰে টোকি আনি মুখত দিয়েহি। কেতিয়াবা হাত দুখন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে ই মুখেৰেই পাতৰ ওপৰত গোট খাই থকা পানীবোৰ চেলেকি চেলেকি খায়। খং উঠাৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ফোঁচ-ফোঁচাই উঠে।

লাহি লাজুকী বান্দৰক সমাজ পাতি বাস কৰা বিধৰ প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। সাধাৰণতে ইয়াক গাই - ওটীয়া ভাৱে বগাই কুৰা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিধ প্ৰাণীয়ে বছৰত কেবাৰাবো পোৱালি জগায়।



সাধাৰণ বান্দব

শ্ৰেণী—তৃত্যপাঠ

বৰ্গ—প্ৰাইমেট

গোত্ৰ—চাৰকোপিথেচিদি

প্ৰজাতি—মেকাকা নিউলেটা

আমাৰ অসমত যি কেইবিধ বান্দব জাতীয় প্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই আটাই কেইবিধৰ ভিতৰত এই প্ৰবন্ধত বৰ্ণনা কৰিবলৈ লোৱা বান্দব বিলাককে আমি ব'তে ভ'তে দেখিবলৈ পাওঁ। সৰ্বসাধাৰণৰ ভাষাত এই বিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ “বান্দব” শব্দটোকে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বেছেতু বান্দব শব্দটো আমাৰ দেশত বাস কৰা কেবাবিধো বান্দব গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীক বুজাবলৈ উল্লেখভীয়া ভাৱে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে সেই বাবে কিছুমান উপ-শব্দ সংবোধনাৰ দ্বাৰা সিহঁতৰ আভিগত পৰিচয় সাব্যস্ত কৰিব লগীয়া হৈছে। অৱশ্যে এই বিধ বান্দবক বুজাবলৈ আমি বান্দব বা আতি বান্দব শব্দ অন্যৱালে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চিনাক্তকৰণৰ সুবিধাৰ বাবে এই প্ৰবন্ধত সাধাৰণ বান্দব শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

হনুমান বান্দব আৰু হলৌ বান্দব গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকক বাদ দি আমাৰ দেশত থকা অন্যান্য বান্দব বিলাকক খাউকতে নেকেক্ বুলি কোৱা হয়। কোৱা বাহুল্য যে নেকেকৰ বহুতো জাত আছে। আমাৰ ইয়াত বাস কৰা আৰু আমি সহজতে ব'তে ব'তে দেখিবলৈ পোৱা বিধ বান্দবক বেচাচ নেকেক্ বুলি অভিহিত কৰা হয়। এইবিধ বান্দবৰ জন্তুসংখ্যা ইমান বেছি যে ইয়াক জাকৰুৱা ভাৱে যেতিয়াই তেতিয়াই ব'তে ভ'তে দেখা যায়।

এইবিধ বান্দবৰ দৰ্শন লাভ কৰিবলৈ গভীৰ অৱণ্য ভূমিত প্ৰবেশ কৰিব নালাগে। ইহঁতৰ কিছুমান প্ৰাণীয়ে আৰু বান্ধি জনকসভিৰ কাষে পাৰ্জবে থকা ঠাইবোৰতে নিগা-জীটক বাস কৰিবলৈ লয়। মানুহৰ বনিষ্ট সম্পৰ্কত থাকি থাকি এই বান্দববোৰ দগধা হৈ পৰে। ইহঁতৰ কিছুমান জন্তক অৱশ্যে ডাঠ হাবিৰ মাজত জাকৰুৱা ভাৱে বাস কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। গছ গছনি বিলাকৰ ডালে পাতে ৰগাই কুৰা বিধৰ প্ৰাণী হ'লেও ইহঁতক নাভে সৰৱে মাটিলৈ নাৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অচৰ্য হাবিৰ মাজত বাস কৰা বান্দব বিলাকে সাধাৰণতে হাবিত উৎপন্ন হোৱা গছৰ ফলবুল খায়েই জীৱন ধাৰণ কৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতে বুকলি বুৰীয়া ঠাইবোৰলৈ নাব বান্ধি ওলাই

আহে আৰু মানুহে বগাই বন্ধা বাতৰ শব্দৰ য'চল লাহি মুহি খাটলৈ আহন্ত কৰেহি।
বান্দৰৰ উৎপাতত বহুতো মানুহৰ দুৰ্গতি হয়। খেতিয়ক সকলৰ বহুতো বান্দৰৰ পৰা
শস্য বন্ধা কৰিবৰ বাবে নানা উপায় অৱলম্বন কৰিব লগীয়া হয়। কিছুমান মানুহে গছৰ



পোৱালিৰে সৈতে এজনী সাধাৰণ বান্দৰ

কেবেলনিউ টিভি ঘৰ সাজি তাৰ ওপৰতে দিনৰ নিশিটো বহি থাকি বান্দৰ খেদোৱাৰ
ব্যৱস্থা কৰিব লগীয়া হয়। খোৱা বস্তু লগতে কঢ়িয়াই নি তেনে মানুহে নিশিটোৰ
খোঁৱাকি টিভি ঘৰতে বুলুঙত কৰি ৰাখে। টোপনি ৰখিলে গছৰ ওপৰত বনাই লোৱা

টহি ঘৰৰ চাঙতে খুমাটি মাৰে। হাই উৰুনি মানি আৰু কেবাচিন তেলৰ টিন আদিত কোৱাই বালুবোৰ আঁতৰলৈ খেদাই পঠোৱান ব্যৱস্থা কৰে। কেটেপা বা বেনুৰ সহায়ত বাটলুগুটি মানিও বালুব খেদায়।

এইবিধ বালুবৰ বহুতা সংখ্যক প্ৰাণীয়ে ডাক বান্ধি আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা ঠাইবোৰতে থলুৱা ভাৱে নিগাজীকৈ বাস কৰে। মঠ-মন্দিৰ বিলাকৰ চৌপাশে থকা বাবে সুবিধাজনক পৰিবেশ বিচাৰি লৈছে। এনেবিলাক ঠাইত বসতি কৰিবলৈ নোৱা বালুব বিলাকে কিন্তু মানুহলৈ অকণো ভয় নকৰে। পুৰুষ-মহিলা নিৰ্বিশেষে ধৰ্মানুৰাগী ব্যক্তি সকলে ইষ্ট দেৱদেৱীক অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে কল, কুঁহিয়াৰ, বুট, নাৰিকল, আপেল আদি যি কলাহাৰ দ্ৰব্য লগত লৈ যায় এই বালুব বিলাকে সেইবোৰৰ ভাগ পাবলৈ মানুহ অহা যোৱা কৰা পথৰ কাষত জাকে জাকে খাপ পাতি বৈ থাকে। পূজাৰ যাৱতীয়া কাম শেষ হ'লে পূজাৰীয়ে ভক্ত বুলক যি প্ৰসাদ বিনাই দিয়ে এই বালুবোৰেও তাৰে অলপ অচৰপ খাবলৈ পায়। ধৰ্মপৰায়ণ লোকসকলে যত জীৱ তত শিৱ'ৰ মনোভাৱ পোষণ কৰি বালুবকপী দেৱতাক দুপদ খোৱা বস্তু দিয়াই দিয়ে। মানুহৰ হাতৰ পৰাও সিহঁতে দুই এটা বস্তু লৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ঘৰচীয়া জন্তুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ স্বভাৱ দেখুৱালেও কিন্তু ইহঁতক তেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। আশয় পোৱা কুকুৰে গললৈকে অপিওৱাৰ দৰে হাতৰ পৰা খোৱা বস্তু বুটলি লৈয়েই ই দাঁত মুখ নিকটাই দিওতা জনক কামুৰিবলৈ খেদি আহে। তেতিয়া বাহেকৈ আঁতৰি দিয়াৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাইকিয়া হৈ পৰে।

গোৱালপাৰা জিলাত টোকোৰা-বন্ধা নামৰ এটা পাহাৰ আছে। এই পাহাৰৰ নিৰ্ধৰত এটা শিৱমন্দিৰ আছে। প্ৰতিদিনে সেই মন্দিৰত পুৰোহিতে সভক্তিৰে পূজা পাওল আগবঢ়ায়। এই পাহাৰটোত বহুতো সংখ্যক বালুব নিগাজীকৈ বাস কৰিবৰ বাবে সুবিধাজনক ঠাই বিচাৰি লৈছে। পূজা-পাওল হৈ যোৱাৰ পাছত আটাইবোৰ বালুব আহি মন্দিৰৰ সন্মুখত প্ৰসাদ খাবৰ বাবে গোট খায়হি। সেই বালুব বোৰৰ ভিতৰতে এটা বুঢ়া মলুৱা বালুব আছে। এই বুঢ়া বালুবটোৱে প্ৰসাদ খোৱাৰ পাছতহে বাকীবিলাক বালুব খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰ মানুহে এই বুঢ়া বালুবটোক পৱিত্ৰ জ্ঞান কৰি শ্ৰদ্ধাৰ চকুৰে চায়।

কিছুমান বালুব নগৰৰ জনপূৰ্ণ ঠাই বিলাকত বাস কৰিবলৈ লয়। নগৰৰ পকী দাঙ্গা, বেৰা, ঘৰৰ চাল আদিত ইহঁতক বগাই ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সুবিধা বুজি ইহঁতৰ কিছুমানে মাটিলৈ নামি আহে আৰু মানুহৰ খোৱা বস্তুবোৰ বুটলি বুটলি খায়হি। গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰতো কিছুমান বনৰীয়া বালুব সোমাই লাপা উপহাৰ কৰেহি। গড়ালৰ ভিতৰত প্ৰতিপাল কৰি বখা অন্যান্য জাতীয় বালুবক বিয়া খোৱা বস্তুবোৰৰ ভাগ লয়হি। বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কালে থকা কিছুমান বেল ষ্টেচনত এইবিধ বালুবৰ একো একোটা জাকে নিগাজীকৈ বাস কৰিবৰ বাবে উপ-বুদ্ধ ঠাই নিৰ্বাচন কৰি লৈছে। যেতিয়া বেল গাড়ীখন আহি ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত বয়হি তেতিয়া এই বালুববোৰে যাত্ৰীসকলৰ পৰা ইটো সিটো খোৱা বস্তু পোৱাৰ আশাত বেগৰ ভৰাবোৰৰ কাষত থিয় হয়হি। কোনোবা যাত্ৰীয়ে পেলনীয়া বস্তু বাহিবলৈ

দলিয়াই পেলালে বালকবোৰে তাত জপিয়াই পৰে। যেয়ে যিসান পাৰে সেই বস্তুবোৰ বুটলি বুটলি খায়। কিছুমানে খোৱা বস্তু পপিয়াই লৈ অলপ নিদৰ্গৰ নিজান ঠাইত বহি বহি খায়গৈ। আকৌ কিবা ভাল বস্তু পাবলৈ পোৱাৰ আশাত পুনৰ বেলখনৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহে। বেলখনে ষ্টেচন এৰি আঁতৰ নহয় গানে বালকৰ আঁকে লীলা-খেলা কৰি তাতে ঘূৰি ফুৰে। যাত্ৰীসকলৰ কিছুমানে এই বালকৰ আঁকৰ আলোৰ্শ-লেখ চাই আনন্দ উপভোগ কৰে।

এইবিধ বালকক সমাজ প্ৰিয় প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ ইহঁত ব'তেই নাথাকক সকলো সময়তে এজাক বালকৰে দৰ্শন লাগি বাস কৰে। ছাৰি অজ্ঞানত খাণ কৰা বালক বিনাকৈ নানাবিধ বনৰীয়া গছৰ ফলমূল বিলাক তক্ষণ কৰি জীৱন ধাৰণ কৰে। কীট-পতঙ্গ আদি ক্ষুদ্ৰতম আকাৰৰ প্ৰাণীবিলাকে ইহঁতক পাদ্যৰ অভাৱ আংশিক ভাৱে পূৰণ কৰে। ইহঁতে পানীত নামিকলৈও ভয় নকৰে। আৱশ্যক হ'লে সৰু-সুৰা আকাৰৰ নদী-নলাবোৰ সাঁতুৰি পাৰ হৈ যাবলৈ সক্ষমচৰোধ নকৰে। কোনো কোনোটো আঁকৰ মাজত একো একোটা ডাঙৰ আকাৰৰ মতা বালক বাল কৰা দেখা যায়। এনে ধৰণৰ ডাঙৰ আকাৰৰ বালক কেতিয়াবা গা-ঙটীয়া ভাৱে বিচৰণ কৰি কৰা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ মানুহ এনে বালকক মলুৱা বালক বুলি কয়। মলুৱা বালকৰ টিকাত এচটা বঙা বনৰীয়া কুচন জিলিকি থকা দেখা যায়।

বছৰৰ যেই কোনো সময়তে এইবিধ বালকে পোৱালি জগায়। মাকে কেতিয়াবা পোৱালিটো পিঠিৰ ওপৰত তুলি বা বুকুত ওলোৱাই লৈ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।



অসমীয়া বান্দৰ

শ্ৰেণী—স্বন্যপায়ী

বৰ্গ—প্ৰাইমেট


গোত্ৰ—চাব্‌কোপিথেচিডি

প্ৰজাতি—সেকাক। আচাৰ্গেফ্‌চ

ইয়াৰ আগৰ প্ৰৱন্ধৰ জৰিয়তে নেচাৰ্‌ মেকেক বা সাধাৰণ বান্দৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি অহা হৈছে। সেইবিধ বান্দৰৰ লগত সকলো বিষয়ে ক'ম বেছি পৰিমাণে মিলি যোৱা এইবিধ বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ বিষয়ে এই প্ৰৱন্ধত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। অসম আৰু অসমৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া আটাই কেইখন ৰাজ্যৰ হাবি জঙ্গল বিনাকত এইবিধ বান্দৰ নিৰলে বাস কৰে বুলি জনা যায়। নিলগৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে এই দুবিধ বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ জিওবৃত্ত যে কিবা লেখত ল'ব নগীয়া পাৰ্ধক্য আছে সেই কথা সহজে ধৰিব নোৱাৰি। অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বনভূমি বিনাকৰ পৰা আবদ্ধ কৰি হিমালয় পৰ্বতমালাৰ নামনি ভাগেদি উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম অঞ্চললৈকে এইবিধ প্ৰাণীৰ বসতি স্থান বিয়পি আছে। পশ্চিম বঙ্গত সুলবন নামৰ বিখন সাগৰ-পৰীয়া উপবনৰ অভয়াৰণ্য আছে সেই উপবনখনতো অসমীয়া বান্দৰ নামেৰে জনাজাত প্ৰাণী বিধ বাস কৰি থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক চাবিলীয়া অভিক্ৰম কৰি এইবিধ প্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান পাট্‌কাই পৰ্বতেদি ব্ৰহ্মদেশৰ অৰণ্যভূমি কিছুমানলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে। শাৰীৰিক গুণাগুণত এইবিধ বান্দৰ আৰু আমাৰ ইয়াত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা বিধ বান্দৰৰ মাজত দুই এটা লেখত ল'ব নগীয়া পাৰ্ধক্য পৰিলক্ষিত হয়। সৰ্বপ্ৰথমে ক'ব লাগিব যে আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে বাস কৰা বান্দৰৰ টিকাত এটা বঙা বৰণীয়া কুচন থাকে। অসমীয়া বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত এনে ধৰণৰ বিশেষৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ইংৰাজী ভাষাত এইবিধ বান্দৰক আচামিক মেকেক (Assamese Macaque) বুলি অভিহিত কৰা হয়। এই নামটোৰ লগত খজিতা ধুৱাই আমাৰ ভাষাত ইয়াক অসমীয়া বান্দৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ল। এই দুবিধ বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ বাহিৰে আম দুবিধ বান্দৰ আমাৰ এই কালৰ হাবি বননি বিনাকত নিৰলে বাস কৰা দেখা যায়। তাৰে এবিধক ষ্টাম্প চেইণ্ট মেকেক

(Stump-tailed Mecaque) আৰু আন বিধক পিগ্ টেইলড মেকেক (Pig-tailed Mecaque) বুলি কোৱা হয়। অসমীয়া ভাষাত এই দুবিধ বান্দৰক ক্ৰমে চুটি নেজীয়া বান্দৰ অথবা নেজহীন বান্দৰ আৰু গাহৰি- নেজীয়া বান্দৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ল। এই দুবিধ বান্দৰৰ বিষয়ে স্থানান্তৰত আলোচনা কৰা হৈছে।

অসমীয়া বান্দৰ নামেৰে জনাজাত প্ৰাণী বিধক গভীৰ অৰণ্যভূমি বিলাকত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইহঁতে সাধাৰণতে গছৰ ওপৰত বাস কৰে। গছৰ ডালে পাতে বগুৱা বাই কৰা অৱস্থাত ইহঁতে এক প্ৰকাৰৰ “পিউ পিউ” শব্দ উচ্চাৰণ কৰে। কিবা কাৰণত ভয় ভাৱৰ সন্ধান হলে ইহঁতে ততাতৈয়াকৈ



অসমীয়া বান্দৰ

মাটিলৈ নামি আহে আৰু আশ্ৰয় ল'বৰ বাবে আওহতীয়া ঠাই বিচাৰি ইকালে লিকালে দৌৰ দি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। কলবুল আদি কলাহাৰ ৰাদ্য ভক্ষণ কৰি সিহঁতে জীৱন ধাৰণ কৰে। কীট-পতঙ্গ আদি ৰাখলৈও ভাল পায়। চিকিৰ আৰু দাড়িলিত্বৰ ফালে বাস কৰা লেপ্‌চা জনহাতীৰ লোকসকলে এইবিধ বান্দৰৰ বাসও ধাৰ। সামাজিক আৰু শাৰিৰাত্মিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এইবিধ বান্দৰ আৰু সাধাৰণ বান্দৰৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই।

সিংহ-নেজীয়া বান্দৰ

শ্ৰেণী---স্থল্যপায়ী

বৰ্গ---প্ৰাইমেট

গোত্ৰ---চাৰকোপিথেচিদি


প্ৰজাতি---মেকাকা চাইলেনচ্

সিংহ নেজীয়া বান্দৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় প্ৰাণী। দক্ষিণাত্যৰ ফালে থকা কোনো কোনো নিদিষ্ট বনভূমিৰ বাহিৰে ভাৰত উপ-মহাদেশখনৰ অন্য কোনো এলেকাতে এই-বিধ বান্দৰক দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ইয়াৰ নেজ ডালৰ আগ ভাগত সিংহৰ নেজৰ আগ ভাগত থকান দৰে এখোপা দীঘল চানেকীয়া নোমৰ উৎপত্তি হয়। সেই বাবে ইয়াক সিংহনেজীয়া বান্দৰ বা লায়ন টেইল্ড মেকেক (Liontailed Macaque) বুলি কোৱা হয়। তদুপৰি ইয়াৰ মুখ বগলৰ চাৰিওকাষে যিখিনি নোম গছে সেই নোম-খিনি সিংহৰ মন্থৰ ভাগত উৎপত্তি হোৱা কেশৰৰ দৰে অতিপাত দীঘল হয়। কেশৰ খিনিৰ সৈতে লগ লাগি জন্তোটো দেখাত ভমকা-ফুৰীয়াটক গহীন হৈ পৰা দেখা যায়। কেশৰ থকাৰ বাবে জন্তোটোক আকাৰত ডাঙৰ দেখি। ইয়াৰ দেহত থকা নোমবোৰৰ বৰণ কেট্ কেট্ কৰে ক'লা হয়। কেশৰ খিনিয়ে অলপ মুগা বৰণীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰে।

এইবিধ জানোৱাৰৰ চৰিত্ৰত কিছুমান স্বতন্ত্ৰ গুণৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা যায়। অন্যান্য বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বিলাকৰ দৰে সিংহনেজীয়া বান্দৰে মুকলি হাবিত অথবা বগতিৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ঠাইত বসবাস কৰিবলৈ ভাল নাপায়। মানুহৰ সন্মুখৰ পৰা নিলগত থকা গভীৰ অৰণ্যভূমি বিলাকে ইহঁতৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে। বগুৱা বাই ফুৰা গছ-গছনি বিলাকৰ তললৈ কোনোবা মানুহ কাষ চাপি অহাৰ উমান পালে জন্তুবোৰে ছিটকি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। অন্যান্য বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবোৰৰ দৰে সিংহনেজীয়া বান্দৰেও জাক বান্ধি হাবিত একেলগে পৰিভ্ৰমণ কৰি কুৰে। খোজ-কাটল আৰু চলন-কিৰণত ইহঁতে গহীনালীৰ ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰে। গছৰ ওপৰত বা মাটিত দৌৰা-দৌৰি কৰি খেলা-খেদি কৰি ক'লা ইহঁতৰ প্ৰকৃতি নহয়।

মতা বান্দৰবোৰে মাঙে সময়ৰ একপ্ৰকাৰৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰে। সাধাৰণতে মতা বান্দৰবোৰতকৈ মাইকী বান্দৰবোৰে আকাৰত অলপ সৰু হয়। মতা-মাইকী আৰু বিভিন্ন বয়সৰ পোৱালিবোৰ লগ লাগি একোটা জাকৰ সৃষ্টি হয়। জাকৰ মাজত অত-

ভুক্ত হৈ থকা বান্দৰবোৰে কোনো প্ৰকাৰৰ কাজিয়া-পেচাল নকৰাটো, বিলা-প্ৰীতিৰে বাস কৰে। কিবা কাৰণত মতা বান্দৰবোৰৰ মাজত অবিয়া-অবিৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'লেও সেই বৈৰীভাৱে কোনো ভয়াবহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। মোচৰ ওপৰত এইবিধ বান্দৰক সবল আৰু নিৰ্ভু প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। আক বাহি গছৰ ডালে পাতে বগাই ইফালে সিকালে বুলি ফুৰা বিধৰ প্ৰাণী হ'লেও এইবিধ বান্দৰে কেতিয়াও একেলগে মাটিত নাহি আহে। কিছু সময়ৰ বাবে মাটিত ইফালে সিকালে খোজ কঢ়ি কুৰি ইহঁতে পুনৰ গছৰ ওপৰত উঠেগৈ। দিনৰ দিনটো এইখন কামকে কৰি কৰি



সিংহনেজীয়া বান্দৰ

সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। বনৰীয়া গছত উৎপন্ন হোৱা নানাবিধৰ ফলমূলবোৰ খাই ইহঁতে জীৱন ধাৰণ কৰে।

সিংহনেজীয়া বান্দৰৰ জন্তু-সংখ্যা আশাতীত ভাৱে নিম্ন হবলৈ কঢ়ি আহিছে বুলি বিশেষজ্ঞ সকলে অভিনত প্ৰকাশ কৰিছে। সেই কাৰণে এই আশু-কঙ্গীয়া প্ৰাণীবিধক বিলুপ্তি হোৱাৰ পৰা বন্ধা কৰিবৰ বাবে দেশৰ সংৰক্ষণকাৰী ক্ষতি সকল উঠি পৰি লাগিছে আৰু চৰকাৰৰ কালৰ পৰাও ইতিমধ্যে উপযুক্ত ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে।

এইবিধ প্ৰাণীৰ স্থিতাবস্থা নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে কেইবা গৰাকীও বিশিষ্ট প্ৰাণীবিদে আগবাঢ়ি আহি যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। এই সকল অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিৰ ভিতৰত চুজিয়ায়া নামৰ এজন বন্যপ্ৰাণীবিদৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। বহু পৰিশ্ৰম কৰি তদন্ত সাপেক্ষে তেওঁ সংগ্ৰহ কৰা তথ্যপাতি বিলাকৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে এইবিধ বান্দৰৰ জন্তু-সংখ্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাই আহিছে। স্বাভাৱিক পৰিবেশ বিলাকৰ সন্মোচন ঘটাত এইবিধ বান্দৰৰ বাবে থকা ঠাইৰ নাটনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ককুপ নামেৰে জনাজাত আন এজন বিশেষজ্ঞই স্বাভাৱিক পৰিবেশত বাস কৰা সিংহনেজীয়া বান্দৰৰ জন্তু-সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেখেতে সংগ্ৰহ কৰা তথ্য পাতিৰ পৰা জনা যায় যে সিংহনেজীয়া বান্দৰ সৰ্বমুঠ ৫৫টা জাকৰ প্ৰাণী স্বাভাৱিক পৰিবেশ বিলাকত এতিয়াও বিচৰণ কৰি ফুৰিছে। গড় হিচাপে প্ৰত্যেকটো জাকত যদি ১০ টাকৈ বান্দৰ আছে বুলি যদি ধৰি লোৱা হয় তেন্তিহে সৰ্বমুঠ বান্দৰৰ সংখ্যা ৫৫০ টা হ'ব। পিছে ককুপ চাহাবৰ হিচাপ অনুযায়ী সিংহনেজীয়া বান্দৰৰ সৰ্বমুঠ জন্তুসংখ্যা ৫০০টা মান হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে।

বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু পৰিচালনাৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিবেচনা কৰি ক'ব পাৰি যে সিংহনেজীয়া বান্দৰৰ স্থিতাবস্থা সন্তোষজনক নহয়। ইমান কম সংখ্যক বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি এন্থি আপুৰুগীয়া প্ৰাণীৰ ভবিষ্যত নিৰ্দ্দয়ক বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। তদুপৰি এটা নিদিষ্ট পৰিসৰৰ অন্তৰ্গত বাস কৰা বিধৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে এইবিধ বন্যপ্ৰাণীৰ ভবিষ্যত উজ্জ্বল বুলি কোৱা টান। প্ৰাকৃতিক দূৰ্যোগ আৰু মানুহৰ অত্যাচাৰৰ পৰা এই জন্তুখিনিক ৰচাই ৰাখিব নোৱাৰিলে এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী চিৰদিনৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰা নিলুপ্তি সাধন হ'ব পাৰে। সেই বাবে বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ কাৰ্য্য ব্যক্তি সকল এই বিষয়ত উদীগ্ৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে। এইবিধ বন্যপ্ৰাণীক পৃথিৱীৰ অন্যতম বিপদ-গ্ৰস্ত প্ৰাণী (Endangered Species) বুলি গণ্য কৰা হৈছে। ১৯৭২ চনতে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ ধাৰা অনুযায়ী এইবিধ বান্দৰক নিৰ্দ্দয় প্ৰাণী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। এইবিধ আপুৰুগীয়া প্ৰাণীক ভাৰতীয় বন্য প্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ প্ৰথমখন তালিকাত (Schedule I) স্থান দিয়া হৈছে।

সিংহনেজীয়া বান্দৰৰ বিষয়ে আৰু এটা জানিব লগীয়া বহুসংখ্যক কথা আছে। এইবিধ বান্দৰৰ মাংসত কিবা এফেৰি ভাল গুণ আছে বুলি দক্ষিণ ভাৰতৰ কিছুমান মানুহে বিশ্বাস কৰে। আমাৰ অসমত থকা গ'ড় জাতীয় প্ৰাণীৰ খৰ্গত আৰোপ কৰাৰ দৰে এইবিধ বান্দৰৰ মাংসত বিশেষ গুণ আৰোপ কৰা হয়। এইবিধ বান্দৰৰ মাংস খালে বোলে পাণ্ডতা জনৰ যৌন-শক্তি প্ৰবৰ্দ্ধিত আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। সেই বাবে সেই ফালৰ কিছুমান মানুহে হেনো এইবিধ প্ৰাণীক খেদি পেদি মাৰে আৰু ইয়াৰ মাংসৰ জুতিলৈ ভবিষ্যত ভীৰৱ শুভ কবিতলৈ দেখা কৰে।

তামিলনাডুৰ কৰ্ণাটক জিলাত ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দতে পাতনি মেলা এই অভয়াৰণ্যখনৰ নাম হ'ল কালিকাৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য। সিংহনেজীয়া বান্দৰৰ বাহিৰে এই অভয়াৰণ্যখনত ঢেঁকীয়া - পতীয়া বাঘ, নাহৰ-ফটুকী বাঘ, নীলগিৰি লেজুৰ, নীলগিৰি ধাৰ, গৌড়ন, বাৰ্ণি ভালুক, ছায়েনা আদি বহু প্ৰকাৰৰ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

দক্ষিণ ভাৰতীয় বান্দৰ বা টুপীয়া বুয়া বান্দৰ

শ্ৰেণী—স্তন্যপায়ী

বৰ্গ—প্ৰাইমেট্


গোত্ৰ—চাৰকোপিথেচিদি

প্ৰজাতি—মেকাকা বেভিয়েটা

অসমকে কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ আৰু পূব ভাৰতত যিবিধ বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী বাস কৰে সেইবিধ সাধাৰণ বান্দৰৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি অহা হৈছে। দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে এইবিধ বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীক বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। দক্ষিণ ভাৰতত আমাৰ ইয়াৰ সাধাৰণ বান্দৰবোৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আন এবিধ বান্দৰক দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই ফালৰ ঠাইবোৰত বাস কৰা বিধ বান্দৰক বনেট মেকেক্ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। তাকে অসমীয়া ভাষাত দক্ষিণ ভাৰতীয় বান্দৰ বা টুপী বুয়া বান্দৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। চাৰিত্ৰিক গুণত এই দুবিধ বান্দৰৰ মাজত কোনো লেখত লব লগীয়া পাৰ্থক্য থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।

দক্ষিণ ভাৰতীয় বান্দৰৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে ইয়াৰ কপালখনৰ ওপৰৰ পৰা তালু লৈকে যিকোছা খলপ দীঘল চানেকীয়া নোমৰ উৎপত্তি হয় সেই নোমকোছাই এটা টুপীৰ নিচিনা গঢ় লয়। এই নোমসোপা জন্তুটোৰ মূৰত এনে ভাৱে লিপিত ৰাই থাকে যে তাৰ মূৰটো সোঁত ফণিয়াই ৰখা যেন দেখি। এইবিধ বান্দৰেও সাধাৰণতে জাক পাতি বাস কৰে। ইহঁতক হাবি বননিৰ মাজত আৰু মানুহ বসতি কৰা গাওঁবিলাকত জাকে জাকে বিচৰণ কৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গছ-গছনিৰ ডালে পাতে ইহঁতে জুম বান্ধি বগুৱা বাই ফুৰে আৰু হাবিৰ বনৰীয়া গছবোৰত উৎপন্ন হোৱা নানাবিধৰ ফলমূল ভক্ষণ কৰি জীৱন ধাৰণ কৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতে মাটিলৈও নামি আহে আৰু তলসৰা ফলমূলবোৰ বুটলি বুটলি খায়। কীট-পতঙ্গ, পোক, মকৰা আদি নানাবিধৰ নিম্নশাৰীৰ প্ৰাণীবোৰো ইহঁতে ধৰি ধৰি খায়। এইবিধ বান্দৰৰ যিবোৰ প্ৰাণী অৰণ্যভূমি বিলাকত বাস কৰিবলৈ লয় সেইবোৰ বান্দৰে মানুহলৈ ভয় কৰি কৰি আলোঙে আলোঙে বাস কৰে। কিন্তু যিবিলাক জন্তুৱে গাঁৱৰ বা নগৰৰ কাষে পাৰ্শ্বৰে বাস কৰিবলৈ লয় সিহঁতে মানুহ লৈ কোনো ভয় নকৰে। মতা মাইকী আৰু বিভিন্ন বয়সৰ পোৱালিবোৰ লগ লাগি একোটা জাকৰ সৃষ্টি হয়। কেইটাও শক্তি-

শালী মতা বান্দৰে আকটোৰ ভিতৰত থকা মাইকী বান্দৰবোৰৰ ওপৰত অধিপাত্য বিস্তাৰ
কৰে। মাহ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহাগ মাহৰ ভিতৰতে সাধাৰণতে মাইকীবোৰে



দক্ষিণ-ভাৰতীয় বান্দৰ

পোৱালি জগায়। আৱশ্যক হলে মাকজনীয়ে পোৱালিশৈক পিঠিত বোকোচা বাঁহ
লৈ ফৰে।



খৰা-নেজীয়া বান্দৰ

শ্ৰেণী----স্তুনাপায়ী

বৰ্গ----প্ৰাইমেট

গোত্ৰ----চাৰকোপিথেচিদি


প্ৰচাৰিত---মেকাকা আৰ্কটাইডিচ, মেকাকা স্পেচিওচা

খৰা নেজীয়া বান্দৰ বা ষ্টাম্প টেইল্ড মেকেক্ নামেৰে জনাজাত এবিধ বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে এই প্ৰবন্ধত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এইবিধ বান্দৰক মুকলি-মুৰীয়া ঠাই আৰু জগৰসতিৰে পৰিপূৰ্ণ ঠাইবিলাকত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সাধাৰণতে ইহঁতে গভীৰ অৰণ্যভূমি বিলাকত থকা গছ-গছনিবোৰৰ ওপৰত উঠি লৈ ডালে পাতে বগুৱা বাই ফুৰে আৰু আৱশ্যক অনুযায়ী এজোপা গছৰ ডালৰ পৰা আন এজোপা গছৰ ডাললৈ আপ মাৰি হাবিৰ মাজত ঘূৰা ঘূৰি কৰি ফুৰে। গছৰ ওপৰত থাকিবলৈ ডাল পোৱা বিধৰ প্ৰাণী হলেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতে মাটিলৈও নামি আহে। হাবি বননিত আপোন!-আপুনি উৎপন্ন হোৱা নানা জাতীয় গছৰ ফল-মূল আদি খাই এইবিধ প্ৰাণীয়ে জীৱন ধাৰণ কৰে। কীট-পতঙ্গ আদি নিম্ন খাপৰ প্ৰাণীও অন্যান্য বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ দৰে ইহঁতে সময় আৰু সুবিধা অনুযায়ী ভক্ষণ কৰে।

এইবিধ বান্দৰৰ নেজডাল একেবাৰেই চুটি হয়। নিলগৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে জঙ্ঘটোৰ নেজডাল একেবাৰেই নথকা নিচিনা লাগে। সেই কাৰণে ইয়াক খৰা-নেজীয়া বান্দৰ কিম্বা নেজহীন বান্দৰ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। সাধাৰণতে মেকেক্ গোষ্ঠীৰ সকলোবিলাক বান্দৰৰ দেহত নেজৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক সেইদৰে নেজুৰ বা হনুমান বান্দৰ বিলাকৰো দীঘল দীঘল নেজ থাকে। কেৱল এপ্ বা হলৌ বান্দৰৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতহে নেজ থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। পৃথিৱীৰ অন্যান্য ঠাইত বাস কৰা চিম্পাঞ্জী, গৰিলা, ওবাং ওটান আদি অ-মানুহ বান্দৰ গোষ্ঠীৰ (Primate) প্ৰাণীবোৰো কোনো নেজ নাথাকে। সেই কাৰণে মেকেক্ কৈদৰ বান্দৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নেজ নথকা বান্দৰ হিচাপে খৰা-নেজীয়া বান্দৰ বা ষ্টাম্প টেইল্ড মেকেক্ নামৰ বান্দৰে এটা ব্যতিক্ৰমৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে বুলি ক'ব লাগিব।

পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া অৰণ্যভূমি বিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰহ্মদেশৰ অন্তৰ্গত থকা কোনো কোনো বনভূমিতো এইবিধ বান্দৰ বাস কৰে বুলি জনা যায়। তদুপৰি ইয়াৰ

গচবাচৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি পাইনেও পৰ্যন্ত বিৰপি আছে বুলি কোৱা হৈছে। সাধাৰণ বিধৰ বান্দৰ কিছা বেচাচ্ মেচেক্ জাতীয় প্ৰাণী। দৰে খৰা-নেজীয়া বান্দৰক য'তে ততে ভাকে ভাবে নগ পাবলৈ আশা কৰিব নোৱাৰি। তদুপৰি অৰণ্যভূমিত আনেঙে আনেঙে বাগ ক'ৱা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে ইহঁত মানুহৰ সংশ্ৰৱণে অহাৰ সম্ভাৱনাও তেনেই কম। এইবিধ বান্দৰৰ জন্তু-সংখ্যাও স্বাভাৱিক পৰিবেশ বিলাকত বন বেছি হয় বুলি উমানা গোৱা গৈছে। সেই কাৰণে ইয়াৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নিকপ্পকপীয়াবৈ পানী নাবৰা বাটো অতিশয় প্ৰয়োজনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। অসমৰ গুৱাহাটী ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত এইবিধ বান্দৰৰ কেইটামানক ডাঙৰ



খৰা-নেজীয়া বান্দৰ

আকাৰৰ আবেষ্টনীৰ ভিতৰত ভৰাই ৰাখি প্ৰতিপালন কৰা হৈছে। মেঘালয়ৰ তুৱাট বিখন ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণৰ চিৰিয়াখানা প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰখা হৈছে সেইখন চিৰিয়াখানাত ৰখাই ৰখা এটা ডাঙৰ আকাৰৰ মজ্জাতো কেইটামান খৰা-নেজীয়া বান্দৰ ৰখা হৈছে। এইদৰে চিৰিয়াখানা বিলাকত আধেবেখে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা খৰা-নেজীয়া

বান্দৰ কেইটাৰ আকাৰ আকৃতি আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাগুণ পৰ্যবেক্ষণ কৰি সিহঁতৰ জীৱন ধাৰণৰ ৰীতি-নীতিৰ বিষয়ে বহুতো কথা জানিব আৰু শিকিব পৰা যায়। ছাত্ৰ সমাজে এনে ধৰণৰ অধ্যয়ন মুখী কাম হাতত ল'বোঁ বন্য প্ৰাণী বিলাকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু আকাৰ-আকৃতিৰ বিষয়ে বহুতো জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব। এইবিধ বান্দৰৰ টিকাত দুচটা বঙা বৰণীয়া আৰু সোপোকা ধৰণৰ পদাৰ্থন কুচনল উৎপত্তি হয়। এই কুচন দুচটাক বহাৰ দাদী বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে এনে ধৰণৰ শাৰীৰিক গুণাগুণ অন্যান্য কেইবাবিধ বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা দেখা যায়। এইবিধ বান্দৰে একে ঠাইতে থিৰেৰে বৈ থাকিবলৈ ভাল নাপায়। খন্তেকৰ বাবে কোনো এঠাইত বহিবলৈ ললেও পিছ মুহূৰ্ততে তাৰ পৰা উঠি আন এঠাইলৈ গুচি যায়গৈ। স্বাধীন নগেৰে হাবি বননিত পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত ইহঁতে এই প্ৰবৃত্তি প্ৰদৰ্শন কৰেনে নকৰে সেই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে জ্ঞান নহায়। গছল ডালত বগুৱা বাট ঘূৰি কুৰা অৱস্থাত সন্মুখ সময়ে ই চাৰিওখন দিগন্ত হাতেৰাহাতে ডাল এঠাইত খামোচ মাতি ধৰি পাবেমানে জোকাৰি থাকে। এই কামৰ পুনৰাবৃত্তি মাতে মাতে চলি থকা দেখা যায়। পোৱালি উৎপাদন কৰি লালন পালন কৰা নিয়তে এইবিধ বান্দৰেও অন্যান্য বান্দৰ ফৈদৰ প্ৰাণীবিধৰ চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়।



গাহৰি-নেজীয়া বান্দৰ

শ্ৰেণী----স্থল্যপায়ী

বৰ্গ----গ্ৰাইমেট

গোত্ৰ----চাৰকোপিথেছি

প্ৰজাতি----মেকাকা নোমেছিটনা

মেকেক্ ফৈদৰ বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত বেচাচ্ মেকেক্ বা সাধাৰণ বান্দৰ নামৰ প্ৰাণীৰ লগত আনাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। এইবিধ বান্দৰক অতি সহজে য'তে ত'তে দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ ঘৰ্ট মন্দিৰ বিলাকত যে এইবিধ বান্দৰে নিগাজীকৈ বাস কৰিবৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশ বিচাৰি লৈছে সেই কথাও ইতিমধ্যে যথাস্থানত উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। তদুপৰি আমাৰ বাৰীত লগোৱা নানাবিধ ফল চাহিমুহি খাই এইবিধ বান্দৰে মানুহৰ ক্ষতি সাধন কৰে।

ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত গাহৰি-নেজীয়া বান্দৰ বা পিগ টেইল্ড মেকেক্ নামেৰে এবিধ মেকেক্ ফৈদৰ বান্দৰ বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অন্যান্য বান্দৰ ফৈদৰ প্ৰাণীবিলাকৰ দৰে এইবিধ বান্দৰেও গছৰ ডালে পাতে বগাই ফুৰে। এজোপা গছৰ এটা ডালৰ পৰা আন এজোপা গছৰ আন এটা ডাললৈ জাপ মাৰি যায়। এইদৰে গছৰ ওপৰতে বগুৱা বাই ফুৰিয়েই সৰহ খিনি সময় অতিবাহিত কৰি দিয়ে। নানাবিধৰ বনৰীয়া গছৰ ফল মূল বিলাক ছিঙি ছিঙি খায়। আৱশ্যক হলে ইহঁতে মাটিলৈও নানি আহে আৰু গছৰ তলৰা ফলমূলবোৰ বুটলি খায়।

এইবিধ বান্দৰৰ নেজডাল সাধাৰণ বিধ বান্দৰৰ নেজৰ দৰে দীঘল আৰু জোপোহা হোৱা দেখা নাযায়। চুটি নেজডালত নোমৰ পৰিমাণ তেনেই কম। ঠৰঙা নেজডাল ওপৰমুৱা হৈ ধনুখনৰ গিচিনাকৈ পাক খাই থাকে। এইবিধ বান্দৰৰ টিকাত যি দুচটা সোপোকা ধবধৰ কুচন বা গাদি থাকে সেই কুচন দুখন আকাৰত সিমান ডাঙৰ হোৱা দেখা নাযায়। তদুপৰি অন্যান্য বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ কুচনৰ দৰে এইবিধ বান্দৰৰ টিকাত উৎপন্ন হোৱা কুচন দুখনৰ বৰণো সিমান উজ্জ্বল ভাৱে বঙচুৱা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। গাত উৎপন্ন হোৱা গোসবোৰৰ বং ছাই বৰণীয়া বা মদকুৱা হোৱা দেখা যায়। নাক, মুখ আৰু চকুৰ চাৰিওফালে যি ডোখৰ ঠাই থাকে সেই ডোখৰ ঠাইত কোনো প্ৰকাৰৰ নোমৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। মুখ-বঙলৰ অন্যান্য ঠাইত যিবোৰ ছাই বৰণীয়া নোমৰ উৎপত্তি হয় সেইবোৰ নোমত কোনো প্ৰকাৰৰ কাৰুকাৰ্যৰ বিকাশ সাধন হোৱা দেখা নাযায়।

এইবিধ বান্দৰৰ মতাবিলাক মাইকীবোৰতকৈ আকাৰত অলপ ডাঙৰ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত একোটা মতা বান্দৰ আকাৰত ইমান ডাঙৰ হয় যে অকস্মাতে লক্ষ্য কৰিলে তাক আফ্ৰিকা মহাদেশত বাস কৰা একোটা বেবোন গোষ্ঠীৰ বান্দৰ যেনহে লাগে। বেবোন জাতীয় বান্দৰৰ নেজৰ দৰে এইবিধ বান্দৰৰ নেজডালে দীঘল ৰূপ ধাৰণ নকৰে। তদুপৰি ইয়াৰ নেজৰ আগ ভাগত কোনো প্ৰকাৰৰ নোমৰ খোঁপা থকা দেখা নাযায়।



গাহৰি-নেজীয়া বান্দৰ

ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব সীমান্তত অৱস্থিত নগাভূমিৰ পৰ্বতীয়া ঠাইবোৰত পৰা আৰম্ভ কৰি এই বিধ বান্দৰৰ বৰ্ণাতন্ত্ৰান ব্ৰহ্মদেশৰ বগভূমি কিছুমানলৈ বিয়পি আছে বুলি জনা যায়। থাইলেণ্ডতো এইবিধ বান্দৰ বাস কৰে বুলি কোৱা হৈছে। মালয়ালিয়াৰ হাবি বননিবোৰত ইয়াৰে আন এটা উপজাতি বাস কৰে। তাত বাস কৰা গাহৰি-নেজীয়া বান্দৰ বিলাকে দুৰ্দান্ত চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতৰ দুই এটাই মানুহলৈও চোঁচা লয় আৰু সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক অকলে পালে আক্ৰমণ কৰিবলৈও কৃষ্ঠাবোধ নকৰে।

হনুমান বাম্বৰ বা লেসুৰ

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---প্ৰাইমেট

প্ৰাণ---চানকোপিত্বেচিদি

প্ৰজাতি---প্ৰেচুৰিচিচ্ এণ্টলচ্

হনুমান বাম্বৰ বা লেসুৰ নামৰ প্ৰাণীবিধক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বাস কৰা দেখা যায়। অৱশ্যে এইবিধ হনুমান বাম্বৰক অসম আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্য-সমূহত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। উত্তৰে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ নামনি অঞ্চল-বিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণে কুম্ভিকা অন্তৰীপলৈকে এই বিস্তীৰ্ণ ভূ-ভাগৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক স্বাধীন চিত্তীয় ভাৱে বাস কৰা দেখা যায়। ঠাই অনুযায়ী থলুৱা হিচাপে নিগাছীকৈ বাস কৰিবলৈ হোৱা এই জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ শাৰী-ৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাৱলীত সামান্য বৰণৰ ভেদভাৱ বিকশিত হোৱা দেখা যায়। এই ভেদভাৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভীৰবিদ্ পণ্ডিত সকলে ঠাৱৰ কৰিছে যে পোণ্টেই দেশখনত নিচেই ফ্ৰণ্ডে ১৪ বিধমান হনুমান বাম্বৰ স্থানীয় ভাৱে নিগাছীকৈ বাস কৰি আছে। ইহঁতৰ কিছুমান জন্তু আকাৰত ডাঙৰ, কিছুমান মজলীয়া আৰু আন কিছুমান তুলামূলক ভাৱে সৰু হোৱা দেখা যায়। কিছুমানৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰ দীঘল চানেকীয়া হয় যদিও আন কিছুমানৰ নোমবোৰে ঠিক তেনে বৰণৰ দীঘল কপ ধাৰণ কৰা দেখা নাযায়। নোমবোৰৰ বৰণৰ কাৰুকাৰ্য্যতো থকা ঠাইৰ বিভিন্নতা অনুপাতে বিভিন্ন কপ প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়।

সি যিয়েই কি নহওক এই সকলো বিবাক ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে এই জাতীয় হনুমান বাম্বৰৰ ঠেং বেইংগন অভ্যন্তৰীণ ভাৱে দীঘল হয়। সেই অনুপাতে ইয়াৰ নেজ-ডালেও অতিপাত দীঘল কপ ধাৰণ কৰে। সকলো ক্ষেত্ৰতে মুখ নগলৰ বৰণ ক'লা হয়। দেহৰ অন্য ঠাইত উৎপন্ন হোৱা নোমবিলাক মটীয়া হয়। ঠাই অনুযায়ী বাস কৰা জন্তুবিলাকৰ মাজত কিছুমান ঠাইৰ জন্তুৰ নোমবোৰ গভীৰ ভাৱে ছাই বৰণীয়া হয়। আন কিছুমান ঠাইত থকা জন্তুবোৰৰ নোমে অলপ পাতলীয়া কপ ধাৰণ কৰে। সেই কাৰণে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাৱে বাস কৰি থকা হনুমান বাম্বৰবোৰৰ আকাৰ আৰু নোমৰ বৰণৰ গভীৰতা আৰু গঠন ভঙ্গীমাৰ তাৰতম্যই বিভিন্ন বংশগত বৈচিত্ৰ্য প্ৰতিপন্ন কৰাত সহায় কৰে।

অন্যান্য বান্দব গোষ্ঠীর প্রাণীবোঝে দবে এইবিধ হনুমান বান্দবে গছের ডালে পাতে বগাই ফুদিলে ভাল পায। মানুষ সংশ্রবত নগরে চহদে বস কবিলে গোরা হনুমান বান্দব বিলাকে পকা যবর চালর ওপৰত দিহা দেৱালত বগাই ফুৰাও দেখা যায়। গছৰ ওপৰত থকা এটা ডালৰ পৰা আন এটা ডাললৈ যাব নগীয়া হলে দিহা এজোপা গছৰ ডালৰ পৰা আন এজোপা গছৰ ডাললৈ যাব নগীয়া হ'লে ইহঁতে হেৰ-



হনুমান বান্দব বা লেঙ্গুর

নীয়াটক জাপ মাৰি দিয়ে। অন্য ডালত জাপ মাৰি পনি ইহঁতে ঠেং কেইখনৰে সেই ডালত ঝানোচ মাৰি ধৰে আৰু লাহেটকৈ বগুৱা বাচ গছৰ ওপৰে ওপৰে পৰিভ্ৰমণ কৰি কুৰে। দেহৰ ভাবসাম্যতা বক্ষা কৰাত দীঘল নেছডালে জঙ্ঘটোক সহায় কৰে। গছৰ ডালত বেৰিয়াই ধৰি মাটিলৈ সৰি নপৰা বিষয়তো নেজডালে অবিহণা যোগায়। গছৰ ডালে পাতে বগুৱা বাই ফুৰা প্রকৃতিৰ প্রাণী হ'লেও হনুমান বান্দববোৰে মাছে গম্ভীৰ

একেলগে মাটিৰে নামি আহে আৰু মাটিত খোজ কাঢ়ি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে। জাক বান্ধি একেলগে বিচৰণ কৰা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে এইবিধ বান্দৰকো সমাজপ্ৰিয় প্ৰাণী বুলি ক'ব লাগিব। মাটিৰ ওপৰত কিন্তু তেনে ধৰণৰ কোনো সমান বা এজনীয়া ঠাইত খোজকাঢ়ি ঘূৰা-ঘূৰি কৰিব লগীয়া হ'লে এইবিধ বান্দৰে কুকুৰ নেকুৱী আদিৰ দৰে চাৰিওখন ঠেং খোজকাঢ়া কামত ব্যৱহাৰ কৰে। সেই কাৰণে ইহঁতক কুকুৰ-খুঙীয়া গোষ্ঠীৰ বান্দৰ বুলি ক'ব পাৰি।

হিন্দুনাথ পৰ্বতমালাৰ ওষ ওষ ঠাইবোৰত যিবিলাক হনুমান বান্দৰ বাস কৰে সেই সেইবিলাক বান্দৰৰ নোমবোৰে দীঘল কপ ধাৰণ কৰে। এই পৰিবেশত বাস কৰা হনুমান বিলাকৰ দেহৰ আঁঠু বৈশিষ্ট্য হ'ল এয়ে যে মুখৰ নুয়োকাষে উৎপন্ন হোৱা ডাঢ়ি-বোৰ অন্য ঠাইত থকা হনুমানৰ ডাঢ়িতকৈ অলপ দীঘল হয়। মুখৰ আগডোৰৰ কেটু কেটু কৰে ক'লা হনেও মুখৰ ওপৰ ভাগত গজা নোমসোপানি বং একেবাৰে শুক্ল-বৰ্ণৰ হোৱা দেখা যায়। দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে যিবিলাক হনুমান বাস কৰে সিহঁতৰ মূৰত গজা নোমবোৰ তেনে ধৰণৰ বগা হোৱা দেখা নাযায়।

ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু সমাজে হনুমান বান্দৰক বাম-ভক্ত হনুমানৰ বংশধৰ বুলি গণ্য কৰে। সেই বাবে এইবিধ প্ৰাণীক কেতিয়াও বধ নকৰে। সেই একেটা কাৰণে এইবিলাক হনুমান বান্দৰে সাধাৰণতে মানুহলৈ ভয় নকৰে। বহু সংখ্যক হনুমানে মানুহৰ বসতি স্থানত নিগাজীকৈ বাস কৰে। বহুতে মঠ-মন্দিৰ বিলাকৰ কাষে-পাছৰে থাকিবলৈ লয়। ইহঁতে মানুহৰ কোনো অপকাৰ নকৰে। বাতিপুৱা ভাগতে ইহঁতে থকা ঠাই-বোৰৰ পৰা ওলাই আহে আৰু দিনৰ দিনটো ইফালে সিফালে ঘূৰা ঘূৰি কৰি আহাৰ বিচৰা কামত লাগি যায়। দুপৰীয়া সময়ত অলপ জিৰণি লৈ আকৌ আবেলি পৰত ঘূৰাঘূৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে।

হনুমান বান্দৰৰ পাৰিবাৰিক আৰু সামাজিক জীৱনৰ বিষয়ে অলপ জানিব লগীয়া বহুলাংশক কথা আছে। ইহঁতে যোৰা-পাতি পাৰিবাৰিক জীৱন যাপন নকৰে। এটা জাকত একেলগে বাগ কৰা মাইকী হনুমানবোৰৰ ওপৰত একচেটিয়া কৰ্তৃত্ব লাভ কৰিবৰ বাবে মতাবোৰৰ মাজত অদিয়া-অবি ভাৱৰ সৃষ্টি হয়। জীৱনীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত তেতিয়া যুঁজ বাগবৰ সৃষ্টি হয়। বিজয়ী হনুমানে বাকীবোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক জাকৰ মাজৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। পৰাজয় বৰণ কৰা হনুমানে আঁতৰ লৈ গৈ নিঃসজ জীৱন কটাবলগীয়া হয়। এই অভিনয় অৱশ্যে একেবাৰে ক্ষণস্থায়ী হোৱা দেখা যায়। পৰাজিত হনুমানৰ দুই এটাই পুনৰ জাকৰ মাজত সোমাই লৈ বিজয়ী হনুমানক আক্ৰমণ কৰে। তাক জাকৰ মাজৰ পৰা বাহিৰ কৰি দি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাত সক্ষম হয়। এই ধৰণৰ খেলা-খেদিৰ খেলা ধাৰাবাহিক ভাৱে হৈ থাকে।

হনুমান বান্দৰে বছৰৰ এটা নিদিষ্ট সময়ত পোৱালি উৎপাদন কৰা দেখা যায়। উত্তৰ ভাৰতৰ ফালে থকা হনুমান বিলাকে বহাগ জেঠ মাহত পোৱালি জগায়। দক্ষিণ ভাৰতীয় হনুমানবোৰে সাধাৰণতে মাৰ ফাগুন মাহত পোৱালি দিয়ে। গৰ্ভাবধৰ সময় গ্ৰাহ হুৱাহ বুলি জনা যায়।

টুপী-মুৰীয়া হনুমান বান্দব

শ্ৰেণী---স্তন্যপায়ী

বৰ্গ---পাইমেট

গোত্ৰ---চাৰকোপিথেচিডি

প্ৰজাতি---প্লেচ্ বাইটচ্ পাইনিয়েটচ্

অসমৰ বনাঞ্চল বিলাকত টুপী মূৰীয়া হনুমান নামৰ এবিধ হনুমান গোষ্ঠীৰ বান্দব বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবিধ হনুমানৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান অসমৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ৰাজ্য কেইখনলৈও সম্প্ৰসাৰিত হৈ থকা দেখা যায়। উনুপৰি বাংলাদেশৰ চিটা গঙেদি ব্ৰহ্মদেশৰ বনাঞ্চল বিলাকলৈ এইবিধ বান্দবৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি বিয়পি আছে। সাধাৰণতে গভীৰ অৰণ্যভূমি বিলাকত এইবিধ হনুমানক বাস কৰা দেখা যায়। ডাঠ হাবিৰ কাষত থকা পাতলীয়া হাবি বিলাকেও ইহঁতৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এইবিধ হনুমান বান্দবৰ মূৰত এক প্ৰকাৰৰ ঠাৰঙা নোম গজে আৰু এই দীঘল চানেকীয়া নোমবোৰ মূৰৰ ওপৰত এনে ভাৱে সজুৱা থাকে যে ইয়াক দেখিলে এটা মূৰত টুপী পিন্ধি থকা প্ৰাণীৰ নিচিনা দেখি। মূৰত গজা চুলিৰ নিচিনা নোমবোৰৰ গঠন তলীয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইবিধ হনুমানৰ নাম টুপীপিঙ্গা হনুমান (Capped langur) ৰখা হৈছে। মূখ-মণ্ডলৰ বৰণ একেবাৰে ক'লা হোৱা দেখা যায়। পিঠিৰ উপৰিভাগত উৎপন্ন হোৱা নোমবোৰৰ বৰণ ক'লা চানেকীয়াটোক ধোঁৱাবৰণীয়া হয়। গালত বঙচুৱা বৰণৰ নোম থাকে। ঠেং কেইখনত গজা নোমৰ বৰণ বঙচুৱা বা কমলা বঙৰ হোৱা দেখা যায়।

এইবিধ হনুমান বান্দবেও সাধাৰণতে গছৰ ডালে পাতে বগাই কুৰি সময়খিনি অতিবাহিত কৰে। এজোপা গছৰ এটা ডালৰ পৰা আন এটা ডাললৈ যাবলৈ হ'লে ই কেতিয়াবা আপ মাৰি এই কাম সমাধা কৰে। ওচৰত থকা আন এজোপা গছৰ ডাললৈ যাব লগীয়া হ'লেও ইহঁতে এইদৰে অপিয়াই অপিয়াই যাব পাৰে। বজা, মাইকী আৰু পোৱালিক লৈ এটা দল বা আকৰ সৃষ্টি হয়। হাবিৰ মাজত ইহঁতক এইদৰে জাক বাঢ়ি একেলগে বাস কৰা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰু জাতীয় প্ৰাণী ওচৰ চাপি অহাৰ উমান পালে ইহঁতে গছৰ ডালে পাতে বঙুৱা বাই আৰু আৱশ্যক অনুযায়ী ডালে ডালে অপিয়াই অপিয়াই নিৰাপদ ঠাইলৈ আঁতৰি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰে। অৰণ্যভূমিত বাস কৰা টুপীমূৰীয়া হনুমানবোৰে

মানুহকো সন্দেহৰ চকুৰে চায়। মানুহ গছৰ তলদি অহাৰ উমান পালে ইহঁতে খাটোৰ
যাবলৈ চেষ্টা কৰে। গাওঁ-ভাঁইৰ কাষে পাজৰে থকা গছ-গছনিবোৰত বাগ কৰা এট



টুপী-মূৰীয়া হনুমান বান্দৰ

জাতীয় হনুमानে কিন্তু মানুহলৈ সিমান ভয় নকৰে। গছৰ তলদি মানুহ অহা বোকা
কৰি থাকিলেও ইহঁতে নিবলে গছৰ ওপৰতে বহি থাকি মানুহৰ আলোচ-লোচ লক্ষ্য
কৰে। কেতিয়াবা নিচিন্ত বনেৰে গছৰ ওপৰত বগাই কুৰে আৰু মানুহৰ পৰা কোনো

প্ৰকানৰ আমনি নাপালে নিচিন্ত মনেৰে গছৰ ডালে পাতে বহি থাকে কিম্বা ইফালে সিফালে বগাই ফুৰে।

চোঁ চোঁ কৈ এক প্ৰকাৰৰ উকি মৰা শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ বাহিৰে এইবিধ হনুমান বান্দৰে কোনো প্ৰকাৰৰ মাত মতা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এইবিধ হনুমান বান্দৰে গছৰ কান্ধল আদি ভৰুণ কৰি জীৱন ধাৰণ কৰে।

আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে টুপী-মূৰীয়া হনুমান বান্দৰৰ কেবাটাও উপ-প্ৰজাতি আছে। এই বিভিন্ন উপ-প্ৰজাতিৰ হনুমানবান্দাক সাধাৰণতে একে ঠাইতে একেলগে বাস কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বঙ্গপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা শোণিত-পুৰ আৰু দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত আৰু হিমালয় পৰ্বতমালাৰ নামনি অঞ্চলত চাৰদুৱাৰ, বালিগাৰা, নন্দুৱাৰ প্ৰভৃতি যি কেইখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে সেই কেইখন বনাঞ্চলত টুপীমূৰীয়া হনুমান বান্দৰৰ এটা ভাৰত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো শব্দ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ নিৰালে গছৰ ডালে পাতে বগাই ফুৰা বিধৰ প্ৰাণী হোৱাৰ বাবে ওচৰৰে গছবোৰৰ ওপৰত থাকিলেও সিহঁতক সহজে দেখা নাযায়। গছৰ ওপৰৰ ডাল পাত লৰি শব্দৰ উৎপত্তি হ'লেহে ইহঁত তাত থকা নথকাৰ গম ল'ব পৰা যায়। মাজৰাট বেজৰ অন্তৰ্গত থকা বাতাচিপুৰ নামৰ এটা বিট অফিচৰ ওচৰৰ এখন হাবিত এবাৰ এজাক টুপীমূৰীয়া হনুমান বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা মনত পৰে। ভাৰতৰ ব্যাস্থ যোজনাৰ কৰ্ণধাৰ কৈলাশ শঙ্কৰ সাংখালিক সৈতে একেলগে বনাঞ্চলত প্ৰবেশ কৰিছিলোঁ। সাংখালী হাবিত বাঘ দেখিবলৈ নাপালে যদিও গছৰ ওপৰত বগুৱা বাই ফুৰা টুপীমূৰীয়া হনুমান বান্দৰক নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পালে। গছৰ ডালে পাতে বগাই ফুৰা হনুমান কেইটামানৰ ভেঁও ফটো তুলি ল'লে। দক্ষিণ পাৰে থকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গতো সেই একে উপজাতিৰ টুপীমূৰীয়া হনুমান-বান্দৰ কেতিয়াবা অকস্মাতে গছৰ ওপৰত বগাই ফুৰা অৱস্থাত দেখি পাবলৈ আশা কৰিব পাৰি।

কাছাৰ জিলাত লোহাৰ-বন্দ নামেৰে জনাজাত এটা বিট অফিচ আছে। ইয়াৰ লাইন ৰিজাৰ্ভটলৈ যাব পৰা এটা ৰাস্তাই দি গৈ থাকিলে লোহাৰ-বন্দৰ পৰা মিজো পাহাৰৰ সীমানামূৰীয়া ঠাইবোৰলৈ যাব পাৰি। বাটত কেবাখনো বনগাওঁ (ফৰেষ্ট ভিনেইজ) আছে। এই বনগাওঁ কেইখনৰ পৰা ফালৰি কাটি যিটো পথ পশ্চিমৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছে সেইটো পথ গৈ লালাচেৰা নামৰ বিট অফিচত শেষ হৈছেগৈ। লালাচেৰা বিটত এটা বনবিভাগৰ জিৰণি ঘৰ আছে। এদিন ইয়াতে ৰাতিটো কটাৰলগীয়া হৈছিল। পিছ দিনা ৰাতিপুৱাই বিচনাৰ পৰা উঠি কিবা বন্যপ্ৰাণী দেখিবলৈ পাওঁনেকি তাৰ বাবে বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ। সৌভাগ্যবশতঃ এজাক হনুমান বান্দৰে গছ এজোপাৰ ওপৰৰ পৰা বোক অভিনন্দন জনালে। এই হনুমান বান্দৰ জাকৰ মুখৰোৰ একেবাৰে ক'লা আছিল। সিহঁতে যে টুপী-মূৰীয়া হনুমানৰ এটা উপজাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই কথা বুজিবলৈ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহ'ল। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ উপজাতিৰ টুপী-মূৰীয়া হনুমানক স্বাভাৱিক অৱস্থাত দকৈ কেতিয়াও দেখা নাই। সি যিয়েই কি নহওক

বিশেষজ্ঞ সকলে অভিমত প্ৰকাশ কৰে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য কেইখনত চাৰিটা উপ-প্ৰজাতিৰ টুপমূৰীয়া হনুমান বাস কৰে।

এই বিধ হনুমান বান্দৰৰ আন এটা উপপ্ৰজাতি ব্ৰহ্মদেশৰ বনাঞ্চল কিছুমানত নিবলে বাস কৰে বুলি জনা যায়।

টুপমূৰীয়া হনুমান বান্দৰ বিলাকে সাধাৰণ জাতৰ হনুমানৰ দৰে সমাজ পাতি একেলগে বাস কৰে। এটা মতা হনুমানে কেইবাজনী মাইকী হনুমানৰ ওপৰত আধিপাত্য বিস্তাৰ কৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা পুৰুষ মতা হনুমানবোৰৰ মাজত অবিয়াঅবি ভাৱৰ সৃষ্টি হ'লে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা হনুমান কেইটাই কিছু সময়ৰ বাবে সমাজ ত্যাগ কৰি নিঃসঙ্গ জীৱন যাপন কৰে। সেয়েহে কেতিয়াবা তিনি চাৰিটা মতা হনুমানে একেলগে লাগি কেৱলীয়া জীৱন যাপন কৰিব লগীয়া হয়। গাত বল বান্ধি সিহঁতে পুনৰ জাকৰ মাজত সোমাই লৈ প্ৰতিদ্বন্দীক বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।



সোণোৱালী হনুমান ৰান্ধৰ

শ্ৰেণী---ঔন্যপায়ী

বৰ্গ---প্ৰাইমেট


গোত্ৰ---চাৰকোপিথেচিদি

প্ৰজাতি--প্ৰেচুৰাইটিচ গীয়াই

সোণোৱালী লেঙ্গুৰ বা সোণোৱালী হনুমান ৰান্ধৰ নামৰ এবিধ আটক-ধুনীয়া ৰান্ধৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী নামনি অসমৰ কেইখনমান বনভূমিত আলোঙে আয়োঙে বাস কৰা দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য কোনো এখন ৰাজ্যতো এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰাৰ পোনপটীয়া প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে কোনোও পোৱা নাই। মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰ (পশ্চিম) জিলাৰ অন্তৰ্গত থকা বংৰিংগিৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু চিজু অভয়াৰণ্যত এইবিধ প্ৰাণীক কোনো কোনো লোকে দেখিবলৈ পাইছে বুলি দাবী কৰে। নিৰীক্ষণ, অনুসন্ধান আৰু অধ্যয়ন সাপেক্ষে এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক তথ্যপাতিৰ সন্ভেদ পোৱা গৈছে সেইবিলাক সমলৰ পৰা সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰি যে আগতে ভবাৰ দৰে গাৰোপাহাৰ জিলাত সোণোৱালী হনুমান ৰান্ধৰ কোনো খনি নাই। অসমৰ ধুবুৰী আৰু কোক্ৰাঝাৰ জিলাৰ সীমামূখীয়া বনভূমি বিলাকে এই বিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান আৰু বিচৰণ ভূমি নিৰ্ণয় কৰিছে। অৱশ্যে অসমৰ ভোগোলক চাৰিসীমা অতিক্ৰম কৰি সোণোৱালী হনুমানৰ বিচৰণ-ভূমি ভূটান পৰ্বতমালাৰ নামনি অঞ্চললৈ বিস্তাৰিত হৈছে।

সোণোৱালী হনুমানৰ ৰান্ধৰ লগত বিজ্ঞান সন্মত ভাৱে পৰিচয় লাভ কৰাটো জীৱবিদ সকলৰ বাবে বৰ বেছি দিনৰ পুৰণি কথা বুলি ক'ব নোৱাৰি। ধুবুৰী জিলাৰ উত্তৰৰ ফালে থকা সীমামূখীয়া বনভূমিত যমদুৱাৰ নামৰ এডোখৰ ঠাই আছে। অটৰা হাবিৰ মাজত বিৰাজ কৰা আঙহতীয়া ঠাইহোৱাৰ বাবে জোন-বেলিৰ পোহৰে তাত সকলো সময়তে লীলা-খেলা কৰিব নোৱাৰে। ডবা ডবাকৈ স্বাভাৱিকতে উৎপন্ন হোৱা শালনি হাবিবোৰৰ মাজেদি গৈ গৈ হে সেই ঠাইত উপনিত হ'বগৈ পাৰি। তাতেই এটা বহুত দিনৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰা বন বিভাগৰ জিৰণি ঘৰ আছে। ঘৰ-টোৰ নিচেই কাষেদি সন্ধ্যোচ (সোণকোষ) নামৰ নদীখন বৈ গৈছে। এইখন নদীৰ উৎপত্তিস্থান ভূটানৰ মোহময়ী পৰ্বতমালাই নিৰ্ণয় কৰিছে। সন্ধ্যোচ নদীয়ে অসম, পশ্চিম বঙ্গ আৰু ভূটানৰ উল্লেখতীয়া সীমাবেধা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰিছে। হিমালয় শৈল-ৰালিৰ পৰা বাগৰি অহা পানীবোৰে তলৰ ফালে নাৰি আহোঁতে যি শব্দৰ উৎপত্তি

হয় সেই শব্দ নিলগৰ পৰা বিগি বিগি শুনা যায়। সঙ্কোচ নদীৰ বালিচৰত জাকে জাকে বালিমাহী আৰু বালিৰোঁৰা জাতৰ পক্ষী উৰি উৰি আহি শব্দকৰ বাবে জিৰণি লয়হি। জিলীয়ে তাত জুনুকা বজাৰ আৰু কেচু-কুমটিৰ চিঁ চিঁ শব্দে তবৰ সমলয়ৰ সৃষ্টি কৰে।



সোণোৱালী হনুমান বান্দৰ

সঙ্কোচ নদীৰ পাৰত থকা অৰণ্যভূমিবিলাকে সোণোৱালী হনুমান বান্দৰৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইহঁতে গছৰ ডালত বগাই ফুৰে আৰু এজোপা গছৰ ডালৰ পৰা আন এজোপা গছৰ ডাললৈ লক্ষা-জাপ মাৰি মাৰি পৰিস্ফৰণ কৰে। সেই বাবে ইহঁতক অন্যান্য হনুমান গোষ্ঠীৰ বান্দৰ বিলাকৰ দৰে বৃক্ষমাসী প্ৰাণীৰ আখ্যা দিব পাৰি। গছৰ ওপৰত বগাই বগাই কুৰাটো সাধাৰণ প্ৰৱ্তি হ'লেও সোণোৱালী হনুমান বান্দৰে সমৰবুজি মাজে সময়ে মাটিলৈও নাৰি আহে। শিলাৰ পাহাৰৰ বকত

উৎপত্তি হোৱা পানীৰ ডোঙাবোৰ বিচাৰি কেতিয়াবা হাতৰ ভলুৱাই সহায়ত আৰু সুবিধা বুজি পানীত বুৰখন ডুৰাই পিয়াহ নিৰানণ কৰে। ইহঁত আৰু ৰান্ধি থাকে।

সোণোৱালী হনুমান ৰান্ধৰৰ সচৰাচৰ বসতিস্থান যমুৱাৰ নামৰ অৰণ্যভূমিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানাহ অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত থকা মঠনুৰি নামৰ ঠাইলৈকে বিয়পি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মঠনুৰিতো বনবিভাগৰ এটা বঙলা আছে। ইয়াৰ কাষেদি মানাহ নদীখন ভূটানৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা বেকাবেকী পতিত ওলাই আহি ভৈৰৱন কালে বৈ গৈছে। মঠনুৰিৰ বঙলাটো নদীৰ পাৰত থকা এটা টিলাৰ ওপৰত অৱস্থিত। এই বঙলাটোৰ ওপৰ মহলৰ পৰা মানাহ নদী আৰু এই নদীখনৰ সিপাৰে থকা ভূটানৰ কৰ্দেগীৰীয়া পাহাৰবোৰৰ দৃশ্য চাবলৈ বৰ ভাল লাগে। মানাহ অভয়াৰণ্যৰ অভূতপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই অসমৰ অন্যান্য ঠাইত থকা সকলোবিলাক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক চেৰ পেলাইছে বুলি ক'ব পাৰি। মঠনুৰিৰ অনুপম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবৰ বাবে যতি বছৰে বনালি মাহত তাত প্ৰকৃতি-প্ৰেমী আৰু বন্যপ্ৰাণী অনুৰাগী মানুহৰ সমাগম হয়। সবহ ভাগ মানুহে নানা জাতীয় বন্যপ্ৰাণী দৰ্শনৰ বাবে মানাহ অভয়া-ৰণ্যলৈ গৈ মঠনুৰিৰ বঙলাত ৰাতিটো কটায়গৈ। ওচৰতে বেলৰ ডবাৰ নিচিনা কেইটামান ঘৰ আটোমটোকাকৈ থকা হৈছে। ইচ্ছা কৰিলে দৰ্শন-প্ৰাৰ্থী পৰিচক সকলৰ কেইজনখনে এইবিলাক ঘৰতো ৰাতিটো কটাব পাৰে। বন্যপ্ৰাণীৰ দৰ্শন-প্ৰাৰ্থী সকলক হাতীৰ পিঠিত তুলি অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হয়। ওৰ ওৰ ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ আৰু অচৰ্য্য অৰণ্যৰ মাজে মাজে হাতীৰ পিঠিত উঠি উঠি গৈ নানা জাতীয় বন্যপ্ৰাণীৰ দৰ্শন লাভ কৰিব পাৰে। হাৰিণ মাজেদি বৈ যোৱা নদী-নলাবিলাক পাৰ হৈ যাওঁতে কেতিয়াবা দ-পানীৰ ওপৰেদি হাতী পাৰ হৈ যাব লগীয়া হয়। পানীলৈ নাৰি যোৱা হাতীৰ কেতিয়াবা পেটলৈকে পানী উঠে আৰু তেনে অৱস্থাত আবেহীৰ বন-প্ৰাণ আনন্দ আৰু আশঙ্কাৰ দোমোজাত পুলকিত হয়।

দৰ্শন-প্ৰাৰ্থী সকলৰ কোনোবাই এই মানাহ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত সোণোৱালী হনুমান ৰান্ধৰ দেখিবলৈ পোৱাৰ কোনো অভিলেখ আজিলৈকে থকাৰ কথা জনা নাযায়। এইবোৰ ঠাইত অৱশ্যে গৌণৰ নামেৰে জনাজাত এবিধ বনগৰু ৰাস কৰা দেখা যাব। কাৰবাৰ ভাগ্যত লিখা থাকিলে এইবিধ বিচিদ্ৰ বন্যপ্ৰাণীৰ দুই এটাক দেখিবলৈ পাব পাৰে। বনৰীয়া ম'হৰ পালবোৰ এইবোৰ ঠাইত থকা দেখা নাযায়। মানাহ নদীৰ পাৰৰ বালিঅঁহীয়া ঠাইবোৰে ইহঁতৰ বাবে অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। পহ জাতৰ প্ৰাণীৰ দুই এটাক এইবোৰ ঠাইত দেখি পাবলৈ আশা কৰিব পাৰি। সিহঁতৰ দুই এটাই কুমলীয়া ঘাঁহ খাই খাই হাৰিণ মাজত চৰি ফুৰে। কেতিয়াবা একেলগে বহুতো সংখ্যক পহ জাক ৰান্ধি চৰি ফুৰা অৱস্থাত দেখি পাবলৈ আশা কৰিব পাৰি। আবেহী সহ ঘৰৰীয়া হাতী সিহঁতৰ কাষ চপি যোৱাৰ উদান পালে গোটেই জাক হৰিণে চাৰিও কালে ছিটিকি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। নিম্ন-শাৰৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ভিতৰত বনৰীয়া গাহৰিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। ইহঁতে থাইঙটীয়া ভাৱে নিজে

নিলগৈ আপোন মনেৰে ঘাঁহ খাই চৰি কৰে। মানহৰ গৰ পালে লাহেকৈ গভীৰ অৰণ্যভূমিৰ আঁৰত লুকাই আত্মগোপনৰ ব্যৱস্থা কৰে।

মানাহ অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত আৰু পাতি পাতি চাব কৰা বনৰীয়া হাতী লগ পোৱা যায়। একেলগে একে ঠাইতে মাৰ বান্ধি চৰি কৰা বনৰীয়া হাতীৰ পালক চাহন বুলি কোৱা হয়। দাঁতাল, বখনা, ধুই (পোৱালি জগোৱা মাইকী হাতী) চাৰিণ (পোৱালি নজগোৱা ডেকেৰী মাইকী হাতী) আৰু কম বয়সীয়া কিশা মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ নেৰা পোৱালি কেইটামানক লৈ এটা চাহনৰ সৃষ্টি হয়। ইহঁতৰ সামাজিক জীৱনৰ বৈচিত্ৰ সম্পৰ্কে এচিয়াৰ হাতী (Asian Elephants) বিষয়ৰ প্ৰৱন্ধত বিষদ ভাৱে আলোচনা আগ বঢ়োৱা হৈছে। কেতিয়াবা দৰ্শন-প্ৰাৰ্থী তথা ঘৰবীয়া হাতীৰ পিঠিত আৰোহণকাৰী পৰ্যটকে বনৰীয়া হাতীৰ চাহনৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হয়। এনে লোমহৰ্ষক ঘটনা আৰম্ভজনক ভাৱে আকৰ্ষণীয় হ'লেও ই কেতিয়াবা ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰে। বেলা চিকাৰত বনৰীয়া হাতী ধৰা মানুহৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি অতিশয় কাম্য হলেও সৰ্বসাধাৰণে জীৱটোক হাতৰ বৃষ্টিত নৈ হেতালি খেলিব নোখোজে। কেনেবাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ চাহনৰ মাজত আৰোহী সহিতে ঘৰবীয়া হাতী সোমাই পৰিব লগীয়া হ'লে গোটাই আৰু বনৰীয়া হাতী ছিটিকি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ঘৰবীয়া হাতীটোৱে অৱশ্যে বীৰ স্থিৰ ভাৱে এই প্ৰত্যাহ্বানক মূৰ পাতি লয়। কিন্তু কেনেবাকৈ গছ-লতাত লাগি আৰোহীজন মাটিত ৰহি পৰিব লগীয়া হলে সৰ্বনাশ!

মঠনগুৰিত থকা বনবিভাগীয় জিৰণি ভৱনৰ কাষেদি বৈ যোৱা বানাহ নদীখনে অসম আৰু ভূটানৰ উমৈহতীয়া সীমাৰেখা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছে। নদীখন ঠাইতে দ আৰু ঠাইতে বাম। দ ঠাই বোৰত শিল-ঘৰীয়া, বোকাঘৰীয়া আদি মাছে আশ্ৰয় লৈ থাকে। নদীৰ পাৰৰ থিয় গৰাৰ তলৰ ফালে থকা শিলাময় ঠাইত বহি মানুহে বৰশী বাই নাছ ধৰে। কোনো কোনোৱে নাৱত উঠি পাহাৰী নদীখনৰ ওপৰৰ ফালে গৈ দুৰ্গম ঠাইত থকা ধূলিবোৰত বৰশীৰে নাছ ধৰেগৈ। ঠায়ে ঠায়ে নদীৰ বুকুখন তেনেই বাম। তাত শিলগুটি আৰু ডাঙৰ আকাৰৰ শিলৰ ভঙাছিঙা টুকুৰাবোৰ পানীৰ সোঁতে আনি আনি ঠায়ে ঠায়ে জমা কৰেহি। ফলত নদীখনৰ বুকুৱেদি নামনিৰ ফালে নাও পাৰ কৰি নিব নোৱাৰাৰ অৱস্থা আহি পৰে। এনে পৰিস্থিতিক অতিক্ৰম কৰিবৰ বাবে নাৱৰীয়া পানীলৈকে নামি নাও তেলি তেলি আৰু আৱশ্যক অনুযায়ী নাওখনৰ টিং অলপ ওপৰলৈ ডাঙি ধৰি ডাটয়নীৰ দ-পানীত নাওখন এৰি দিব লগীয়া হয়। যি ঠাইত বানাহ আৰু ৰেকী নদী দুখন পাহাৰৰ বুকুৰ পৰা হেলনীয়াতকৈ বৈ আহি একেলগ লাগিছেহি তাত দুয়োখন নদীৰ পানীৰ মাজত খণ্ড যুদ্ধ আৰম্ভ হয়। অলপ নিলগৰ পৰা পানীৰ শব্দ শুনিলে এনেহে লাগে যেন ক'ৰবাৰ পৰা এজাক প্ৰবল ধুমুহা ঘৰষণ আহিছে আৰু অলপ পৰৰ পাছতে শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে।

এই নদীখনৰ পানীত এবিধ বিচিত্ৰ আকৃতিৰ বনৰীয়া হাঁহ জাতীয় পক্ষী চৰি কুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই হাঁহ জাতীয় পক্ষীক মাৰগেন্‌চাৰ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। এইবিধ মাৰগেন্‌চাৰৰ ডিঙিৰ পৰা মূৰৰ ওপৰ ভাগত থকা পাখিবোৰৰ বৰণ

বগা হয়। সেই কাৰণে পানীত চৰি ফুৰা চৰাইটোক নিলগৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে জিলিকি থকা যেন লাগে। অৱশ্যে মাইকী মাৰগেন্‌চাৰৰ গাত এনে ধৰণৰ বগা পাখিৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। পানী কাউৰী, দৈকলা, মণিৱৰি আদি জনচৰ পক্ষীৰ দৰে ইহঁতে পানীৰ তললৈ বুৰ মাৰি বহুত দূৰ বাৰ পাৰে। পানীৰ তলত বুৰ মাৰি সাতুনি মাঙতে ইহঁতে মাছ ধৰে। উল্লেখযোগ্য যে এইবিধ হাঁহ জাতীয় পক্ষীৰ ঠোঁটটো হাঁহৰ ঠোঁটৰ দৰে চেপেটা নহৈ বগলী চৰাইৰ ঠোঁটৰ দৰে জোঙা হয়। এই বিধ বিচিহ্ন পক্ষীক মানাহ অভয়াৰণ্যৰ অন্যতম আপুৰুগীয়া শ্ৰাণী বুলি গণ্য কৰিব পাৰি।

নাৱত উঠি মানাহ নলীখন অতিক্ৰম কৰি উত্তৰ পাৰলৈ গ'লে ভূতানৰ অন্তৰ্গত থকা উত্তৰ পাৰৰ ঠাই ভোখৰত এটা বাজ-হাউলি পোৱা যায়। মাছে সৰয়ে ভূতানৰ মহা-বজাই অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে ইয়ালৈ আহে। যনুপন্ন প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে এইভোখৰ ঠাই ভৰপূৰ হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ ঠিক কাষতে যিখন বনভূমি আছে সেই খণ্ড বনভূমিক অভয়াৰণ্যলৈ ব্যাপ্ত কৰি ভূতান চৰকাৰে মানাহ অভয়াৰণ্যৰ পৰিপূৰক তথা বন্যপ্ৰাণীৰ বিচিহ্ন বনভূমি ৰূপত ঘোষণা কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে।

ভূতানৰ অন্তৰ্গত থকা মানাহ অভয়াৰণ্যৰ অনুপন্ন পৰিবেশে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ সোণোৱালী হনুমান বান্দৰ ধাৰণ কৰিছে। ইয়াৰ নদী-কুলীয়া অৰণ্যভূমিত চিলা, কৰৈ আদি যিবিলাক ওখ ওখ গছ আছে সোণোৱালী হনুমান বান্দৰে কেইটামান জাকে তাতেই আনেও আনেও গছৰ ওপৰৰ ডালবোৰত উঠি উঠি থাকে। এইবিলাক গছ-লতাই ধাৰণ কৰা মানাৰিধ ফলে ইহঁতৰ বান্দে আহাৰৰ যোগান ধৰে। গছবোৰৰ তললৈ মানুহ যোৱাৰ উমান পালে ইহঁতে গছৰ ডালবোৰত জপিয়াই জপিয়াই আঁতনি মাৰিলে চেঁচা কৰে। অলপ নিলগৰ গছৰ ডালত বহি মানুহৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰে। সন্দেহৰ মাত্ৰা উপশম নহ'লে পুনৰ ডাল পাত বগাই কিম্বা ডাপ মাৰি মাৰি নিয়াপদ ঠাইলৈ গুচি যায়গৈ। কেতিয়াবা নুই এটা বান্দৰে কিবা কাৰণত মাটিলৈ নামি আহিব লগীয়া হ'লেও ইহঁতে বৰ বেছি সময় মাটিত খোজ কাঢ়ি ধৰি নুফুৰে।

এইবিধ হনুমান বান্দৰৰ সেহত যিবিলাক নোমৰ উৎপত্তি হয় সেই নোমনোমৰ বৰণ সাধাৰণতে বগা হয়। এই নোমৰ উপৰি ভাগত সোণালী বৰণৰ চিক্‌মিকিয়া দাগে বিধাজ কৰে। গাত সোণালী বৰণৰ নোমৰ বিকাশ সাধন হোৱাৰ বাবেই এইবিধ হনুমান বান্দৰক সোণোৱালী হনুমান বান্দৰৰ আখ্যা দিয়া হয়। মাটিত খোজ কাঢ়ি যাৰ লগ, হ'লে এইবিধ হনুমান গোষ্ঠীৰ বান্দৰেও কুকুৰ-খুজীয়া গতিত চাৰিখন ঠেঙেৰে খোজ কাঢ়ি যায়। গছৰ ডালত বগাই ফুৰা অৱস্থাত দীঘল নেজ ডালে ইয়াক সহায় কৰে।

স্বাভাৱিক পৰিবেশত এইবিধ আপুৰুগীয়া হনুমান বান্দৰৰ সৰ্বমুঠ জন্তু সংখ্যা কিমান হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে নিশ্চুট ভাৱে জনা নাযায়। অনুমান কৰা হৈছে যে বৰ্তমান অৱস্থাত ইয়াৰ জন্তু-সংখ্যা ১০০০ৰ কম নহ'ব। সং-বক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত এইবিধ বান্দৰৰ জন্তু-সংখ্যা এতিয়া ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে। তদুপৰি ইয়াৰ থকা ঠাইৰ পৰিগৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। পিয়লৰ অৱিয়তে জন্তু-সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিলে আৰু এই পিয়লৰ কাম কেইবছৰ মানৰ অন্তৰে অন্তৰে ধাৰাবাহিক ভাৱে সম্পাদিত হ'লে এইবিধ বিচিহ্ন শ্ৰাণীৰ ভবিষ্যত ঠাৱৰ কৰিব পৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব।

সোণোৱালী হনুমান বান্দৰে জুন-জুলাই মাহত এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জন্মায়।



নাগগিৰি-হনুমান

শ্ৰেণী---স্থান্যপায়ী

বৰ্গ---পাইমেট


গোত্ৰ---চাৰকোপপেচিচ

প্ৰজাতি---প্ৰেচবাইটিচ্ কানিগাট

ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত সাধাৰণতে গিৰিৰ হনুমান বান্দৰ মঠ-মন্দিৰ বিলাকৰ চৌহদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানা ঠাইৰ ভিন্ন ভিন্ন পৰিবেশত বাস কৰা দেখা যায়। সেইবিধ হনুমানৰ জীৱন বুজা ইতিমধ্যে যথা স্থানত আলোচনা কৰি লোৱা হৈছে। আনহাতে টুপীমূৰীয়া হনুমান বান্দৰ নামৰ গিৰিৰ হনুমান আমাৰ অঙ্গমগনকে আকৃষ্ট কৰি এইফালৰ ঠাইবোৰৰ গছ-গছনিৰ বগুৱা বাই বা ইজোণা গছৰ ডালত পৰা আন এজোপা গছৰ ডালটো আপ মাৰি মাৰি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে সেইবিধ হনুমান বান্দৰৰ জীৱনালেখা অঙ্কন কৰিও ইতিপূৰ্বে দেখুওৱা হৈ গৈছে। সোণোৱানী হনুমান বান্দৰ নামেৰে জনাজাত তৃতীয় বিধ ধুনীয়া চেহেৰা-পাতিৰ জানোৱাৰ দ্বাৰায়ও আগতে আলোচনা কৰি লোৱা হৈছে। এই প্ৰৱন্ধত গিৰিৰ হনুমান বান্দৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেইবিধ হনুমান বান্দৰক নীলগিৰি-হনুমান বুলি অভিহিত কৰা হয়। এইবিধ হনুমান বান্দৰক দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই ফালৰ যিবোৰ কল্পিত সাধাৰণতে সিংহনেজীয়া বান্দৰ বাস কৰে ঠিক তেনেবোৰ পৰিবেশতে কম-বেছি পৰিমাণে নীলগিৰি-হনুমান নামৰ প্ৰাণীবিধকো একেলগে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

পশ্চিমঘাট পৰ্বতমালাই এইবিধ হনুমান বান্দৰৰ মূল ঘাট বুলি ক'ব পাৰি। দক্ষিণ ভাৰতত সাগৰৰ পাৰে পাৰে উত্তৰে কুৰ্গৰ পৰা দক্ষিণৰ ফালে থকা কুমাৰিকা প্ৰান্তৰ পৰা গিৰিৰ পৰ্বতীয়া ঠাই আছে সেই ঠাইখিনিত থকা অগণ্যভূমি বিলাকত এইবিধ হনুমানে নিগাজীকৈ বাস কৰিবৰ বাবে সুবিধা কৰি লৈছে। দক্ষিণাত্যৰ এনে-বোৰ ঠাইত যিবোৰক চিৰ সেউজীয়া গছ-গছনিৰ ছাৰি-বননিয়ে বিস্তীৰ্ণ ঠাই জুৰি পৰাও লাভ কৰি আছে তেনেবোৰ ঠাইক তাৰ মানুহে “চোলা” বুলি কয়। “চোলা” নামেৰে জনাজাত এই ছাৰি-বননি বোদৰ মাজে মাজে নানা নিচিনা পানীৰ সুঁতি বৈ আছে আৰু এনে ধৰণৰ ঠাইবিলাকে এইবিধ হনুমান বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ বাবে অনু-

কূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে। অৰণ্যভূমিৰ গছ-গছনি বিলাকৰ ভালে-পাখত বগাই কুপা বিৰৰ প্ৰাণী হ'লেও নীলগিৰি হনুমান বান্দৰ বিলাকৰ একো একোটা জাকে কেতিয়াবা নাটিলৈকে নামি আহে আৰু কেতিয়াবা দলে বনে আহি মানুহে খেতি পথাৰ কৰা ঠাইবোৰত সোমাইহি। খেতি কৰা ঠাইত মানুহে লগাই দিয়া শস্য বিলাকৰ কেতিয়াবা এইবিধ জানোৱাৰে অনিষ্ট সাধন কৰে। এইবিধ প্ৰাণীয়ে বাতিৰ বাতিটো গছৰ ওপৰত উঠি থাকে আৰু বাতিপুৱাৰ বেজিটো মূৰৰ ওপৰলৈ উঠিবলৈ লওঁতে নো লওঁতেই



নীলগিৰি-হনুমান

ইহঁতে ধোৱা বস্ত্ৰ বিচাৰিবলৈ বাবে জাক বান্ধি নামি আহে। দুপৰীয়া সময়ত বেতিয়া সূৰ্যৰ বশ্মি প্ৰবল হৈ পৰে তেতিয়া ইহঁতে টলক। নাৰি গছৰ ডালত বহি থাকে। আবেলি সময়ত বেজিটো পশ্চিম আকাশত ডুব সাবটৈ; বহুতখিনি সময় বাকী থাকোঁতেই ইহঁত আকৌ গছৰ ডালপাত বোৰৰ পৰা নাটিলৈ নামি আহে আৰু নানা ধৰণৰ গছৰ কুঁহিপাত, ফল-মূল আদি বিচাৰি বিচাৰি খানটলৈ আৱৰ্ত্ত কৰে। বেজি পৰোঁতে নৌপ-ৰোঁতেই আকৌ গৈ গছৰ ডালত আশ্ৰয় লয় গৈ।

নীলগিৰি লেঙ্গুৰ বা হনুমান বান্দৰৰ গাঁৱ নোমবিলাক অতিপাত ক'লা হয়। এই বিষয়ত সেই বিলাক ঠাইত বাস কৰা সিংহভোজীয়া বান্দৰৰ গাঁৱ নোমৰ আগত ইয়াৰ গাঁৱ নোমৰ বৰণৰ ভালেখিনি সাদৃশ্য থকা দেখা যায়। আনহাতে দেখা যায় যে এইবিধ লেঙ্গুৰৰ মূৰৰ নোমবোৰৰ বৰণ গাভ গজা নোমবোৰৰ দৰে ক'লা নহয়। ডিঙিৰ ওপৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূৰৰ ওপৰ-ছোৱাত যিখিনি নোম থাকে সেইখিনি নোমৰ বৰণ হালধীয়া ধৰণৰ বুলি হয়। সেইবাবে এইবিধ হনুমান বান্দৰৰ প্ৰত্যেকটোৱে

একোটাকৈ বাশৰ-টুপী পিছি থকা যেন লাগে। পাছ-তপিনাৰ পাছৰ কালে আৰু দীঘল নোঙ্গ ডালত যিবোৰ নোম থাকে সেইবোৰ নোমৰ বৰণো ক'লা হলেও তাত ফুটুকী বং ছটিয়াই খোৱাৰ নিচিনা লাগে। এই ধৰণৰ বঙৰ ছিটিকনি পৰাৰ বাবে এই ডোখৰ ঠাইত এক প্ৰকাৰৰ চিক্‌মিকনি বিৰাজ কৰা দেখা যায়।

এইবিধ হনুমান বান্দৰে “হোহা” “হোহা” ধৰণৰ দীঘলীয়া দীঘলীয়া উকি মাৰে। যিবোৰ ঠাইৰপৰা এই ধৰণৰ শব্দ আহি মানুহৰ কাণত ঠহৰ ঠহৰকৈ বিচ্ছিন্ন সেইবোৰ ঠাইত যে এইবিধ প্ৰাণী আনেঙে আনেঙে গছৰ ডালত উঠি বগুৱা বাই কুৰিছে এই কথা অনুমান কৰিব পৰা যায়। সেইবিন্যাস ঠাইত থকা জনআতীয়া মানুহ কিছুমানে এইবিধ হনুমান বান্দৰক মাৰি মাৰি খায়। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে এইবিধ হনুমান বান্দৰৰ বঙহত কিবা একেৰি ভাল গুণ আছে আৰু সেই বাবে ইয়াৰ মাংস, তেজ আদি খালে হেনো বহুতো বেমাৰ আত্মাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। তদুপৰি ইয়াৰ গাৰ ধুনীয়া নোম থকা ছালখন বখলিয়াই বহুতো মানুহে নানা ধৰণৰ বিলাসৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি লয়। এইবিলাক কাৰণত সচৰাচৰ বিচৰণ ভূমি বিলাকত এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ সংখ্যা কৰি অহাৰ উমান পোৱা গৈছে।

পাৰিবাৰিক বা সাৰ্বাজিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰে ক'ব লগীয়া হ'লে এই কথা সঁচা বুলি গণ্য কৰিব লাগিব যে অন্যান্য বিলাক হনুমান বান্দৰৰ দৰে এইবিধ হনুমানৰ মাজতো পৰিয়াল গঠনৰ বেলিকা খোৱা-কাৰোৱা লাগে। শক্তিশাল্য বৃত্তান্তোৱে লগৰ অনাগ্য মতাৰোৰক আঁতৰাই মাইকীবোৰৰ মাজত অধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰে।



হলৌ বান্দৰ

শ্ৰেণী—স্বন্যপায়ী

বৰ্গ—প্ৰাইমেট

গোত্ৰ—হাইলোবোৰ্টিডি

প্ৰজাতি—হাইলোবোৰ্টিচ হ'লক

হলৌ বান্দৰ প্ৰাইমেট গোষ্ঠীৰ প্ৰাণী। প্ৰাইমেট বিলাকক সিহঁতৰ শাৰীৰিক আৰু চাৰিত্ৰিক গুণাবলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায়। এই বান্দৰ জাতীয় অমানুষ প্ৰাইমেট বিলাকে কিছুমানে সিহঁতৰ চাৰিওখন ঠেং ব্যৱহাৰ কৰি মাটিত খোজ কাঢ়ি যাব পাৰে। আন কিছুমানে আকৌ সাধাৰণতে চাৰিখন ঠেঙে সলনি ধামেই দুখন ঠেংহে পোজ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। পাছ ঠেং দুখনেৰে ইহঁতে মানুহৰ দৰে মাটিত খোজ কাঢ়ি আগ বাঢ়ি যাব পাৰে। এই দৰে খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত ইহঁতে আগ ঠেং দুখন মানুহৰ হাতৰ দৰে ওলোমাই ৰাখে। এই দুখন ঠেঙে তেতিয়া জন্তুটোৰ ভাবসাম্যতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। পাছৰ ঠেং দুখনেৰে খোজ কাঢ়িব পৰা বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকক “মেন লাইক মংকি” বা মানুহৰ নিচিনা বান্দৰ বুলি কোৱা হয়। চাৰিওখন ঠেং ব্যৱহাৰ কৰি খোজ কঢ়া বান্দৰ বিলাকক “দগ্ লাইক মংকি” বা কুকুৰ সদৃশ বান্দৰ বুলি অভিহিত কৰা হয়। ইহঁতক সংক্ষেপতে কুকুৰ-খুজীয়া বান্দৰ বুলিও ক'ব পাৰি।

আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ পৰিবেশত বাস কৰা সাধাৰণ বিধ বান্দৰকে আৰম্ভ কৰি আঁহ বনোতা প্ৰকাৰৰ বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীয়ে চাৰিওখন ঠেং মাটিত পেলাই খোজ কাঢ়ে। মুঠৰ ওপৰত বান্দৰ জাতীয় সাহ ভাগ প্ৰাণীকে এই চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ দেশত বাস কৰা হনুমান বান্দৰ বা লেদুৰ আৰু লাজুকী বান্দৰ নামৰ প্ৰাণী বিলাকে এই শ্ৰেণীতে পৰে। গোটেই পৃথিৱীখনৰ অন্যান্য ঠাইত বাস কৰা লেম্বু, মাগাৰে, টাৰচিয়াৰ, ল'ৰ্চ (লাজুকী বান্দৰ) বেবোন, মাৰমোচেট, মাজিল, উকাৰি আদি বান্দৰ এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পৰে। প্ৰথম শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীৰ সংখ্যা সিনান বেছি নহয়। গৰিলা, চিম্পাজী, ওবাং ওটান প্ৰভৃতি প্ৰাণী এই শ্ৰেণীত পৰে। আমাৰ হলৌ বান্দৰ নামেৰে জনাজাত বান্দৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাণীকে আৰম্ভ কৰি গীৰন ফৈদৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীবোৰ এই শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম ফৈদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আটাইবিলাক বান্দৰৰ বসতি-

স্থান পূৰ্ব গোলাধ্বৰ এচিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশ দুখনতে সীমিত হৈ আছে সিহঁতৰ
বসতিস্থান অন্যান্য মহাদেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱা নাই। ইহঁতক দুটা নিৰ্দিষ্ট গোত্ৰ বা
পৰিয়ালত ভালকাতৰু কৰা হৈছে। গৰিলা, চিম্পাঞ্জী আৰু ওৰাং ওটানক যিটো



হলৌ ৰাশ্বৰ

গোত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেই গোত্ৰক পংগিৰি গোত্ৰ বা পৰিয়াল বুলি কোৱা হয়।
হলৌ ৰাশ্বৰকে আৰম্ভ কৰি পৰিৱন বিলাকক হাইলোবোচিদি পৰিয়ালত স্থান দিয়া হৈছে।

ভাৰতবৰ্ষৰ চানি সীমানা ভিত্তত হলৌ বান্দৰ বাসস্থান আৰু নিচিনা ভূমি পৰ্শ্ব-
দক্ষিণ অসম আৰু অন্যান্য ৰাজ্য কেইখনতে আৱদ্ধ হৈ থকাৰ কথা জনা যায়। এইবিধ
বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণীৰ কোনো নেজ নাথাকে আৰু ইয়াৰ আগৰ ঠোঁট দুখন পাচৰ ঠোঁট
দুখনতকৈ ডালেখনি দীঘল হয়। গাত গজা নোমকিৰাৰ বৰণ সাধাৰণতে বগা
হয়। মাইকী হলৌ বান্দৰ বয়স আগবাঢ়ি গৈ গাঁৱ নোমবোৰ শেঁতা পৰি পীত-বৰ্ণ
ধাৰণ কৰে। চকুৰ চেলাউৰীৰ ওপৰেদি বৈ পৰা নোমখিনি বগা বগা হয়। এই
বগা বৰণীয়া নোমৰ পাট্টাল কপালত নিয়গি থকাৰ বাবে এইবিধ গীৰনক ছোৱাই-
বুড়িল গীৰন বা বগা চেলাউৰী থকা হলৌ বান্দৰ বুলি কোৱা হয়। বাংলাদেশৰ চিটা-
গণ্ডেদি বৃহদ্দেশ পাৰ হৈ খাইলৈও পৰ্যন্ত এইবিধ বিচিত্ৰ আকাৰৰ বান্দৰ বসতিস্থান
আৰু বিচৰণ ভূমি সংগ্ৰহাবিত হৈ আছে।

যিবিলাক অৰণ্যভূমি ওখ ওখ গছৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু য'ত খোৱা বস্তু যথেষ্ট পৰি-
মাণে পোৱা যায় হলৌ বান্দৰে তেনেবোৰ ঠাইকে বাস কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰি লয়।
সাধাৰণতে ইহঁতে জাক বান্ধি একে ডোখৰ ঠাইত বাস কৰে। গত, মাইকী আৰু
পোৱালিবোৰক লৈ একোটা জাকৰ সৃষ্টি হয়। দিনৰ সৰহখিনি সময় ইহঁতে গছৰ
ওপৰত বগাই বগাই সময় অতিবাহিত কৰে। ৰাতি হলে হাবিৰ মাজৰে এডোখৰ
নিজান ঠাইৰ গছত আলোঙে আলোঙে জিনগি লৈ থাকে। ৰাতিপুৱাৰ বেলিটো ওলাই
অহাৰ লগে লগে ইহঁতে গছৰ ডালত বগাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইহঁতৰ দীঘল হাত দুখ-
নেৰে গছৰ ডালত ধৰি ধৰি ইঠাইদ পৰা সিঠাইলৈ যায়। গছ জোপাৰ এটা ডালৰ
পৰা আন এটা ডাললৈ এইদৰে গতি কৰি গৈ থকাৰ ওপৰিও এজোপা গছৰ পৰা আন
এজোপা গছলৈ আগ বাঢ়ি গৈ থাকে। সাধাৰণতে একোটা পথকে ইহঁতে দিনৰ পাছত
দিন ধৰি অনুসৰণ কৰে। ব'দ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰা সময়খিনিত ইহঁতে উকি মাৰি
মাৰি শব্দ উচ্চাৰণ কৰে আৰু এই শব্দৰ স্বনি বহুত দুখৰ পৰা শুনিবলৈ পোৱা
যায়। পোন প্ৰথমতে এটা হলৌ বান্দৰে শব্দ উচ্চাৰণ কৰে। তেতিয়া ওচৰৰ গছবোৰত
উঠি থকা আনবিনাক হলৌ বান্দৰে তদুপ শব্দ উচ্চাৰণ কৰি গোটেই হাবিখন বজ্জন-
জনাই তোলে। ভৰ-দুপৰীয়াৰ সময়খিনিত হলৌ বান্দৰ ডাকে গছৰ ডালত বহি জিনগি
লয় আৰু আবেলি বেলিকা পুনৰ আহাৰ বিচাৰি ইফালে সিফালে থকা গছৰ ডালবোৰত
বগাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইদৰে ধূৰি ফুৰাৰ সময়ত ইহঁতে আকৌ চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ
কৰে আৰু গোটেই হাবিখনকে পুনৰ সজীৱ কৰি তোলে। মাটিত পোজকাটি ৰাৰ
লগীয়া হলে ইহঁতে খোজ কঢ়াৰ বাবে পাছৰ ঠোঁট দুখন ব্যৱহাৰ কৰে। ওলমি থকা
দীঘল হাত দুখনে জন্তুটোৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে।

হলৌ বান্দৰৰ মাইকী জনীয়ে এবাৰত এটাকৈ পোৱালি জগায় বুলি জনা যায়।
সাধাৰণতে জাৰকালিৰ সময়ত তাই পোৱালি জগায়। মাক জনীয়ে প্ৰায়েই পোৱালিটো
পিঠিৰ ওপৰত তুলি লৈ ফুৰে। এইদৰে পিঠিৰ ওপৰত পোৱালিটো নোকোচাত বান্ধি
লৈ লৈয়েই তাই এটা ডালৰ পৰা আন এটা ডাললৈ জাপ মাৰি মাৰি যায়। হলৌ
বান্দৰে পোহ মানে। গিৰিহঁতে কোনো খোৱা বস্তু তাৰ হাতত দিলে সি অতি আগ্ৰ-
হৰে লৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। তদুপৰি গিৰিহঁতক সি অনুসৰণ কৰি খেৰেলীয়া শৰ্ভাৱ
দৰ্শন কৰে।

সমুদ্রবাসী স্তন্যপায়ী জন্তুসমূহ

এতিয়ালৈকে ভাৰত উপ মহাদেশখনত সাধাৰণতে বাস কৰা যিবিলাক স্তন্যপায়ী জন্তুৰ জীৱন বুৰঞ্জী বৰ্ণনা কৰা হ'ল সেই সকলোবিলাক প্ৰাণীয়েই পৃথিৱীৰ উপবিভাগৰ মাটিত বাস কৰে। সেই কাৰণে এইবিলাক প্ৰাণীক খাউকতে স্থলচৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি। এই প্ৰকৃত পানীৰ তলত আৰু পানীৰ উপবিভাগত নাপুৰি-সাতুৰি সময় অতি-বাহিত কৰা স্তন্যপায়ী জন্তু বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা অৰ্দ্ধ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। কোনো বাহুল্য যে স্তন্যপায়ী স্থলচৰ প্ৰাণীবিলাকৰ সৰহ ভাগেই মহা-সমুদ্ৰৰ বিশাল জল-বাশিত বাস কৰে। তাঁৰে ভিতৰত কেইবিধমান বিচিত্ৰ প্ৰাণীয়ে সাধাৰণতে পানীত থাকিবলৈ ভাল পায় যদিও মাছে সময়ে বানলৈও উঠি উঠি আহে আৰু একে লেঠালিয়ে বহুতো সময় সাগৰৰ পানৰ মাটি ভাগত কিয়া বৰফৰ চামনিৰ ওপৰত কটাই দিয়েহি। এনেবিলাক প্ৰাণীক খাউকতে পিনিপেদিয়া (Pinnipedia) নামৰ এটা গোট বা উপ-শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। চিল, চি-লায়ন আৰু হাঙ্গাৰ নামৰে জনাজাত প্ৰাণী কেইবিধ এই উপ-শ্ৰেণীত পৰে। পৃথিৱীৰ উপবিভাগত থকা বায়ুস্থল আৰু গভীৰ পানীৰ তলত সমান দক্ষতাৰে বহুতো সময় কটাৰ পৰাৰ আচৰিত চাৰিত্ৰিক গুণৰ অধিকাৰী হোৱাৰ বাবে এই প্ৰাণীবিলাকক হয়তো উভয়চৰ প্ৰাণীৰ আখ্যাও দিব পাৰি। উল্লেখযোগ্য যে পিনিপেদিয়া গোটত ঠাই পোৱা প্ৰাণীবিলাকৰ ঠেং নাই। চৰাইৰ ডেউকাৰ দৰে ফিাপাৰ নামৰ শাৰীৰিক গঠনে পানীত সাতুৰা আৰু মাটিত ইফালে সিফালে যোৱা কামত ইহঁতক সহায় কৰে।


ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা পিনিপেদিয়া উপশ্ৰেণীৰ কোনো এবিধ প্ৰাণীকো ভাৰত উপ মহাদেশৰ জলবাশিত বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গঙ্গা, যমুনা, মহানদী, গোদাবৰী, তাপ্তী, কৃষ্ণা, কাবেৰী আদি মহাবাহু নদ-নদী সমূহ আৰু এই নদী-বিলাকৰ উপনদী বিলাকৰ কথাই নাই আনকি ভাৰতৰ উপকূলৱৰ্তী ঠাই আৰু সমুদ্ৰৰ জলখানিতো ইহঁতৰ কোনো এবিধ প্ৰাণীকো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।

দ্বিতীয় উপশ্ৰেণী বা গোটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা স্তন্যপায়ী স্থলচৰ প্ৰাণীবিলাকক চিটা-চিয়া (Cetacea) নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। তিনিবাছ (Whale) বিলাক এই উপ-শ্ৰেণীত পৰে। উল্লেখযোগ্য যে হোৱেল বিলাকক আমাৰ ভাষাত তিনিবাছ বুলি কোৱা হয় যদিও ইহঁত প্ৰকৃততে মাছ নহয়। পানীত বাস কৰা প্ৰকৃতিৰ প্ৰাণী হ'লেও ইহঁতৰ শাৰীৰিক গুণাগুণত স্তন্যপায়ী জন্তুৰ চৰিত্ৰেহে বিকাশ সাধন হোৱা দেখা যায়। এইবিলাক প্ৰাণীয়ে বাহুৰ দৰে কণী পাৰি পোৱালি উৎপাদন নকৰে। স্তন্যপায়ী জন্তু

বিলাকৰ দৰে ইহঁতে পোৱালি জগাই ডাঙৰ দীঘল কৰে। তিনিমাছ বা হোৱেলৰ বহুতো জাত আছে আৰু এই হোৱেল বিলাকে মহাসমুদ্ৰৰ বিশাল জনবান্ধিত ঠায়ে ঠায়ে বাস কৰে। কিছুমানে সাগৰৰ পানীৰ উপৰিভাগত থাকিবলৈ ভাল পায়। কিছুমানে পানীৰ বহুত তললৈ গৈ পানীৰ তলে তলে বুৰমাৰি বুৰমাৰি পৰিস্ফৰণ কৰি ফুৰে। দুই এবিধ তিনি মাছে মহাসমুদ্ৰৰ গভীৰ তলিত নাগুৰি সাতুৰি সময় অতিবাহিত কৰে। সিহঁতৰ কিছুমান আকাৰত বিৰাট ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ ভিতৰত ব্লু-হোৱেল (Blue Whale) বা নীলা তিনিমাছ নামৰ প্ৰাণীবিধ আকাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ হয়। পূৰ্ণ বয়স পোৱা একোটা ব্লু-হোৱেল দীঘলে দীঘলে এশ ফুটতকৈ বেছি হ'লেও কম নহ'ব। আন কিছুমান জাতৰ তিনিমাছ বিলাক আকাৰত ব্লু-হোৱেলৰ তুলনাত অলপ সৰু হয়। কিন্তু ব্লু-হোৱেলতকৈ আকাৰত সৰু হ'লেও এইবিলাক তিনি মাছকো বিৰাট আকাৰৰ জনচৰ প্ৰাণী বুলিয়েই ক'ব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান যুগত পৃথিৱীত যিমান বিলাক জনচৰ আৰু স্থলচৰ প্ৰাণী জীৱিত অৱস্থাত বাচি আছে সেই আটাইবিলাকৰ ভিতৰত তিনিমাছৰ কেইটামান জাতেই আকাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ। ব্লু-হোৱালেতকৈ তুলনামূলক ভাৱে অলপ সৰু আকাৰৰ তিনিমাছ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত স্পৰ্মি হোৱেল, গ্ৰে-হোৱেল, ব্ৰেক-শাইট হোৱেল, ফিন-হোৱেল, ব'হেড-হোৱেল, হাম্পবেক হোৱেল আদিৰ নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। কিছুমান জাতৰ তিনিমাছ বিলাক অৱশ্যে আকাৰত বহুতো সৰু হয়। বৰণত ইহঁতৰ দুই এবিধ বগা বা হালধীয়া আৰু কেইবিধমান চিলা-পৰ্বা কৈ ধুনীয়া হয়। তাৰ ভিতৰত পাইলট-হোৱেল আৰু কিলাব-হোৱেল নামেৰে জনাজাত দুবিধ তিনিমাছৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। এই-বিলাক তিনিমাছে পোঁহ মানে আৰু ডলফিন, চিল আদি জনচৰ প্ৰাণীৰ দৰে নানা প্ৰকাৰৰ খেল-ধেমালি প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহক আনন্দ দিয়ে। পাইলট-হোৱেল আৰু কিলাব-হোৱেল নামেৰে জনাজাত দুবিধ তিনিমাছে ধেমেলীয়া চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু শিকা-ওতা জনৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী পানীত সাতুৰি সাতুৰি থকা অৱস্থাতে পানীৰ উপৰি ভাগতে লুটিবাগৰ মাৰে আৰু পানীৰ ওপৰলৈ বিভিন্ন ভঙ্গিমাত আপ মাৰি বিবিধ খেল প্ৰদৰ্শন কৰে। ইউৰোপ, আমেৰিকাৰ উন্নত দেশ বিলাকৰ মেৰিন-লেণ্ড (Marineland) ওচিনেৰিয়াম (Oceanarium) চি-ৱৰ্ল্ড (Sea World) একুৱাৰিয়াৰ (Aquarium) আদি বহুতো আনন্দ বিলাসী অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠান বিলাকত প্ৰতিদিনে জনচৰ প্ৰাণীবিলাকে পৰিবেশন কৰা নানা ধৰণৰ বিচিত্ৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এই খেল-ধেমালি বিলাক চাই অসীম আনন্দ উপভোগ কৰে। ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকে এই বিচিত্ৰ প্ৰাণীবিলাকৰ বিষয়ে বহুতো জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে।

ইউৰোপ, আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া আদি মহাদেশৰ কিছুমান মানুহে বহুত পৰিমাণৰ ডাঙৰ আকাৰৰ হোৱেল বা তিনিমাছ প্ৰতি বছৰে বধ কৰে। এইদৰে ধাৰাবাহিক ভাৱে বহুবি বহুবি এই জন্তুবিলাকক বধ কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া সাগৰ মহাসাগৰৰ জনবান্ধিত বাস কৰা তিনিমাছ বিলাকৰ সংখ্যা আশাতীত ভাৱে কমি আহিল। ইতিমধ্যে বহুতো উন্নত দেশৰ উদ্যোগপতি ব্যক্তি সকলৰ কিছুমানে তিনিমাছ বধ কৰা কামক জীৱন

ধাৰণৰ মুখ্য অৱলম্বন ৰূপে বাচি ল'লে। ঠায়ে ঠায়ে তিনিমাছ বধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিল্পানুষ্ঠান বিলাক গঠন কৰা হ'ল। আনহাতে পৃথিৱীৰ সমুদ্ৰভাগৰ জলবাসিত তিনিমাছৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাত শিল্পানুষ্ঠান বিলাকে মহা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হ'ল। বিপুল প্ৰকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ বাশি সংৰক্ষণৰ বাবে যিটো আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান গঠন কৰা হৈছে (International union for Conservation of Nature and Natural Resources) সেই অনুষ্ঠানৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু সদস্য বৃন্দই এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে গভীৰ ভাৱে চিন্তা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আন্তৰ্জাতিক তিনি শিল্প আয়োগ (International Whaling Commission) নামৰ এটা অনুষ্ঠানো ইতিমধ্যে গঠন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানৰ সদস্যবৃন্দই গভীৰ ভাৱে আলো-



স্পাৰ্ম হোৱেল

চনা-বিলোচনা কৰি এই সিদ্ধান্তলৈ আহিছে যে ১৯৮৫ চনৰ পৰা তিনিমাছ বধ কৰা কিছুদিনৰ বাবে একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব লাগে। তিনিমাছ বধ কৰা শিল্পই (Whaling Industry) অগ্ৰগতি লাভ কৰা বহুতো উন্নত দেশৰ চৰকাৰে এই বিষয়ত সহাবি জনাই সত্ৰাৱৰ পৰিচয় দিছে। এই সম্পৰ্কত জাপানৰ নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। উল্লেখ যোগ্য যে প্ৰতি বছৰে জাপানলৈ বহু পৰিমাণৰ তিনিমাছ-জাত সামগ্ৰী পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা আমদানি কৰা হয়। সেই কাৰণে আন্তৰ্জাতিক তিনি শিল্প আয়োগৰ সদস্যসকলে আশা পোষণ কৰিছে যে জাপানলৈ তিনিমাছ-জাত

সামগ্রীৰ আমদানি বন্ধ হ'লে বহুতো দেশত তিনি শিল্পৰ পতন ঘটিব। ফলত মহা-সমুদ্রবিলাকৰ জলবাসিত বাস কৰা বিভিন্ন জাতৰ তিনিমাছ বিলাকে স্বাভাৱিক পৰিবেশ বিলাকত বাচি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। সিহঁতৰ জন্তু-সংখ্যা (Population) ক্ৰমে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু কালক্ৰমে পূৰ্বৰ ওভ দিনালৈকে থাকোঁ পৃথিৱীতৈ ঘূৰি আহিব। উল্লেখযোগ্য যে সিদিনাখনলৈকে বাছিয়াৰ পৰা আন্তৰ্জাতিক তিনি শিল্প আয়োগে কোনো আশাঙ্কনক সমিধান নোপোৱাত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানৰ সদস্য বৃন্দ উইগু হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। পৃথিৱীৰ আটাইবিলাক সংশ্লিষ্ট দেশৰ পৰা আশা-নুকপ সহানি আৰু সহানুভূতি নাপালে তিনিমাছ সংৰক্ষণৰ কামত যে লাশা পৰিল এই কথাৰ পুনৰ্নিবেশ নিষ্প্রয়োজন।

তিনি শিল্প (Whaling Industry) জন্ম আৰু অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে কিছু কথা এতিয়া আলোচনা কৰা যাওক। মানৱ সভ্যতাৰ বহুত দিন পূৰ্বেই যে সংশ্লিষ্ট দেশ-বিলাকত তিনি শিল্পই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল এই কথা পুনৰাই নকলোও হ'ব। তিনি শিল্পত আত্ম নিয়োগ কৰা লোকসকলে দোপতদোপে উন্নতি কৰি উৰ্দ্ধ শিৰষত নিৰ্ভক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিছুমান লোকে অসীম ঐশ্বৰ্য্যশালী হৈ পৰিয়াল সহ মহা আনন্দত জীৱন যাপন কৰিছিল। কিছুমানৰ ভাণ্ডা উদয় হৈছিল আৰু আন কিছু মানে তিনিমাছ চিকানত মহা সমুদ্রলৈ জাহাজত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দৈৱ দুখিপাকত দুৰ্ভিক্ষাত পতিত হ'ব লগীয়া হৈ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল।

আমেৰিকাৰ ঠায়ে ঠায়ে তিনি শিল্পৰ কাহিনী অঙ্কন কৰা কিছুমান সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰি থকা হৈছে। উত্তৰ মেক্স দুৰ্গম বৰফাচ্ছয় ঠাইবিলাকলৈ উন্নতিকামী আৰু সাহসী উদ্যোগপতি সকলে পূৰ্বতে পাততৰা নান্দৰ নিচিনা জাহাজত উ। উঠিগৈ কেনেকৈ জীৱন বিপন্ন কৰিব লগীয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ বহুতেই কেনেকৈ জীৱন উদ্ধাৰ কৰিব লগীয়া হৈছিল এই সংগ্ৰহালয় বিলাকত তেনে পৰিস্থিতিবিলাকৰ জীৱন্ত স্বৰূপ প্ৰতিকৃতিৰ দ্বাৰা কপায়ণ কৰা হৈছে। আমেৰিকাত থাকোঁতে তেনে ধৰণৰ অনুষ্ঠান বিলাক দৰ্শন কৰি তিনি মাছৰ জীৱন বুজী আৰু তিনি শিল্পৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে জানিব লগীয়া কথা বিলাকৰ ভ্ৰম আহৰণ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত মুজ হিল পক্ষীবিহাৰ (Moose Hill Bird Sanctuary) অন্তৰ্গত স্থাপন কৰা তিনি শিল্পৰ সংগ্ৰহালয় (Whaling Museum) নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা যায়।

তিনি শিল্প (Whaling Industry) আৰু তিনি শিল্পৰ লগত পৰোক্ষ ভাৱে সাঙুৰ খাই থকা বিষয়-বস্তু বিলাকৰ লগত আমেৰিকাৰ মানুহ বিলাক বাককৈয়ে জৰিত হৈ থকা দেখা যায়। এই সম্পৰ্কত আমেৰিকান পূৰ্বাঞ্চলত থকা ৰাজ্য কেইখনমানৰ মানুহবিলাকৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ্য পাৰি। এই ৰাজ্যবিলাকৰ ভিতৰত নিউ ইয়ৰ্ক, মাচাচাছেট্‌, নিউ হেম্পশ্বাৰ, ৰোড আয়াৰলেণ্ড আৰু মেইন নামৰ ৰাজ্য কেইখনৰ কথা ক'ব পাৰি। ঠাউকতে এই আটাই কেইখন ৰাজ্যক নিউ ইংলণ্ড নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। কলহছে আমেৰিকা মহাদেশ আৱিষ্কাৰ কৰি উলিওৱাৰ পাছত ইংৰাজ সকলৰ বহুতে গৈ এইবিলাক ঠাইত উপনিবেশ স্থাপন কৰিছিলগৈ। এই

ঠাইবোৰ তেতিয়া-প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল। মানুহৰ বসতি তাত তেনেই থাকে আছিল। জনশূণ্য বনভূমি বিলাকৰ মাজত বেড্ ইণ্ডিয়ান সকলৰ কেইটামান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ সেৰেঙা সেৰেঙাক বাস কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে বেড ইণ্ডিয়ান বিলাকে তেতিয়া ইংৰাজী, ফৰাচী আদি কোনো ইউৰোপীয় ভাষা নাভাণিছিল। সেই কাৰণে তেওঁলোকে নবাগত সকলক সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিল। কালক্ৰমত তেওঁলোকৰ ভিতৰে কোনো কোনো মানুহে দুই চাৰিটা ইংৰাজী কথা ক'বলৈ শিকিলে। ইংৰাজসকলে তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিলে। সংঘৰ্ষৰ সম্ভাৱনা নাহে নাহে কৰি আছিল।

সাগৰ উপসাগৰৰ উপকূলৱৰ্তী জলবায়ু, সমুদ্ৰৰ পানীৰ বালিচৰ, উপকূলৰ ধল ভাগত থকা সমুদ্ৰৰ জলাশয় আৰু নদ-নদীৰ সজ্জমন্তলৰ বালিঅঁহীয়া ঠাইবোৰত নানাবিধৰ প্ৰাণী বাস কৰে। এই জীৱজন্তু বিলাকৰ ভিতৰত মানুহৰ খাদ্যৰ উপযোগী কিছুমান জলচৰ প্ৰাণীও আছে। আন কিছুমান প্ৰাণীক অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা অতি মূল্যবান বুলি গণ্য কৰা হয়। খাদ্যৰ উপযোগী প্ৰাণী বিলাকৰ ভিতৰত লব্ঠাৰ নামৰ এবিধ, ডাঙৰ মিছা মাছ আৰু কেইবিধ মান শামুক গোষ্ঠীৰ জলচৰ প্ৰাণী পৰে। এই সম্পৰ্কত ক্লেম, ক্ৰেম (Clam) ক্ৰেব (Crab) অৰ্থাৎ খাদ্যোপযোগী কেঁকোৰা কেইবিধ মানৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। মাচাচুছেট নামৰ ৰাজ্যখন মাকিন বুজৰাষ্ট্ৰৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা সমুদ্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত। এইখন উপকূলৱৰ্তী ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত কেপ কড নামৰ যিটো উপদ্বীপ আছে সেই উপদ্বীপটোৱে পুৰণি দিনৰ কিছুমান অৰ্থপূৰ্ণ সাধৰ সামগ্ৰী ৰাখিছে। এই উপদ্বীপটো দীঘলে দীঘলে প্ৰায় ৪৫ কিলোমিটাৰৰ কম নহ'ব। এজন দৈত্যাকায় মানুহৰ হাত এখনৰ আকৃতিত গঢ় লোৱা এই উপদ্বীপটো আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ অশান্ত জলবায়িয়ে সাৱটি ৰাখিছে। পথানিয়ে পথানিয়ে এই উপদ্বীপবোৰৰ ব্যাপকতা অতি কম। কোনো কোনো ঠাইত বহলে বহলে দুই বা তিনি কিলোমিটাৰতকৈ বেছি হোৱা দেখা নাযায়। সৰল (Pine) এচ্পেন (Aspen) উইলো (Willow) মেপল (Maple) আদি গছে এই উপদ্বীপটোক সজাই পৰাই ৰাখিছে। আকাৰত অৱশ্যে এই গছবোৰ সিমান ডাঙৰ হোৱা দেখা নাযায়। সিহঁতক দেখিলে বয়সত কম আৰু আকাৰ আকৃতিত গঁঠীয়া যেন লাগে।

ইউৰোপৰ পৰা অহা মানুহ বিলাকে কড্ উপদ্বীপৰ চাৰিওফালে থকা সাগৰৰ পানীত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ কড্ মাছ (Cod-fish) দেখিবলৈ পাইছিল। তেওঁলোকৰ বহুতো কড্ মাছ ধৰা বৃত্তিটোক জীৱন ধাৰণৰ বুখা অৱলম্বন ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল। কালক্ৰমত উপকূলৱৰ্তী সমুদ্ৰৰ পানীত কড্ মাছৰ সংখ্যা কমি আহিল আৰু এই ব্যৱসায়ী সকলৰ জীৱন ধাৰণৰ সুগ্ৰন পথ ৰুদ্ধ হ'ল। উদ্যোগী আৰু উৎসাহী ব্যক্তি সকলে তেতিয়া তিনিবাছ বধ কৰা ব্যৱসায়ত আৱনিয়েগ কৰিলে। এই কামৰ বাবে তেওঁলোকে বহুতো সাগৰ ভ্ৰমণৰ উপযোগী পাল-ডৰা জাহাজ তৈয়াৰ কৰিলে। এই জাহাজ বিলাকত উঠি তেওঁলোকে সাগৰৰ পানীত তিনিবাছ বধ কৰিবৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। কালক্ৰমত এইদৰে তিনিবাছ ধৰাৰ কামে ইমান ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ

কবিলে যে কড় উপরীপৰ আশে পাশে থকা সমুদ্রৰ পানীত তিনি মাছৰ সংখ্যা একে-
বাবে কমি আহিল। তেতিয়া এই ব্যৱসায়ী লোকসকলে মহাসমুদ্রৰ মাজৰ পানী ভাগলৈ
যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সমুদ্রযাত্ৰী জাহাজ ঘূৰি আহি
আগৰ ঠাই পাওঁতে তিনি চাৰি মাহ সময় লাগিছিল। অকল আটান্টিচ মহাসাগৰৰ
অশান্ত জনবান্ধিতেই এই তিনি মাহ নৰা মানুহ বিলাকৰ কাৰ্যকলাপ সীমিত হৈ থকা
নাছিল। তেওঁলোকে সমুদ্র যাত্ৰাত উত্তৰ-মুৱা হৈ গৈ গৈ কেতিয়াবা উত্তৰ মহাসাগৰৰ
বৰফাচ্ছন্ন ঠাইবোৰ পাইছিলগৈ। মহাসমুদ্রৰ মাজত প্ৰৱাহমান প্ৰৱল ধুমুহাত আক্ৰান্ত
হৈ বহুতো তিনিমাছ মৰীয়া জাহাজ অথাই সাগৰত ডুব গৈছিল। বাটলৈ চাই বৈ থকা
পৰিয়াল বৰ্গই বহুত দিনৰ পাছতহে শোকাবহ ঘটনাৰ সন্ত্ৰণ পাইছিল। চকুৰ পানী
টুকি পৰিয়ালবৰ্গই অশুভ বাতৰি আদৰিব লগীয়া হৈছিল। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা
জাহাজৰ তিনিমাছ ধৰা মানুহৰ দুই এজনে কিবা প্ৰকাৰে কেতিয়াবা প্ৰাণটো বচাই
নাদুৰি সাতুৰি সমুদ্রৰ উপকূলৰ বালিখঁড়ীয়া ঠাই কিবা পাথৰেৰে পৰিবেষ্টিত থিয় গৰাৰ
বিপদ সঙ্কল ঠাইত উপনিত হৈছিলহি। পিছে অতিপাত ঠাণ্ডাত আক্ৰান্ত হোৱা এই
মানুহ বিলাকৰ বহুতে খোজ কাটি কাটি ঘৰ পোৱাৰ আগতে মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'ব
লগীয়া হৈছিল। এই মানুহবিলাকক বন্ধা কৰিবৰ বাবে আমেৰিকাত কোষ্ট গাৰ্ড
(Coast Guard) বা উপকূলৰক্ষী বাহিনী গঠন কৰিব লগীয়া হৈছিল। এই উপকূল-
ৰক্ষী বাহিনী বিলাকে এতিয়াও আমেৰিকাৰ উপকূল বিলাকৰ তত্ত্বাবধান লয়। এনে
ধৰণৰ শোকাবহ ঘটনাবোৰে বৰ্জিত বহুতো কাহিনী তিনি শিল্প জগতত কলঙ্কৰ দৰে
জিলিকি আছে বুলি ক'ব পাৰি। এই কলঙ্ক মোচন কৰা সামান্য কথা নহয়। যুগ
যুগান্তৰৰ পাছতো মানৱ জাতিৰ সন্তান সন্ততি সকলে এই শোকাবহ ঘটনাবোৰ
সোঁৱৰিব লাগিব। সেয়েহে তিনি শিল্প উদ্যোগক জীৱন্ত ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰা
এই তিনি মাছৰ সংগ্ৰহালয় বা বাদুৰবোৰে আজি সকলোৰে মনোযোগ লাভ কৰিবলৈ
সক্ষম হৈছে। এই মিউজিয়াম বিলাকে ভবিষ্যতেও যে সকলোৰে পৰা আদৰ সমাদৰ
পাব পাৰিব এই বিষয়ে সন্দেহ কৰিবৰ কাৰণ আছে বুলি ভাবিব নোৱাৰি।

এতিয়া তিনিমাছ বিলাকৰ আকাৰ আকৃতি আৰু স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে অলপ
আলোচনা কৰা যাওক। আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে সকলো জাতৰ তিনি-
মাছৰ ভিতৰত ব্লু-হোৱেল বা নীলা তিনি নামৰ প্ৰাণীবিধ আকাৰত
আটাইতকৈ ডাঙৰ। আচনতে বৰ্তমান যুগত জীৱিত হৈ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত পৰি-
ভ্ৰমণ কৰি ফুৰা প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত ব্লু-হোৱেলক সৰ্ববৃহৎ আকাৰৰ জানোৱাৰ
বুলি গণ্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সাগৰৰ পানীত বাস কৰা কিছুমান জাতৰ
তিনিমাছে নানাবিধৰ সাগৰত থকা মাছ আৰু অন্যান্য প্ৰাণী ভক্ষণ কৰি জীৱন ধাৰণ
কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত স্পাৰ্-হোৱেল নামৰ তিনিমাছৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব
পাৰি। এইবিধ তিনিমাছৰ ওপৰৰ আৰু তলৰ ঠোঁটত চুটি চুটি আৰু আগ-জোড়া এশাৰী
চোকা চোকা দাঁত থাকে। এই দাঁতৰ সহায়ত এইবিধ তিনিমাছে সাগৰত থকা মাছ
ধৰি খায়। উল্লেখযোগ্য যে সাগৰৰ পানীত কুইড্ (Squid) নামৰ এবিধ দশভোজী

প্ৰাণী বাস কৰে। কেঁকোৰাৰ দৰে দহ ঠেঙীয়া প্ৰাণী হলেও স্কুইডৰ দেহৰ উপবিভাগ কোনো ধৰণৰ বাকলিৰ আৱৰণেৰে ঢাক খাই নাথাকে। বু-হোৱেলকে ধৰি কিছুমান জাতৰ তিমিনাছৰ মুখত দাঁতৰ উৎপত্তি হোৱা দেখা নাযায়। দাঁতৰ সলনি সিহঁতৰ মুখৰ এক প্ৰকাৰৰ ঠৰঙা গৌফৰ উৎপত্তি হয়। এই গৌফক বালিন (Baleen) নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। বালিন নামেৰে পৰিচিত গৌফৰ বিশেষত্ব হ'ল এয়ে যে এই গৌফ মুখৰ বাহিৰৰ ফালে উৎপত্তি নহয়। দাঁত দৃপাৰিৰ



বু-হোৱেল

নিচিনাকৈ এই গৌফবোৰ মুখৰ ভিতৰত উৎপত্তি হয়। সিহঁতে দীঘল দীঘল চুলি যেন ঠৰঙা শলাবে গঠিত একো একোখন ফণিৰ নিচিনা কপ ধাৰণ কৰে। সমুদ্ৰৰ পানীত প্লেকটন (Plankton) নামৰ এবিধ উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হয়। শেলুটৰেৰ নিচিনাকৈ এই উদ্ভিদবোৰ পানীৰ মাজতে ওপঙি ওপঙি থাকে। বালিনৰ সহায়ত তিমি মাছে এই প্লেকটনৰ জীৱবোৰ আঁকৰে মাছ ধৰাৰ দৰে ধৰে। মুখৰ ভিতৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্লেকটন গোট ধালে সেই গোটেইখিনি আহাৰ পেটৰ ভিতৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি দিয়ে। বু-হোৱেল নামেৰে জনাজাত তিমিনাছৰ ক্ষেত্ৰতো বালিন নামৰ গৌফ উৎপন্ন হোৱা দেখা যায়।

উশাহ-নিশাহ লোৱা ক্ষেত্ৰত তিনিষাছ বিলাকে এক অদ্ভুত চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়। মাছৰ নিচিনা জলচৰ প্ৰাণীৰ দৰে ইহঁতৰ দেহত নাক নাথাকে। নাকৰ সন্ধানি ইহঁতৰ মূৰৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰৰ বতাহ ফুৰোৱা বিন্ধা (Blow-hole) থাকে। এই নলি বা বিন্ধাৰ মাজেদি সিহঁতে সাগৰৰ পানীৰ উপৰিভাগৰ পৰা মাজে মাজে প্ৰচণ্ড ফোৰাত পানী উদ্‌গীৰণ কৰে। তেতিয়া সাগৰৰ মাজত আগুৱয়গিৰিৰ দৰে পানী-গছাৰ উৎপত্তি হয়। যিখন সাগৰৰ বা উপসাগৰৰ অনুকূল পৰিবেশত যথেষ্ট সংখ্যক তিনিষাছ একে ঠাইতে ওচৰাওচৰিকৈ বাস কৰে তাত অসংখ্য পানী-গছাৰ উৎপত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰ্যটন বিভাগ আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠান বিলাকে এইবোৰ ঠাইলৈ দৰ্শনপ্ৰাৰ্থী পৰ্যটক সকলক আহ্বানত তুলি তুলি এইদৰে থকা তিনিষাছৰ ঘাটিবোৰলৈ লৈ যায়। দৰ্শক সকলে পানী-গছাৰ অনুপম দৃশ্য জাহাজৰ পৰা নিচেই ওচৰতে দেখিবলৈ পায়। পানীৰ ওপৰলৈকে জাপ মাৰি শুমাই আহিলে চোৱা কৰা তিনিষাছ দুই এটা কেতিয়াবা কেতিয়াবা দৰ্শকৰ চকুত পৰে। অনুপম প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিব পৰা ভ্ৰমণসূচী (Sight-seeing tours) বিলাক এনে ধৰণেৰে পৰিচালনা কৰা হয় যাতে যাত্ৰীসকলে আনায়ালে পানী-গছা আৰু তিনিষাছবোৰ নিচেই ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সুবিধা হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা পানী-গছা বোমৰ পৰা ওতৰি পৰা পানীৰ কণিকাবোৰ জাহাজৰ ভিতৰত পৰিলে জাহাজত এক হুলস্থূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয়।

এতিয়া ডলফিন আৰু শিহ নামেৰে জনাজাত জলচৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। এই দুবিধ প্ৰাণীকো তিনিষাছেৰে অন্যতম সংৰক্ষণ বুলি ক'ব পাৰি। ডলফিন বিলাক সাধাৰণতে সাগৰৰ পানীত বাস কৰে। ভূমধ্য সাগৰ, লোহিত সাগৰ আদিত ইহঁতৰ উৎপত্তি বেছি। পৃথিৱীৰ অন্যান্য ঠাইত থকা সাগৰ উপসাগৰ বিলাকেও এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীক ধাৰণ কৰিছে। এই প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত সাধাৰণ ডলফিন (Common Dolphin) আৰু বটল-নকীয়া ডলফিনৰ (Bottle-nosed Dolphin) নাম বিশেষ ভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি। এইবিলাক প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নিকপ-কপীয়া কৰিবৰ বাবে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণকাৰী অনুষ্ঠান বিলাকে উঠি পৰি লাগিছে। শিহ বিলাকক ইংৰাজী ভাষাত পৰ-পইজ (Porpoise) বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰে এবিধ প্ৰাণীক বুজাবলৈ গদা নদী বাসী ডলফিন্ (Gangetic Dolphin) শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবিধ প্ৰাণীক অসমৰ নদ-নদী বিলাকতো বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইহঁতে উশাহ ন'বৰ বাবে মাজে মাজে পানীৰ ওপৰি ভাগলৈ উঠি আহে আৰু এইদৰে উঠি অহাৰ সময়ত ফঁচ ফঁচ শব্দৰ উৎপত্তি হোৱা শুনিবলৈ পোৱা যায়।

সৰ্বশেষত ডুগং (Dugong) বা চি-কাউ (Sea-cow) নামেৰে জনা-জাত এবিধ সমুদ্ৰবাসী বিচিত্ৰ প্ৰাণীৰ কথাটো আহোঁ। কোনো কোনো দেশৰ মানুহে এইবিধ প্ৰাণীকে সমুদ্ৰকন্যাৰ আখ্যা দিব খোজে। তিনিষাছ, ডলফিন, শিহ আদি জলচৰ প্ৰাণীৰ শাৰীৰিক গঠন-প্ৰণালীৰ লগত এইবিধ প্ৰাণীৰ দেহৰ গঠন-প্ৰণালী যোটাৰূটি ভাৱে মিলি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই বিধ বিচিত্ৰ জলচৰ প্ৰাণীকে কোনো কোনোদেহে

মাৰমেইদ (Mermaid) নামেৰে জনাজাত এবিধ কাল্পনিক প্ৰাণীৰ অন্যতম প্ৰতিনিধি বুলি ক'ব খোজে। মাৰমেইদৰ ওপৰৰ ভাগে তিবোতা মানুহ আৰু তলৰ ভাগে মাছৰ আকৃতি ধাৰণ কৰে বুলি জনা যায়। এইবিধ সমুদ্ৰবাসী কাল্পনিক প্ৰাণীৰ জীৱন বহুসংখ্যক কেন্দ্ৰ কৰি বহুতো সাধুকথাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই সাধু কথা বিলাকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাৰ সাহিত্যত স্থান পাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিম আৰু দক্ষিণৰ ফালে থকা উপকূলবৰ্তী সমুদ্ৰৰ পানীত ডুগং বা চি-কাউ নামৰ প্ৰাণীবিধ বাস কৰে। তিমিয়াছ, ডলফিন আৰু শিহৰ নিচিনা প্ৰাণী হলেও ডুগঙৰ দেহত কিছুমান স্বতন্ত্ৰ ৰূপৰ বিকাশ সাধন হোৱা



এটা ডলফিনে খেলৰ কৌশল দেখুৱাইছে

দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ মুখখন তিমিয়াছ আৰু ডলফিন তথা শিহৰ মুখৰ দৰে কোণেগোণি বুৰা নহৈ ভোটা হয়। তলৰ ফালে থকা ওঠটোতকৈ ওপৰৰ ওঠটো বহুত-খিনি ডাঙৰ আৰু বগ্‌হাল হোৱা দেখা যায়। এই ওঠ দুটাৰ সহায়ত জন্তুটোৱে পানীৰ উপৰত হোৱা সানো আভৰ উত্তল বুটলি বুটলি খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। কেতি-

যাবা কেতিয়াবা ই সাগৰৰ পাৰৰ বাম পানী থকা ঠাই ফাঁটলৈও উঠি উঠি আহে। তেনেবোৰ ঠাইত গজা নানা বিধৰ ঘাঁহ খায়। অতীততে উপকূলবৰ্তী সাগৰৰ কোনো কোনো ঠাইত বহুত সংখ্যক ডুগং একেলগে চৰি ফুৰা অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সাগৰপৰীয়া মানুহবিলাকৰ বহুতে ইয়াৰ মাংস খাইছিল। বহুতো সংখ্যক আনোৱাৰ মানুহে একেলগেঠাৰিয়ে মাৰোঁতে মাৰোঁতে ইয়াৰ জন্তু-সংখ্যা স্বাভাৱিক পৰিমাণ বিলাকত আশাতীত ভাৱে কমি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে।

আমেৰিকাৰ কালিফৰ্ণিয়া, লচ্ এঞ্জেলচ্ আদি ঠাইৰ উপকূলবৰ্তী সমুদ্ৰত আন এবিধ এনে আকৃতিৰ বিচিত্ৰ প্ৰাণী বাস কৰে। এইবিধ প্ৰাণীক মেনোটি (Manatee) নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। এইবিধ বিচিত্ৰ প্ৰাণীকো তাৰ মানুহে মার্মেইড (Mermaid) বুলি ক'ব খোজে।



ভাৰতবৰ্ষত ১৯৮৩ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে প্ৰতিষ্ঠিত বাহীৰ উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্য বিলাকৰ বিষয়ে থুলথুলকৈ জানিব লগীয়া
ৰূপাৰোৰ ।

অসম

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
নাম	কি কি অস্ত সাধাৰণতে সেৰিবলৈ পোৱা যায়	কি উপায়েৰে যাৰ পাৰি	কাৰ ঙ্গত ৰোগাৰোগ কৰিব লাগে	দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময় আৰু থকা বেলাৰ সা-সুবিধা
কাৰ্জিবৰঙা বাহীৰ উদ্যান বা নোচনেল পাৰ্ক	গঁড়, হাতী, বাঘ, ভালুক, দলহৰিণ, ঝাটীয়া হৰিণ, সুগৰী পহ, বনৰীয়া মহ, বনৰীয়া গাহৰি, বান্দৰ, চুপীমূৰীয়া হনুমান, উৰ, উলুৰ'বা আৰু নানা জাতীয় চৰাই আৰু স্তম্ভকাৰী বনৰীয়া হাঁহ ।	গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটৰ পৰা চুবিষ্ট বিভাগৰ আৰু ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্টৰ বাছেৰে কঁইবালৈ যাব পাৰি ।	ভিত্তিকলৈ ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, ইষ্টাৰ্ণ আসাম হাইৱেড নাইফ ডিভিজন, পোঃ বোকাখাট জিঃ গোলাঘাট (অসম)	নবেম্বৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ । বগৰকাৰী সকলৰ বাবে কঁইবাড কেইবাটাও পৰ্যটক নিবাস আছে । আগতীয়াটক বোগাযোগ কৰিলে বনবিভাগে দৰ্শনৰ বাবে হাতীৰ ব্যৱস্থা কৰি থাকে ।
মানাহ অভয়া- ৰণ্য ভথা ব্যাঘ্ৰ ৰোজনা	হাতী, বাঘ, ভালুক, গঁড়, দলহৰিণ, শৰ-পহ, ঝাটীয়া হৰিণ, জহামল, সোণোৱালী হনুমান, নল-গাহৰি, বনৰীয়া গাহৰি, পানী-গুই, উৰ আৰু নানা জাতীয় চৰাই ।	গুৱাহাটীৰ পৰা নিজৰ গাড়ী লৈ কিম্বা চুবিষ্ট বিভাগৰ গাড়ীৰে মঠ- গুৰিলৈ যাব পাৰি ।	ফিল্ড ডিৰেক্টৰ, টাইগাৰ প্ৰজেক্ট, বৰপেটা ৰোড, জিঃ বৰপেটা (অসম)	জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহ । মঠ-গুৰি নান্ন গুহিত বনবিভাগৰ ডাক বঙলা আছে । দৰ্শনৰ বাবে হাতী ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা আছে আৰু নাৱেৰে বৰণ কৰিবওঁ

(১)

ওমা:
অভয়াবণা

(২)

গঁড়, হাতী, বাঘ, নাহৰ-
ফুটকী বাঘ, শবপত্ৰ, দল
হৰিণ, সুগুৰী পত্ৰ, পানী-
হাঁহ, বেৰা, কোৱেইল বা
চাকৰ, উলুৰ'ৰা ।

(৩)

গুৱাহাটীৰ পৰা টুৰিট
বিভাগৰ গাড়ীৰে যাব
পাৰি ।

(৪)

ডিভিজনেল কৰ্মেট
অফিচৰ, ৱাইল্ড লাইফ
ডিভিজন পো: তেজপুৰ
জি: শোণিতপুৰ
(অসম)

(৫)

দৰ্শনৰ উৎকৃষ্ট সময় ফেব্ৰুৱাৰী,
মাৰ্চ । অভয়াবণৰ অন্তৰ্গত বন-
বিভাগৰ বঙলা আছে । অগ-
তীয়াকৈ পৰব দিলে বনবিভাগে
থকা-বেলাৰ সুবিধা কৰে ।
সাতশিমল নামৰ ওখ চানেকীয়া
ঠাইত পিব দিলে বিলত চৰি
কুনা জানোৱাৰ আৰু নাগবিধৰ চৰাই
দেখিবলৈ পোৱা যায় । হাতীত
যোৱাৰ ব্যৱস্থা আগতীয়াকৈ
কৰিব লাগে ।

নাও-বাহা
অভয়াবণা

গঁড়, বনৰীয়া ম'হ, শৰ পত্ৰ,
নানাবিধৰ বন-নীয়া হাঁহ,
পানী কাউৰী আদি পানীত
চৰা চৰাই ।

নগাঁওপৰগনা বাছেৰে যাব
পাৰি । দূৰত্ৰ প্ৰায় বিশ
কিলোমিটাৰ ।
পো: তেজপুৰ জি: শোণিতপুৰ
(অসম)

ভানুৱানী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ
মাহ দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।
নাও-বাহাত এটা সামান্য বৰ্ণৰ
নন বিভাগৰ জিৰণি যাব আছে ।
হাতীৰে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ হ'লে
আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব
লাগিব ।

পুনৰপানী
অভয়াবণা

হাতী, বনৰীয়া ম'হ, হলৌ
বান্দৰ, ইপীমূৰীয়া হনুৱান ।

বোৰহাট, গোলাঘাট আৰু
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বাছেৰে অহা চাব,
কাৰি আক: ইট

বছৰটোৰ সকলো সময়তে
গবৰ্ণপানীৰ উই দৰ্শনৰ বাবে যাব

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
<p>হাইঠা ডাঙীয় আক অন্যান্য বনবীয়া চবাই। ভদ্রপরি ইয়াব পৰব পানীৰ উইত লৰ্শন-দ্রাবী লোকে শুন বদাব সুবিধা আছে। পাত অভয়াবণা</p>	<p>হাইঠা ডাঙীয় আক অন্যান্য বনবীয়া চবাই। ভদ্রপরি ইয়াব পৰব পানীৰ উইত লৰ্শন-দ্রাবী লোকে শুন বদাব সুবিধা আছে। বনবীয়া ম'হ, হুলবী পহ। উ: লক্ষীমপুৰৰ পনা বাছেবে বা নিজৰ গাড়ী বোপাব কবি যাব পাৰি।</p>	<p>যোজ্য কবিত পাৰি তিভিজল, পো: ভিক্, জি: কাৰি আ., (অনব) তিভিজনেল ফৰেই অকি- চান লক্ষীমপুৰ ভিভিজন পো: লক্ষীমপুৰ (অনব)</p>	<p>পাৰি। কিন্তু হাবিৰ ভিহেটল সোবাই বন্যগামী চাবলৈ হলে খবালি যাহত বোবাই ভাল। পৰব পানীত এটা বনবিভাপন জিবাধ ঘৰ আছে। খবালি হাহব সন্নয়বিনি লৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট বুলি ক'ব পাৰি। লক্ষীমপুৰত থকা চাকিট হাউচ, ডাক বক্তা বা অন্যান্য হোটেলত থকাৰ ব্যবস্থা কৰি ল'ব লাগিব।</p>	<p>খবালি: সন্নয়বিনি লৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত। তেজপুৰত থকা চাকিট হাউচ বা হোটেল লুইত নামৰ হোটেল থকাৰ বাবে উপযুক্ত। জানুৱাৰী, ফেব্রুৱাৰী মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাহ লৰ্শনৰ উপযোগী। লৰ্শনৰ উপযুক্ত সময় খবালি-বন্যগামী উকান বঙৰ। থকা-ফলাৰ বাবে ডি এক অ'ব দৃশ্যত বোগাযোগ</p>
<p>সোণাই-কপাই অভয়াবণা পৰিত্যা অভয়াবণা</p>	<p>গুঁড়, হাতী, গৌড়ৰ, বনবীয়া ম'হ, হবিধ, বাঘ, নাহৰ- কুটকী বাঘ, বনবীয়া বেকুৰী হৰ্ণকিল, হাইঠা পছুয়া আদি চবাই। গুঁড়, গাহৰি, নানাজাতৰ চবাই।</p>	<p>তেজপুৰৰ পৰা বাছেবে যাব পাৰি যদিও ডি এক অ'ব লগত বিশেষ ব্যবস্থা কৰি গলে সুবিধা হয়। গুৱাহাটীৰ পৰা ৬০ কি: মি: দূৰ। বাছেবে যাব পাৰি।</p>	<p>তিভিজনেল ফৰেই অকি- চান ৱাইল্ড লাইফ ডিভি- জন পো: তেজপুৰ জি: পোনিওপুৰ (অনব) ডি এক অ'ব গাণ্ড বা ডি এক অ' ৱাইল্ড লাইফ (তেজপুৰ)</p>	<p>খবালি: সন্নয়বিনি লৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত। তেজপুৰত থকা চাকিট হাউচ বা হোটেল লুইত নামৰ হোটেল থকাৰ বাবে উপযুক্ত। জানুৱাৰী, ফেব্রুৱাৰী মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাহ লৰ্শনৰ উপযোগী। লৰ্শনৰ উপযুক্ত সময় খবালি-বন্যগামী উকান বঙৰ। থকা-ফলাৰ বাবে ডি এক অ'ব দৃশ্যত বোগাযোগ</p>
<p>নাবদাকা অভয়াবণা তথা প্রজাবিত</p>	<p>চেকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহৰকুটকী বাঘ, গোধা কুটকী বাঘ, হিবৰা, সোণো-</p>	<p>অকণ্ঠচল প্রাণেশ ভিত্তপুৰত থকা চাবুৱা বিমান বলৰৰ পৰা এই ঠাইৰ দূৰ ১৭৫ কি:</p>	<p>তিভিজনেল ফৰেই অকি- চান, গান্ধাফা ৱাইল্ড লাইফ চেংগাৰী ডিভি-</p>	<p>লৰ্শনৰ উপযুক্ত সময় খবালি-বন্যগামী উকান বঙৰ। থকা-ফলাৰ বাবে ডি এক অ'ব দৃশ্যত বোগাযোগ</p>

বায়োস্কিফেৰ	বালী বেকুৰী, বনৰীয়া ম'হ	মি:। ডাব পৰা বাছেৰে	ডিভিজন, পো: মিয়াও	কৰিব লাগে।
বিজাৰ্ড অৰ্ধাং	গৌণব, বাং কুকুৰ, বিন্টন,	লিডুলৈ যাব পাৰি।	জি: টিৰাপ (অকণাচল	
পৰ্যাবৰণ	হাতী, খটীয়া হৰিণ, সুগৰী	লিডুৰ পৰা নামদাকালৈ	প্ৰদেশ)	
সংৰক্ষিত	পহু, ভালুক, আৰু নানা	৯০ কিলোমিটাৰ দূৰ।		
বনাঞ্চল	জাতীয় পাহাৰী চৰাই।			
জালি	চেকীয়া পতীয়া আৰু নাহৰ	লীলাবাৰী বিমান বন্দৰ	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি-	নৰেশ্বৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ
অভয়াৰণ্য	ফুটুকী জাতৰ বাঘ, হাতী,	পৰা ২৩০ কিলোমিটাৰ	চাঁব, চেণ্টেল ডিভিজন	সময়ছোৱা দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত
	খটীয়া-হৰিণ, সুগৰী পহু	আৰু মৰকচেলেৰ পৰা	পো: পাছিয়াট, জি: চিয়াং	সময়। থকা-বেলা আৰু দৰ্শনৰ
	অজগৰ সাপ আৰু নানাবিধ	ইয়ালৈ ৪০ কিলোমিটাৰ	(অকণাচল প্ৰদেশ)	বাৰে আগতীয়াটক যোগাযোগ কৰিব
	পানীত চৰি ফুৰা আৰু	দূৰ হ'ব।		লাগে।
	গছত পৰা পক্ষী।			
ইটানপৰ	চেকীয়াপতীয়া আৰু নাহৰ-	লীলাবাৰী বিমান বন্দৰ	ডেপুটি চীফ, হাইল্ড	নৰেশ্বৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল পৰ্যন্ত
অভয়াৰণ্য	ফুটুকী বাঘ, হাতী, গৌণব,	পৰা ইয়ালৈ ৫২ কিলো	লাইক ৱাৰ্ডেন, ইটানপৰ	এইছোৱা সময় দৰ্শনৰ উপযুক্ত।
	শৰপহু, সুগৰী পহু, খটীয়া	মিটাৰ দূৰ। হাৰমতিপৰা	পো: জি: গোৱণশিৰী	থকা-বেলাৰ বাবে আগতীয়াটক
	হৰিণ, ভালুক ইত্যাদি।	নাজ ২৫ কি: মি:	(অকণাচল প্ৰদেশ)	যোগাযোগ কৰা আৱশ্যক।
পাকুই	হাতী, গৌণব, শৰপহু, খটীয়া	ভেজপুৰ পৰা ৬০	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি-	নৰেশ্বৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহ
অভয়াৰণ্য	হৰিণ, সুগৰী পহু, অজগৰ	কিলোমিটাৰ আৰু বালি-	চাব, জেটাৰ্ণ হাইল্ড লাইক	পৰ্যন্ত এই ছোৱা সময়ই দৰ্শনৰ
	সাপ আৰু নানাবিধ	পাৰাৰ পৰা ২৫ কিলোমিটাৰ	ডিভিজন, পো: ভালুক দু:	বাৰে প্ৰস্তু। আগতীয়াটক
	পৰ্জীয়া চৰাই।	দূৰত অৱস্থিত।	জি: কাকৈ (অকণাচল	যোগাযোগ কৰা ভাল। ভালুক
			প্ৰদেশ)	

(১)

পাকুই

অভয়াবণা

(২)

৩)

(৪)

(৫)

পুত্ৰ অসমৰ পৰ্যটন বিভাগে এটা
অনুষ্ঠানকালীন নিবাস নিৰ্মাণ কৰি
বাৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ
দূৰত পৰা টিপি নামৰ ঠাইত
অনুষ্ঠানকালীন বিভাগৰ এটা ভিৰি
ভৱন আছে।

নাগালেণ্ড

ইন্টাৰ্ণা

অভয়াবণা

হাতী, গোধী, গাহৰি,
চৈকীয়াপতীয়া বাঘ, নাহব-
কুটুকী বাঘ, গোয়া ফুটুকী
বাঘ, কেমটাই পহ, আৰু
নাগাবনৰ সৰীফপ গোষ্ঠীৰ
গ্ৰাণী আৰু পক্ষী কুল
জীৱ।

ডিমাপুৰ বিমান বন্দৰ
আৰু ডিমাপুৰ বেলবে
ষ্টেচনৰ পৰা পাড়ীৰে
যাব পাৰি।
বাইল্ডে গাইফ প্ৰিজাৰ্টে-
চন অফিচৰ, বাইল্ডে
লাইফ প্ৰিজাৰ্টেচন ডিভিজন
পো: ডিমাপুৰ ভি: কোহিমা
(নাগালেণ্ড)

খৰা বেল। আৰু চৰ্মাৰ সুবিধাৰ
নানে আন্তৰ্জাতিক যোগাযোগ কৰিব
লগে।

পুলি বস্বে

অভয়াবণা

গোধী, দেও-ছাগলী, খটীয়া
হৰিণ, সুগৰী-পহ, বনৰীয়া
গাহৰি, বন-সেকুৰী, কেৰ্কে-
টুয়া, বাঘৰ, কুগোপান,
হাইঠা, পৰ্শুমা, ভাটো
ইত্যাদি।

কোহিমাৰ নিচেই ওচৰতে ডিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচৰ, কোহিমা ডিভি-
জন, ডিমাপুৰ (নাগালেণ্ড)
বন্দৰ আৰু বেলবে ষ্টে-
চনৰ পৰা ট্ৰেনপট বাছ
কিছা টেক্সিৰে যাব পাৰি।

পৰ্যটক নিবাস কোহিমা আৰু
অতিথি শালা কোহিমাৰ
বাবে আন্তৰ্জাতিক যোগাযোগ কৰা
আৱশ্যক।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
কেইবোল লামজাও বাহীৰ উপায়	ব্ৰোও-এনট্ৰাৰ্ড বনুশিখীয়া হৰিণ, সেও ছাগলী আৰু নানাবিধৰ পানীত চৰা চৰাই।	ইন্ ফাল বিমান বন্দৰ কিয়া ইমফালৰ পৰা যাব পাৰি।	টাক হাইল্ড লাইক হাৰ্ডেন, পো: ইম ফাল, জি: চেংনুল (মণিপুৰ)	পকা-মেলা আৰু দশমী সুবিধা বাবে আগভূমিক নোপায়োগ কৰা ভাৰ।
চিহ্ন অভয়াবগ্য	হাতী, বাঘ, নাহৰ ফুটী বাঘ গোৰাফুটী কী বাঘ, গৌণ, ব, সোণেৰালী বেকুৰী, বাং কুকুৰ নানাবিধৰ বলীয়া চৰাই। চিহ্নৰ গুহা আৰু তাত সচৰাচৰ বাস কৰা বাদুলিবোৰ এই অভয়াবগ্যৰ অন্যতম আকৰ্ষণ।	মোৰালয় গুৱাহাটী বিমান বন্দৰ বা গুৱাহাটীৰ পৰা তুৰা টাইনটেল বাছেৰে যাব পাৰি। তুৰাৰ পৰা চিহ্নটেল আকৌ বাছেৰে যাব লাগিব।	(১) কনজাৰ্ডটন অৱ ফৰেট টাক হাইল্ড লাইক হাৰ্ডেন, পো: শিল্প, মেৰালয়। (২) ভিত্তিজনেল ফৰেট অকিটল হাইল্ড লাইক ভিত্তিজন পো: শিল্প (মেৰালয়)	পৰ্বাণ্ণিৰ সাহ কেইটা দৰ্শনৰ উপ- যোগী গন্য। পকা-মেলাৰ সুবিধা আৰু দৰ্শনৰ বাবে ই- ভূমিক যোগাযোগ কৰা নিতান্ত আৱশ্যক। তুৰাৰ চাকিট হাইল্ড আৰু বাঘ-গৰাও পকা টাক বঙলগত পকা-মেলাৰ সুবিধা আছে। তুৰাৰ তুৰাৰপৰা ভিত্তিজনো বনবিভাগে এটা দল বহুলা গিৰীশ কৰি লৈছে।
গংখাইলান্ অভয়াবগ্য	হাতী, চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ-ফুটী বাঘ, দলহাবিণ, সুগুৰী পহু, হলৌ-বান্দৰ, ভহাৰাল ভাতীয়া শালী, বাম- শৰ, ভাংৰ কেপ্‌কটুৱা, লাল ভাতীয়া বলীয়া চৰাই।	গুৱাহাটীৰ বৰফাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা প্ৰায় ৮০ কিলোমিটাৰ আৰু গুৱাহাটী বেনৰে হৈচেনৰ পৰা ৬৫ কিলোমিটাৰ মান দূৰত অৱস্থিত।	ভিত্তিজনেল ফৰেট অকি- টল, হাইল্ড লাইক ভিত্তি- জন মেৰালয়, শিল্প আৰু কনজাৰ্ডটন অৱ ফৰেট হাইল্ড লাইক চাকিটল (মেৰালয় শিল্প)	ভিত্তিজন নাহৰ পৰা মেৰালয়, ভ- পৰ্বত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট গম্য।

কলকাত্ত বাহু

বাহীয়া
উদ্যান

হাতী, গৌড়, বনৰীয়া বাহু
হিমানয়ৰ ক'না ডানুক,
হেৰাও বা হেও ছাগলী, বাঃ
ক'বু, গোৰা-কুটুৰী বাহু,
সোণোৱালী বেকুৰী, নত
বেকুৰী, বন-কেকুৰী
হলৌ ৰালৰ, টপী যুৰীয়া
হনুৱান, সেওডৰিক ইত্যাদি

বহাগেউ গৰ্জ নামৰ ডু-

পৃষ্ঠৰ বহু ডালিলৈকে দেখিব
পৰা বিচিত্ৰ পুতুতুনি আৰু
নানাবিধৰ দুঃখপ্ৰাপ্য বৃক্ষৰাজি

তথা উদ্ভিদ সমূহ এই

বাহীয়া উদ্যানৰ অনা-
তৰ অপূৰ্ব আকৰ্ষণ। তদু-
পৰি কলকাত্ত বাহু নামৰ বিখ্যাত
মানভূমি আছে সেই ডোৰৰ
ঠায়েদি বৃত্তকৰ প্ৰেতাত্মা স্বৰ্গ
লৈ যায় বুলি গাৰো জন-
জাতীয় লোকসকলে বিশ্বাস
কৰে আৰু সেই অঞ্চলত
কোনো প্ৰকাৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য
কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ৈ।

বনজাৰঙেটোৰ অৰ
কৰেট, হাইল্ড লাইক
চাৰ্কোণ (সেৰালৰ) শিলঃ
আৰু ডিভিছনেল কৰেট
অকিচাৰ, হাইল্ড লাইক
ডিভিছন, (সেৰালৰ) শিলঃ

ডিভেচনৰ হাৰৰ পৰা কেবুৰাবী,
নাছ পৰ্বত এই অভয়াৰণ্য
তথা নেচনেল পাৰ্কৰ লৌলৰ উপ-
ভোগ কৰা আৰু বন্যপ্ৰাণী তথা
অতুলনীয় চিহ্নিত সঙ্গৰ দৰ্শন আৰু
অধ্যয়ন কৰাৰ উপায়ঃ সদয়
বুলি ক'ব লাগিব। বাৰিষাৰ সময়
ছোৱাত এই ঠাইলৈ যোৱা মান।

(২)

বং আপু গাই-
বোঁ চেৰো-
হাবী বা
বান্দৰ
অভয়াবণ্য
(প্রস্তাবিত)

হলো বান্দৰ, দু পীমুৰীয়া হনু-
মান, সাধাৰণ বিধৰ বান্দৰ,
হাতী, বাঘ, নাহৰ-কুটুকী
বাঘ, গোৰা-কুটুকী বাঘ,
গোপোহানী প্ৰেক্ষী আৰু
নাগ ভাতীয়া পাহাৰী বগ-
নীয়া পক্ষীকুলৰ গ্ৰাণী ।

(৩)

গুৱাহাটী-দাৰ্জা-ডাইনা-ডুবি
দাকগিৰি পথেদি এই
ঠাইলৈ গভীৰে যাব পাৰি ।
বং আপু প্রস্তাবিত অভয়া-
বণ্যখনৰ নিচেই ওচৰতে
দৰ্শনগিৰি বেজ অকি-
চটো আছে । বৰিগিৰি
পৰা গায় ও কিলোনিচাৰ
বাঁতৰত জিনাব সৰ
উইনিগান নগৰ নামৰ ঠাই
আছে । গুৱাহাটীৰ পৰা
ইয়ালৈ বাছেৰে যাব পাৰি ।

(৪)

কনজাৰভেটৰ অৰ ফৰেট,
হাইল্ড নাইক চাৰ্কোল,
(সেৱানয়) শ্মিলং
বা ডিভিজনাল ফৰেট
অকিচাৰ, হাইল্ড নাইক
ডিভিজন, (সেৱানয়)
শ্মিলং ।

(৫)

বছৰৰ যেই কোনো সময়ত বং-
বিগিৰি পৰ্বত যাব পাৰি । পিছে
অভয়াবণ্য দৰ্শনৰ বাবে ধৰালি
হাীয়া তালৈ যাব লাগে ।

ডিফ্ৰহিল ৱাৰ্ড
চেফ্ৰোৱাৰী বা
পক্ষীবিহাৰ অভয়াবণ্য
(প্রস্তাবিত)

নাগা জাতীয় পাহাৰী আৰু
ভৈয়নীয়া পক্ষী কুলৰ গ্ৰাণী ।

গুৱাহাটীৰ পৰা ফুল-
বাৰীয়েদি তুবানৈ
বাওঁতে বাটতে হৈলভা
নামৰ সংৰক্ষিত বনভূমিত
এই প্রস্তাবিত অভয়াবণ্য
দৰ্শন কৰিব পাৰি ।

কনজাৰভেটৰ অৰ ফৰেট,
হাইল্ড নাইক চাৰ্কোল
সেৱানয়, শ্মিলং আৰু
ডিভিজনাল ফৰেট অকি-
চাৰ, হাইল্ড নাইক
ডিভিজন (সেৱানয়) শ্মিলং ।

বছৰৰ যেই কোনো সময়ত
যাব পাৰে যদিও ধৰালি হাীয়া
সময়ৰ দৰ্শনৰ বাবে অধিক
উপযুক্ত ।

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

তুৰা-নক্‌বেক বীজ বায়ো- ক্ষিৰেৰ বিজাতি বা পৰ্য্যাবৰণ বনাঞ্চল। (প্ৰস্তাৱিত চাইট্ৰাচজিন চেঞ্চোৱাৰী)	সেখালয়ৰ গানোপাহাৰ পূব আৰু গানোপাহাৰ পশ্চিম এই জিলা দুখনত পূৰ্বা- পশ্চিমটোক বিস্তৃতি লাভ কৰি পকা তুৰা নক্‌বেক নামৰ ওপৰ পৰ্বতমালাৰ পৰা সোম শুৰী, ভোপাই নিতাই আৰু গানন নদী প্ৰবাহমান হৈ আছে। এই পাহাৰত গজা বনৰীয়া পুৰুষটোৱাক গানোপাহাৰকৈ "মোনাং নাৰেং" বা "ভুত পিচাচন কমালা" বুলি কয়। বিশেষজ্ঞসকলে অতিমত প্ৰকাশ কৰে যে এইবিধ বনৰীয়া গছৰ লগত বাৰীত বোৱা সৰুগৰাৰ কলম ধৰি গছ গছৰ পাৰিলে সেই গছ নিৰোগী আৰু দীৰ্ঘ জীৱি হ'ব।	ইয়াৰ বাহিৰেও এই পৰ্বত- মালাত বহুতো প্ৰকাৰৰ আপকুপীয়া বনৰীয়া উদ্ভিদ আৰু বনাপ্ৰাণী আছে। তাৰ ভিতৰত "বাক-চাল" নামৰ সৰু আকাৰৰ এবিধ বনৰীয়া গাছৰি দ্বিতীয় প্ৰাণীৰ নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ- যোগ্য। তদুপৰি পিগুনি এলিকেণ্ট নামৰ এবিধ সৰু আকাৰৰ বনৰীয়া হাতী ইয়াত বাস কৰাৰ কথা জনা যায়। তুৰাৰ পৰা গৈ এই পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য উপ- ভোগ কৰিব পাৰি।	কগজাৰডোৰ অৱ ফৰেট, হাইল্ড লাইক চাৰ্কেল, মৈথালয়, শিলং আৰু ডিভিজনেল ফৰেট অফিচাৰ, হাইল্ড লাইক ডিভিজন (মৈথালয়) শিলং।	এই দুৰ্গম পৰ্বতমালাৰ ওপৰ অঞ্চল দৰ্শন কৰিবৰ বাবে খৰালি মহীয়া সময়খিনি উৎকৃষ্ট।
--	---	--	---	--

(২) ডাকমা অত্যাধাণ	(২) চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহদ- ফটুকী বাঘ, নতানেকবী বাঘ, হাতী, শব্দপুহ, নুগবী পহ, হিমালয়ৰ ভালুক, গৌড়ৰ, বাং ককন, অজগৰি সাপ, সেঙ- ডাৰিক ইত্যাদি।	(২) আইজানৰ পৰা ১৫০ কিলোমিটাৰ আৰু পিন- চৰৰ পৰা ৩৫০ কিলো- মিটাৰ দূৰত এই অত্যা- ধাণখন প্রতিষ্ঠিত।	(৩) ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, জ. ইজাল ডিভিজন, পো: আইজাল (নিজোৰাম)।	(৫) নবেৰৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ এইছোৱা সময় অত্যাধাণ দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল। আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি গোৱা ভাল।
অখিয়ান হীপ অভয়াধাণ ২৪-পৰগণা)	বন্যীয়া গাহৰি, ফটুকী হৰিণ, মৰিয়াল, ডাকফিল, অৰু নানা জাতীয় পানীত চৰি কৰা পক্ষী।	পশ্চিমবঙ্গ দুই দশ বিমান বন্দৰ পৰা ১৭১ কিলোমিটাৰ আৰু ডায়েনগ হাৰবাৰ পৰা ৮৮ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, ২৪-পৰগণা ডিভিজন, আলিপুর, কলিকতা-২৭ (পশ্চিম বঙ্গ)	ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ দৰ্শনৰ উপযুক্ত।
দ্বীপ ২৪ পৰগণা)	চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, ফটুকী হৰিণ আৰু নাগবিহল	দুই দশ বিমান বন্দৰ পৰা ২৫৭ কিলোমিটাৰ আৰু ডায়েনগ হাৰবাৰ পৰা ১৭৪ কিলোমিটাৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, ২৪ পৰগণা ডিভি- জন, আলিপুর, কলি- কতা-২৭ (পশ্চিম বঙ্গ)	ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰু- ৱাৰী মাহ দৰ্শনৰ উপযুক্ত।
চাভুনা খালি অভয়াধাণ (২৪-পৰগণা)	চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, বন- বীয়া গাহৰি, ফটুকী-হৰিণ শামুক ভড়া, পানী কাউৰী, দৈকনা, মৰিয়াল, বগা আই বিচ, বেংগীয়া কণামচৰী, সেউজীয়া ইটা গুৰীয়া চৰাই, বেৰা ইত্যাদি।	দুই দশ বিমান বন্দৰ পৰা ১৩০ কিলোমিটাৰ আৰু ইষ্টাৰ্ণ বেলেৱৰ প'ষ্ট কেনিং ষ্টেচনৰ পৰা ৬৫ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত।	কিন্ড ডিবেক্টৰ, স্কুল বন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, গ'চাভ, ২৪-পৰগণা (পশ্চিম বঙ্গ)	জুলাই মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিচেম্বৰ মাহলৈ এই গোটেই ছোৱা সময় দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল।

(১) পক্ষৰা জন-পাইগুৰি অভয়াৰণ্য	(২) হাতী, গড়, বাঘ, গৌড়, শৰপহ, খটীয়া হৰিণ, বন-বীয়া-গাহৰি আৰু নানাবিধ পক্ষী।	(৩) বাগ্‌দুপৰা বিমানবন্দৰ পৰা ৮৫ কিলোমিটাৰ আৰু চালতা বেলৰে ষ্টেচনৰ পৰা ১৩ কিঃ মিঃ দূৰত অৱস্থিত।	(৪) ভিভিঅনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, জনপাইগুৰি ডিভি-জন, পোঃ জনপাইগুৰি জিঃ জনপাইগুৰি (পশ্চিম বঙ্গ)	(৫) অষ্টোবৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈ এই পোটেই ছোৱা সময় এইখন অভয়াৰণ্য দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল।
চাৰামাৰি অভয়াৰণ্য	হাতী, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, গৌড়, শৰপহ, সুগৰী পহ, বনবীয়া গাহৰি আৰু নানা ধৰণৰ পক্ষী।	বাগ্‌দুপৰা বিমান বন্দৰৰ পৰা ৭৮ কিলোমিটাৰ আৰু চালতা ষ্টেচনৰ পৰা ৬ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত। নাপাকটা ষ্টেচনৰ পৰা ৬ কিঃ মিঃ দূৰ।	ভিভিঅনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, জনপাইগুৰি ডিভিজন, পোঃ জনপাইগুৰি, জিঃ জনপাইগুৰি (পশ্চিম বঙ্গ)	অষ্টোবৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈ দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময়।
জলুদাপাৰা অভয়াৰণ্য	হাতী, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, নাহৰ-ফুটী বাঘ, গঁড়, গৌড়, বনবীয়া গাহৰি, খটীয়া হৰিণ, সুগৰী পহ, আৰু নানা জাতীয় বনবীয়া চৰাই।	হাঁচিমৰা ষ্টেচনৰ পৰা ৫ কিঃ মিঃ আৰু মাল-বিহাট ষ্টেচনৰ পৰা ১ কিঃ মিঃ দূৰ।	ভিভিঅনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, কোছবিহাৰ ডিভি-জন পোঃ কোছবিহাৰ, জিঃ কোছবিহাৰ (পশ্চিম বঙ্গ)	ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মে' মাহলৈ দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময়।
মহানদী অভয়াৰণ্য	বাঘ, হাতী, গৌড়, খটীয়া হৰিণ, বনবীয়া গাহৰি, হালো বাঘৰ আৰু নানা বিধৰ পক্ষী।	বাগ্‌দুপৰা বিমান বন্দৰৰ পৰা ২৪ কিলোমিটাৰ আৰু শিলিগুৰি বেলৰে ষ্টেচনৰ পৰা ১২ কিঃ মিঃ দূৰ।	ভিভিঅনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, কাটিং ডিভিজন, পোঃ মাতুহিল জিঃ দাৰ্জিলিং (পশ্চিম বঙ্গ)	নবেম্বৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈ দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময়।

মিটাৰ নিলপত অৱস্থিত।

কল যন্তরাবণ্য	হেবাও বা শেঙ্‌হাপলী, হিমা- নয়ৰ ক'লা ভালুক, গড়াল, সুগৰী পহু আৰু নাঁনাবিধৰ পৰ্বতীয়া চৰাই।	বাগ্‌দগৰা বিমান বন্দৰৰ পৰা ৪৫ কিলোমিটাৰ আৰু যোন ষ্টেচনৰ পৰা ২ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত।	ডিভিজনেল যেনেজাৰ, দাৰ্জিলিং শ্বেটিয়াল ডিভিজন, পোঃ দাৰ্জিলিং জিঃ দাৰ্জিলিং (পশ্চিম বঙ্গ)	এপ্ৰিল, মেই, জুন নবেম্বৰ মাহৰ দৰ্শনৰ বাবে জনকুল সময়।	আৰু সপ্তাহ জনকুল সময়।
দিয়েৰ পাৰ্ক ব্যৱতপুৰ (শাস্তিনিকেতন)	দিয়েৰ পাৰ্ক ব্যৱতপুৰ বুকুগাৰ আৰু ফুটুকী হৰিণ।	দৰম্‌ বিমান বন্দৰৰ পৰা ১৬৫ কিলোমিটাৰ নিল- গত অৱস্থিত। বলপুট বেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ ৩ কিলোমিটাৰ।	ডিভিজনেল যেনেজাৰ, বীৰভূম ডিভিজন, পোঃ চুৰি, জিঃ বীৰভূম (পশ্চিম বঙ্গ)	জুন, অক্টোবৰ সকলো সময় জনকুল।	দৰ্শনৰ সময় জনকুল।
বেথুৱাবাৰী দিয়েৰ পাৰ্ক	ফুটুকী হৰিণ, শৰ পহু, সুগৰী পহু।	দম্‌ বিমান বন্দৰৰ পৰা ১৪৪ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত। বেথুৱা বাৰী বেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ ২ কিলোমিটাৰ।	ডিভিজনেল যেনেজাৰ, চেন্দ্ৰনৈল ডিভিজন, পোঃ বৃক্ষ নগৰ, জিঃ নৰীয়া (পশ্চিম বঙ্গ)	জুন, অক্টোবৰ সকলো সময় জনকুল।	দৰ্শনৰ সময় জনকুল।
পৰমানন্দ দিয়েৰ পাৰ্ক	ফুটুকী-হৰিণ আৰু নিপান হৰিণ।	দম্‌ বিমান বন্দৰৰ পৰা ১৩০ কিলোমিটাৰ আৰু বনন যন্তলা আৰাধ্যাচাৰী ষ্টেচনৰ পৰা ৩৬ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত।	ডিভিজনেল যেনেজাৰ, চেন্দ্ৰনৈল ডিভিজন, পোঃ বৃক্ষনগৰ, জিঃ নৰীয়া (পশ্চিম বঙ্গ)	জুন, অক্টোবৰ সকলো সময় জনকুল।	দৰ্শনৰ সময় জনকুল।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
সুন্দৰ-বন টাইগাৰ বিজাৰ্চ	ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, বেলেগ বেলেগ আতৰ হৰিণ, ঘৰিয়াল আৰু ডল্‌ফিন ।	দন্দু বিমান বন্দৰৰ পৰা ১২ কিলোমিটাৰ দূৰ ।	কিল্ড ডিবেটৰ, সুন্দৰ বন টাইগাৰ বিজাৰ্চ । গোচাৰা, জি: ২৪-পৰ- গণা (পশ্চিম বঙ্গ)	চেণ্ডেৰৰ মাহৰ পৰা বৈই মাহলৈ দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময় ।
হাজাৰিবাগ অভয়াৰণ্য	ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, মাহৰ- ফুটুকী বাঘ, ফুটুকী হৰিণ, নীলগাহি, বনবীয়া গাহৰি, বন- বোলা আৰু ম'ৰা চৰাই ।	বিহাৰ	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, পশ্চিম হাজাৰিবাগ ডিভিজন । পো: হাজা- ৰিবাগ জি: হাজাৰিবাগ (বিহাৰ) ।	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহলৈকে এই গোটেই সময় দৰ্শনৰ উপযুক্ত ।
ভীম-বন অভয়াৰণ্য	ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, মাহৰ- ফুটুকী বাঘ, ফুটুকী হৰিণ, মনবীয়া গাহৰি, কুকুৰ নেচীয়া বাঘ আৰু নানানিধৰ পানীত চৰি ফুৰা চৰাই ।	পাটনা বিমান বন্দৰৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ নিল গত অৱস্থিত । জামুই বেলত্ৰে ষ্টেচনৰ পৰা ২০ কিলোমিটাৰ দূৰ ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, যুদ্ধেৰ ডিভিজন, পো: যুদ্ধেৰ জি: যুদ্ধেৰ (বিহাৰ)	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ এই গোটেইছোৱা সময় বাবে অনুকূল ।
মহাদুৱাৰ অভয়াৰণ্য	ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, মাহৰ- ফুটুকী বাঘ, শৰ পহ, ফুটুকী হৰিণ, সুগৰী পহ, বনবীয়া গাহৰি, কুকুৰ নেচীয়া বাঘ ।	বাঁচিৰ পৰা ২৪০ কিলো- মিটাৰ আৰু চিপাদুহাৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৮০ কিলো মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, ডালচন্ গঞ্জ ডিভিজন । পো: ডাল- চন্ গঞ্জ জি: ডালচনগঞ্জ (বিহাৰ)	নবেম্বৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পর্যন্ত এই গোটেই ছোৱা সময় দৰ্শনৰ উপযুক্ত ।

(১)

ভালুয়া অভয়াবণ্য

(২)

হাতী, নাহব কুটুকী বাঘ,
বনবীয়া গাহবি, নিপনি হবিণ,
সুগৰী পহ, সুখ ভালুক বা
মাটি ভালুক ।

পানানো অভয়াবণ্য

হাতী, নাহব-কুটুকী বাঘ,
পৌণ্ডব, বনবীয়া গাহবি,
কুটুকী হবিণ, শবপহ, সুগৰী
পহ আক ব'বা চবাই ।

পৌণ্ডব যুধ
অভয়াবণ্য

চুকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহব
কুটুকী বাঘ, কুটুকী হবিণ,
সুগৰী পহ আক
ব'বা চবাই ।

বানবীয়া অভয়াবণ্য

চুকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব-
কুটুকী বাঘ, সুগৰী পহ,
আক ব'বা চবাই ।

চপুসানি
অভয়াবণ্য

নাগা কিষ বনবীয়া হাঁহ ।

(৩)

বাঁচিৰ প'ৰা ১১০
কিলোমিটাৰ আক আম-
ছেলপুৰ পৰা ১৬ কিলো-
মিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ।
বাঁচিৰপৰা ১৮০ কিলো-
মিটাৰ আক চিপা-
দুহাৰ পৰা ৮০ কিলো-
মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।

(৪)

ভিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি-
চাৰ, গালভুৰ ভিভিজন,
পো: গালভুৰ, জি:
সিংভুৰ (বিহাৰ)
ফিল্ড ডিবেক্টৰ, টাইগাৰ
বিজাৰ্ড, পানানো, জি:
ডালটন-গঞ্জ (বিহাৰ) ।

(৫)

অষ্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ
এই পোটেইছোৱা সময় দৰ্শনৰ
অনুকূল ।

বছৰৰ সকলো সময় দৰ্শনৰ
অনুকূল ।

চপুসানি

অষ্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ
এই পোটেইছোৱা সময় দৰ্শনৰ
অনুকূল ।

অষ্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন
মাহলৈ এই পোটেইছোৱা সময়
দৰ্শনৰ অনুকূল ।

অষ্টোবৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ
দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময় ।

(২)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ল্লাংগাং অভয়াৰণ্য	চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ,, ভালুক, ফুটুকী হৰিণ, শৰপহ ইত্যাদি ।	বাঁচিৰ পৰা ১৫০ কিলোমিটাৰ আৰু গয়াৰ পৰা ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, ছাত্ৰা ডিভিজন, ছাত্ৰা জিঃ হাজাৰিবাগ (বিহাৰ) ।	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।
লাগাউল, যদনপুৰ আৰু উদয়পুৰ অভয়াৰণ্য	চেকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহৰ- ফুটুকী বাঘ, সুৰ ভালুক, বুৰুৰ নেটীয়া বাঘ, ফুটুকী হৰিণ, শৰপহ ইত্যাদি ।	পাটনাৰ পৰা ১৫০ কিলোমিটাৰ আৰু বাগাহাৰ পৰা ৮ কিলোমিটাৰ।	ডেপুটি ডিবেঞ্চৰ, বিহাৰ নাতিয়ন ফৰেষ্ট ডেভে- লপমেণ্ট কৰ্পৰেচন্ জিঃ চাম্পাৰন (বিহাৰ) ।	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময়।
কাইমূৰ অভয়াৰণ্য	চেকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহৰ- ফুটুকী বাঘ, শৰ পহ, নীল- গাই, চিল্ কাৰা আৰু হৰিয়াল।	পাটনা বিমান বন্দৰৰ পৰা ১৯০ কিলোমিটাৰ আৰু চাচাবান্ বেলেৰে ষ্টেচনৰ পৰা ৪০ কিলোমিটাৰ ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, চাহাবাদ ডিভি- জন পোঃ চাহাবাদ, জিঃ বহটাহ (বিহাৰ) ।	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।
বানিয়া বুক অভয়াৰণ্য	হাতী, চেকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, শৰ পহ, বনৰীয়া গাহৰি ইত্যাদি।	বাঁচিৰ পৰা ১৫০ কিলোমিটাৰ আৰু চনুৱা বেলেৰে ষ্টেচনৰ পৰা, ১৫ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, কলহান্ ডিভিজন পোঃ কলহান জিঃ সিংভূ (বিহাৰ) ।	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।

(১) চাটু অভয়াবণ্য

(২)

হাতী, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ,
নাহর-কটুকী বাঘ, শব-পহ,
বনবীয়া গাহবি ইত্যাদি ।

কর্ণমালা অভয়াবণ্য

ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, নাহর-
কটুকী বাঘ, শূণ্ড তালুক, শবপহ,
কটুকী হরিণ, চাৰিনিভীয়া
এন্টেলপ ।

চাটুকুড়িয়া গৰ্জ,
অভয়াবণ্য

বৰিয়াল আৰু বগব, ঢেকীয়া,
পতীয়া বাঘ, নাহর-কটুকী
বাঘ, গৌড়, বন-সেকুৰী,
বাটেল, তালুক, শবপহ, কটুকী
হরিণ, নীলগাই, চাৰিনিভীয়া
এন্টেলপ, গানবিধ বনবীয়া
চৰাই ।

ডিচাৰ কালিকা
অভয়াবণ্য

লুপীয়া পশীৰ ঘদিয়াল, নাহর-
কটুকী বাঘ, হায়েনা, বন-
বোশা, লতা সেকুৰী,
বনবীয়া গাহবি, কটুকী হরিণ ।

(৩)

বাঁচিৰ পৰা ৭০ কিলো-
মিটাৰ আৰু চাকধৰপুৰ
ষ্টেচনৰ পৰা ৩৫
কিলোমিটাৰ ।
পাটনাৰ পৰা ২৫০
কিলোমিটাৰ আৰু
কলনামা ষ্টেচনৰ পৰা
৮ কিলোমিটাৰ ।

উৰিষ্যা

ভুবনেশ্বৰ পৰা ২৫০
কিলোমিটাৰ আৰু নাৰা-
মণ্ডালি ষ্টেচনৰ পৰা
৮০ কিলোমিটাৰ
আঁতৰত অৱস্থিত ।

(৪)

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, পৰাহাটি ডিভি-
জন, পো: পৰাহাটি, জি:
সিংভূম (বিহাৰ)
ডিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ কলনামা ডিভি-
জন, পো: কলনামা, জি:
হাছবিবাগ (বিহাৰ)

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ আৰু হাইন্ড
নাইক হাৰ্ডেন, আকুল,
নায়াপুত্ৰ, আৰ্টিগে. কুন্সাবী,
বাইবকন, জি: বেনকাল
পুণ্ডী, কটক কুন্সাবী
(উৰিষ্যা) ।

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি-
অফিচাৰ, আৰ্টিগে ডিভি-
জন, জি: কটক (উৰিষ্যা) ।

(৫)

অক্টোবৰ নাহৰ পৰা জুন নাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল
সময় ।

অক্টোবৰ নাহৰ পৰা জুন নাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত
সময় ।

বছৰৰ প্ৰায় সকলো সময় দৰ্শনৰ
বাৰে অনুকূল ।

খৰি নহীয়াৰ সময়পৰি দৰ্শনৰ
বাৰে বেছি উপযুক্ত ।

(১)

(২)

কপাহ, পানীতাই, সাপৰত থকা
কাছ, অজপৰ সাপ, কেটীলাপ,
বতীন কবচৌকোলা, সাধাবণ
কবচৌকোলা, শাবুক ভঙা, বগা
আইবিচ্, ক'না আইবিচ্
ইত্যাদি ইত্যাদি ।

চিন্কা অভয়াবণ্য

বৃক্ষাৰ, ফুটুকী-হৰিণ, বগা
আৰু ক'না কৰণীয়া আইবিচ্
কঠল বা ক্ৰেইন, পানীকাউৰী
মপিয়ৰি, সৈকলা, কেৰিংগো
আৰু বেৰা ।

ভূৰনেশ্বৰ পৰা ২০০
কিলোমিটাৰ আৰু বালি-
গাওঁ ষ্টেচনৰ নিচেই
কাষতে অৱস্থিত ।

কুলদিয়া অভয়াবণ্য

হাতী, গৌণ্ডৰ, ফুটুকী হৰিণ,
শৰপহ ।

ভূৰনেশ্বৰ পৰা ২৫০
কিলোমিটাৰ আৰু বালিচুৰ
ষ্টেচনৰ পৰা ৭০ কিলো-
মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।

কাৰলাপাট
অভয়াবণ্য

চেঁকীয়াপতীয়া বাঘ, নাহব-
ফুটুকী বাঘ, গৌণ্ডৰ, শহাপহ,
কিলোমিটাৰ দূৰ আৰু

ভূৰনেশ্বৰ পৰা ৪০০

(৩)

(৪)

(৫)

ভিত্তিজন্মেল ফৰেষ্ট অফি-
চাৰ আৰু হাইল্ড লাইক
ৱাৰ্ডেন, লক্ষ্মণ গুণাৰ
ভাণ্ডাৰ-মগৰপুৰী ভিত্তিজন্ম,
পো: ৰোৰদা, জি:
গজামপুৰী (উদ্যোগ)

ভিত্তিজন্মেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ আৰু হাইল্ড
লাইক ৱাৰ্ডেন, বাৰি-
পাডা ভিত্তিজন্ম, পো:
বাৰিপাডা, জি: বালিচুৰ
(উদ্যোগ)

খৰালি মহীয়া দৰ্শনৰ বাবে
উপযুক্ত ।

ভিত্তিজন্মেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ আৰু হাইল্ড লাইক
উপযুক্ত ।

খৰালি মহীয়া দৰ্শনৰ বাবে

ফুটুকী হৰিণ ।

সগুৰুৰ অভয়াৰণ্য

হাতী, পৌণ্ডৰ, নাহব-ফুটুকী
বাঘ, শৰপহ, ফুটুকী-হৰিণ ।

কাপিলচ অভয়াৰণ্য

হাতী, পৌণ্ডৰ, নাহব-ফুটুকী
বাঘ, শৰপহ, ফুটুকী-হৰিণ ।

উগাকুঠ অভয়াৰণ্য

হাতী, পৌণ্ডৰ, ঢেঁকীয়া-পতীয়া
বাঘ, নাহব-ফুটুকী বাঘ, শৰ
পহ, ফুটুকী-হৰিণ, সূপনী
পহ ।

চিদ্ৰিল্পাল
অভয়াৰণ্য

ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, হাতী,
পৌণ্ডৰ, নাহব-ফুটুকী বাঘ,
ফুটুকী হৰিণ, সিঁপসিঁপ-হৰিণ,
বাকশৰ আৰু ফৰ ।

কাচিঙ্গা ষ্টেচনৰ পৰা
৮০ কিলোমিটাৰ ।

ভুবনেশ্বৰৰ পৰা ১২০
কিলোমিটাৰ আঁতৰত
অৱস্থিত । বেনকানাল
ষ্টেচনৰ পৰা ২০ কিলো-
মিটাৰ ।

ভুবনেশ্বৰৰ পৰা ১৫০
কিলোমিটাৰ আৰু বেন-
কানাল ষ্টেচনৰ পৰা ৫০
কিলোমিটাৰ নিলগত
অৱস্থিত ।

ভুবনেশ্বৰৰ পৰা ৪০০
কিলোমিটাৰ আঁতৰত
আৰু চহলপুৰ ষ্টেচনৰ
পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ
নিলগত অৱস্থিত ।

ভুবনেশ্বৰৰ পৰা ৩৫০
কিলোমিটাৰ নিলগত
আৰু বাৰিপাঙ্গা ষ্টেচনৰ
পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ
আঁতৰত অৱস্থিত ।

ৱাৰ্ডেন, কানাহান্সি
ভিভিজন, পো: ডৱানী-
পাটনা, জি: কানাহান্সি
(উৰিষ্যা)

ভিভিজনেন ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, বেনকানাল
ভিভিজন, পো: বেনকা-
নাল জি: বেনকানাল
(উৰিষ্যা)

ভিভিজনেন ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, বেনকানাল
ভিভিজন, পো: বেনকানাল
জি: বেনকানাল (উৰিষ্যা)

ভিভিজনেন ফৰেষ্ট
অফিচাৰ আৰু ৱাইল্ড
লাইফ ৱাৰ্ডেন, বাঘা
ভিভিজন, জি: চহলপুৰ
(উৰিষ্যা)

ভিভিজনেন ফৰেষ্ট
অফিচাৰ আৰু ৱাইল্ড
লাইফ ৱাৰ্ডেন, বাৰিপাঙ্গা,
কাৰাজিয়া ভিভিজন, জি:
ময়ূৰভদ্ৰ (উৰিষ্যা)

খৰালি মহীয়া দৰ্শনৰ উপযুক্ত
সময় ।

খৰালি মহীয়া দৰ্শনৰ উপযুক্ত
সময় ।

খৰালি মহীয়া দৰ্শনৰ উপযুক্ত
সময় ।

খৰালি মহীয়া দৰ্শনৰ উপযুক্ত
সময় ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
গৰচুনি অভয়াৰণ্য	হাতী, গৌণ, শাপহ, ফুটুকী, হৰিণ আৰু ভালুক।	ভূবনেশ্বৰৰ পৰা ৩৩০ কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু নেংগুণালি ষ্টেচনৰ পৰা ১৫০ কিলোমিটাৰ -	ডিভিজনৰ ফৰেষ্ট আফিচৰ আৰু হাইল্ড নাইফ ৱাৰ্ডেন, হাইবৰ্ণ ডিভিজন, জি: চৰলপুৰ (উৰিষ্যা)।	খৰালি মহীমা দৰ্শন উপবন
কুলহাশ অভয়াৰণ্য	কুজাৰ আৰু ফুটুকী হৰিণ।	ভূবনেশ্বৰৰ পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ আৰু পূবীৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ।	ডিভিজনৰ ফৰেষ্ট অফিচৰ আৰু হাইল্ড নাইফ ৱাৰ্ডেন, পূবী ডিভিজন, খোৰদা, জি: পূবী (উৰিষ্যা)।	কছৰৰ সকলো সংগ দৰ্শন উপযোগী।
মন্দাকী অভয়াৰণ্য	হাতী, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, ফুটুকী-হৰিণ, শৰপহ, মূবী-পহ, ভালুক, জহাশাল ইত্যাদি।	ভূবনেশ্বৰৰ পৰা ৩৫ কিলোমিটাৰ আৰু বনাঃ ষ্টেচনৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত।	ডিভিজনৰ ফৰেষ্ট অফিচৰ আৰু হাইল্ড নাইফ ৱাৰ্ডেন, পূবী ডিভিজন, খোৰদা, জি: পূবী (উৰিষ্যা)।	খৰালি মহীমাৰ সম্বন্ধে দৰ্শন উপযোগী।
শ্ৰীপত্নী অভয়াৰণ্য	নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, শৰ পহ, আৰু গৌণ।	ভূবনেশ্বৰৰ পৰা ৩৫০ কিলোমিটাৰ আৰু হিৰা-কুড় ষ্টেচনৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত।	ডিভিজনৰ ফৰেষ্ট অফিচৰ আৰু হাইল্ড নাইফ ৱাৰ্ডেন, চৰলপুৰ ডিভিজন, পো: চৰলপুৰ জি: চৰলপুৰ (উৰিষ্যা)।	খৰালি মহীমাৰ সম্বন্ধে দৰ্শন উপযোগী।

(১)

বন্দনকানন অভয়াবণা হাতী, বাঘ, সাহৰ-কুটকী বাঘ,
(পূৰী) যক্ষ্মাল ইত্যাদি ।

(২)

বাংচেন্দ্ৰেনা

অভয়াবণা

হিৰ বাঘ, গোৰা ফুটকী বাঘ,
সৰ্বল কেই, বিলুং
হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক, বেড
পাঙা, ভিন্নতৰ বনবীয়া গাধ,
নীলাভেড়া, ছেৰাঙ, গড়াল,
টাকিন, কন্তৰী হৰিণ,
শেঙড়বিক, পাট্টুছ,
হাইঠা আৰু অলান্দা
পৰ্বতীয়া পক্ষী ।

(৩)

ভুবনেশ্বৰৰ পৰা যাব
পাবি ।

ছিক্কিম

বাগ্‌পুৰা বিমান বন্দৰৰ
পৰা গেন্টকলৈ ১৪৮
কিলোমিটাৰ দূৰ ।

(৪)

হাইল্ড নাইফ হাৰ্ডেন
পূৰী ডিভিজন, খোবদা
স্বিঃ পূৰী (উৰিষ্যা) ।

চিক হাইল্ড নাইফ,
হাৰ্ডেন. (ছিক্কিম)
গেণ্টক ।

(৫)

খবানি সাহ কেইটা দৰ্শনৰ বাবে
অনুকূল ।

চেপ্‌শ্বৰ অক্টোবৰ সাহ দৰ্শনৰ
বাবে ভাল ।

সাঁইহিঙ

২২৫

উত্তৰ প্ৰদেশ

কৰবেট নেচনেল
পাৰ্ক

হাতী, চেকীয়া-পতীয়া বাঘ,
সাহৰ-কুটকী বাঘ, নীলগাই,
শৰু পহু, ফুটকী হৰিণ,
বনবীয়া-শুহৰি, কেনটাই পহু
ব'ৰা চৰাই, বঙা বন-কুৰা,
শ্ৰেণ্ডাবিক, ঘৰিয়াল, বগৰ,
গছৰি আৰু জাবি শিঙীয়া
গেণ্টলপ্ ।

নাইনিভালৰ পৰা ১৩০
কিলোমিটাৰ আৰু বান-
নগৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৫০
কিলোমিটাৰ নিলগত
অবস্থিত ।

নবেদৰ সাহৰ পৰা বেই সাহ
পৰ্বত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
দুখুয়া নোচনেল পাৰ্ক	শ্ৰীমঙ্গল-পুৰীয়া বাঘ, নাহব-কুটুকী বাঘ, মটি-ভালুক (শুখ বিয়েৰ) শব-পহ, কুটুকী হৰিণ, খাটীয়া হৰিণ, সুগৰী পহ, নীলপাই, বন কুকুৰা আৰু কেণ্ডাবিক।	লক্ষ্মীপৰা ২৫০ কিলো-মিটাৰ আৰু দুখুয়া ষ্টেচনৰ পৰা ৪ কিলো-মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত।	হাইল্ড লাইক হাৰ্ডিন, বেবি অকল, লক্ষীমপুৰ, শেৰি (উত্তৰ ব্ৰহ্মণ)	নবেৰৰ মাহৰ পৰা মেই মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত।
গোবিন্দ পত্ৰ-বিছাৰ	হিমালয়ৰ ক'লা ভালুক, হিমালয়ৰ দুগা-ভালুক, হিম-বাঘ, ভাঙাল, কহৰী হৰিণ, বাঘ, ছোৱাণ, গড়াল, নাহব-কুটুকী বাঘ, শবপহ, বনৰীয়া গাহৰি, বনাল, কেণ্ডাবিক, হিম হাইঠা, সেউজীয়া হাইঠা ইত্যাদি।	শিগীৰপৰা ৪০০ কিলো-মিটাৰ নিলগত আৰু ডোৰাতুন বেনৰে ষ্টেচনৰ পৰা ২২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত।	হাইল্ড লাইক হাৰ্ডিন, ডোৰাতুন অকল, ডোৰাতুন, জি: উত্তৰ কানি (উত্তৰ ব্ৰহ্মণ)	চেণ্ডেৰ-অকল আৰু মেই জুন মাহ দৰ্শনৰ অনুকূল।
নশাদেবী অভয়াৰণ্য (কৰ্মাংগিত বাহীৰ উপাংগ)	হিমালয়ৰ ক'লা-ভালুক, হিমালয়ৰ দুগা-ভালুক, হিম-বাঘ, ভাঙাল, কহৰী হৰিণ, বাঘ, ছোৱাণ, গড়াল, নাহব-কুটুকী বাঘ, শব পহ, বনৰীয়া গাহৰি, বনাল, কেণ্ডাবিক, হিম হাইঠা, সেউজীয়া হাইঠা ইত্যাদি।	ৰবিকেশ বেনৰে ষ্টেচনৰ পৰা বাহেৰে বাৰ পানি।	হাইল্ড লাইক হাৰ্ডিন, ডোৰাতুন অকল, ডোৰাতুন, জি: চামলি (উত্তৰ ব্ৰহ্মণ)	চেণ্ডেৰ-অকল আৰু মেই জুন মাহ দৰ্শনৰ উপযুক্ত।

(১) বাগ্ৰাজী অভয়াবণা

(২)

হাতী, ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, মাটি ভালুক
নীল-গাঁই, শৰপহ, ফুটুকী
হৰিণ, বনবীয়া গাহৰি,
কেটেলা পহ, ম'ৰা চৰাই,
বঙা বন-কুকুৰা, আক ডৰিক ।
ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ,
ফুটুকী-নাঘ, হাতী, মাটি-ভালুক
নীলগাঁই, শৰপহ, ফুটুকী-হৰিণ
বনবীয়া গাহৰি, কেটেলা পহ,
ম'ৰা চৰাই, বঙা বন-কুকুৰা,
মেঙাডৰিক ।

মতিচূৰ অভয়াবণা

(৩)

দিল্লীৰপৰা ২০০ কিলো-
মিটাৰ আৰু হৰিষাৰ
বেলৰে ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ
৫ কিলোমিটাৰ নিলগত
অৱস্থিত ।
অৱস্থিত ।
দিল্লীৰপৰা ২০০ কিলো-
মিটাৰ আৰু হৰিষাৰ
বেলৰে ষ্টেচনৰ পৰা ৫
কিলোমিটাৰ আঁতৰত
অৱস্থিত ।

কিৰাণপুৰ
অভয়াবণা

আমগুটি (লক্ষ্ণৌ) বিমান
বন্দৰৰ পৰা ২৫০ কিলো-
মিটাৰ দূৰ আৰু নাইনি-
ভালৰ পৰা মাত্ৰ ১২
কিলোমিটাৰ ।
ঢেঁকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহৰ-
ফুটুকী বাঘ, শৰপহ, দল-
হৰিণ, ফুটুকী হৰিণ, খটীয়া-
হৰিণ, মূগী পহ, নীলগাঁই,
ম'ৰা চৰাই, বন-কুকুৰা আৰু
ডৰিক জাতীয় পক্ষী ।

কোলাবাৰা অভয়াবণা

হিৰাগল ম'ৰা-জালুক, হিৰা-
দল মূগা-ভালুক, দিহ বাঘ,
ভাটাল, কছৰী হৰিণ,
গাম, হোৱাঙ, গঁড়াল ।

(৪)

বাইল্ড লাইক বাৰ্ডেন,
ডেৰাডুন মণ্ডল, ডেৰাডুন
জি: ডেৰাডুন (উত্তৰপ্ৰদেশ)

(৫)

নৰেঘৰ মাহৰ পৰা সেই মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

বাইল্ড লাইক বাৰ্ডেন,
ডেৰাডুন মণ্ডল, ডেৰাডুন
জি: ডেৰাডুন (উত্তৰপ্ৰদেশ)

নৰেঘৰ মাহৰপৰা সেই মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

বাইল্ড লাইক বাৰ্ডেন,
ৰেবি মণ্ডল, লক্ষীমপুৰ
ৰেবি (উত্তৰপ্ৰদেশ)

নৰেঘৰ মাহৰ পৰা সেই মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

তিতিবন্ধেৰে কৰেই
অকিচাৰ, কোলাৰ নাথ
কৰেই তিতিবন্ধ, কোলাৰ
নাথ (উত্তৰপ্ৰদেশ)

শ্ৰেণীৰ মাহৰ পৰা সেই মাহলৈ
এই পোটেই ছোৱা. গৰা দৰ্শনৰ
অনুকূল ।

(১)

চতুঃপদা অত্যাধিকা

(২)

চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব-
কুটুকী বাঘ, শবপত, গেভেল,
মাটি-ভালুক, নীলগাই, ম'বা
চবাই ইত্যাদি ।

কাঠিন্যনিমিত্ত
অন্তঃপদা

চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব-
কুটুকী বাঘ, ভালুক, কুক-
দাঘ, কুটুকী হরিণ ।

বানীপুত্র অত্যাধিকা

চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব-
কুটুকী বাঘ, বনবোশা, শব-
পত, হারেল, বেক শিৱাল,
বড়া শিৱাল, কুটুকী হরিণ,
চিকনা, কুকাদা ইত্যাদি ।

চিন্তা অত্যাধিকা

চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব-
কুটুকী বাঘ, ভালুক, হাতী,
কুটুকী হরিণ, শবপত, গড়াল,
নীলগাই ইত্যাদি ।

বহুবীচ বানী
অত্যাধিকা

নাহব-কুটুকী বাঘ, নীল গাই,
শব পত, ভালুক, কুটুকী-
হরিণ, চিকনা, কুকাদা,
ক'না ভালুক ইত্যাদি ।

(৪)

ভিত্তিভঙ্গনে কবেটে
অফিচাব, বাবাণী ভিতি-
ভ্রম, জি: বাবাণী
(উত্তর প্রদেশ) ।

রাইল্ড নাইক রাউল
ইষ্টার্ন বিজিৱন, গণ্ডা
(উত্তর প্রদেশ) ।

ভিত্তিভঙ্গনে কবেটে
অফিচাব, বাবা ভিত্তিভ-
বান্ধা (উত্তর প্রদেশ) ।

রাইল্ড নাইক রাউল
ক'ট ঘাৰা নওল খট ঘাৰা
জি: পাচিৱাল
(উত্তর প্রদেশ) ।

ভিত্তিভঙ্গনে কবেটে
অফিচাব, বুদ্ধেলখাল
কবেটে ভিত্তিভঙ্গ। বাঁকি
(উত্তর প্রদেশ) ।

(৫)

ক্ষেত্ৰেব নাহবপদা বেই নাটলৈ
এই পোটেই ভোৱ। সময় ল'লৈ
উপযোগী ।

নবেব নাহল পৰা। বেই নাহ
পৰ্বত ল'লৈ বাবে প্রশস্ত সময় ।

নবেব নাহব পৰা বেই নাহ
পৰ্বত ল'লৈ বাবে উপযোগী সময় ।

নবেব নাহব পৰা বেই নাহ
পৰ্বত ল'লৈ বাবে উপযোগী
সময় ।

নবেব নাহব পৰা বেই নাহ
পৰ্বত ল'লৈ বাবে উপযুক্ত সময় ।

(১) চাৰাল অভয়াৰণ্য

(২)

ঘৰিয়াল আৰু মগৰ।

(৩)

লক্ষ্ণৌৰ পৰা ইয়াটল
বোৱাৰ সুবিধা আছে।

(৪)

ভিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ চাৰাল চেফো-
ৱাৰী, লক্ষ্ণৌ (উত্তৰ প্ৰদেশ)
টীক, ৱাইল্ড লাইফ
ৱাৰ্ডেন, পঞ্জাব চণ্ডীগড়,
জি: পাটিয়ালা (পঞ্জাব)

(৫)

বহুবৰ বেই কোনো সময়তে
যাব পাৰি।

বীৰ মতিবাগ্
অভয়াৰণ্য

নীলগাই, বনৰীয়া গাহৰি,
খটীয়া হৰিণ, শহা গহ, ম'ৰা
চৰাই, নানাবিধৰ অন্যান্য
বনৰীয়া চৰাই।

পাটিয়ালাৰপৰা আঠ
কিলোমিটাৰ নিলগত
অৱস্থিত।

বীৰ ভোনাৰহৰী
অভয়াৰণ্য

নীলগাই, বনৰীয়া গাহৰি,
খটীয়া হৰিণ, শহা গহ, ম'ৰা
চৰাই, নানা বিধৰ অন্যান্য
বনৰীয়া চৰাই।

পাটিয়ালাৰ পৰা ১২
কিলোমিটাৰ আঁতৰত
অৱস্থিত।

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযোগী
সময়।

আৱহাৰ অভয়াৰণ্য

কৃষ্ণাব, শহা গহ, ডবিক
জাতীয় চৰাই, হাইঠা, কপৌ
ইত্যাদি।

কিবোজপুৰৰ পৰা ১৩৭
কিলোমিটাৰ আৰু আৱ-
হাৰ ষ্টেচনৰ পৰা ১৬
কিলোমিটাৰ নিলগত।

অক্টোবৰ-পৰা মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত
দৰ্শনৰ বাবে উপযোগী সময়।

হাৰিক হেড্ হাৰ্কচ

নীলগাই, বনৰীয়া গাহৰি,
বনৰীয়া হাঁহ, কুট, দেওৰাজ
হাঁহ, অন্যান্য পানীত চৰি
মুৰা বিধৰ বনৰীয়া চৰাই।

চণ্ডীগড়ৰ পৰা ৪০
কিলোমিটাৰ আৰু কপাব
পৰা কেতু কিলো-
মিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত।

ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন
পাটিয়ালা (পঞ্জাব)।
চণ্ডীগড়।

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

সুৰনা লেক্
চেণেৰাৰী

নানাবিধৰ পানীত চৰি
মুৰা চৰাই।

ভিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, চণ্ডীগড়
(চণ্ডীগড়)।

বহুবৰ সকলো সময় দৰ্শনৰ বাবে
উপযুক্ত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
হুনাটনপুৰ লেক বাৰ্ড চেৰেগাৱাৰী	কৰ্চন চবাই, বনৰীয়া পাতি হাঁহ, চাইক-চকাৱা ইত্যাদি।	হাৰিয়ানা দিল্লীৰ পানাম বিমান বন্দৰ পৰা ৪৫ কিলো- মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত।	ব্ৰজেক্ট অফিচাৰ, চুখনা প্ৰিজাৰ্ডেচন অথৰিটি। (হাৰিয়ানা)।	অক্টোবৰ মাহৰ মাজ ভাগৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ মাজ ভাগ পৰ্যন্ত এই সময়ছোৱা দৰ্শনৰ বাবে উপযোগী।
কালৈগৰ নিষিদ্ধ এলেকা	নানা জাতীয় বনৰীয়া চৰাই।	আমানাৰ পৰা যাব পাৰি।	ব্ৰজেক্ট অফিচাৰ, সুখনা প্ৰিজাৰ্ডেচন অথৰিটি (হাৰিয়ানা)	অক্টোবৰ নবেম্বৰ মাহ দৰ্শনৰ বান উত্তৰ সময়।
চেচোটোন নামা অভয়াৰণ্য	আইবেল, ধাৰ, কস্তুৰী হৰিণ, মুগা-ভালুক, ক'লা-ভালুক, গুজাল, ছেৰাও, মনাল, ট্ৰেপ্পান, ডবিক, কক্‌লাচ্, চাকৰ, হিমবাঘ, লিঙ্কচ্, মাৰ্টেন, খেক্ নিয়াল, বঙা শিয়াল, মাৰ্ভিট, উইজেল।	হিমাচল প্ৰদেশ পাঠানকোটৰ পৰা ১৯২ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ব্ৰজেক্ট অফিচাৰ, সুখনা প্ৰিজাৰ্ডেচন অথৰিটি (হাৰিয়ানা) ডিজিটেল কৰেট অফিচাৰ, চায়া ডিজিটেল জি: চায়া (হিমাচল প্ৰদেশ)।	এপ্ৰিল মাহৰ পৰা নবেম্বৰ মাহলৈ দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময়।
গামগুন্-চিয়া বেছলি অভয়াৰণ্য	ধাৰ, মুগা ভালুক, কস্তুৰী হৰিণ, গুজাল, হাজুল, কক্‌লাচ্ চাকৰ, ক'লা-ভালুক, মনাল, ট্ৰেপ্পান, মৌ, কক্‌, ডবিক, নাহৰ-কুটুকাঁ বাঘ, উইজেল, মাৰ্টেন, জাহানাল, হিল কল্প, বানশৰ, ইত্যাদি ইত্যাদি।	পাঠানকোটৰ পৰা ১৫০ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত।	ডিজিটেল কৰেট অফিচাৰ, চায়া ডিজিটেল, জি: চায়া (হিমাচল প্ৰদেশ)।	এপ্ৰিল মাহৰ পৰা নবেম্বৰ মাহ- লৈকে দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
টুন্‌দাহ অভয়াৰণ্য	ধাৰ, সুগা ভালুক, কলা ভালুক, কস্তুরী হৰিণ, গড়াল, ছেৰাও, আইবেল, হিমবাহ, নাহৰ, কুটুকী বাঘ, উইজেল, মাৰ্টেন, চিভেট, ফল্ল, মনাল, টাৰ্গ'পান ডবিন্‌গ, চাকৰ ইত্যাদি ইত্যাদি।	পাঠানকোটৰ পৰা ২৩১ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, চায়া ডিভিজন। জি: চায়া (হিমাচল প্ৰদেশ)	এথিল সাহৰ পৰা জুন মাহলৈ আৰু চেণ্ডেম্বৰ অক্টোবৰ মাহ দৰ্শনৰ বাবে উপযোগী।
কুণ্‌টি অভয়াৰণ্য	সুগা-ভালুক, ক'লা-ভালুক, হিমালয়ৰ পাহ, কস্তুরী হৰিণ, আইবেল, গড়াল, ছেৰাও, হিমবাহ, নাহৰ, কুটুকী বাঘ, মাৰ্টেন, চিভেট, বেক্‌ শিয়াল, বাৰশৰ, ডবিক, কক্‌লাজ, চাকৰ, মনাল, টেৰ্গ'পান।	পাঠানকোটৰ পৰা ২২৭ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, চায়া, ডিভিজন, পো: চায়া, জি: চায়া, (হিমাচল প্ৰদেশ)	এথিল সাহৰ পৰা জুন মাহলৈ আৰু চেণ্ডেম্বৰ-অক্টোবৰ মাহ দৰ্শনৰ বাবে উপযোগী।
কিলাটপ্‌ আৰু ঝাণ্‌ জাৰ অভয়াৰণ্য	গড়াল, ছেৰাও, ক'লা-ভালুক, সুগাৰী পহ, হিমবাহ, মাৰ্টেন, চিভেট, ফল্ল, বাৰশৰ, (ফ্লাইং ফল্ল) কক্‌লাজ, কলিঙ্গ (ডবিক জাতীয় চৰাই) চিৰো ইত্যাদি।	পাঠানকোটৰ পৰা ১০১ কিলোমিটাৰ দিলগত অৱস্থিত।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, চায়া ডিভিজন জি: চায়া (হিমাচল প্ৰদেশ)	এথিল, মেই, জুন, চেণ্ডেম্বৰ, অক্টোবৰ মাহ দৰ্শনৰ উপযুক্ত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
নেৰগো আৰু উইলস কাৰো অভয়াৰণ্য	গড়াল, ছেৰাও, ক'লা ভালুক, কন্তৰী হৰিণ, নাপ্ত-কুটুকী বাঘ, হিবৰাঘ, ব'ৰ্চেন, ফল্ল, চিভেট ফ্লাইং ফল্ল, মনাল, কলিঙ্গ, কক্ লাছ, চিৰো ইত্যাদি ইত্যাদি।	পাঠানকোটিৰ পৰা ১৫৫ কিলোমিটাৰ দূৰত অত- পৰ আৰু ছগিলৰ পৰ ১৩ কিলোমিটাৰ যাত্ৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, নান্দি ডিভিজন জিলা-মান্দি (হিমাচল প্ৰদেশ)।	এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত আৰু ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহ পৰ্যন্তৰ বাবে উপযুক্ত।
চিকৰী দেৱী অভয়াৰণ্য	গড়াল, ছেৰাও, ক'লা ভালুক, সুগৰী, পহ, কন্তৰী হৰিণ, নাহৰ কুটুকী বাঘ, হিবৰাঘ, মাৰ্চেন, চিভেট, ফল্ল, ফ্লাইং ফল্ল, মনাল, কলিঙ্গ, চিৰো, চাকৰ, পাটুজ ইত্যাদি।	ভোনটাৰ পৰা ১৬০ কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত। কিৰাটপুৰ চাহেব চিৰনাৰ পৰা ১৮৭ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, সুন্দৰ নগৰ ডিভিজন, জিলা-মান্দি (হিমাচল প্ৰদেশ)।	এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত আৰু ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহ পৰ্যন্তৰ অনুকূল।
বাণি অভয়াৰণ্য	ক'লা ভালুক, সুগৰী, পহ, গড়াল, হিবৰাঘ, নাহৰ-কুটুকী বাঘ, মাৰ্চেন, চিভেট, ফল্ল, ফ্লাইং ফল্ল, কলিঙ্গ, চাকৰ, পাটুজ।	ভোনটাৰ পৰা ১৬০ কিলোমিটাৰ আৰু চণ্ডীগড়ৰ পৰা ১৬৭০ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত। কিৰাটপুৰ চাহেবৰ পৰাও ১৭০ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, সুন্দৰনগৰ ডিভিজন, জিলা মান্দি (হিমাচল প্ৰদেশ)।	এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত আৰু ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহ পৰ্যন্তৰ উপযোগী।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
গোবিন্দ সাগর অভ্যাসৰণ্য	মেওঁহাঁহ, মেওঁহাঁহ আৰু কঠন প্ৰভৃতি পানীত চৰি কৰা বিহৰ চৰাই।	চঙীপড়ৰ পৰা ১২৫ কিলোমিটাৰ আৰু কিৰাটপুৰ চাহেবৰ পৰা ৬৪ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত।	তিভিজনেন কৰেই অকিতাৰ, বিনাসপুৰ তিভিজন খিলা-বিনাসপুৰ (হিমাচল প্ৰদেশ)।	বহুবৰ সকলো সময় উপযুক্ত।
বীণৱলা মেৰী অভ্যাসৰণ্য	ৰ'না ভালুক, গুৰ্গবী পহু, শৰ-পহু, বনবীয়া পাহৰি, নীল গাই, হিবৰাষ, নাহৰ-ফুটী, ৰাঘ, মাঠেন, চিভেট, ফল, ফ্লাইং ফল, বঙা বন-ফুৰা, কলিছ, পাফিছ, ইত্যাদি ইত্যাদি।	চঙীপড়ৰ পৰা ১৮০ কিলোমিটাৰ আৰু কিৰাট- পুৰ চাহেবৰ পৰা ২১ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত।	তিভিজনেন কৰেই অকিতাৰ, বিনাসপুৰ তিভিজন খিলা- বিনাসপুৰ (হিমাচল প্ৰদেশ)।	বহুবৰ সকলো সময় উপযুক্ত।
জাফল আৰু হাব- ওঁ অভ্যাসৰণ্য	ৰ'না ভালুক, গুৰ্গবী, হিব- ৰাঘ, নাহৰ-ফুটী, ৰাঘ, মাঠেন, চিভেট, ফল, ফ্লাই ফল, গুৰ্গবী পহু, ভবিক, বঙা বন- ফুৰা, পাফিছ, ইত্যাদি ইত্যাদি।	চঙীপড়ৰ পৰা ১১০ কিলোমিটাৰ আৰু চিন্- নাৰ পৰা ৫০ কিলো- মিটাৰ দূৰ।	তিভিজনেন কৰেই অকিতাৰ। কুনিহাৰ ভিভি- জন, খিলা-চনান্ (হিমাচল প্ৰদেশ)।	বহুবৰ সকলো সময় উপযুক্ত।
পৰাংখাটি অভ্যাসৰণ্য	গুৰ্গবী, ফ্ৰোণ্ড, ৰ'না ভালুক, নাহৰ-ফুটী, ৰাঘ, চিভেট, মাঠেন, ফ্লাইং ফল, বনান, কলিছ, ক'লাছ ইত্যাদি ইত্যাদি।	চঙীপড়ৰ পৰা ৩১৬ কিলোমিটাৰ আৰু চিনা হেলিপেডৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ।	তিভিজনেন কৰেই অকিতাৰ, কুনিহাৰ ভিভি- জন, খিলা-বিনাডৰ, (হিমাচল প্ৰদেশ)।	এখিল সাহৰ পৰা কুনা সাহ পৰ্বত আৰু মেওঁহাঁহৰ অটোবৰ সাহৰ দৰ্শনৰ উপযোগী।

(১)

চিলি অভয়াৰণ্য

(২)

স গৰী পহ, নাহৰ-কটকী বাঘ, হিৰবাৰ, মাৰ্চেন, চিটেট, কল্প, ফ্লাইং কল্প, চাকৰ, কনিজ, পাটিল ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩)

চণ্ডীপড়ৰপৰা ৬৪ কিলোমিটাৰ আৰু চ'লা-নৰ পৰা যাত্ৰ ৫ কিলো-মিটাৰ দূৰ।

(৪)

ডিভিছনেৰ ফৰেষ্ট অফিচৰ চ'লা ডিভিছন স্থানা-চলান (হিমালয় প্ৰদেশ)।

(৫)

জাৰ কানিৰ বাহিৰে বছৰৰ বাকী আটাইবোৰ সময় দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল।

চিলি বাটৰ চাপ্ৰাই গড়ান, ছেৰাও, স গৰী পহ, হিৰবাৰ, নাহৰ কটকী বাঘ, মাৰ্চেন, হিল কল্প, ফ্লাইং কল্প, কনিজ, ক'লাছ ইত্যাদি।

চণ্ডীপড়ৰপৰা ১১৬ কিলোমিটাৰ দূৰ।

ডেপুটি চীফ হাইন্ড নাইক হাউচ, চিৰা, (হিমালয় প্ৰদেশ)।

জাৰ কানিৰ বাহিৰে বছৰৰ বাকী সকলো সময় দৰ্শনৰ অনুকূল।

চালবা অভয়াৰণ্য

গড়ান, স গৰী পহ, ক'লা ভালুক শৰপহ, কছৰী হৰিণ, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, মাৰ্চেন, চিটেট কেট, ফ্লাইং কল্প, কনিজ, ক'লাছ, চাকৰ, মনাল ইত্যাদি।

ডিভিছনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, চপাল ডিভিছন, (হিমালয় প্ৰদেশ)

এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত আৰু পুনৰ চেপ্তেম্বৰ অক্টোবৰ মাহটো দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।

দাৰবাঘাট অভয়াৰণ্য

গড়ান, হিমবাৰ, স গৰী পহ, মাৰ্চেন, চিটেট কেট, ফ্লাইং কল্প, চাকৰ, কনিজ, পাটিল ইত্যাদি।

ডিভিছনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, কনিহাৰ ডিভিছন, জি: চ'লা (হিমালয় প্ৰদেশ)

বছৰৰ সকলো সময় দৰ্শনৰ অনুকূল।

বাৰ্চাচ

ভাঙাল, গড়ান, ক'লা ভালুক, যুগা ভালুক, নাহৰ-কটকী বাঘ, মাৰ্চেন, ফ্লাইং কল্প মনাল, ক'লাছ, চাকৰ ইত্যাদি।

ডিভিছনেল ফৰেষ্ট অফি-চাৰ, কিনাণ্ডাৰ ডিভিছন, জিলা: কিনাণ্ডা (হিমালয় প্ৰদেশ)।

এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত আৰু পুনৰ চেপ্তেম্বৰ-অক্টোবৰ মাহটো দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।

(১)

কিয়াছ অভয়াবণ্য

(২)

ধাৰ, গড়াল, ছেৰাও, ক'লা
ভালুক, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ,
চিভেট, মাৰ্চেন, ফ্লাইং ফক্স,
কনিজ, ককলাছ, চাকৰ
পাট্ৰিছ ইত্যাদি ।

খোঁধান অভয়াবণ্য

ধাৰ, গড়াল, ছেৰাও, ক'লা
ভালুক, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ,
চিভেট, মাৰ্চেন, ফ্লাইং ফক্স,
কনিজ, ককলাছ, চাকৰ ।

কাছুয়াৰ
অভয়াবণ্য

ধাৰ, গড়াল, ছেৰাও, ক'লা,
ভালুক, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ,
মাৰ্চেন, ফ্লাইং ফক্স, কনিজ
ককলাছ, চাকৰ, পাট্ৰিছ
ইত্যাদি ইত্যাদি ।
গড়াল আৰু সুগৰী-পহ ।

চেইল্ অভয়াবণ্য

খিৰধান অভয়াবণ্য

গড়াল, ছেৰাও, কলা-ভালুক
ইত্যাদি ইত্যাদি ।

(৩)

ভোনটাৰ পৰা ১০
কিলোমিটাৰ আৰু জগি-
ন্দৰ নগৰৰ পৰা ১৫৬
কিলোমিটাৰ আঁতৰত
অৱস্থিত
ভোনটাৰ পৰা ১০
কিলোমিটাৰ আৰু জগি-
ন্দৰ নগৰৰ পৰা ১৫৬
কিলোমিটাৰ আঁতৰত ।

ভোনটাৰ পৰা ৪০

কিলোমিটাৰ আৰু জগি-
ন্দৰ নগৰৰ পৰা ১৪৬
কিলোমিটাৰ নিলগত
অৱস্থিত ।

চণ্ডীগড়ৰ পৰা ৯০
কিলোমিটাৰ আৰু কান্দা-
ঘাটৰ পৰা ২০ কিলো-
মিটাৰ ।

চণ্ডীগড়ৰ পৰা যাৰ
পাৰি ।

(৪)

ভিত্তিঙ্গনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ,
কুলু ডিভিজন, জিঃ কুলু,
(হিমাচল প্ৰদেশ) ।

ভিত্তিঙ্গনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, কুলু ডিভিজন
জিঃ কুলু (হিমাচল প্ৰদেশ)

ভিত্তিঙ্গনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, কুলু ডিভিজন,
জিঃ কুলু (হিমাচল প্ৰদেশ) ।

ভিত্তিঙ্গনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, চোনাং ভিভি-
জ্ঞান জিলা: চোনাং
(হিমাচল প্ৰদেশ) ।

ভিত্তিঙ্গনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, কুলু ডিভিজন,
জিঃ কুলু (হিমাচল প্ৰদেশ) ।

(৫)

এপ্ৰিল, মেই, জুন, চেপ্তেম্বৰ
আৰু অক্টোবৰ মাহ দৰ্শনৰ
বাবে উপযুক্ত ।

এপ্ৰিল, মেই, জুন, চেপ্তেম্বৰ আৰু
অক্টোবৰ মাহ দৰ্শনৰ বাবে
প্ৰশস্ত সময় ।

এপ্ৰিল, মেই, জুন, চেপ্তেম্বৰ
আৰু অক্টোবৰ মাহ দৰ্শনৰ বাবে
উৎকৃষ্ট সময় ।

এপ্ৰিল, মেই, জুন, চেপ্তেম্বৰ
আৰু অক্টোবৰ মাহ দৰ্শনৰ বাবে
ভাল সময় ।

এপ্ৰিল, মেই, জুন, চেপ্তেম্বৰ,
অক্টোবৰ মাহ দৰ্শনৰ বাবে
উপযুক্ত ।

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

ভাটিপায় অভয়াবণ

হাজুল, কস্তুরী-হৰিণ, ছেৰাও,
পঁজাল, ক'লা-ভালুক, বুগা-
ভালুক, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ
ইত্যাদি।

বাৰপাৰিমান
অভয়াবণ

বুগা ভালুক, ক'লা ভালুক,
কস্তুরী-হৰিণ, ছেৰাও, হাজুল,
চাকৰ মড়ুডি পক্ষী কুলব
ঘাৰী।

শৰবাচাৰিয়া
অভয়াবণ

চাকৰ পক্ষী।

চোমশাই বেচিন
অভয়াবণ

বুগা ভালুক, ক'লা ভালুক,
নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, কস্তুরী
হৰিণ ইত্যাদি।

কাম্পীৰ

শ্রীমগৰৰ পৰা ২৬ ডিব্ৰুগড়, গৌৰী এণ্ড
কিলোমিটাৰ আৰু জামুৰ ফিচাৰিজ, শ্রীমগৰ
পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ (কাম্পীৰ)
নিৰ্গত অৱস্থিত।

শ্রীমগৰৰ পৰা ৬১ ডিব্ৰুগড় গৌৰী এণ্ড
কিলোমিটাৰ আৰু ফিচাৰিজ শ্রীমগৰ
জামুৰ পৰা ২০০ (কাম্পীৰ)
কিলোমিটাৰ আঁতৰত
অৱস্থিত।

শ্রীমগৰৰ পৰা ১২ ডিব্ৰুগড় গৌৰী এণ্ড
কিলোমিটাৰ আৰু ফিচাৰিজ, শ্রীমগৰ (কাম্পীৰ)
জামুৰ পৰা ২০০ উপবৃত্ত।
কিলোমিটাৰ আঁতৰত
অৱস্থিত।

শ্রীমগৰৰ পৰা ৬৭ ডিব্ৰুগড় গৌৰী এণ্ড
কিলোমিটাৰ আৰু জামুৰ ফিচাৰিজ শ্রীমগৰ
পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ (কাম্পীৰ)
দূৰ।
এপ্ৰিল মাহৰ পৰা নবেম্বৰ মাহলৈ
এই গোটটি ছোৱা সময় দৰ্শনৰ
বাবে ভাল।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
কান্ধা নেচনেল পাৰ্ক	চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব- ফুটী বাঘ, মন-হৰিণ, শৰ পহু, ফুটী-হৰিণ, কৃষ্ণাব, চাওচিঙ্গা, স গৰ্ভা হা, নীলগাই নিৰ্গা-হৰিণ, বা কুকুৰ, বনৰীয়া গাহাং ইত্যাদি।	মধ্য প্ৰদেশ		মাৰ্চ সাহব পৰা জুন সাহব দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময়।
বাৰদগড় নেচনেল পাৰ্ক	চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব-ফুটী বাঘ, গৌড়ব, শৰপহু, ফুটী-হৰিণ, নীল- গাই, চিন্কাবা, সুগৰী পহু, ভালুক, বনৰীয়া গাহাং আৰু নাৰান্দিং বনৰীয়া চমাই।	ভবলপুৰ পৰা ১৭০. কিলোমিটাৰ আৰু খেজু- বাহৰ পৰা ২১০ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত। উমাৰিয়া বেলৰে ষ্টেচনৰ পৰা মাৰ্চ ৩০ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিবেট্টৰ বাৰদগড় গেচ- নেল পাৰ্ক, উমাৰিয়া (মধ্য প্ৰদেশ)	নবেম্বৰ সাহব পৰা জুন সাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।
শিৱপুৰী নেচনেল পাৰ্ক	চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব- ফুটী বাঘ, মাৰ্চ ভালুক, হাৰেণা, শৰ পহু, ফুটী- হৰিণ, চাওচিঙ্গা, নীলগাই, কৃষ্ণাব, চিন্কাবা, বনৰীয়া গাহাং, মৰিয়াল, ইত্যাদি।	গোৱালিয়ৰ পৰা ২২০ কিলোমিটাৰ আৰু ৰাখিৰ পৰা ৯৭ কিলো- মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত।	ডিবেট্টৰ, নেচনেল পাৰ্ক শিৱপুৰী (মধ্য প্ৰদেশ)	জানুৱাৰী, সাহব পৰা জুন সাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।

(১)

বৰী অভয়াৰণ্য

(২)

চৈকীয় পতীয়া বাঘ, নাহব-
ফুটুকী বাঘ, গৌড়, শব পহ,
ফুটুকী-হৰিণ, নীলগাই, সুপৰী
পহ, চিন্কাৰা, বনৰীয়া গাহৰি,
ভাৰুক ইত্যাদি ।

(৩)

পাছ মানহিৰ পৰা ৩২
কিলোমিটাৰ আৰু
ইটাৰিছ টেচনৰ পৰা
১০৪ কিলোমিটাৰ নিল-
গড় অৱস্থিত ।

(৫)

জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহ-
দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

(৪)

চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, বৰী
চেফোৱাৰী, ইটাৰিছ
(মৰ্য্যাপ্ৰদেপ)

কুৱিত্ৰাইল্ড বকেলো

চেফোৱাৰী বা

বনৰীয়া ম'হৰ

অভয়াৰণ্য

বনৰীয়া ম'হ, চৈকীয়াপতীয়া
বাঘ, নাহব ফুটুকী বাঘ, মাটি
ভালুৰ, নীল-গাই, শব-পহ,
ফুটুকী-হৰিণ, বনৰীয়া গাহৰি,
গৌৰ, বাং কুকুৰ, চাওচিকা,
হিল মইনা ইত্যাদি ।

চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, কুৱিত্ৰাইল্ড
বকেলো চেফো-
ৱাৰী, জবলপুৰ (মাজাৰ)
(মৰ্য্যাপ্ৰদেপ)

মাৰ্চ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

ভাৰুপিন্ধা

অভয়াৰণ্য

চৈকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহব-

ফুটুকী বাঘ, গৌড়, শব পহ.

ফুটুকী-হৰিণ ইত্যাদি ।

বোৰাসৰ পৰা ২০০

কিলোমিটাৰ দূৰ ।

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট

অফিচাৰ, চোৰগোজা

অধিকাৰপুৰ (মৰ্য্যাপ্ৰদেপ)

ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ

পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

চোৰাচল্ অভয়াৰণ্য

চৈকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহব-

ফুটুকী বাঘ, গৌড়, শব পহ.

ফুটুকী-হৰিণ ইত্যাদি ।

বোৰাসৰ পৰা ১১৫

কিলোমিটাৰ দূৰ ।

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট

অফিচাৰ, চোৰগোজা,

অধিকাৰপুৰ (মৰ্য্যাপ্ৰদেপ)

ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ

পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

পাঞ্জা অভয়াৰণ্য

চৈকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহব

ফুটুকী বাঘ, শব পহ, ফুটুকী

হৰিণ, গৌড়, নীলগাই,

সুপৰী পহ ইত্যাদি ।

বেজোৰাহৰ পৰা ২০

কিলোমিটাৰ দূৰ ।

চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, পাঞ্জা

চেফোৱাৰী, পাঞ্জা

(মৰ্য্যাপ্ৰদেপ)

নবেম্বৰ মাহৰ পৰা মেই মাহ

পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ৰোমাক্স অভ্যৰণ	চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব ফুটুকী বাঘ, শৰপহ, নীলগাই ফুটুকী হৰিণ, গৌণব, সুগুৰী পহ ইত্যাদি ।	বাইপুৰৰ পৰা ২০২ কিলোমিটাৰ দূৰ আৰু বাক্সগড় বেলৰে ষ্টেচনৰ পৰা ৭০ কিলোমিটাৰ ।	চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট, গোসাঁজা চেফোৱাৰী (যৰা প্ৰদেশ)	ফেফুৱাৰী সাহৰ পৰা কেই সাহ দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সৰৱ ।
বালব্ধ অভ্যৰণ	চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব ফুটুকী বাঘ, নীলগাই, শৰপহ, ফুটুকী হৰিণ ইত্যাদি ।	বাঁচিৰ (বাহাৰ) পৰা ২৪০ কিলোমিটাৰ আৰু বাইপুৰ (যৰা প্ৰদেশ) পৰা ৩৮৬ কিলোমিটাৰ দূৰ ।	চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট ৰাজলখল চেফোৱাৰী (যৰা প্ৰদেশ)	নাৰেখন সাহৰ পৰা ফেফুৱাৰী সাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে ভাল সম্ভৱ ।
বান্ধাজাপৰা অভ্যৰণ	চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব- ফুটুকী বাঘ, তালুক, শৰপহ, ফুটুকী হৰিণ ইত্যাদি ।	বাইপুৰৰ পৰা ১৩০ কিলোমিটাৰ ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, নৰ্থ বায়পুৰ ডিভিজন (যৰা প্ৰদেশ)	মাৰ্চ সাহৰ পৰা জুন সাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ উপযুক্ত সৰৱ ।
চিৰপাৰ পকী অভ্যৰণ	নাগাবিৰ চৰাই আৰু জানোৱাৰ ।	বাইপুৰৰ পৰা ৬৮ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, নৰ্থ বায়পুৰ ডিভি- জন (যৰা প্ৰদেশ) .	মাৰ্চ সাহৰ পৰা জুন সাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ উপযুক্ত সৰৱ ।
সীতানলী অভ্যৰণ	চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব- ফুটুকী বাঘ, শৰপহ, ফুটুকী হৰিণ, বনৰীয়া গাহৰি, গৌণব সুগুৰী পহ, ব'ৰা চৰাই ইত্যাদি ।	মানা বাইপুৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা ১৮৬ কিলোমিটাৰ দূৰ আৰু বামচাৰি ষ্টেচনৰ পৰা ৯৮ কিলোমিটাৰ ।	চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট, সীতানলী চেফোৱাৰী (যৰা প্ৰদেশ)	মাৰ্চ সাহৰ পৰা জুন সাহলৈ দৰ্শনৰ বাবে ভাল সৰৱ ।

(১)

নবদেহী অভয়াবণা

(২)

চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, গাছব-
ফুটকী বাঘ, শৰপহ, চিন-
কাৰা, নীলগাই, ফুটকী হৰিণ,
ভালুক ইত্যাদি।

(৩)

বানা সাগৰৰ পৰা ৭২
কিলোমিটাৰ দূৰ।

৪)

চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট নৰসিং
চেঞ্চাৰাণী (নব্য প্ৰদেশ)

(৪৫)

ডিচেম্বৰ মাহত পৰা মাৰ্চ মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ প্ৰশস্ত সময়।

নবদেহী অভয়াবণা

নাহৰ ফুটকী বাঘ, শৰ পহ,
ফুটকী হৰিণ, নীলগাই, বন-
বীয়া গাহৰি, ব'ৰা চৰাই
ইত্যাদি।

ভূপালপৰা ৭৫ কিলো-
মিটাৰ আৰু বিয়াউৰা
ষ্টেচনৰ পৰা ২৫ কিলো-
মিটাৰ নিম্নপত অৱস্থিত।

চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট, নৰসিং
চেঞ্চাৰাণী (নব্য প্ৰদেশ)
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট সময়।

দুৰ্বি অভয়াবণা

চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, গাছব-
ফুটকী বাঘ, নীলগাই, ফুটকী
হৰিণ, সুগৰী পহ, চিলকাৰা
ইত্যাদি।

চিৰিৰ পৰা ৬৫ কিলো-
মিটাৰ দাঁতৰত অৱস্থিত।

চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট, দুৰ্বি
চেঞ্চাৰাণী (নব্য প্ৰদেশ)
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট সময়।

ৰাপু দাৰা অভয়াবণা

নাহৰ ফুটকী বাঘ, কুকুৰাৰ,
ভালুক, গৌড়, শৰপহ,
সুগৰী পহ, নীলগাই ইত্যাদি।

বিৰ্জাপুৰ (উত্তৰপ্ৰদেশ)
পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ

চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট, ৰাপু-
দাৰা চেঞ্চাৰাণী
(নব্য প্ৰদেশ)
নবেম্বৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে ভাল সময়।

পাচমাৰহি
অভয়াবণা

চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ-
ফুটকী বাঘ, ভালুক, ফুটকী-
হৰিণ, শৰ পহ, সুগৰী পহ,
নীল গাই ইত্যাদি।

পাপাৰিয়া বেলহে ষ্টে-
চনৰপৰা ২৫ কিলোমিটাৰ।

চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট পাচ
মাৰহি চেঞ্চাৰাণী
(নব্য প্ৰদেশ)

মাৰ্চ মাহৰ পৰা জুন
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ প্ৰশস্ত সময়

(১)

আজানাৰ
অভ্যাস

(২)

ঠেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, গৌড়, শব-পহ, ফুটুকী হৰিণ, বন-বীয়া পাহৰি, বঁৰা চৰাই ইত্যাদি।

(৩)

বাঁহপুৰ পৰা ১৬৫ কিলোমিটাৰ আৰু কাৰ পিবোড ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ ৩০ কিলোমিটাৰ নিম্নগত অৱস্থিত।

৪)

চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট, আচা-নাক্ষাৰ চেঞ্চাৰী (মৰ্য্যাদা)

(৫)

নৰেশ্বৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে ভাল সময়।

বাতাপানী অভ্যাস

ঠেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, শব পহ, ফুটুকী, হৰিণ, নীলগাই, চিল্কাৰা ইত্যাদি।

চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট, বাতাপানী চেঞ্চাৰী (মৰ্য্যাদা)

ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে প্ৰশস্ত সময়।

পাক অভ্যাস

ঠেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, গৌড়, শবপহ, ফুটুকী হৰিণ, নীলগাই ইত্যাদি।

জিভিভাৰ ফৰেষ্ট অফিচাৰ, চেউনী ডিভিজন (মৰ্য্যাদা)

নৰেশ্বৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

নিৰ্দ্ধাৰিত অভ্যাস

ঠেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, গৌড়, শব পহ, ফুটুকী হৰিণ, নীলগাই ইত্যাদি।

জিভিভাৰ ফৰেষ্ট অফিচাৰ, বাইচেন ডিভিজন (মৰ্য্যাদা)

নৰেশ্বৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

পানি দৰ্শন
অভ্যাস

শব পহ, সুপৰী পহ, ফুটুকী-হৰিণ, চিল্কাৰা আৰু নানাবিধ পানীত চৰি ফুৰা চৰাই।

ডি.এক'চ'ইল কন-জাৰভেণ্ট, নান্দত (মৰ্য্যাদা)

নৰেশ্বৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে ভাল সময়।

(১২)

খেওনি অভয়াবধা

(২)

নাছব, ফুটকী বাথ, শব পহ, ফুটকী-হাবি, ভালুক, নীল গাই ইত্যাদি।

চান্দোবা নেচনেল

পার্ক

চেন্দীয়া-পড়ীয়া বাথ, নাছব-ফুটকী বাথ, মাটি ভালুক, গৌড়, শব পহ, ফুটকী হাবি, নীল গাই, চিলকাবা আৰু ঘদিবাদ।

পাক্ষ নেচনেল পার্ক

চেন্দীয়া-পড়ীয়া বাথ, নাছব ফুটকী বাথ, মাটি ভালুক, শব-পহ, ফুটকী হাবি, সুগনী পহ, সগুচিলা, নীল গাই, চিলকাবা, ন'বা চখাই, বন-বুড়া ইত্যাদি।

নাছবগাঁও নেচনেল পার্ক

চেন্দীয়া পড়ীয়া বাথ, নাছব-ফুটকী বাথ, গৌড়, মাটি ভালুক, শব পহ, ফুটকী-হাবি, সুগনী পহ, নীলগাই আৰু জাজিহিল বনপৰীদ চান্দ

(৩)

ইলোৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা ১৫০ কিলোমিটাৰ।
মহাবাতি

নাগপুৰ পৰা ২০৮ কিলোমিটাৰ দূৰত, বাবেদা আল চক্ৰপুৰ বেলেৰে ষ্টেচনৰ পৰা ক্ৰমে ৫৬ কিলোমিটাৰ আৰু ৪৫ কিলোমিটাৰ আঁতৰত অবস্থিত।

নাগপুৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা ১৪ কিলোমিটাৰ নিলপত আৰু নাগপুৰ বেলেৰে ষ্টেচনৰ পৰা ৬৪ কিলোমিটাৰ আঁতৰত অবস্থিত।

নাগপুৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা ১৪৫ কিলোমিটাৰ নিলপত অবস্থিত।

(৪)

চুপাৰিগেটেডেণ্ট, পেডান চেফোৰাণী (মহা প্রাণেশ)

ভিত্তিভগেন কৰেটে অফিচৰ, জাফা ভিত্তিভগ, চক্ৰপুৰ (মহা-ই)

ভিত্তিভগেন কৰেটে অফিচৰ, নাগপুৰ ভিত্তিভগ নাগপুৰ (মহা-ই)

ভিত্তিভগেন কৰেটে অফিচৰ, পঞ্জি ভিত্তিভগ পঞ্জি (মহা-ই)

(৫)

নাছবৰ মাছৰ পৰা জুন মাছ পৰ্বত পৰ্জনৰ বাবে ভাৰ সম্ভ।

মেই ডাৰ জুন নাছ পৰনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

মেই নাছ পৰনৰ বাবে শ্রেষ্ঠ।

মেই নাছ পৰনৰ বাবে ভাৰ।

(১)

বসিভূমি
পার্ক

(২)

নাহর-কুটুকী বাঘ, শব পহ,
চাওচিকা, নিশানি হরিণ,
বনবীয়া গ্রাহবি আক লেহু
বা হনুমান বালব ।
সিংহ-কাঁকড়ি আছে ।

বান্ না
গাইপার

কেকীয়া-পটীয়া, বাঘ, নাহর-
কুটুকী বাঘ, শব পহ, ভালুক
সুপতী পহ, চাওচিকা, বনবীয়া
গ্রাহবি, কুটুকী হরিণ, মানবিবর
বনবীয়া চবাই ।

হাওরাল
অভাষণ

নাহর-কুটুকী বাঘ, বনবোলা,
নীল গাই, বনেট বেকক,
হনুমান বালব, শব পহ,
কুটুকী হরিণ, হাওরোলা, বাং
কুকু, বাঘ, চিন্ কাবা, ব'লা-
চবাই, বন-কুকু, হাইচা,
পাটুই ইভাগি ।

বাগানপতী
অভাষণ

গৌড়, নাহর কুটুকী বাঘ,
শব পহ, বনবীয়া গ্রাহবি
আক নানা বিবর বনবীয়া
চবাই ।

(৩)

চাওচাক ককর পবা
২০ কিনোমিটার খাঁড়-
বড় অরুহিত । হাঁট
পাড়াবে ককর পবা হাঁট
পাবি ।

নাগপুসর পবা ২৬০
কিনোমিটার আক বাদ-
নেবা টেটর পবা ১২৪
কিনোমিটার দুবড়
অরুহিত ।

অলপাও নাগর গাইব
পবা বাঘ পাবি । জলুনি
বাডের বেগরে টেটর
পবা ১৭ কিনোমিটার
দুব ।

পুণার পবা ২৯০

কিনোমিটার দুব আক
কলহাপুর বেলে টেট-
নর ওচবেতে অরুহিত ।

(৫)

জানুয়ারী সাহর পবা সার্চ সাহ
দর্শন বাবে উপবৃত্ত সময়

(৪)

ভিভিঅনেন কবেটে
অকিচাব, বরিভুনি ভিভি-
অন (কহাবাই)

এগ্রিল আক সেই সাহ দর্শন
উপবোপী ।

ভিভিঅনেন কবেটে
অকিচাব, ইয়াহান ভিভি-
ভিভিঅন (কহাবাই)

এগ্রিল আক সেই সাহ দর্শন
বাবে জল ।

ভিভিঅনেন কবেটে
অকিচাব, ইয়াহান ভিভি-
অন, অলপাও (কহাবাই)

সে সাহর পবা চেগেদর সাহল
দর্শন বাবে উপবৃত্ত সময় ।

ভিভিঅনেন কবেটে
অকিচাব, কলহাপুর ভিভি-
অন, কলহাপুর (কহাবাই)

(২)

কাৰিগালা পক্ষীবিহাৰ মিনিভেট, পাৰ্ভাইড

অভয়াবণ্য

(২)

কুই কেচাৰ, চামা (কল্যাণি)
মালৱান হুইচিং; প্ৰাচ,
ভীম্বাজ. কাঠৰোকা বা ৱাটিন-
টোকা, জন্তৰ তিতৰত নাহৰ
ফুটকী নাথ. চাণ্ডচিঙ্গা আৰু
সাধৰণ হনুমান বান্দৰ সেৰি-
বটল পোৱা যায়।

তান্‌ছা অভয়াবণ্য

নাহৰ ফুটকী বাথ, চাণ্ডচিঙ্গা
বা চাৰি-শিঙীয়া এণ্টেলপ্‌,
ফুটকী-হৰিণ. শৰপহ. বন-
নীয়া গাহৰি আৰু নাগবিধৰ
ৰং বেৰডৰ বনবীয়া চৰাই।

নাৰ্জিৰা অভয়াবণ্য

চেকীয়া-পতীয়া বাথ, নাহৰ-
ফুটকী বাথ, পৌণ্ডৰ, মাটি-
ভালুক, শৰ-পহ, চাণ্ডচিঙ্গা,
নাগ-পাই, ফুটকী হৰিণ,
মুগুনী পহ, নিগনি-হৰিণ
ম'ৰা চৰাই, বন-কুকুৰা আৰু
নাগবিধৰ অন্যান্য বনবীয়া
চৰাই।

(৩)

বৰেৰ চান্দক্ৰম্ব বিমান
বন্দৰ পৰা ৭০ কিলো-
মিটাৰ দূৰ আৰু পান-
তেল নাগৰ বেলেৱে হেচ-
চনৰ পৰা ১২
কিলোমিটাৰ।

(৪)

ভিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, বাইপাড ভিভি-
জন, আলিবাগ্‌ (মহাবাট্‌)

যেই সাহ দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত।

ভিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, চাহাপুৰ ভিভি-
জন জিলা: ধান
(মহাবাট্‌)

এফিল সাহৰ পৰা ছুন সাহ
পৰ্বত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

ভিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, ভান্‌পাৰা ভিভি-
জন (মহাবাট্‌)

হৰ অভয়াবণ্য	নাহৰফুটুকী বাঘ, মাটি ভালুক শব-পহ, নীল-পাই, ফুটুকী হৰিণ, সুপৰী-পহ, বনবীয়া গাহৰি আৰু বাঘ ।	নাগপুৰ পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ আৰু বান্দাব পৰা ৩৬ কিলোমিটাৰ দূৰ ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, বান্দাব ডিভিজন (মহাবাহু)	১৩) বে নাহৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত ।
কিন্ বাৰ্চ অভয়াবণ্য	চেকীয়া গভীয়া বাঘ, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, নীলগাই, মাটি ভালুক, ফুটুকী-হৰিণ, চিন- কাৰা, সুপৰী পহ আৰু বনবীয়া গাহৰি ।	নাগপুৰ সোণপাণ্ড বিমানকোঠৰ পৰা ৩৭২ কিলোমিটাৰ নিম্নপত আৰু কিন্ বাৰ্চ ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ ২ কিলোমিটাৰ বীতৰত অৱস্থিত ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, ইন্টৰ্নাল ডিভি জন, ইন্টৰ্নাল (মহাবাহু)	বেই আৰু অনু নাহৰ্শনৰ বাৰে উপযুক্ত ।
গ্ৰেইট ইণ্ডিয়ান বাৰ্চাৰ্ড চেঞ্চাৰী	গ্ৰেইট ইণ্ডিয়ান বাৰ্চাৰ্ড বা গোদবন নামৰ উলুবা স্বাতীয় পকী ।	পুনা বিমান বন্দৰ পৰা যাৰ পাৰি । শ্ৰীগণ্ডা বেলৰে ষ্টেচনৰ পৰা ৮০-৮৫ কিলোমিটাৰ আৰু চোলাপুৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, আহমদনগৰ আৰু চান ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, চোলাপুনা (মহাবাহু)	আগষ্ট আৰু চেপ্তেম্বৰ মাহ দৰ্শনৰ বাৰে উপযুক্ত ।
সেউলগাওঁ দেহেকুৰি ব্লেক-বাক চেঞ্চাৰী	সেউলগাওঁ দেহেকুৰি ব্লেক-বাক চেঞ্চাৰী	পুনা বিমান বন্দৰপৰা যাৰ পাৰি । শ্ৰীগণ্ডা বেলৰে ষ্টেচনৰ পৰা ৮০-৮৫ কিলোমিটাৰ দূৰ ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, আহমদনগৰ (মহাবাহু)	বছৰৰ সকলো সময় বাৰে উপযুক্ত ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
বায়ব টাইপাব প্রজেক্ট	ফ্রেন্সী পতীয়া বাঘ, নাহব ফুটকী বাঘ, হায়েনা, বন- বোশা, চিত্তেট, শব পহু, ফুটকী-হবিদ, নীলগাই, ভালুক, বনবীয়া গাছনি, নাগাবিহব বনবীয়া চবাই ।	জয়পুৰ পৰা ১৪৫ কিলোমিটাৰ আৰু টাইয়াই মাধপুৰ নেলৈ টেচনৰ পৰা ১১ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ।	ফিল্ড ডিবেটব, চাইয়াই মাধপুৰ বায়ব টাইপাব প্রজেক্ট (বাজস্থান)	জুলাই, আগষ্ট আৰু নাহব বাহিৰে বছৰ বাকী আটাই কেইটা মাহ দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল ।
চাৰিত্ৰ অভ্যাবণা	ফ্রেন্সী-পতীয়া বাঘ, নাহব- ফুটকী বাঘ, হায়েনা, বন- শেকুৰী, চিত্তেট, শবপহু, চিনকাৰা, নীলগাই, চাওচিমা আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰ বনবীয়া পক্ষী ।	জয়পুৰ পৰা ১০৮ কিলোমিটাৰ আৰু আল- ৱাৰ বেলেৰ টেচনৰপৰা ২১ কিলোমিটাৰ দূৰ ।	সাইল্ড নাইক হাৰ্ডেন, চাৰিত্ৰা অভ্যাবণা (বাজস্থান)	জুলাই, আগষ্ট আৰু মাহব বাহিৰে বছৰ বাকী আটাই কেইটা মাহ দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত ।
ভাবতপুৰ পক্ষী- বিহাৰ অভ্যাবণা	চাইবেৰিয়ান ফ্রেইন, পানী- কাউনী, সৈকলা, শৰিগবি, ব- চৌকোলা, শামুক ভঙা, আই- শিত, বপলী, কংগুচি, ইটা- গুৰীয়া চবাই, চাকৰ, কুট, পঙা চিলনী, বড়ী ব- চৌকোলা, বালি-মাই, বালি- বোবা, নাগাবিহব বনবীয়া পাতিহাছ, ডাউক, দলৰ বা আদি চবাই ।	আগ্ৰা পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ আৰু ভাবতপুৰ পৰা ২ কিলোমিটাৰ আন্তৰত অৱস্থিত দিল্লীৰ পৰা ১৭৬ কিলোমিটাৰ জয়পুৰ পৰা ১৫২ কিলোমিটাৰ আৰু মধ- নাৰ পৰা ৩৫ কিলো-	ভেপাটী চীক সাইল্ড নাইক হাৰ্ডেন, ভাবতপুৰ পক্ষীবিহাৰ চৌকো ৱানী, ভাবতপুৰ (বাজস্থান)	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত দায় ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
বনবিহার বাকগাওঁ অভয়াবণা	কাম চবাই ইত্যাদি । স্তন্যপায়ী ঘস্তব ভিতবত শব- পহ, ফুটুকী হৰিণ, নীলগাঁই, কুকুৰা, বনবীয়া গাহৰি, চিতেই কেট আদি আনোৱাৰ পেৰিটল পোৱা যায় ।	বিসাঁহ দূৰ ।	আশ্ৰাৰ পৰা ৭৫ কিলো- মিটাৰ আৰু চলপুৰ বেলতৈ ষ্টেচনৰ পৰা ২০ কিলোমিটাৰ দূৰত	জুলাই, আগষ্ট আৰু চেপ্তেম্বৰ মাহৰ বাহিৰে বছৰ বাকী আটাই কেইটা মাহ দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।
দৰা অভয়াবণা	বিধৰ বনবীয়া চবাই । চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ- ফুটুকী বাঘ, শব-পহ, ফুটুকী হৰিণ, নীলগাঁই, বনবীয়া- গাহৰি, শহাপহ আৰু নানা- বিধ চবাই ।	অগপুৰৰ পৰা যাৰ পাৰি । কোটা বেলতৈ ষ্টেচনৰ পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ দূৰ ।	ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন দৰা অভয়াবণা (বাজস্থান)	জুলাই, আগষ্ট আৰু চেপ্তেম্বৰ মাহৰ বাহিৰে বছৰ বাকী আটাই কেইটা মাহ দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময় ।
অগচানাত অভয়াবণা	নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, ফুটুকী হৰিণ, শিয়াল, নীল-গাঁই, চিন্কাৰা, শহাপহ আৰু বিভিন্ন জাতীয় চবাই ।	উদয়পুৰৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ আৰু উদয়- পুৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।	ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন অগচানাত অভয়াবণা (বাজস্থান)	জুলাই, আগষ্ট মাহৰ বাহিৰে বছৰ বাকী আটাই কেইটা মাহ দৰ্শনৰ বাবে ভাল ।

ভাৰি দিবেৰ এবেলা
(২৩শ বিন্দু হই
নীলৰ ঢকা পঠিত)

বৃক্ষাৰ, চিনকাৰা, চিনকাৰা ।

নীতা বাতা
অভয়াৰণ্য
মকড়নি অভয়াৰণ্য

বৃক্ষাৰ, চিনকাৰা, নীলগাই
ইত্যাদি ।
শ্বেট ইতিমান বাতাৰ্চ,
বৃক্ষাৰ, চিনকাৰা ইত্যাদি ।

বাঙ্গালী
পাৰ্চ

হাতী, বাঘ, গৌড়, শৰপহ,
ফুটী-হৰিণ, সুগদী পহ,
বাং-কুকুৰ, বনবীয়া-গাহৰি,
শিয়ান, মাটি ভালুক, নাহৰ-
ফুটী বাঘ, চাঙাচিঙ্গা,
বাঙ্গালীৰ কেৰ্কেট, বন-
কুকুৰা, ডৰিক, হাইঠা
চৰাই, চাকৰ ইত্যাদি ।

(১৭)

বোম্বুৰ বিমান কোঠৰ
পৰা এইবোৰ ঠাইলৈ
যাব পাৰি । বোম্বুৰ
বেলৰ ষ্টেচনৰ পৰা
৫০ কিলোমিটাৰ দূৰত
অৱস্থিত ।

উমৰপুৰৰ পৰা যাব পাৰি ।
অমৰপুৰৰ পৰা যাব পাৰি।
কোচা বেলৰ ষ্টেচনৰ
পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ
দূৰত অৱস্থিত ।

কৰ্ণাটক

বাঙ্গালীৰপৰা ১৯০
কিলোমিটাৰ আৰু মহী-
ভবৰ পৰা ৬৫ কিলো-
মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।

(১৮)

বেঙ্গ অফিচৰ, বোম্বুৰ
(বাঙ্গালী)

বেঙ্গ অফিচৰ, উমৰপুৰ
(বাঙ্গালী)
বেঙ্গ অফিচৰ, বোম্বুৰ
(বাঙ্গালী)

কিল্ড ডিবেট, প্ৰজেক্ট
টাইপাৰ, মহীভব
(কৰ্ণাটক)

(১৯)

কৰ্মৰ বেই কোনো সৰ্ব-
যাবে উপযুক্ত ।

কৰ্মৰ বেই কোনো সময়তে এই
অভয়াৰণ্য দৰ্শন কৰিব পাৰি ।
কৰ্মৰ বেই কোনো সময়তে এই
অভয়াৰণ্য দৰ্শন কৰিব পাৰি ।

মাৰ্চ হাৰৰ পৰা আগষ্ট মাহ পৰ্যন্ত
দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময় ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
বানানবাচা নেচনেল পার্ক	হাতী, মাটি ভালুক, ফুটকী- হরিণ, সুগন্ধী-পহ, মুগা বর্ণন পাটুজ, চাকৰ ইত্যাদি ।	বাক্সালোবৰ পৰা ২০ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ।	এচিষ্টেণ্ট কনষ্টাৰভেটৰ অৱ ফৰেষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ চাৰ ডিভিজন, বাঙ্গালোব (কৰ্ণাটক)	বছৰৰ যেই কোনো সময়ত দৰ্শন কৰিব পাৰি ।
নাগৰহোল নেচনেল পার্ক	হাতী, ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ-ফুটকী বাঘ, ফুটকী হৰিণ, শৰপহ, মাটি ভালুক, বন-কুকুৰা, পাটুজ ইত্যাদি ।	বাক্সালোবৰ পৰা ২২০ কিলোমিটাৰ আৰু মহী- উবৰ পৰা ৯০ কিলো- মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।	এচিষ্টেণ্ট কনষ্টাৰভেটৰ অৱ ফৰেষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ চাৰ ডিভিজন, বাক্সালোব (কৰ্ণাটক)	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ পর্যন্ত এই গোটেই ছোৱা সময় দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত ।
গোবিশুব অভয়াৰণ্য	গৌওন, ফুটকী হৰিণ, শৰ- পহ, নাহৰ ফুটকী বাঘ, ঢেঁকীয়া পতীয়া বাঘ, মাটি ভালুক, বাং কুকুৰ ইত্যাদি ।	বাক্সপাটৰ পৰা ৯০ কিলোমিটাৰ আৰু বাক্সা লোবৰ পৰা ১১০ কি: দূৰত অৱস্থিত ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, মাৰুকা ডিভিজন, কুৰ্গ (কৰ্ণাটক)	বছৰৰ যেই কোনো সময় ।
বুধাপিৰি অভয়াৰণ্য	ঢেঁকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহৰ- ফুটকী বাঘ, শৰপহ, ফুটকী হৰিণ, সুগন্ধী পহ, মাটি- ভালুক, ফেটীপাং, বাঘশৰ, বালাবাৰ কেৰ্কেটৱা, চিৰেট, নিপানি-হৰিণ ইত্যাদি ।	বাক্সালোবৰ পৰা ১২৫ কিলোমিটাৰ আৰু মহী- উবৰ পৰা ১০০ কিলো- মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, মাৰুকা ডিভিজন কুৰ্গ (কৰ্ণাটক)	বছৰৰ যেই কোনো সময় ।
আৰাৰিৰিতো সুপৰাৰন	ফুটকী-হৰিণ, বনৰীয়া গাহৰি কেৰ্টোনা-পহ, শৰাপহ, শিয়াল, ডৰিক, চাকৰ, বন-কুকুৰা ইত্যাদি ।	বাক্সালোবৰ পৰা ১৬০ কিলোমিটাৰ আৰু মহী- উবৰ পৰা ৩০ কিলো- মিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।	এচিষ্টেণ্ট কনষ্টাৰভেটৰ অৱ ফৰেষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ চাৰ ডিভিজন, মহীশুৰ (কৰ্ণাটক)	বছৰৰ যেই কোনো সময় দৰ্শনৰ অনুকূল ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
শালকেটি মলিব অভয়াবণ্য	নাহব-ফুটুকী বাঘ, কুকুৰ নেচীয়া বাঘ, মাটি ভালুক, কৃষ্ণসাব, শহাপহ, কেটনা, পহ, বনবীয়া গাহৰি ইত্যাদি।	বাজাগোবৰ পৰা ৯০ কিলোমিটাৰ নিম্নপত অৱস্থিত।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, নৰা ডিভিজন মৰা (কৰ্ণাটক)	খৰালি নাহ কেইটা দৰ্শনৰ উপযোগী।
মাটাগ্ৰা পক্ষী- বিহাৰ অভয়াবণ্য	বৰগনী, পানী-কাউৰী, দৈকলা, কণামুচৰি ইত্যাদি।	বেলগাঁৱৰ পৰা ৪০ কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, পোকাক ডিভি- জন, পোকাক (কৰ্ণাটক)	খৰালি নাহ কেইটা দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল।
নোগো অভয়াবণ্য	হাতী, বাঘ, শৰপহ, ফুটুকী- হৰিণ, সুপৰী-পহ, গৌণব, বনবীয়া-গাহৰি, মাটি ভালুক ইত্যাদি।	বাস্তানোৰ বিমানকোঠৰ পৰা ৯০ কিলোমিটাৰ আৰু মহীশূৰৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ নিম্নপত	এণ্ডিষ্টেণ্ট কমণ্ডাণ্ডেণ্টৰ অফ ফৰেষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ চাৰ ডিভিজন, মৰী ওৰ (কৰ্ণাটক)	খৰালি নাহ কেইটা দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল।
টঙ্গ-ভদ্রা অভয়াবণ্য	নাহব-ফুটুকী বাঘ, কৃষ্ণসাব, চিনকাদা, ফুটুকী-হৰিণ, বন- বীয়া-গাহৰি, চাগুটিঙা বা চাৰিশিঙীয়া এণ্টেলপ, শৰ-পহ মাটি-ভালুক, থেক-শিয়াল, গাওজ, বাস্তাৰ্ড, উলুৰবা, আদি জন্তু আৰু চৰাই।	বাস্তানোৰ পৰা ১২০ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, বেলাৰী ডিভি- জন মেলাৰী (কৰ্ণাটক)	খৰালি নাহ কেইটা দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল।
বাণাবেলোৰ কৃষ্ণাব অভয়াবণ্য	কৃষ্ণসাব, ফুটুকী-হৰিণ, কুকুৰ- নেচীয়া দাপ, শহাপহ আদি সুনাংপায়ী জন্তু আৰু গ্ৰেইট ইণ্ডিয়ান বাস্তাৰ্ড নামৰ উলু-শৰা ভাতীয় চৰাই।	বেলগাঁৱৰ পৰা ১৬০ কিলোমিটাৰ দূৰ আৰু বাণাবেলোৰ বেলগে ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ ১০ কিলোমিটাৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, ধাবছাৰ ডিভি- জন, ধাবছাৰ (কৰ্ণাটক),	বহুবৎ সকলো সময়তে এইখন অভয়াবণ্য দৰ্শন কৰিব পাৰি।

(১) বোকাহিকা অভয়াৰণ্য	(২) হাতী, শৰ-পহ, বনবীয়া- গাহৰি, কেটেলা পহ, নাহব- ফুটুকী বাঘ আদি জনোৱাৰ ।	(৩) মাকালোৰৰ পৰা ৯০ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ।	(৪) ভিত্তিজনেল ফৰেট অফিচাৰ, গোন্দাপুৰ, ডিভি- জন গোন্দাপুৰ (কৰ্ণাটক)	(৫) বহুবৰ মেই ৫ নোৱা সময় দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল ।
শাৰাৰাথি উপত্যকা অভয়াৰণ্য	হাতী, ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, গোঁড়ৰ, শৰপহ, ফুটুকী-হৰিণ সুগৰী-পহ, বনবীয়া-গাহৰি, শিয়াল, বাং-কুকুৰ, ভালুক, চাৰিনিজীয়া এন্টেলপ বা চাওচিঙ্গা, মানায়াৰ কেৰ্কেটুৱা, বন-কুকুৰা, পাণ্ডুজ, সিংহ- নেজীয়া বান্দৰ, ঘৰিয়াল, দাছ, অজগৰ, ফেটসাপ আদি নানাবিধৰ সাপ ইত্যাদি ।	বাকালোৰৰপৰা ৩৫০ কিলোমিটাৰ আৰু সাগৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৬০ কিলো- মিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ।	ভিত্তিজনেল ফৰেট অফি- চাৰ, সাগৰ ডিভিজন, গো: সাগৰ ছি: চি: সাগৰ (কৰ্ণাটক)	মেঘনাৰী সাহৰ পৰা সেই গাঁহ পৰ্যন্ত এই পোটেইখিনি সময় দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল ।
বিনিপিত্তি বাসস্থানী অভয়াৰণ্য	হাতী, গৌড়, ফুটুকী-হৰিণ, সুগৰী-পহ, শৰ-পহ, ভালুক আৰু নাহব-ফুটুকী বাঘ ইত্যাদি ।	বাকালোৰৰ পৰা ১৭০ কিলোমিটাৰ আৰু মহী- ভাৰ পৰা ৪০ কিলো- মিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ।	এচিষ্টেণ্ট কনষ্টাৰভল অৱ ফৰেট, মহীভাৰ চাৰ্- ডিভিজন, মহীভাৰ (কৰ্ণাটক)	কেম্ৰাহাৰীৰ পৰা এখিল সাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ অনুকূল ।
ভূম অভয়াৰণ্য	হাতী, গৌড়, নাহব-ফুটুকী বাঘ, মাটি-ভালুক, শৰ পহ, ফুটুকী-হৰিণ, সুগৰী পহ, বনবীয়া গাহৰি ইত্যাদি ।	বাকালোৰৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ আৰু কাঙ্গোৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৭০ কিলোমিটাৰ দূৰ ।	ভিত্তিজনেল ফৰেট অফি চাৰ, চিক্ৰ মাকালোৰ ডিভিজন, চিক্ৰ মাকালোৰ (কৰ্ণাটক)	জালোৱাৰী সাহৰ পৰা জুন সাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে প্ৰশস্ত সময় ।

(১)

ছাটপালি অভয়াবণ

(২)

হাতী, গৌড়, নাহব-কুটী, বাঘ, শব পহ, কুটী-হরিণ, সুগ্ৰী পহ, মাটি ভালুক, বনবীয়া গাছনি ইত্যাদি।

বাপানগিতো পক্ষী
বিহার অভয়াবণ

শাবুক-ভড়া, ক্যা আইবিচ, গুব-বক, সুহ-বক, পানী কাউনী, সৈকতা, মণিদি, কণামুচাং, নদীর গজাচিলা, চামুচ, মিলিয়া ববটোকোলা, মনিসাল ইত্যাদি।

তালেশনি অভয়াবণ

নাহব-কুটী, বাঘ, মেলীয়া-পতীয়া, বাঘ, হাতী, গৌড়, মাটি-ভালুক, শব-পহ, কুটী-হরিণ, বনবীয়া গাছনি ইত্যাদি।

এবাতিকুলাম বাত-
ফাগার গেচনেল
পার্ক

হাতী, চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহব-কুটী, বাঘ, গৌড়, শব-পহ, সুগ্ৰী-পহ, নীলগাই বন বেকুদী, হনুমান বাঘ, লিং-নেলীয়া বাঘ, বন-বীয়া গাছনি, মালার বাঘ, ইয়া, বাং-কুব, বন-ককনা, পর্দুনা ইত্যাদি।

(৩)

বাকালোবং পৰা ২৭০
কিলোমিটার আৰু চিমপা
ষ্টেচন পৰা ২০
কিলোমিটাৰ দূৰ।
বাকালোবং পৰা ১১০
কিলোমিটাৰ আৰু
শ্রীনাগাপাটিনাৰ বেলেৰে
ষ্টেচন পৰা ১০ কিলো
মিটাৰ দূৰত্বে অৱস্থিত।

বেলগাঁৱৰ পৰা ১০০
কিলোমিটাৰ দূৰত্বে
আৰু বাংহাৰ ষ্টেচন
পৰা ৪০ কিলোমিটাৰ
দূৰত্বে অৱস্থিত।

কেকেলা

কোচিন পৰা ১৪০
কিলোমিটাৰ আৰু আল
হাৰে ষ্টেচন পৰা ১২০
কিলোমিটাৰ দূৰ।

(৪)

ভিভিকনেল ফৰেষ্ট অফি-
চাৰ, চিমপা ভিভিকনেল
চিমপা (কৰ্পাটক)
এচেটেংট কান্ডাবভেট
অফ ফৰেষ্ট, হাইল্ড লাইফ
ভিভিকনেল, হাইল্ড (কৰ্পাটক)

এচেটেংট কান্ডাবভেট
অফ ফৰেষ্ট, হাইল্ড লাইফ
ভিভিকনেল, হাইল্ড
(কৰ্পাটক)

ভিভিকনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, ম্যুমাৰ ভিভিকনেল
পেভিকৰ (কেবেলা)

(৫)

ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা জানুৱাৰী
মাহ মাহ পৰ্বত মৰ্শনৰ বাবে
উপযুক্ত সময়।
জুলাই আৰু আগষ্ট মাহ মৰ্শনৰ
বাৰে উপযোগী।

ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল আৰু
মেই এচৈ চাৰি মাহ সময় মৰ্শনৰ
বাৰে অনুকূল।

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহ
পৰ্বত মৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

(১)

পেৰিয়াৰ অভাৱৰণ্য

(২)

হাতী, বাঘ, নাহৰ, ফুটুকী,
বাঘ, গাং-বুকুৰ, ভালুক, শব-
পহ, সুপুৰী-পহ, নীল-গাই,
বনৰীয়া গাহৰি ইত্যাদি।

(৩)

কোচিনৰ পৰা ২০০
কিলোমিটাৰ আৰু
মাদুৰাইৰ পৰা ১৪০
কিলোমিটাৰ আঁতৰত
অৱস্থিত। বটায়াৰ বেনাৰে
ষ্টেচনৰ পৰা ১২২
কিলোমিটাৰ দূৰ।

(৪)

হাইল্ড নাইক হাৰ্ডেন-
ভেচন অফিচাৰ, ট্ৰেকাডি
(কেৰেলা)

(৫)

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা কেই মাহ
পৰিস্ফৰ্ণনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

পৰিস্ফৰ্ণন

অভাৱৰণ্য

টেকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ-
ফুটুকী বাঘ, হাতী, পৌতৰ,
মাটি-ভালুক, নীলগাই, শব-পহ,
ফুটুকী হৰিণ, বৰিয়াল ইত্যাদি।

হাইল্ড নাইক হাৰ্ডেন
আৰু ডি এক অ.
পৰিস্ফৰ্ণন (কেৰেলা)

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহ
পৰিস্ফৰ্ণনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

নেৰাৰ অভাৱৰণ্য

হাতী, ঢেকীয়া-পতীয়া বাঘ,
নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, বনৰীয়া
গাহৰি, শবপহ, ফুটুকী-হৰিণ
নীল-গাই, নীলগিৰি পৰ
ইত্যাদি।

হাইল্ড নাইক হাৰ্ডেন
আৰু ডি এক অ.
ট্ৰেকাডিম (কেৰেলা)

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা কেই মাহ
পৰিস্ফৰ্ণনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

প্ৰাচি-ভালুগি

অভাৱৰণ্য

হাতী, বনৰীয়া গাহৰি, ফুটুকী-
হৰিণ ইত্যাদি।

ডিভিডেনল কৰেণ্ড
অফিচাৰ, ট্ৰেকাডি ভিকিজন
ট্ৰেকাডিম (কেৰেলা)

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহ
পৰিস্ফৰ্ণনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

কিলোমিটাৰ আঁতৰত
কডে ষ্টেচনৰ পৰা ১০৪
কিলোমিটাৰ নিৰ্ভৰত
অৱস্থিত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
উইনাৰ্ড অভয়াৰণ্য	হাতী, পৌণ্ডৰ, শৰ পহু, ফুটুকী হৰিণ, গুগৰী পহু, বনৰীয়া গাহৰি ইত্যাদি।	হাতী, কোঁৱৰ, শৰ পহু, ফুটুকী কিলোমিটাৰ পৰা ৩১০ কিলোমিটাৰ আৰু কৰিকডে ষ্টেচনৰ পৰা ১০৪ কিলোমিটাৰ নিৰূপণত ব্ৰহ্মস্থিত। কোচিন পৰা ১৬৪ কিলোমিটাৰ আৰু ত্ৰিশূৰ পৰা ৯১ কিলোমিটাৰ আঁতৰত ব্ৰহ্মস্থিত।	ভিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, কৰিকডে ভিভিজনেল আৰু ভিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ উইনাৰ্ড ভিভিজনেল (কেৰেলা) ৱাইল্ড লাইফ প্ৰিভাইলেচন অফিচাৰ, গোকাভি (কেৰেলা)	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মেই মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।
ইডুক অভয়াৰণ্য	হাতী, শৰপহু, পৌণ্ডৰ, মাটি ডালুক, বনৰীয়া গাহৰি ইত্যাদি।	হাতী, শৰপহু, পৌণ্ডৰ, মাটি ডালুক, বনৰীয়া গাহৰি ইত্যাদি।	ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন, মাদ্ৰাছ (তামিল নাডু)	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মেই মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।
গুইদি নোচনেল পাৰ্ক	ফুটুকী হৰিণ, কৃষ্ণমাৰু আৰু ব্ৰেক পাৰ্ক।	মাদ্ৰাছ পৰা লাভ্ৰ ৫ কিলোমিটাৰ দূৰত ব্ৰহ্মস্থিত।	ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন, মাদ্ৰাছ (তামিল নাডু)	বহুবৎসকলো গম্ভীৰ দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।
শৰমালাই অভয়াৰণ্য	হাতী, পৌণ্ডৰ, ফুটুকী-হৰিণ, শৰ-পহু, বনৰীয়া-পতীয়া বাঘ, মাহৰ-ফুটুকী বাঘ, মাটি ডালুক, বাং কুকুৰ ইত্যাদি।	ফুটুকী-হৰিণ, পৰা ১৬০ কিলোমিটাৰ অৰু উইনাৰ্ড ফৰেষ্ট পৰা ৬৪ কিলোমিটাৰ নিৰূপণত ব্ৰহ্মস্থিত।	ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন, কুইলচিৰ (তামিল নাডু)	ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।
আগামালাই অভয়াৰণ্য	হাতী, পৌণ্ডৰ, ফুটুকী-হৰিণ, শৰপহু, বনৰীয়া-পতীয়া মাঘ, মাহৰ-ফুটুকী বাঘ, মাটি ডালুক, বাং কুকুৰ ইত্যাদি।	ফুটুকী-হৰিণ, পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ আৰু পলাচী ষ্টেচন পৰা ৩৫ কিলোমিটাৰ আঁতৰত ব্ৰহ্মস্থিত।	ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন, কুইলচিৰ (তামিল নাডু)	ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

মুদানখুৰাই টাইগাৰ
অভয়াৰণ্য

চৌকীয়া-পতীয়া বাঘ, শৰপত,
ফুটকী-হৰিণ, বনৰীয়া গাহৰি
আৰু সিংহ নেজীয়া বান্দৰ।

পাইন্ট কালিমৰে
অভয়াৰণ্য

বৃক্ষসাগৰ, কুটুৰ্ণ, হৰিণ, বনৰীয়া
গাহৰি ইত্যাদি।

ভেদাছাল পক্ষী
বিহাৰ অভয়াৰণ্য
(পাৰাতাই
শুৰমাগলয়ৰ)

বেলেগ বেলেগ বিধৰ পানীত
চৰিহুৱা চৰাই।

কাৰ্ণাট
অভয়াৰণ্য

সিংহ-নেজীয়া বান্দৰ আৰু
চুপী-মুনীয়া বান্দৰ প্রভৃতি
দক্ষিণ ভাৰতীয় প্রাণী।

ভেটাজুদি পক্ষীবিহাৰ
অভয়াৰণ্য

নাগা ধৰণৰ বনৰীয়া চৰাই।

মাদুৰাই বিনাম কোঠৰ
পৰা ২০৩ কিনোমিটাৰ
দূৰ আৰু অন্য সমুদ্ৰ
বেলতৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৪০
কিলোমিটাৰ।

টিৰচি বিনাম কোঠৰ
পৰা ২৩২ কিলোমিটাৰ
আৰু পাইন্ট কাৰ্ণাট
বেলতৰ ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ
৫ কিলোমিটাৰ দূৰ।

মিনাষাকাম বিহাৰ
কোঠৰ পৰা ৭০ কিলো-
মিটাৰ আৰু চিঙ্গুপুত
বেলতৰ ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ
২৮ কিলোমিটাৰ দূৰ।

ব্ৰিহদ্ৰদৰ পৰা ২০০
কিলোমিটাৰ আৰু পেলা
মাৰ্গেপাই বেলতৰ ষ্টেচনৰ
পৰা ২৫ কিলোমিটাৰ
বিলগত অবস্থিত।

ব্ৰিহদ্ৰমলৰ পৰা ২৮
পাৰি।

ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন
কুইবাটৰ (ভামিল নাডু)

ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন
মাদ্ৰাজ (ভামিল নাডু)

ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন
মাদ্ৰাজ (ভামিল নাডু)

ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন
পাম্ৰাচি (ভামিল নাডু)

চেন্দুৱৰ অক্টোবৰ আৰু নবেম্বৰ
মাহ দৰ্শনৰ উপযুক্ত সময়।

ভামুৱাৰী মাহৰ পৰা চেপ্তেম্বৰ
মাহ দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।

নবেম্বৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী
মাহ পৰ্যন্ত এই আটাই কেইটা মাহ
দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

বহুদূৰ যেই কোনো মাহতে এই
অভয়াৰণ্য দৰ্শন কৰিবলৈ যাব
পাৰি।

ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন
বামনাথপুৰম (ভামিল নাডু)
অভয়াৰণ্য দৰ্শন কৰিব পাৰি।

নীলগিৰি বায়ো- সিক্‌য়েৰ বিজাৰ্ড ৰা পৰ্য্যাবৰণ সং- ক্ষিপ্ত বনভূমি (প্ৰস্তাৱিত) পাৰ্শ্বাল অভয়াৰণ্য	সকলো বিধৰ উদ্ভিদ আৰু জীৱ-জন্তুক সংৰক্ষণ কৰি বৰাৰ বাবে তামিলনাডু, কৰ্ণা- টক আৰু কেৰেলা ৰাজ্যৰ কেইবাখনো বনভূমি। চৈকীয়া পতীয়া বাঘ, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, শৰপত, ফুটুকী- হৰিণ, নীলগাই ইত্যাদি।	বায়োসিক্‌য়েৰ বিজাৰ্ড বা পৰ্য্যাবৰণ বনভূমি প্ৰতিষ্ঠাৰ ৰাৱস্থা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্য্যাবৰণ বিভাগে কৰিছে। হায়দাৰাবাদ বিনাম কোঠৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ আৰু কাছি পেট বেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ দূৰ।	চেক্ৰেটাৰী পৰ্য্যাবৰণ বিভাগ ভাৰত চৰকাৰ, চাহ জাহান ৰোড, নতুন দিল্লী অৰু প্ৰদেশ ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, ৱাইল্ড লাইফ ৱেনেইছমেণ্ট, বাদাকালি (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)	দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা এতিয়াও হৈ উঠা নাই। ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।
এটোবনাগাৰা অভয়াৰণ্য	শৰপত, চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ-ফুটুকী বাঘ, গৌওৰ বন-বেৰুকী, কৃষ্ণবাৰ ইত্যাদি।	হায়দাৰাবাদ বিনাম কোঠৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ আৰু কাছিপেট ষ্টেচনৰ পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, উত্তৰ বাদাকালি ডিভিজন, পিঃ বাদাকালি (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)	ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।
পতাৰাৰ অভয়াৰণ্য	চৈকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, চিলকাৰা, হৰা চৰাই আৰু গান্ধা প্ৰকাৰৰ পানীত চৰি ফুৰা পক্ষী কুলৰ প্ৰাণী।	হায়দাৰাবাদ বিনাম কোঠৰ পৰা ১২০ কিলোমিটাৰ আৰু বাদি- য়াৰাম বেংগেৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৪০ কিলোমিটাৰ নিৰ্ণণত অৱস্থিত।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, বেদক ডিভিজন, পিঃ বেদক (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)	ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল সময়।

(১)

কাৰাল অভয়াৰণ্য

(২)

ঢোলিয়া পতীয়া বাঘ, নাহৰ-
ফুটুকী নাথ, গৌড়ৰ, শৰপল,
ফুটুকী-হৰিণ, কৃষ্ণাব, বনা-
বীয়া গাহৰি, আন
মান্তালক ।

কলেক

পেনিকেনেৰী

পেলিকান (ধেনা), বগলী,
ফ্ৰিগেগো, বটীন বনটো-
কোলা, এভাচোট, দেওহাঁহ
আৰু গঙ্গাচিলনী চৰাই ।

নীলাপাঠো পক্ষী
বিহাৰ (অভয়াৰণ্য)

গ্ৰে পেলিকান, বগলী, পানী-
কাউৰী, দৈৰ্ঘকা, মণিয়ৰি,
নানা জাতীয় দেওহাঁহ
ইত্যাদি ।

কিনাৰচান
অভয়াৰণ্য

ঢোলিয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ-
ফুটুকী নাথ, কৃষ্ণ-মোতীয়া
বাঘ, গৌড়ৰ, শৰ-পল, ফুটুকী-
হৰিণ, নীলগাই, ভালুক
ইত্যাদি ।

(৩)

হায়দাৰাবাদ বিমান
কোঠৰ পৰা ২৮৮ কিলো-
মিটাৰ আৰু মানচাৰি-
য়া বেলতৈ ষ্টেচনৰ
পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ
দূৰ ।

মাদ্ৰাজৰ পৰা ৯০
কিলোমিটাৰ আৰু চুলু-
পেটা বেলতৈ ষ্টেচনৰ
পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ দূৰ ।

মাদ্ৰাজ বিমান বন্দৰৰ
পৰা ৯০ কিলোমিটাৰ
আৰু ডুনাবাৰী ক্ষেত্ৰন
বেলতৈ ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰ
৪ কিলোমিটাৰ নিলগত
অৱস্থিত ।

হায়দাৰাবাদ বিমান
কোঠৰ পৰা ৩০০
কিলোমিটাৰ আৰু ভদ্ৰ-
চান বোড বেলতৈ
ষ্টেচনৰ পৰা ২০
কিলোমিটাৰ দূৰ ।

(৪)

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, ভাণাৰাম ডিভি-
জন, স্ত্ৰি: আনিসাদাৰ
(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ)

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, ইলেক ডিভি-
জন, ইলেক (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ)

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, নোলোৰ ডিভি-
জন, নোলোৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ)

এচিষ্টেণ্ট কমণ্ডাৰভেটৰ
অৰ ফৰেষ্ট, কিনাৰচানি
অভয়াৰণ্য (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ)

(৫)

ডিচেষ্টৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে শ্ৰমন্ত সময় ।

ডিচেষ্টৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত
সময় ।

নবেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ
এই জটাই কেইটা মাহ দৰ্শনৰ
বাৰে অনুকূল সময় ।

ডিচেষ্টৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ
দৰ্শনৰ বাবে যিভোগুন সময়

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
গান্ধাবাদগো (শিৱালয়) অভয়াৰণ্য	ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ- ফুটুকী বাঘ, মাটি-ভালুক, শৰপহু, ফুটুকী-হৰিণ, হনুৱান বান্দৰ, বনৰীয়া গাহৰি ইত্যাদি।	হায়দাবাদ বিমান কোঠৰ পৰা ২৮০ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিভিজনলৈ ফৰেষ্ট অফিচাৰ, কৰিবনগৰ পশ্চিম ডিভিজন, কিয়া, ডিভিজনলৈ ফৰেষ্ট অফিচাৰ মানচেৰিয়াল ডিভিজন, জি: এদিলাবাদ আৰু কৰিবনগৰ (অস্থ:দেশ)	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে প্রশস্ত সময়।
মজিৰা অভয়াৰণ্য	ঘৰিয়াল আৰু নানাবিধ পানীত চৰিফণা পক্ষী কুলৰ প্ৰাণী।	হায়দাবাদ বিমান কোঠৰ পৰা ১০০ কিলো- মিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত।	ডিভিজনলৈ ফৰেষ্ট অফিচাৰ, মেদাক ডিভিজন জি: মেদাক (অস্থ:দেশ)	অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ দৰ্শনৰ বাবে সুন্দৰ সময়।
পাপিকলা অভয়াৰণ্য	ঢেঁকীয়া-পতীয়া বাঘ, নাহৰ- ফুটুকী বাঘ, বাং কুকুৰ, হায়েনা, শিয়াল, কুকুৰ- মেচীয়া বাঘ, গৌওৰ, চাৰি- শিঙীয়া এণ্টেলপ্ শৰপহু ফুটুকী-হৰিণ, নীলগাই।	বিজয়াদা বিমান কোঠৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ নিৰাপত্ত অৱস্থিত।	বাইল্ড লাইফ হাউচ, ৰাজামসী ফৰেষ্ট ডিভিজন, জি: পূৰ গোদাবৰী (অস্থ:দেশ)	নবেম্বৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট সময়।

(১)

কবিনাগা

অভয়াৰণ্য

(২)

লুনীয়া পানীত থকা বিধৰ
ষমিয়াল, মাছোঠৰ সেকুৱী,
শিয়াল, চি-গাল বা সাগৰৰ
গজাচিলনী ডাতীয়া পক্ষী
(বাম পাৰ). পেলিকান ল
ধোৰা, বৰটোকোচা, বগলী,
ফ্লুমিংগো।

নাগাৰ্জুন সাগৰ

শ্ৰীচাইনাম অভয়াৰণ্য
বঙালীয়া গাহৰি, শৰপছ,
ফুটুকী-হৰিণ, নীলগাই, কৃষ্ণ-
সাৰ, শিয়াল, বেক শিয়াল,
কুকুৰ-মেচীয়া বাঘ, আৰু
সগৰ কোকদাইল (যৰিয়াল)
ইত্যাদি।

পুলিকাট অভয়াৰণ্য

ফ্লুমিংগো, পেলিকান, নাগা-
বিধৰ বনহীয়া হাঁহ, কৰ্চন বা
ক্লেইন আৰু বগলী।

প্রগহিতা অভয়াৰণ্য

চেকীয়া-পতীয়া বাঘ, কৃষ্ণাৰ

(৩)

বিজয়াদা বিমান

কোঠৰ পৰা ইয়াটল
যাব পাৰি। কাকিন্দ
বেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ২০
বিলোমিটাৰ নিলগত
অৱস্থিত।

হায়দাৰাবাদৰ পৰা ইয় টেল
অহা যোৱা বৰিব পাৰি।

(অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)

(৪)

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট
অফিচাৰ, কাকিন্দ ডিভি-
জন (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট
সময়।

পৰিচিষ্ট

৪৫১

(৫)

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মেই মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট সময়।

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে ভাল সময়।

অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জুন মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট
সময়।

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট

অফিচাৰ, নেলোৰ ডিভি-

জন জিঃ নেলোৰ,

(অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)

ডিভিজনেল ফৰেষ্ট

অফিচাৰ, মানচোৰিয়াল

ডিভিজন, আদিলাবাদ

(অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)

আত্মদামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ

নাৰচান্ দ্বীপ
অত্যাৱণ্য নৰ্ধ বীক
দ্বীপ অত্যাৱণ্য
বাবেন আয়াল্লেণ্ড
অত্যাৱণ্য চাউথ
চেনিটনেৰ আৰবলেণ্ড
অত্যাৱণ্য

হৰিণ, গাহৰি, কচ্চি আৰু
নানাবিধ সাগৰত ধকা প্ৰাণী।

টীক কনসৰভেচন থৰ
ফৰেষ্ট তথা টীক
ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন
গোৰ্ণমেন্ট (আত্মদামান)

অত্মদামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপ
পুঞ্জত থকা অত্যাৱণ্য সমূহ
দৰ্শন কৰিবলৈ টীক ৱাইল্ড
লাইফ ৱাৰ্ডেন (গোৰ্ণমেন্ট)
ৱাৰ্ড যোগাযোগ কৰি লোৱা
ভাল।

গোৱা, দমন আৰু দিউ

নমান্ অত্যাৱণ্য

গৌণ, শৰপহ, নিগনি
হৰিণ, সুগুণী-পহ, নাহৰ-
ফুটকী বাঘ, বাম্বৰ, কেটেলা
পহ, চিভেট কেট, বন-
বেকুৰী, কেমটাই পহ, লাহি
লাহুকী বাম্বৰ, বন-কুকুৰা
ইত্যাদি।

টীক ৱাইল্ড লাইফ
ৱাৰ্ডেন (গোৱা)

নৰেঘৰৰ পৰা সেই নাই পৰ্যন্ত
দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।

বন্দনা অত্যাৱণ্য

গৌণ, শৰপহ, নিগনি-
হৰিণ, সুগুণী পহ, নাহৰ-
ফুটকী বাঘ, বাম্বৰ, কেটেলা
পহ, চিভেট-কেট, বন-
বেকুৰী, কেমটাই পহ, লাহি
লাহুকী বাম্বৰ, বন-কুকুৰা
ইত্যাদি।

টীক ৱাইল্ড লাইফ
ৱাৰ্ডেন (গোৱা)

নৰেঘৰ সাহৰ পৰা সেইনাই
পৰ্যন্ত এই গোটেই ছোৱা সময়
দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত।

(১)

কাটিগোৱা
যজ্ঞমানবা

(২)

গৌওৰ, শব-পহ, নিগনি-
হৰিধৰ্ম্মসুগৌ-পহ, নাহৰ-
ফুটকী বাৰ, কেটেলা-পহ,
চিভেট-কেট, বন-সেংকুণী,
কেমটাই-পহ, লাহি লাজুকী
বাদৰ, বন-কুকুৰা ইত্যাদি।

গাঁৱ নেচনেল
পাৰ্ক

ভান্ডাৰীয়া গিহে, নাহৰ ফুটকী
বাৰ, হায়েনা, শবপহ, নীল-
গাই, ফুটকী হৰিধ, চাবি-
শিঙীয়া এন্টেলপ, চিনকাৰা,
বনানীয়া গাহনি, নগৰ ইত্যাদি।
কুকুৰাৰ আৰু কুকুৰ-নেটীয়া
বাৰ হায়েনা পোৱা যায়।

ভেনাডাৰ নেচ-
নেল পাৰ্ক

নগৰ সলোৱৰ পাৰ্ক
বিহাৰ (অস্ত্ৰালিয়া)

পানীত চৰা নানাবিধ
বনানীয়া চাই।

(৩)

ডাৰবেনি (গোৱা)
বিনান কোঠৰ পৰা ৭০
কিলোমিটাৰ আৰু
মাদ-গাওঁ বেলেৱে টেচনা
পৰা ৩৪ কিলোমিটাৰ
দূৰ।

গুজৰাট

কেজুদৰ পৰা ৮৬
কিলোমিটাৰ আৰু
বাজকোটৰ পৰা ১৬৬
কিলোমিটাৰ দূৰত
অৱস্থিত।

ভাৱনগৰৰ পৰা গায়
৬৫ কিলোমিটাৰ দূৰ।

আহমেদাবাদৰ পৰা ৬৪
কিলোমিটাৰ দূৰ।

(১)

টাই-বাইল্ড লাইফ
ৱাউণ্ড (গোৱা)

(৫)

নবেৰ মাছৰ পৰা বেই মাছ
পৰ্যন্ত দৰ্শনমূল্যবান ভাল সময়।

ভেপুটি কলভাৰভেটল
অৰ কৰেট (লইল্ড
লাইফ) শপল গাঁৱ, ডি:
ভূনাগড় (গুজৰাট)

ডিচেৰ মাছৰ পৰা জুনা মাছ
নাছ ডাগিনকে দৰ্শনৰ বাবে
উপযুক্ত সময়।

ৰেঞ্জ অফিচাৰ, ভেনা-
ভাৱ নেচনেল পাৰ্ক,
ভেনাডাৰ, পো:
বলতিপুৰ ডি: ভাৱ-
নগৰ (গুজৰাট)

অক্টোবৰ মাছৰ পৰা জুনা মাছ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত
সময়।

ৰেঞ্জ অফিচাৰ, নল
সৰোবৰ ৱাৰ্ড চেফেগ্ৰাৰী,
ৰেকাৰিয়া, পো: চানদে,
ডি: আহমেদাবাদ (গুজৰাট)

নবেৰ মাছৰ পৰা ফ্ৰেগ্ৰাৰী
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে অনুকূল
সময়।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
বাণ্ জৱ কচ্ছৰ বনৰীয়া গাধ অভয়াৰণ্য	বনৰীয়া গাধ, নীল গাই, কুকুৰ-গোচীয়া বাঘ, চিন্কাৰা।	আহুদাবাদৰ পৰা ১৫৬ কিলোমিটাৰ আৰু ধৰাঙ্গাধাৰাৰ পৰা ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰ। বাজ্জাৰ পৰা মাত্ৰ ১০ কিলোমিটাৰ।	চেঞ্চোৱাৰী চুপাৰিচেট- ডেণ্ট, ৱাইল্ড এচ চেঞ্চোৱাৰী, ধাৰাঙ্গাধাৰা, জি: সুচেণ্ড নগৰ (গুজৰাট)	জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহৰ মাজ ভাগলৈকে দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।
ছেচৌৰ মুখ বিয়েৰ অভয়াৰণ্য	মুখ বিয়েৰ: না মাটি ভালুক আৰু নৰ-ভূমি এলেকাত ধাৰণতে বাস কৰা অন্যান্য স্থানপায়ী জন্তু আৰু চৰাই।	আহুদাবাদ বিমানকোঠৰ পৰা আৰু ধাৰাঙ্গাধাৰাৰ পৰা যাব পাৰি।	শ্বেচিয়েল চীফ কন্- চেণ্ট্ৰেল অৱ ফৰেষ্ট, (ৱাইল্ড লাইফ) গুজৰাট ষ্টেট পো: ভাদ্- দাৰা (গুজৰাট)	জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ সময়।
গোৰিণ চেঞ্চোৱাৰী বা উপকূলবতী অভয়াৰণ্য আৰু বেৰিণ নেচনেল পাৰ্ক	ফ্লেমিং পো: নামৰ বিচিত্ৰ হাঁহ- জাতীয় চৰাই আৰু গনাৰিধৰ সাগৰ আৰু সাগৰৰ উপকূল অঞ্চলত বাস কৰা সৰীসৃপ, নাহু, শায়ক আৰু পক্ষী- কুলৰ প্ৰাণী।	আহুদাবাদ বিমানকোঠ আৰু ধাৰাঙ্গাধাৰাৰ পৰা যাব পাৰি। যমুনগৰ নিকচই ওচৰত অভয়াৰণ্য আৰু নেচনেল পাৰ্কখন সন্নিৱিষ্ট।	শ্বেচিয়েল চীফ কন্- চেণ্ট্ৰেল অৱ ফৰেষ্ট, (ৱাইল্ড লাইফ) গুজ- ৰাট ষ্টেট পো: ভাদ্- দাৰা (গুজৰাট)	জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত সময়।
বগ্চন্দা নেচনেল পাৰ্ক	মৰুভূমিৰ ৰালিঅৰীয়া ঠাইৰ নিৰাকী বিচিত্ৰ প্ৰাণী।	আহুদাবাদ বিমানকোঠৰ পৰা যাব পাৰি।	শ্বেচিয়েল চীফ কন্- চেণ্ট্ৰেল অৱ ফৰেষ্ট, (ৱাইল্ড লাইফ) গুজ ৰাট ষ্টেট, ভাদুদাৰা (গুজৰাট)	জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহ পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট সময়।

(১)

বাবদা লায়ন
চেঞ্চোৱাবী
(অভয়াবণ্য)

(২)

ভাৰতীয় সিংহ সংৰক্ষণ
কৰিবৰ বাবে এই নতুন
অভয়াবণ্য গুজৰাট চলুকাৰে
প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।

(৩)

ভূনাগড় আৰু ভাৰ-
নপৰৰ পৰা এই অভয়া-
বণ্যলৈ যাতায়াত কৰিব
পাৰি ।

(৪)

শ্বেচিয়ল চীফ কন-
জাৰভেটৰ অৱ ফৰেষ্ট
(ৱাইল্ড লাইফ) গুজ-
ৰাট ষ্টেট পো: ভাদুদাৰা

(৫)

জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহ
পৰ্যন্ত অভয়াবণ্য দৰ্শনৰ উপযুক্ত
সময় ।

হিঙ্গল গড় নোচৰ
এভোকেচন
চেঞ্চোৱাবী

নোচৰ এভোকেচন বা প্ৰকৃতি
অৱলম্বন আৰু গবেষণাৰ বাবে
গুজৰাটৰ বাণ্ডা চৰকাৰে এই
অভয়াবণ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।

ৰাজকোটিৰ পৰা প্ৰায়
৫০ কিলোমিটাৰ
নিলগত অৱস্থিত ।

শ্বেচিয়াল চীফ কন-
জাৰভেটৰ অৱ ফৰেষ্ট,
(ৱাইল্ড লাইফ) গুজ-
ৰাট ষ্টেট, পো: ভাদুদাৰা
(গুজৰাট)

জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট সময় ।

নয়ন গৰোবৰ
প্ৰস্তাৱিত চিন্কাৰা
চেঞ্চোৱাবী বা
অভয়াবণ্য

চিন্কাৰা নাম: এণ্টেলপ্
ভাৰতীয় প্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে
এই অভয়াবণ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি-
বলৈ লোৱা হৈছে ।

আহমদাবাদ আৰু ৰাৰা-
ভাৰাৰ পৰা যাব
পাৰি ।

শ্বেচিয়াল চীফ কনজাৰ-
ভাৰভেটৰ অৱ ফৰেষ্ট
(ৱাইল্ড লাইফ) গুজ-
ৰাট ষ্টেট পো: ভাদুদাৰা
(গুজৰাট)

জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহ
পৰ্যন্ত দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত
সময় ।

ফ্লেমিং গো চেঞ্চো,
ৰাবী (প্ৰস্তাৱিত)
বা অভয়াবণ্য

গাখ্ অৱ কচ্ছৰ বিস্তীৰ্ণ
বালিৰীয়া এলেকাৰ মাজ
ভাগত থকা সৰোবৰ বিলাকত
ফ্লেমিংগো নামৰ অসংখ্য
বিচিত্ৰ ৰাজহাঁহ জাতীয় চৰায়ে
বাচিব বঁহ মাখি থাকে ।

আহমদাবাদ আৰু ৰাৰা-
ভাৰাৰ পৰা জীপ
গাড়ীৰে যোৱাৰ ব্যৱস্থা
কৰিব লাগিব ।

শ্বেচিয়ল চীফ কনজাৰ-
ভেটৰ অৱ ফৰেষ্ট
(ৱাইল্ড লাইফ) গুজৰাট
পো: ভাদুদাৰা
(গুজৰাট)

ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী মাহৰ পৰা
আৰম্ভ কৰি বছৰৰ বৰালি মাহ
কেইটাৰ সময়কালিত এই অভয়া-
বণ্য দৰ্শন কৰিব পাৰি ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
<p>পূৰ্ণ চেকোৱাৰী বা অভয়াবণা (প্ৰস্তাবিত)</p>	<p>তাতে কবী পাবি পোৱানি জগায় । এই জাতীয় অসংখ্য চৰাইৰে ভৰপূৰ অকলচৌক সামৰিলৈ গুজৰাট চৰকাৰে এই অভয়াবণখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লৈছে ।</p>	<p>এই প্ৰস্তাবিত অভয়া- বণখন দৰ্শন কৰিবলৈ কোন ঠাইৰ পৰা কি উপায়েৰে গলে সুবিধা হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে সঠিক ভাৱে জ্ঞান নাযায় ।</p>	<p>শ্বেচিমাল চীক কনজাব- ভেটব অৱ ফৰেষ্ট, (বাইল্ড লাইফ) গুজ- বাট ষ্টেট, পো: ভাদ্ৰাৰা (গুজৰাট)</p>	<p>খৰানি মহীয়া সময়খিনি দৰ্শনৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব ।</p>
<p>বতন মহল ৰায়ো- শ্বিষেৰ বিজাৰ্ত অথবা পৰ্য্যাবণ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল (প্ৰস্তাবিত)</p>	<p>গুজৰাট চৰকাৰৰ বনবিভাগে পঞ্চমহল জিলাৰ অন্তৰ্গত খকা বতন মহল নামৰ বিচিত্ৰ উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণী অধ্য- যিত এলেকাক সামৰি লৈ ৰায়োশ্বিষেৰ বিজাৰ্ত বা “পৰ্য্যাবণ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল” এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাৰতীয় ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ।</p>	<p>বতন মহল পৰ্য্যাবণ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নামৰ এলেকা দৰ্শনৰ্থ বাবে কোন ঠাইৰ পৰা গলে সুবিধা হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে বিতং বিবৰণ এতিয়াও নিৰ্দিষ্ট হোৱা নাই ।</p>	<p>শ্বেচিমাল চীক কন- জাৰ্ভেটব অৱ ফৰেষ্ট, (বাইল্ড লাইফ) গুজৰাট ষ্টেট পো: ভাদ্ৰাৰা (গুজৰাট)</p>	<p>খৰানি মহীয়া সময়খিনি পূৰ্বা বৰণ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল দৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট সময় হ'ব বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে ।</p>

অসম
(পৰিপূৰক তালিকা)

(১) বৰনগী অভয়াৰণ্য	(২) পিপ্পি হগ্ বা বল-গাহবি আৰু ললৰবিয়া নামৰ দুবিধ আপুৰুপীয়া শ্ৰানীৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে ১৯৮০ চনত এই অভয়াৰণ্যখন প্রতিষ্ঠিত হৈছিল।	(৩) গুৱাহাটীৰ পৰা নিজৰ গাড়ীৰে বা বাছেৰে যাব পাৰি। দুবছৰ প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ। যজ্ঞদৈৰ পৰাও যাব পাৰি।	(৪) ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন, পো: 'তেজ- পুৰ, জিলা শোণিতপুৰ (অসম)	(৫) বৰনগী বিজাৰ্ডৰ কিনাৰত থকা নতুন নামৰ ঠাইত ৰেজ অফিচ আৰু এটা পৰিদৰ্শন বঙলা আছে। বৰনগী নামৰ ভিতৰুৱা ঠাইতো আন এটা জিৰণি ঘৰ আছে।
কছুগাঁও গেইন্ বিজাৰ্ড বা বৃগয়াৰন	সোণালী হনুমান বাগৰ আৰু অগ্ন্যান্য জাতৰ থলুৱা পশু- পক্ষী।	গুৱাহাটীৰপৰা কছুগাঁৱলৈ বাছেৰে বা মটৰ গাড়ীৰে যাব পাৰি। দুবছৰ প্ৰায় ৪৬০ কিলোমিটাৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, কছুগাঁও ডিভিজন, পো: গোসাঁই গাঁও।	কছুগাঁও, ৰাইনা আৰু যমদুৱাৰত বনবিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলা আছে।
নাৰেবি অভয়াৰণ্য	হাতী, গৌড়, বনৰীয়া ম'হ, বাঘ প্রভৃতি স্তম্ভ আৰু যেনে মইনা, দেও-ডৰিক, বন- বুকুৰা, ভাটী প্রভৃতি চৰাই। জীয়া-ভলী নদীত বৰশীৰে মাছ ধৰিব পাৰি।	তেজপুৰৰ পৰা চাৰি- দুৱাৰেলি প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ দূৰ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন, পো: তেজপুৰ, জিলা-শোণিতপুৰ(অসম)	ভালুকপু: নামৰ ঠাইত পৰ্বত বিভাগৰ বঙলা আছে।

(১) দীপৰ বিন অভয়া- বণ্য (প্রত্যাহিত)	(২) নানা জাতৰ বন্যকাৰী বন- বীয়া হাঁহ আৰু বগলী, কণা- মুচৰি আদি জনবিলাসী থলুৱা চৰাই ।	(৩) গুৱাহাটী মহনগৰীৰপৰা মাত্ৰ ১২ কিলোমিটাৰ মান হ'ব ।	(৪) ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, পূব গুৱাহাটী ডিভিজন, পোঃ গুৱাহাটী (অসম)	(৫) চক্ৰবেৰ্ত্তী নামৰ ঠাইত বনবিভাগৰ এটা অফিচ থকা আছে ।
ডিব্ৰু-ছৈখোৱা অভয়াবণ্য	“গুৱপাৰিৰ দেওহাঁহ” নামৰ লুপ্তপ্ৰায় পক্ষী ধকাৰ সম্ভাৱনা আছে । হাতী, বাঘ, বনৰীয়া- ম'হ, শৰপহ, খঁটয়া-হৰিণ, সুবগী পহু আদি ঘানী আছে । নানা জাতৰ জনবিলাসী আৰু বৃক্ষাৰোহী পক্ষীও দেখা যায় ।	তিন্ চুকীয়াৰপৰা ডিব্ৰু- বিজাৰ্ভৰ গুইজান, লাইকা, দীঘল-ভৰজ প্রভৃতি ঠাইলৈ মটৰ গাড়ীৰে যাব পাৰি । গুইজানলৈ দূৰত্ব প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, ডিব্ৰুগড় ডিভিজন, পোঃ ডিব্ৰুগড়, জি: ডিব্ৰু- গড় (অসম)	তিন্ চুকীয়া আৰু গুইজানত বনবিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলা আছে ।
পানীতিহিঃ পক্ষী- বৈহাৰ অভয়াবণ্য (প্রত্যাহিত)	দেওবাৰজহাঁহ, বুডৰাজ, মানাৰ্ভ, দীঘলী হাঁহ, শৰালি, বিলা প্রভৃতি বন্যকাৰী পানী- হাঁহ আৰু বগলী, কণামুচৰি ভাউক, কাম চৰাই বৰ- টোকোনা প্রভৃতি জনবিলাসী থলুৱা চৰাই ।	শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা মাত্ৰ ২০ কিলোমিটাৰ মান দূৰত্ব অৱস্থিত ।	ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফি- চাৰ, শিৱসাগৰ ডিভি- জন পোঃ যোৰহাট, জি: শিৱসাগৰ (অসম)	শিৱসাগৰত এটা পৰ্যটন বিভাগৰ নিৰ্মাণ আছে । আগতীয়াকৈ অনুমতি লৈ যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰত থকা আৱৰ্ত্ত ভৱনতো ধাকিব পাৰি ।

-: সমাপ্ত :-